

**Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene**

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren					
		6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	9–14	15–17	ab 18
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) <sup>e</sup>	A (ggf. N) <sup>e</sup>	A (ggf. N) <sup>e</sup>
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) <sup>e</sup>	A (ggf. N) <sup>e</sup>	A (ggf. N) <sup>e</sup>
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) <sup>e</sup>	A (ggf. N) <sup>e</sup>	A (ggf. N) <sup>e</sup>
Hib <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N					
Poliomyelitis		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N	A1		ggf. N		
Hepatitis B		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N					
Pneumokokken <sup>a</sup>		G1		G2	G3	N				S <sup>g</sup>		
Rotaviren	G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)									
Meningokokken C						G1 (ab 12 Monaten)		N				
Masern						G1	G2	N		S <sup>f</sup>		
Mumps, Roteln						G1	G2	N				
Varizellen						G1	G2	N				
Influenza										S (jährlich)		
HPV Humane Papillomviren								G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>	N <sup>d</sup>		

**Erläuterungen**

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teiliimpfungen G1–G4)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

N Nachholimpfung  
(Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw.  
Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen

b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.

d Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff) mit 2 Dosen im Abstand von 6 Monaten, bei Nachholimpfung im Alter &gt; 13 bzw. &gt; 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von &lt; 6 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

f Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, mit einem MMR-Impfstoff

g Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff