

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission
(STIKO), 2014.
www.stiko.de



Sprache: **Deutsch**

ALTER	(in Wochen)	Säuglinge (in Monaten)			Kleinkinder		Kinder (in Jahren)			Jugendliche	Erwachsene		
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	ab 18	ab 60
IMPfung			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2		A	f	(alle 10 Jahre, ggf. N)
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2		A	f	(alle 10 Jahre, ggf. N)
Keuchhusten <i>Pertussis</i>		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2		A	f	(ggf. N)
Kinderlähmung <i>Poliomyelitis</i>		G1	G2 ^a	G3	G4	N			A1				ggf. N
Hepatitis B		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Hib <i>Haemophilus influenzae Typ b</i>		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Pneumokokken		G1	G2	G3	G4	N						S ^c	
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)										
Meningokokken Serogruppe C					G1 (ab 12 Monaten)		N						
Masern					G1	G2	N					S ^d	
Mumps Röteln					G1	G2	N						
Windpocken Varizellen					G1	G2	N						
Grippe Influenza												S (jährlich)	
HPV Humane Papillomviren							G1 ^e	G2 ^e	N ^e				

Nächste Impftermine



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- S** STANDARDIMPFUNG
- A** AUFRISCHIMPFUNG
- N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** **J** Früherkennungsuntersuchung
Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- b** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c** Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.

- d** Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- e** Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9 – 13 bzw. 9 – 14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff), Anzahl der Impfstoffdosen siehe Fachinformation!
- f** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.