

## Préparation et riposte aux situations d'urgence

### Virus Zika: information pour les voyageurs se rendant dans les pays affectés

15 février 2016

Les voyageurs doivent se tenir informés au sujet du virus Zika et des maladies transmises par les moustiques; ils doivent consulter les autorités sanitaires locales ou celles en charge des voyages s'ils sont concernés.

En relation avec la maladie à virus Zika et sur la base des données disponibles, l'OMS ne recommande pas d'appliquer des restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux. Le risque de transmission ultérieure est faible, voire nul, dans les pays notifiant des cas sporadiques d'infection par le virus Zika chez des voyageurs en provenance de pays affectés.

À titre de précaution, certains gouvernements nationaux peuvent diffuser dans leurs populations des recommandations concernant la santé publique et les voyages, sur la base de leur évaluation des données disponibles et des facteurs de risque locaux.

#### **Mesures de précaution pour les femmes enceintes et celles qui envisagent une grossesse**

Sur la base des dernières informations mettant en évidence un lien possible entre l'infection à virus Zika pendant la grossesse et la microcéphalie du nouveau-né, l'OMS publie de nouvelles mesures de précaution pour les voyages à l'intention des femmes enceintes et de leurs partenaires sexuels.

Les femmes enceintes doivent parler de leurs projets de voyage avec leur prestataire de soins et envisager de différer le voyage vers toute zone où des infections à virus Zika sont contractées localement.

Le virus Zika est transmis par les moustiques, pas par contact d'une personne à l'autre, bien qu'on ait documenté un petit nombre de cas de transmission sexuelle.

On a trouvé le virus Zika dans le sperme humain. Deux rapports ont décrit des cas où il a été transmis d'une personne à l'autre lors de rapports sexuels.

Jusqu'à ce que l'on en sache plus à propos du risque de transmission sexuelle, tous les hommes et toutes les femmes revenant de régions où le virus Zika est en circulation, notamment les femmes enceintes et leurs partenaires, doivent avoir des rapports sexuels protégés en

utilisant correctement et régulièrement des préservatifs.

Tous les voyageurs, y compris les femmes enceintes, se rendant dans une région où des infections à virus Zika sont contractées localement doivent respecter scrupuleusement les mesures permettant d'éviter les piqûres de moustiques pendant le voyage:

- appliquer des produits répulsifs contenant du DEET. Ces répulsifs doivent être utilisés en respectant strictement le mode d'emploi indiqué;
- porter des vêtements (de préférence de couleur claire) couvrant le plus possible le corps;
- mettre des obstacles physiques comme par exemple, des écrans anti-insectes, en fermant les portes et fenêtres;
- dormir sous des moustiquaires notamment en journée lors que les moustiques sont les plus actifs;
- vider, nettoyer ou couvrir tous les contenants susceptibles de retenir l'eau même en petite quantité, comme les seaux, les pots de fleurs ou les pneus, de façon à éliminer les endroits où les moustiques peuvent se reproduire.

---

---

## **Virus Zika et microcéphalie**

»

Toutes les informations concernant l'urgence mondiale de santé publique concernant le virus Zika

---

### **Maladie à virus Zika**

[Principaux repères sur la maladie à virus Zika](#)

[Questions-réponses sur la maladie à virus Zika](#)

### **Microcéphalie**

[Microcéphalie](#)

[Microcéphalie et maladie à virus Zika: réponses aux questions des femmes](#)

### **Syndrome de Guillain–Barré**

[Principaux repère sur le syndrome de Guillain–Barré](#)