

Respuesta de los CDC frente al zika

El zika y las relaciones sexuales: Información para las mujeres embarazadas que viven en áreas con zika



Qué sabemos

- ◆ El virus del Zika puede transmitirse de un hombre que padezca la enfermedad a sus parejas sexuales.
- ◆ En los casos conocidos de transmisión sexual, los hombres tenían síntomas del zika. A partir de estos casos, sabemos que el virus puede transmitirse cuando el hombre presenta síntomas, antes de la aparición de los síntomas y después de que desaparecen.
- ◆ El virus permanece en el semen durante más tiempo que en la sangre.



Qué no sabemos

- ◆ Cuánto tiempo puede permanecer el virus del Zika en el semen de hombres infectados o cuánto tiempo puede transmitirse a través de las relaciones sexuales.
- ◆ Si los hombres que padecieron el zika y nunca presentaron síntomas, pueden contener el virus en el semen o transmitirlo a través de las relaciones sexuales.
- ◆ Si una mujer puede transmitir el virus del Zika a sus parejas sexuales.

Lo que debe saber acerca del zika y las relaciones sexuales

Como el zika puede causar ciertos defectos congénitos, tome medidas para evitar la infección durante el embarazo.

Siempre que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales (boca-pene), use condón de principio a fin, durante el embarazo de su pareja.



No tenga relaciones sexuales durante el embarazo.

Si piensa que su pareja masculina puede tener o ha tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica

- ◆ Si él ha tomado medidas para evitar las picaduras de mosquitos.
- ◆ Si usted tuvo relaciones sexuales sin condón.



www.cdc.gov/zika



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention