



Prévalence de l'anémie et paludisme selon l'âge

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant testés positifs pour le paludisme selon la microscopie et pourcentage ayant l'anémie sévère (l'hémoglobine <8,0g/dl)



Prévalence du paludisme par région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant testés positifs pour le paludisme selon la microscopie



Taux de couverture et méthodologie : Tous les enfants de 6-59 mois des ménages sélectionnés étaient éligibles pour subir le test d'hémoglobine et les tests de dépistage du paludisme. Pour le diagnostic du paludisme, deux prélèvements de sang capillaire ont été effectués : un Test de Dépistage rapide (TDR) et un examen microscopique. La mesure de niveau d'hémoglobine pour l'anémie a été effectuée en utilisant le système HemoCue. Parmi les 6 029 enfants éligibles, 98 % ont subi le test TDR, 97 % la microscopie et 98 % l'anémie.



Pour plus de renseignements sur l'EIPBF 2014, contacter :

Au Burkina Faso :

Direction Générale de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD),
01 BP 374, Ouagadougou 101, Burkina Faso ;
Téléphone : (226) 5047-8051, Fax : (226) 5037-6226
E-mail : insd@insd.bf ou insdbf@yahoo.fr ;
www.insd.bf.

Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP),
03 BP 7009, Ouagadougou 03, Burkina Faso ;
Téléphone : (226) 5032-6932

Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP),

01 BP 2208, Ouagadougou 101, Burkina Faso ;
Téléphone : (226) 5032-4695/5032-4696 ;
E-mail : cnrfp@fasonet.bf

Aux États-Unis :

The DHS Program
530 Gaither Road, Suite 500
Rockville, MD 20850 USA
Téléphone: +1-301-407-6500 ; Fax: +1-301-407-6501
E-mail : info@DHSprogram.com
www.DHSprogram.com ; STATcompiler.com

L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme a été effectuée au Burkina Faso du 28 septembre au 28 novembre 2014 (EIPBF 2014). Elle a été préparé par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie, Direction de la Démographie (INSD/DD), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et le laboratoire du Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP) en coordination avec ICF International. Le financement a été assuré par l'USAID pour l'assistance technique d'ICF et les achats de matériels, et par le Fonds Mondial pour les coûts locaux.



Le Fonds mondial



Enquête sur les Indicateurs du Paludisme 2014

Dépliant



Burkina Faso


Enquête sur les Indicateurs du Paludisme Burkina Faso (EIPBF) 2014

L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Burkina Faso (EIPBF) 2014 fournit des données des indicateurs du paludisme tels que la prévention du paludisme, le traitement des enfants et la prévalence du paludisme et de l'anémie pour guider la planification, le suivi et l'évaluation des programmes de santé.

Tendances de la possession des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) par résidence

Pourcentage des ménages avec au moins une MII

■ EDSBF 2010 ■ EIPBF 2014




Possession, accès et utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)

Pourcentage de :

Ménages


Population de fait des ménages



*Supposant une MII pour chaque 2 personnes

Couverture universelle et PID par région


Pourcentage des ménages avec au moins une MII pour 2 personnes et/ou la pulvérisation intradomestique d'insecticide résiduel (PID) au cours des 6 derniers mois



Tendances de l'utilisation des MII

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une MII la nuit dernière


■ EDSBF 2010 ■ EIPBF 2014



Tendances du traitement préventif intermittent durant la grossesse (TPIg)

Pourcentage des femmes enceintes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années qui ont pris :

■ EDSBF 2010 ■ EIPBF 2014



*Au moins une dose au cours d'une visite prénatale

Diagnostic et traitement de la fièvre chez les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 derniers semaines à qui :

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre et ayant pris des antipaludiques, pourcentage qui ont pris :

