

ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 2011

EDADES VACUNAS (anti)	RECIÉN NACIDO	rangos de edad recomendados			vacunación de enganche			valoración preadolescente			
		1 MES	2 MESES	4 MESES	6 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	24 MESES	4 - 6 AÑOS	7 - 9 AÑOS
TUBERCULOSIS (BCG)	BCG	BCG			BCG			BCG (hasta 14 años)			
HEPATITIS B	HEP B1	HEP B2			HEP B3			HEPATITIS B			
POLIO (VPI / VPO)		POLIO	POLIO	POLIO	POLIO			POLIO			
DTPa / DTP/dTpa (difteria-tétanos-tosferina)		DTPa / DTP	DTPa / DTP	DTPa / DTP	DTPa / DTP			DTPa / DTP	dTpa		
HAEMOPHILUS INFLUENZAE tipo B		Hib	Hib	Hib	Hib			Hib			
TRIVALENTE VIRAL (sarampión-rubéola-paperas)					TRIVALENTE VIRAL 1			TRIVAL 2	TRIVALENTE VIRAL		
NEUMOCOCO		NEUMO CONJUGADA	NEUMO CONJUGADA	NEUMO CONJUGADA	NEUMO CONJUGADA			NEUMO CONJUGADA	NEUMO POLISACARIDA		
VARICELA (LECHINA)					VARICELA			VARICELA			
HEPATITIS A					HEPATITIS A			HEPATITIS A			
INFLUENZA (ANTIGRI PAL)		ANUALMENTE (Solo 1 dosis, 2 dosis entre 6 meses y 8 años a primovacunados)									
FIEBRE AMARILLA					≥ 9 meses			FIEBRE AMARILLA (refuerzo cada 10 años)			
MENINGOCOCO A+C MENING. C conjugada		Conjugda	Conjugda		MENIG. CONJUGADA			MENIG. CONJUGADA	MENIG. POLISACARIDA		
ROTA VIRUS		RV1/RV5	RV1/RV5	RV5							
Virus Papi loma Humano		En espera de aprobación									

Fuente: Modificado por nuevas vacunas del Calendario de Inmunizaciones, Manual SVPP. Julio 2011