

Santé de la mère au Sénégal selon l'Enquête Continue 2014

L'Enquête Continue au Sénégal collecte des données chaque année pour atteindre deux objectifs :

- 1) Répondre aux besoins permanents en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé et de population.
- 2) Renforcer des capacités des institutions du Sénégal dans le domaine de la collecte et de l'utilisation des données.


L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en collaboration avec le Ministère de la Santé et l'Action Sociale (MSAS), est chargée de la mise en œuvre de l'Enquête Continue qui comporte deux volets :

- Le volet ménage : appelé l'Enquête Démographique et de Santé (EDS-Continue), qui collecte des données auprès des membres des ménages, des femmes, des hommes et des enfants de moins de cinq ans.
- Le volet structures de santé : appelé l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS), qui collecte des données auprès des structures de santé, des prestataires de soins de santé et des clients des structures de santé.


DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ MATERNELLE ET DU PERSONNEL FORMÉ

Disponibilité des services de santé maternelle

Parmi tous les hôpitaux, centres de santé et postes de santé (N=363), pourcentage offrant des services spécifiques de maternité



Plus de **3** structures de santé sur **4** offrent des soins prénatals et des services d'accouchement normal.



© Doctor by Andrew McKinley et icônes avec la permission de The Noun Project

1 prestataire sur **10** a reçu une formation sur la Prise en Charge Intégrée de la Grossesse et l'Accouchement au cours de 24 derniers mois.

SOINS PRÉNATALS



Icônes avec la permission de The Noun Project

48 % des femmes ont effectué au moins les 4 visites prénatales recommandées.


COMPOSANTS DES CONSULTATIONS PRÉNATALES (CPN)

Dans **100 %** des consultations observées, le prestataire a mesuré la pression artérielle et dans **99 %** des cas, le prestataire a mesuré le poids de la femme.


Consultations observées pour les femmes enceintes venues en CPN

Pourcentage des femmes enceintes venues en CPN (N=1 211)


EXAMEN PHYSIQUE DE BASE



INTERVENTIONS PRÉVENTIVES



VACCINATION ANTITÉTANIQUE



Pour **84 %** des mères, la dernière naissance a été protégée contre le tétanos néonatal.




© 2013 Diana Mrazikova, Networks, Senegal, avec la permission de Phototshare.

ACCOUCHEMENT

Assistance lors de l'accouchement par région

Pourcentage de naissances vivantes au cours des cinq dernières années assistées par un prestataire formé (médecin, sage-femme, infirmier/infirmières chefs de poste)




Ces résultats sont basés sur les données agrégées de 2012-2013 et 2014

59 % des accouchements ont été assistés par un médecin, sage-femme ou infirmier/infirmière chef de poste.


SERVICES D'ACCOUCHEMENT NORMAL

Normes, protocoles et équipement pour les services d'accouchement

Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé offrant des services d'accouchement normal (N=279), pourcentage ayant :



SOINS POSTNATALS



© Breastfeeding par Edward Boatman avec la permission de The Noun Project


Plus de **3** femmes sur **4** ont reçu des soins postnatals dans les deux jours après la naissance.

58 % des structures de santé offrant des services d'accouchement normal disposent du transport d'urgence.

SOINS D'URGENCE OBSTÉTRICALE

Activités essentielles en cas d'alerte pour les soins d'urgence obstétricale


Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé offrant des services d'accouchement normal (N=279), pourcentage qui ont effectué les services suivants au moins une fois durant les trois mois ayant précédé l'enquête :



99 % des structures de santé offrant des services d'accouchement normal ont effectué, au moins une fois, l'assistance à l'accouchement par voie basse au cours des trois derniers mois.

5 % des structures de santé offrant des services d'accouchement normal ont effectuée, au moins une fois, une césarienne au cours de la même période.

PALUDISME



Icônes avec la permission de The Noun Project

2 femmes enceintes sur **5** ont reçu un traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse.

Disponibilité des MII dans les structures offrant des services de consultation prénatale par région

Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé qui offrent des consultations prénatales (N=329), pourcentage qui distribuent et avaient en stock des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)

