

Prévalence



L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme
À Madagascar (EIPMD) 2011


- **Prévalence de l'anémie**
- Prévalence du paludisme

Couverture des tests

- 97 % d'enfants de 6-59 mois ayant été testés pour l'anémie
- 97 % d'enfants de 6-59 mois ayant été testés pour le paludisme par le test diagnostique rapide
- 97 % d'enfants de 6-59 mois ayant été testés pour le paludisme par la goutte épaisse et frottis mince


Prévalence de l'anémie

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois atteints de l'anémie



Prévalence de l'anémie par âge


Pourcentage d'enfants de 6-59 mois atteints de l'anémie



- Prévalence de l'anémie
- **Prévalence du paludisme**

Prévalence du paludisme par âge


Pourcentage d'enfants de 6-59 mois positifs à la goutte épaisse



Prévalence du paludisme selon les faciès de transmission du paludisme

Madagascar
6 %


*Pourcentage d'enfants de
6-59 mois positifs à la
goutte épaisse*



Prévalence du paludisme selon les faciès opérationnels

Madagascar
6 %


*Pourcentage d'enfants de
6-59 mois positifs à la
goutte épaisse*



Prévalence du paludisme par les zones d'intervention MID

Madagascar
6 %

*Pourcentage d'enfants de
6-59 mois positifs à la
goutte épaisse*



Principaux résultats

- **54 %** d'enfants sont atteints de **l'anémie**, la plupart sous forme légère.
- **6 %** d'enfants ayant été testés positifs à la goutte épaisse du paludisme.
- Prévalence du **paludisme** chez les enfants est **la plus élevée** dans le faciès de transmission du paludisme de **l'Équatorial** et dans le faciès opérationnel de **l'Est**.