

Traitement



L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme
À Madagascar (EIPMD) 2011

- **Traitement préventif des femmes enceintes**
- Traitement des enfants


Traitement Préventif Intermittent

Le traitement préventif intermittent (TPIg) consiste à administrer la :

- **SP/Fansidar**
- au cours des **visites prénatales** après le premier trimestre
- Au moins 2 fois


Traitement préventif chez la femme enceinte

Pourcentage des femmes qui ont pris des antipaludéens à titre préventif pendant leur dernière grossesse qui ont



TPIg selon les faciès de transmission du paludisme

Madagascar
20 %




Pourcentage de femmes ayant pris deux doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale

■ Zone non enquêtée

TPIg selon les faciès opérationnels

Madagascar
20 %



Pourcentage de femmes ayant pris deux doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale

TPIg par les zones d'intervention


Madagascar
20 %

Districts non- ciblés
7 %

Districts ciblés
22 %

*Pourcentage de femmes
ayant pris deux
doses ou plus de
SP/Fansidar et
qui en ont reçu
au moins une au
cours d'une visite
prénatale*

■ Zone non enquêtée




- Traitement préventif des femmes enceintes
- **Traitement des enfants**

Traitement des enfants


Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans

Parmi les enfants ayant eu de la fièvre




Traitement des enfants

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines avant l'enquête, pourcentage d'enfants ayant pris



Traitement précoce des enfants

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines avant l'enquête, pourcentage d'enfants ayant pris le jour même où a débuté la fièvre



Principaux résultats

- **31 %** de femmes ont pris de la **SP/Fansidar** au cours d'une visite prénatale et **20 %** en ont pris 2 doses ou plus au cours des visites prénatales
- **15 %** d'enfants moins de 5 ans **ayant eu de la fièvre** dans les deux semaines avant l'enquête. Parmi eux:
 - À **6 %** on a **prélevé du sang** au doigt ou au talon **pour être testé**
 - **20 %** ayant pris des **antipaludiques**
 - **6 %** ayant pris un **antipaludique** (non compris la chloroquine) **le jour où a débuté la fièvre**