

ПЕРЕЧЕНЬ Антиретровирусных Препаратов

Лекарственные препараты, лицензированные для применения в Европейском Союзе на АПРЕЛЬ 2018

nam
aidsmap

ОБЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ФОРМА ВЫПУСКА	СТАНДАРТНАЯ ВЗРОСЛАЯ ДОЗИРОВКА	ТАБ / ДЕНЬ	ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ	ДИЕТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
РЕЖИМ ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ						
Эфавиренз/ эмтрицитабин/ тенофовир дизопроксил	Генерик, внешний вид различается	Таблетки, содержащие, Эфавиренз 600 мг, Эмтрицитабин 200 мг, Тенофовир дизопроксил 245 мг	Одна таблетка один раз в день	1	Часто встречающиеся: бессонница (нарушения сна), утомляемость, необычные сновидения, нарушения концентрации внимания, головокружение, сыпь, зуд, тошнота, рвота, диарея, сухость во рту, головная боль, беспокойство, депрессия, повышение уровня печеночных ферментов, потемнение уровня креатинкиназы и амилазы, потемнение (гиперpigментация) кожи, снижение уровня фосфата крови, слабость, боли в животе, метеоризм (вздутье живота), расстройство желудка, потеря аппетита, сахарный диабет Редко встречающиеся: аллергические реакции, лактоацидоз, психоз, нарушение функций печени	Принимать натощак, желательно перед сном
Рилпивирин/ эмтрицитабин/ тенофовир дизопроксил	Эвиллера	Таблетки, содержащие, Рилпивирин 25 мг, Эмтрицитабин 200 мг, Тенофовир 245 мг	Одна таблетка один раз в день	1	Часто встречающиеся: Повышение уровня холестерина, потеря аппетита, депрессия, нарушения сна, аномальные сны, сонливость, тошнота, рвота, диарея, головокружение, бессонница, головная боль, слабость, сыпь, зуд, боль в животе, сухость во рту, усталость, вздутие живота, метеоризм, потемнение кожи, низкий уровень лейкоцитов Редко встречающиеся: лактоацидоз почечная недостаточность	Принимать во время еды
Рилпивирин/ тенофовир алафенамид/ эмтрицитабин	Одифсей	Таблетки, содержащие Рилпивирин 25 мг, Тенофовир алафенамид 25 мг, Эмтрицитабин 200 мг	Одна таблетка один раз в день	1	Часто встречающиеся: необычные сновидения, головная боль, головокружение, тошнота, диарея, боль в животе, метеоризм, сыпь, усталость Редко встречающиеся: депрессия, отек кожи, лица, губ, языка или горла	Принимать во время еды
Элвите格拉维/ кобицистат/ эмтрицитабин/ тенофовир алафенамид	Дженевоя	Таблетки, содержащие, Элвите格拉维 150 мг, кобицистат 150 мг, Эмтрицитабин 200 мг Тенофовир алафенамид 10 мг	Одна таблетка один раз в день	1	Часто встречающиеся: Проблемы со сном, необычные сновидения, депрессия, головная боль, головокружение, потеря аппетита, тошнота, абдоминальная боль, рвота, сухость во рту, расстройство желудка, метеоризм, диарея, сыпь, усталость Редко встречающиеся: Сильная сыпь и лихорадка	Принимать во время еды
Элвите格拉维/ кобицистат/ эмтрицитабин/ тенофовир дизопроксил	Стрибид	Таблетки, содержащие, 150 мг Элвите格拉维, 150 мг кобицистат, 200 мг эмтрицитабин, 245 мг тенофовир	Одна таблетка один раз в день	1	Часто встречающиеся: тошнота, диарея, необычные сновидения, головная боль, усталость, головокружение, бессонница, кожная сыпь, метеоризм, сонливость Редко встречающиеся: тяжелое нарушение функции печени или почек, снижение плотности костной ткани	Принимать во время еды
Долутегравир/ абакавир/ ламитивудин	Триумек	Таблетки, содержащие, 50 мг долутегравира, 600 мг абакавира, 300 мг ламитивудина	Одна таблетка один раз в день	1	Часто встречающиеся: Проблемы со сном, сонливость, необычные сновидения, депрессия, головная боль, диарея, тошнота, усталость, сывь, зуд, боль в животе, головокружение, выпадение волос, депрессия, метеоризм, боль в животе, вздутие живота, боль в мышцах и дискомфорт, боль в суставах, насморк, кашель, несварение, желудочный рефлюкс и потеря аппетита Редко встречающиеся: аллергическая (гиперчувствительность) реакция, лактоацидоз, синцитидные мысли	Принимать во время еды или натощак
Дарунавир/ кобицистат/ эмтрицитабин/ тенофовир алафенамид	Симтуза	Таблетки, содержащие, 800 мг дарунавира, 150 мг кобицистата, 200 мг эмтрицитабина, 10 мг тенофовира алафенамида	Одна таблетка один раз в день	1	Часто встречающиеся: аллергическая реакция (гиперчувствительность), потеря аппетита, необычные сновидения, диабет, повышение липидов крови, нарушение функции печени и поджелудочной железы, головная боль, головокружение, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, вздутие живота, расстройство желудка, метеоризм, отек лица, сывь, зуд, боль в суставах или мышцах, усталость, слабое чувство Редко встречающиеся: Сильная сыпь с лихорадкой (синдром Стивенса-Джонсона) Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)	Принимать во время еды
НУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ (НИОТ)						
Эмтрицитабин	Эмтриева	Капсулы 200 мг	200 мг 1 раз в день	1	Часто встречающиеся: тошнота, диарея, головная боль, повышение уровня креатинкиназы, потемнение (гиперpigментация) кожи Редко встречающиеся: лактоацидоз, нарушение функций печени	Принимать во время еды или натощак
Ламитивудин	Генерик, внешний вид различается	Таблетки по 150, 300 мг	1 таблетка 150 мг два раза в день или 300 мг в сутки однократно	2	Часто встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, головная боль, боль в животе, алопеция, лихорадка, бессонница (нарушение сна), сывь, усталость, боль в суставах Редко встречающиеся: лактоацидоз, нарушение функции печени	Принимать во время еды или натощак
Тенофовир	Генерик, внешний вид различается	Таблетки 245 мг	245 мг в день	1	Часто встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, повышенное газо выделение, головокружение, снижение уровня фосфата крови, слабость, сывь, головная боль, боль в животе, усталость, метеоризм (вздутье живота) Редко встречающиеся: нарушение функции почек, снижение плотности костной ткани	Принимать во время еды
Зидовудин	Генерик, внешний вид различается	Капсулы 250 мг	250 мг дважды в день фиксированной комбинацией	2	Часто встречающиеся: тошнота, рвота, утомляемость, головная боль, головокружение, слабость, боли в мышцах, потеря аппетита, лихорадочное состояние Редко встречающиеся: нарушение кроветворения, липотрофия, лактоацидоз, нарушение функции печени, панкреатит	Принимать во время еды или натощак
НИОТ С ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИЕЙ						
Абакавир/ Ламитивудин	Генерик, внешний вид различается	Таблетки, содержащие, абакавира 600 мг +ламитивудин 300 мг	Одна таблетка в сутки	1	Часто встречающиеся: головная боль, боль в животе, выпадение волос, бессонница, усталость, потеря аппетита, боль в суставах Редко встречающиеся: аллергическая (гиперчувствительность) реакция, лактоацидоз	Принимать во время еды или натощак
Эмтрицитабин/ Тенофовир дизопроксил	Тревада	Таблетки, содержащие, эмтрицитабин 200 мг + тенофовир 245 мг	Одна таблетка в сутки	1	Часто встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, бессонница, необычные сновидения, головная боль, головокружение, аллергическая реакция, сывь, зуд, слабость, боли в животе, усталость, метеоризм, изжога, повышенный уровень сахара в крови, повышение уровня печеночных ферментов, повышение уровня креатинкиназы и амилазы, низкий уровень фосфата крови, потемнение кожи, низкий уровень лейкоцитов Редко встречающиеся: почечная недостаточность, лактоацидоз, истончение костей, панкреатит	Рекомендуется принимать во время еды, но может приниматься и натощак
Эмтрицитабин/ Тенофовир алафенамид	Дескази	Таблетки, содержащие, 200 мг эмтрицитабина+10 мг или 25мг тенофовира алафенамида	Одна таблетка в сутки	1	Часто встречающиеся: головная боль, головокружение, необычные сновидения, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, метеоризм, расстройство желудка, сывь, усталость Редко встречающиеся: отек кожи, лица, губ, языка или горла, боли в суставах, анемии	Принимать во время еды или натощак
Зидовудин/ Ламитивудин	Генерик, внешний вид различается	Таблетки, содержащие, зидовудин 300 мг + ламитивудин 150 мг	Одна таблетка два раза в день	2	Часто встречающиеся: Тошнота, рвота, диарея, усталость, головная боль, головокружение, слабость, мышечная боль, потеря аппетита, лихорадка, боль в животе, выпадение волос, бессонница, сывь, кашель, насморк, боль в суставах или мышцах, липотрофия, анемия, низкий уровень лейкоцитов Редко встречающиеся: Нарушение функций печени, тяжелая анемия, лактоацидоз	Принимать во время еды или натощак

ОБЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ФОРМА ВЫПУСКА	СТАНДАРТНАЯ ВЗРОСЛАЯ ДОЗИРОВКА	ТАБ / ДЕНЬ	ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ	ДИЕТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИНГИБИТОРЫ ИНТЕГРАЗЫ						
Долутегравир	Тивикай	Таблетка 50 мг	1 таблетка 1 раз в сутки или 50 мг дважды в день, если принимать с эфавирензом, невирапином или тирагравиром, или для ВИЧ резистентного к ингибиторам интегразы	1 или 2	Часто встречающиеся: Тошнота, диарея, головная боль, сыпь, зуд, рвота, боль в животе или дискомфорт, головокружение, аномальные сны, усталость, метеоризм, увеличение ферментов печени, увеличение креатинфосфокиназы (ферменты произведенные в мышцах) Редко встречающиеся: аллергическая (гиперчувствительность) реакция (сыпь, лихорадка, мышечная боль, болдыри), нарушение функции печени	Принимать во время еды или натощак
Ралтегравир	Исентресс	Таблетка 400 мг	2 раза в сутки по одной таблетке	2	Часто встречающиеся: потеря аппетита, головная боль, проблемы со сном, необычные сновидения, депрессия, головокружение, беспокойство, боль в животе, вздутие живота, метеоризм, диарея, тошнота, рвота, расстройство желудка, сыпь, слабость, усталость, лихорадка, нарушение функции печени и поджелудочной железы Редко встречающиеся: аллергическая (гиперчувствительность) реакция (сыпь, лихорадка, мышечная боль, болдыри), суицидальные мысли и поведение, печеночная недостаточность, почечная недостаточность	Принимать во время еды или натощак
НЕНУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ (ННИТ)						
Эфавиренз	Генерик, внешний вид различается	Таблетки 600 мг и капсулы 200 мг	Один раз в день 600 мг	1 или 3	Часто встречающиеся: сыпь, головокружение, нарушение сна, необычные сновидения, нарушение концентрации внимания, тошнота, рвота, головная боль, усталость, диарея, беспокойство, депрессия, суицидальные мысли Редко встречающиеся: психоз, сильно выраженная кожная сыпь, нарушение функции печени	Принимать натощак, желательно перед сном
Этравирин	Интеленс	Таблетки 100 и 200 мг.	400 мг/сут. по 2 таблетки 100 мг дважды в день или по одной таблетке 200 мг 2 раза в день	2 или 4	Часто встречающиеся: анемия, низкий уровень тромбоцитов, диабет, рост уровня сахара в крови или холестерина, беспокойство, проблемы со сном, головная боль, высокое кровяное давление, диарея, тошнота, рвота, боли в животе, почечная недостаточность, усталость, сыпь, периферическая невропатия (повреждение нервов в руках или ногах) Редко встречающиеся: кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсона)	Принимать во время еды
Невирапин	Генерик, внешний вид различается	Таблетки 200 мг; Таблетки длительного высвобождения 400 мг	400 мг/сут — одна таблетка два раза в день.	2 или 1	Часто встречающиеся: аллергические реакции, сыпь, тошнота, головная боль, усталость, боль в животе, диарея Редко встречающиеся: кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсона)	Принимать во время еды или натощак, таблетки по 400 мг принимать не разъёvывая во время еды или натощак
Рилпивирин	Эдюрант	Таблетки 25 мг	Одна таблетка в день	1	Часто встречающиеся: бессонница, головная боль, тошнота, сыпь, повышение уровня ферментов печени, депрессия, головокружение, боль в животе, рвота, снижение аппетита, проблемы со сном, сонливость, сухость во рту Редко встречающиеся: сильная сыпь и аллергическая (гиперчувствительность) реакция	Принимать во время еды
ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕАЗЫ						
Атазанавир	Генерик, внешний вид различается	Капсулы 150, 200, 300 мг	300 мг атазанавира +100 мг ритонавира один раз в день	2 или 35	Часто встречающиеся: тошнота, диарея, кожная сыпь, боль в животе, головная боль, бессонница, рвота, гипербилирубинемия, липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет Редко встречающиеся: почекаменная болезнь, нарушение функции печени, изменения сердечного ритма	Принимать во время еды
Атазанавир/Кобицистат	Эвотаз	Таблетка содержит атазанавира 300 мг; кобицистата 150 мг	Одна таблетка один раз в сутки	1	Часто встречающиеся: Повышенный аппетит, проблемы со сном, необычные сновидения, головная боль, головокружение, нарушения вкуса, повышение уровня билирубина, иногда приводящие к желтухе, тошноте, рвоте, диарее, расстройству желудка, боли в животе, вздутию живота, метеоризм, сухость во рту, сыпь, усталость Редко встречающиеся: камни в почках, сильная сыпь и лихорадка, изменения сердечного ритма	Принимать во время еды
Дарунавир	Генерик, внешний вид различается	Таблетки 600, 800 мг.	800 мг с ритонавиром 100 мг один раз в день или 600 мг с 100 мг ритонавира два раза в день	2 или 45	Часто встречающиеся: диарея, тошнота, сыпь, боль в животе, рвота, головная боль, липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет, лихорадочное состояние Редко встречающиеся: нарушение функций печени, изменения сердечного ритма	Принимать во время еды
Дарунавир/Кобицистат	Резолста	Таблетка содержит дарунавира 800 мг + кобицистата 150 мг.	Одна таблетка в день	1	Часто встречающиеся: диарея, тошнота, сыпь, боль в животе, рвота, головная боль, липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет, лихорадочное состояние Редко встречающиеся: нарушение функций печени, изменения сердечного ритма	Принимать во время еды
Лопинавир/Ритонавир	Калетра	Таблетка содержащая лопинавира 200 мг + Ритонавира 50 мг	2 таблетки 2 раза в день или 4 таблетки один раз в день	4	Часто встречающиеся: липодистрофия, повышение уровня печёночных ферментов, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, изжога, головная боль, повышение липидов крови, нарушение функции печени, сахарный диабет Редко встречающиеся: нарушения сердечного ритма	Принимать не разъёvывая во время еды или натощак
Маравирок	Целзентри	Таблетки 150, 300 мг	300 мг два раза в день	2 или 4	Часто встречающиеся: тошнота, диарея, усталость, головная боль, потеря аппетита, метеоризм, слабость, депрессия, проблемы со сном, повышение уровня ферментов печени, сыпь Редко встречающиеся: аллергические реакции, нарушение функции печени	Принимать во время еды или натощак
БУСТЕРЫ						
Кобицистат	Тибост	Таблетка 150 мг	Одна таблетка один раз в сутки	1	Часто встречающиеся: Повышение уровня сахара в крови, повышенный аппетит, проблемы со сном, сонливость, необычные сновидения, головная боль, головокружение, нарушения вкуса, тошнота, диарея, боль в животе, вздутие живота, метеоризм, сухость во рту, желтуха, сыпь и усталость Редко встречающиеся: камни в почках	Принимать во время еды
Ритонавир	Норвир	Таблетка 100 мг	Для усиления других препаратов: 100 - 200 мг один или два раза в день	1 или 4	Часто встречающиеся (при низкой дозировке): Повышенные уровни липидов, диарея Редко встречающиеся: изменения сердечного ритма, тяжелой аллергической реакции (реакции гиперчувствительности) и сыпь (синдром Стивенса-Джонсона)	Принимать не разъёvывая во время еды или натощак

Адрес NAM, Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, Лондон WC1X 8DP

Email info@nam.org.uk Вебсайт www.aidsmap.com

Этот материал основан на оригинальной публикации авторские права на которую принадлежат NAM Publications, независимой благотворительной организации, расположенной в Великобритании. Разрешение на этот перевод предоставлено NAM. С оригинальной публикацией можно ознакомиться на сайте www.aidsmap.com. NAM не несет ответственность за точность перевода или местную релевантность текста.

В качестве некоторых препаратов используются генерики, внешний вид которых может отличаться. Авторы этого издания приложили все необходимые предосторожности при работе этой публикации. Ни NAM, ни авторы не несут ответственность за какие-либо неточности или неверную интерпретацию изложенных фактов. Используемым здесь информацией должна всегдаользоваться наряду с профессиональной консультацией NAM. NAM обеспечивает независимую и новейшую информацию для лиц, работающих в глобальной сфере борьбы с ВИЧ/СПИД. Пожалуйста, посетите наш сайт, на котором вы сможете найти последние новости по лечению и профилактике ВИЧ и подписанься на бесплатные рассылки новостей из наших информационных источников.