


# Половина диагнозов ВИЧ-инфекции в Европейском регионе ВОЗ ставится поздно.

**Ранняя диагностика способствует более длительной и здоровой жизни и снижает риск передачи инфекции.**




**Поздняя диагностика задерживает лечение и повышает риск СПИДа и смерти.**

Процент **поздней диагностики** ВИЧ-инфекции выше среди людей, инфицированных при гетеросексуальных контактах, особенно мужчин, или при **употреблении инъекционных наркотиков**.



Процент **поздней диагностики** ВИЧ-инфекции увеличивается с возрастом, достигая пика у людей старше 50 лет.



**Сделайте тестирование на ВИЧ бесплатным и легкодоступным**



**Лечение и помощь при ВИЧ-инфекции следует оказывать незамедлительно**



На основе данных от 40 из 53 европейских государств-членов ВОЗ. Источник: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Европейское региональное бюро ВОЗ. Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Европе, 2018 г. – данные за 2017 г. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2018 г.

## Тестировать раньше. Лечить всех.

[www.euro.who.int/aids](http://www.euro.who.int/aids)

© ВОЗ 11/2018



Всемирная организация здравоохранения  
Европейское региональное бюро