


Vaccination

71 % des enfants de 12-23 mois dans le Mono ont reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête.

3 % des enfants n'ont reçu aucun vaccin.




Mortalité des enfants

Plus de I enfant sur I0 dans le Mono n'atteint pas son cinquième anniversaire.

Mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le Mono

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 10 années avant l'enquête




Santé maternelle et du nouveau-né

96 % des naissances dans le Mono se sont déroulées dans un établissement de santé contre 84 % pour l'ensemble du pays.

75 % des mères et 70 % des nouveau-nés dans le Mono ont reçu des soins postnatals dans les 2 jours suivant la naissance.

Santé maternelle et du nouveau-né




Planification familiale (PF)

18 % des femmes en union dans le Mono utilisent une méthode moderne de PF contre 12 % pour l'ensemble du pays.

Les implants sont la méthode moderne la plus fréquemment utilisée (9 % dans le Mono).

Utilisation des méthodes de PF

Pourcentage des femmes de 15-49 en union qui utilisent :
■ Ensemble Bénin ■ Mono




Violence conjugale

44 % des femmes en union ou en rupture d'union dans le Mono ont subi des violences émotionnelles, physiques ou sexuelles exercées par leur mari ou partenaire.

Violence conjugale


Pourcentage des femmes de 15-49 en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences exercées par leur mari/partenaire actuel ou le plus récent

• Ensemble Bénin • Mono



Momo Niveau d'instruction

Dans le Mono, 44 % des femmes n'ont aucun niveau d'instruction contre 55 % pour l'ensemble du pays. De même, 18 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction contre 36 % pour l'ensemble du pays.



Fécondité

Une femme dans le Mono a, en moyenne, 5,7 enfants au cours de sa vie féconde même comme pour l'ensemble du pays.

Fécondité

Enfants par femme pour la période de trois années avant l'enquête



Paludisme

83 % de la population des ménages, 87 % d'enfants de moins de 5 ans et 91 % des femmes enceintes dans le Mono ont dormi sous une MII la nuit dernière.

Utilisation des MII dans le Mono

Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) la nuit dernière

