

Bénin



Enquête
Démographique
et de Santé

2017-2018

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



Cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V) 2017-2018

Ministère du Plan et du Développement
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE)
Cotonou, Bénin



ICF
Rockville, Maryland, USA

Avril 2019



Ce rapport présente les résultats clés de la cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V) réalisée par l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement, en collaboration avec les services techniques du Ministère de la Santé, le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN) et le Laboratoire de Parasitologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM). Le financement de l'EDSB-V a été assuré par le Gouvernement du Bénin, l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) par le biais d'un financement du Fonds Mondial et la Banque Mondiale par le biais du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition assuré par le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (PMASN/SP-CAN). ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du programme DHS, financé par l'USAID, et dont l'objectif est d'apporter un appui et une assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation des enquêtes sur la population et la santé.

Pour tout renseignement concernant la cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V), contacter l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, 01 BP 323, Cotonou, République du Bénin ; téléphone : (229) 21-30-82-44/21-30-82-45 ; fax : (229) 21-30-82-46 ; email : insae@insae-bj.org ; internet : www.insae-bj.org.

Pour obtenir des informations sur le Programme DHS, contacter ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA ; téléphone : +1-301-407-6500 ; fax : +1-301-407-6501 ; email : info@DHSprogram.com ; internet : www.DHSprogram.com.

Photo de couverture : Ganvié, Bénin. Utilisée avec la permission du photographe, Dr. Ren Ruilin

Citation recommandée :

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) et ICF. 2019. *Enquête Démographique et de Santé au Bénin, 2017-2018*. Cotonou, Bénin et Rockville, Maryland, USA : INSAE et ICF.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|--------------|
| LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES..... | ix |
| REMERCIEMENTS | xxi |
| PRÉFACE | xxiii |
| LISTE DES PARTICIPANTS À L’ATELIER D’ANALYSE DE L’EDSB-V 2017-2018..... | xxv |
| SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES..... | xxvii |
| LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE LA CINQUIÈME ENQUÊTE | |
| DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU BÉNIN (EDSB-V) 2017-2018..... | xxx |
| INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE..... | xxxix |
| CARTE DU BÉNIN..... | xlii |
| 1 PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE..... | 1 |
| 1.1 Objectifs de l’enquête..... | 1 |
| 1.2 Conception de l’échantillon..... | 2 |
| 1.3 Questionnaires..... | 4 |
| 1.3.1 Questionnaire ménage..... | 4 |
| 1.3.2 Questionnaire femme..... | 4 |
| 1.3.3 Questionnaire homme..... | 4 |
| 1.3.4 Questionnaire biomarqueur..... | 4 |
| 1.4 Anthropométrie, test d’anémie, test du paludisme et mesure de la tension artérielle..... | 5 |
| 1.4.1 Mesures anthropométriques..... | 5 |
| 1.4.2 Test d’anémie..... | 5 |
| 1.4.3 Test du paludisme..... | 5 |
| 1.4.4 Mesure de la tension artérielle..... | 5 |
| 1.5 Prétest..... | 5 |
| 1.6 Formation du personnel de collecte..... | 6 |
| 1.7 Collecte des données..... | 6 |
| 1.8 Traitement des données..... | 6 |
| 1.9 Taux de réponse..... | 7 |
| 2 CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS ET DE LA POPULATION | |
| DES MÉNAGES..... | 9 |
| 2.1 Sources d’approvisionnement en eau de boisson et traitement..... | 10 |
| 2.2 Installations sanitaires..... | 11 |
| 2.3 Exposition à la fumée à l’intérieur du logement..... | 11 |
| 2.4 Bien-être économique du ménage..... | 12 |
| 2.5 Lavage des mains..... | 13 |
| 2.6 Population des ménages et composition..... | 14 |
| 2.7 Instruction..... | 15 |
| 2.7.1 Niveau d’instruction atteint..... | 15 |
| 2.7.2 Fréquentation Scolaire..... | 16 |
| 3 CARACTÉRISTIQUES DES ENQUÊTÉS..... | 29 |
| 3.1 Caractéristiques de base des enquêtés..... | 29 |
| 3.2 Niveau d’instruction et alphabétisation..... | 30 |
| 3.2.1 Niveau d’instruction..... | 30 |
| 3.2.2 Niveau d’alphabétisation..... | 32 |
| 3.3 Exposition aux médias..... | 32 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 3.4 | Emploi | 33 |
| 3.5 | Occupation..... | 35 |
| 3.6 | Couverture par une assurance médicale | 35 |
| 3.7 | Utilisation de tabac | 36 |
| 4 | NUPTIALITÉ ET ACTIVITÉ SEXUELLE..... | 59 |
| 4.1 | État matrimonial | 60 |
| 4.2 | Polygamie | 60 |
| 4.3 | Âge à la première union..... | 62 |
| 4.4 | Âge aux premiers rapports sexuels | 63 |
| 4.5 | Activité sexuelle récente..... | 64 |
| 5 | FÉCONDITÉ | 75 |
| 5.1 | Fécondité actuelle | 75 |
| 5.2 | Enfants déjà nés et enfants survivants | 78 |
| 5.3 | Intervalle intergénéral..... | 78 |
| 5.4 | Insusceptibilité de tomber enceinte | 78 |
| 5.5 | Âge à la première naissance | 80 |
| 5.6 | Fécondité des adolescentes | 80 |
| 5.6.1 | Fécondité des adolescentes | 80 |
| 5.6.2 | Comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans..... | 82 |
| 6 | PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ..... | 91 |
| 6.1 | Désir d'avoir un autre enfant | 92 |
| 6.2 | Nombre idéal d'enfants | 93 |
| 6.3 | Planification de la fécondité | 95 |
| 6.4 | Taux de fécondité désiré..... | 96 |
| 7 | PLANIFICATION FAMILIALE | 105 |
| 7.1 | Connaissance et utilisation de la contraception | 106 |
| 7.2 | Source d'approvisionnement des méthodes modernes | 109 |
| 7.3 | Choix informé..... | 109 |
| 7.4 | Discontinuité des méthodes contraceptives | 110 |
| 7.5 | Demande en planification familiale..... | 110 |
| 7.6 | Prise de décision sur la planification familiale | 112 |
| 7.7 | Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale | 113 |
| 8 | SANTÉ MATERNELLE | 133 |
| 8.1 | Couverture et contenu des soins prénatals..... | 134 |
| 8.1.1 | Prestataires qualifiés | 134 |
| 8.1.2 | Stade de la grossesse et nombre de visites prénatales | 135 |
| 8.2 | Composantes des visites prénatales | 135 |
| 8.3 | Protection contre le tétanos néonatal | 136 |
| 8.4 | Services d'accouchement | 137 |
| 8.4.1 | Accouchement en établissement de santé | 137 |
| 8.4.2 | Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié | 139 |
| 8.4.3 | Accouchement par césarienne..... | 139 |
| 8.4.4 | Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance | 140 |
| 8.5 | Soins postnatals | 140 |
| 8.5.1 | Examen postnatal de la mère | 140 |
| 8.5.2 | Examen postnatal du nouveau-né | 141 |
| 8.6 | Problèmes d'accès aux soins de santé | 142 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 9 | SANTÉ DE L'ENFANT | 159 |
| 9.1 | Poids à la naissance | 159 |
| 9.2 | Vaccination des enfants | 160 |
| 9.2.1 | Possession et disponibilité d'un carnet de vaccination | 162 |
| 9.3 | Symptômes d'infections respiratoires aiguës | 162 |
| 9.4 | Fièvre | 163 |
| 9.5 | Maladies diarrhéiques | 163 |
| 9.5.1 | Prévalence de la diarrhée | 163 |
| 9.5.2 | Traitement de la diarrhée | 163 |
| 9.5.3 | Pratiques alimentaires | 164 |
| 9.5.4 | Sources des conseils ou traitement | 165 |
| 9.5.5 | Connaissance des sachets de SRO | 165 |
| 9.6 | Traitement des maladies infantiles | 165 |
| 9.7 | Évacuation des selles des enfants | 165 |
| 10 | PALUDISME..... | 181 |
| 10.1 | Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide | 182 |
| 10.2 | Accès aux MII et utilisation des MII dans les ménages | 186 |
| 10.3 | Utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes | 187 |
| 10.4 | Paludisme pendant la grossesse | 188 |
| 10.5 | Prise en charge du paludisme chez les enfants | 189 |
| 10.6 | Prévalence du faible niveau d'hémoglobine chez les enfants..... | 191 |
| 10.7 | Prévalence du paludisme chez les enfants | 192 |
| 11 | NUTRITION DES ENFANTS ET DES FEMMES..... | 211 |
| 11.1 | État nutritionnel des enfants | 212 |
| 11.1.1 | Mesure de l'état nutritionnel des jeunes enfants | 212 |
| 11.1.2 | Collecte des données..... | 213 |
| 11.1.3 | Niveaux de la malnutrition des enfants..... | 214 |
| 11.2 | Alimentation du nourrisson et du jeune enfant..... | 215 |
| 11.2.1 | Allaitement..... | 215 |
| 11.2.2 | Allaitement exclusif..... | 216 |
| 11.2.3 | Durée médiane de l'allaitement | 217 |
| 11.2.4 | Aliments de complément | 217 |
| 11.2.5 | Minimum alimentaire acceptable..... | 218 |
| 11.3 | Prévalence de l'anémie parmi les enfants..... | 220 |
| 11.4 | Présence de sel iodé dans les ménages | 221 |
| 11.5 | Consommation de micronutriments et supplémentation parmi les enfants | 221 |
| 11.6 | État nutritionnel des femmes | 222 |
| 11.6.1 | État nutritionnel des femmes | 222 |
| 11.7 | Prévalence de l'anémie Chez les femmes..... | 224 |
| 11.8 | Consommation de micronutriments parmi les mères | 224 |
| 12 | MORTALITÉ DES ENFANTS..... | 241 |
| 12.1 | Mortalité des enfants de moins de cinq ans | 242 |
| 12.2 | Facteurs de risque biodémographiques..... | 244 |
| 12.3 | Mortalité périnatale | 245 |
| 12.4 | Comportements procréateurs à hauts risques | 245 |
| 13 | CONNAISSANCE, ATTITUDES, ET COMPORTEMENTS VIS-À-VIS DU VIH/SIDA .. | 251 |
| 13.1 | Connaissance du VIH/Sida, des moyens de transmission et de prévention..... | 252 |
| 13.2 | Connaissance de la transmission mère-enfant | 254 |
| 13.3 | Comportements de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH..... | 255 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 13.4 | Partenaires sexuels multiples..... | 256 |
| 13.5 | Rapports sexuels payants..... | 257 |
| 13.6 | Couverture en services de tests du VIH..... | 257 |
| | 13.6.1 Connaissance de services de test du VIH..... | 258 |
| | 13.6.2 Test du VIH chez les femmes enceintes..... | 260 |
| 13.7 | Circoncision..... | 260 |
| 13.8 | Infections sexuellement transmissibles déclarées..... | 261 |
| 13.9 | Connaissance du VIH/Sida et comportements parmi les jeunes..... | 261 |
| | 13.9.1 Connaissance..... | 261 |
| | 13.9.2 Premiers rapports sexuels..... | 262 |
| | 13.9.3 Rapports sexuels pré-nuptiaux..... | 262 |
| | 13.9.4 Partenaires sexuels multiples..... | 262 |
| | 13.9.5 Couverture en services de tests du VIH..... | 262 |
| 13.10 | Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH..... | 263 |
| 14 | POUVOIR D'ACTION DES FEMMES..... | 285 |
| 14.1 | Emploi des femmes et des hommes en union..... | 286 |
| 14.2 | Contrôle des gains de la femme..... | 286 |
| 14.3 | Contrôle des gains de l'homme..... | 287 |
| 14.4 | Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et de ceux de leur conjoint..... | 288 |
| 14.5 | Possession de biens par les femmes et les hommes..... | 288 |
| 14.6 | Possession d'un titre de propriété pour la maison et les terres..... | 289 |
| 14.7 | Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables..... | 289 |
| 14.8 | Participation des femmes et des hommes dans la prise de décision..... | 290 |
| 14.9 | Opinion concernant le fait de battre son épouse/partenaire..... | 291 |
| 14.10 | Négociation de rapports sexuels..... | 292 |
| 14.11 | Indicateurs du pouvoir d'action des femmes..... | 293 |
| 15 | MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE..... | 317 |
| 15.1 | Données..... | 317 |
| 15.2 | Éstimation directe de la mortalité adulte..... | 318 |
| 15.3 | Tendances de la mortalité adulte..... | 319 |
| 15.4 | Éstimation directe de la mortalité maternelle..... | 320 |
| 15.5 | Tendances de la mortalité liée à la grossesse..... | 321 |
| 16 | VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE..... | 325 |
| 16.1 | Mesure de la violence..... | 325 |
| 16.2 | Violence physique..... | 326 |
| | 16.2.1 Auteurs des actes de violence physique..... | 327 |
| 16.3 | Violence sexuelle..... | 327 |
| | 16.3.1 Prévalence de la violence sexuelle..... | 327 |
| | 16.3.2 Auteurs des actes de violence sexuelle..... | 328 |
| 16.4 | Différentes formes de violence..... | 328 |
| 16.5 | Contrôle exercé par le conjoint..... | 328 |
| 16.6 | Formes de violence conjugale..... | 329 |
| | 16.6.1 Prévalence de la violence conjugale..... | 330 |
| | 16.6.2 Premier épisode de violence conjugale..... | 332 |
| 16.7 | Blessures dues à la violence conjugale..... | 332 |
| 16.8 | Violence Initiée par les femmes à l'encontre de leur conjoint..... | 332 |
| 16.9 | Recherche d'aide et source de l'aide..... | 333 |
| | 16.9.1 Recherche d'aide parmi les femmes qui ont subi des actes de violence..... | 333 |
| | 16.9.2 Sources auprès desquelles l'aide a été recherchée..... | 334 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 17 | SANTÉ DES ADULTES ET MALADIES NON TRANSMISSIBLES | 351 |
| 17.1 | Dépistage et traitement de l'hypertension artérielle | 351 |
| 17.2 | Prévalence et niveaux d'hypertension artérielle | 353 |
| 17.3 | Prévalence des maladies non transmissibles..... | 354 |
| 17.4 | Connaissance et pratique de l'examen pour le cancer du col utérin | 354 |
| 17.5 | Dépistage et traitement de l'hyperglycémie | 355 |
| 18 | SITUATION DE L'ENFANT | 363 |
| 18.1 | Enregistrement des naissances à l'état civil..... | 364 |
| 18.2 | Enfants orphelins et résidence avec les parents | 366 |
| 18.3 | Discipline des enfants..... | 366 |
| 18.4 | Travail des enfants..... | 368 |
| 18.4.1 | Activités économiques des enfants de 5-17 ans | 370 |
| 18.5 | Développement du jeune enfant | 370 |
| 18.5.1 | Éducation de la petite enfance | 370 |
| 18.5.2 | Soutien à l'apprentissage | 371 |
| 18.5.3 | Matériel d'apprentissage..... | 372 |
| 18.6 | Encadrement inapproprié des jeunes enfants..... | 373 |
| 18.7 | Indice de développement du jeune enfant | 374 |
| | RÉFÉRENCES | 389 |
| ANNEXE A | PLAN DE SONDAGE..... | 391 |
| A.1 | Introduction | 391 |
| A.2 | Base de sondage | 391 |
| A.3 | Plan de sondage et mise en œuvre | 393 |
| A.4 | Probabilités de sondage et poids de sondage | 394 |
| A.5 | Résultats de l'enquête..... | 396 |
| ANNEXE B | ÉSTIMATION DES ÉRREURS D'ÉCHANTILLONNAGE..... | 399 |
| ANNEXE C | TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES | 437 |
| ANNEXE D | PERSONNEL DE L'EDSB-V 2017-2018 | 447 |
| ANNEXE E | QUESTIONNAIRES..... | 455 |

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE..... | 1 |
| | Tableau 1.1 Résultats des interviews ménage et individuelle..... | 7 |
| | Graphique 1.1 Organisation de l'EDSB-V Bénin..... | 3 |
| 2 | CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS ET DE LA POPULATION DES MÉNAGES..... | 9 |
| | Tableau 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire | 18 |
| | Tableau 2.2 Disponibilité de l'eau | 19 |
| | Tableau 2.3 Type d'installations sanitaires utilisées par les ménages..... | 19 |
| | Tableau 2.4 Caractéristiques du logement..... | 20 |
| | Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages | 21 |
| | Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique | 21 |
| | Tableau 2.7 Lavage des mains | 22 |
| | Tableau 2.8 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence | 23 |
| | Tableau 2.9 Composition des ménages | 24 |
| | Tableau 2.10.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme | 25 |
| | Tableau 2.10.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme | 26 |
| | Tableau 2.11 Taux de fréquentation scolaire | 27 |
| | Graphique 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire, par résidence | 10 |
| | Graphique 2.2 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages, par résidence | 11 |
| | Graphique 2.3 Quintiles de bien-être économique par résidence..... | 13 |
| | Graphique 2.4 Pyramide des âges de la population..... | 14 |
| | Graphique 2.5 Fréquentation scolaire au niveau secondaire par bien-être économique du ménage..... | 16 |
| 3 | CARACTÉRISTIQUES DES ENQUÊTÉS..... | 29 |
| | Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés | 38 |
| | Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femme | 39 |
| | Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme | 40 |
| | Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femme..... | 41 |
| | Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Homme..... | 42 |
| | Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme..... | 43 |
| | Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Homme..... | 44 |
| | Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femme..... | 45 |
| | Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Homme | 46 |
| | Tableau 3.6.1 Emploi : Femme | 47 |
| | Tableau 3.6.2 Emploi : Homme | 48 |
| | Tableau 3.7.1 Occupation : Femme..... | 49 |
| | Tableau 3.7.2 Occupation : Homme..... | 50 |
| | Tableau 3.8 Type d'emploi : Femme | 51 |
| | Tableau 3.9.1 Couverture médicale : Femme..... | 52 |
| | Tableau 3.9.2 Assurance médicale : Homme | 53 |
| | Tableau 3.10.1 Consommation de tabac à fumer : Femme | 54 |
| | Tableau 3.10.2 Consommation de tabac à fumer : Homme | 55 |
| | Tableau 3.11 Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme | 56 |
| | Tableau 3.12 Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme ... | 57 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| Graphique 3.1 | Niveau d'instruction des enquêtés | 30 |
| Graphique 3.2 | Niveau d'instruction secondaire par résidence | 31 |
| Graphique 3.3 | Sans niveau d'instruction par département..... | 31 |
| Graphique 3.4 | Exposition aux médias..... | 33 |
| Graphique 3.5 | Statut de l'emploi par état matrimonial | 34 |
| Graphique 3.6 | Occupation..... | 35 |
| 4 | NUPTIALITÉ ET ACTIVITÉ SEXUELLE..... | 59 |
| Tableau 4.1 | État matrimonial actuel..... | 65 |
| Tableau 4.2.1 | Nombre de coépouses des femmes | 66 |
| Tableau 4.2.2 | Nombre d'épouses des hommes | 67 |
| Tableau 4.3 | Âge à la première union | 68 |
| Tableau 4.4 | Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques..... | 69 |
| Tableau 4.5 | Âge aux premiers rapports sexuels..... | 70 |
| Tableau 4.6 | Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques | 71 |
| Tableau 4.7.1 | Activité sexuelle récente : Femme..... | 72 |
| Tableau 4.7.2 | Activité sexuelle récente : Homme..... | 73 |
| Graphique 4.1 | État matrimonial | 60 |
| Graphique 4.2 | Tendances de la polygamie..... | 61 |
| Graphique 4.3 | Polygamie par département | 61 |
| Graphique 4.4 | Âge médian des femmes à la première union par résidence..... | 62 |
| Graphique 4.5 | Âge médian aux premiers rapports sexuels et âge médian à la première union..... | 63 |
| Graphique 4.6 | Âge médian aux premiers rapports sexuels : Tendances | 63 |
| 5 | FÉCONDITÉ..... | 75 |
| Tableau 5.1 | Fécondité actuelle..... | 83 |
| Tableau 5.2 | Fécondité selon certaines caractéristiques | 83 |
| Tableau 5.3.1 | Tendance de la fécondité par âge | 84 |
| Tableau 5.3.2 | Tendance de la fécondité par âge et Indice Synthétique de Fécondité | 84 |
| Tableau 5.4 | Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes | 84 |
| Tableau 5.5 | Intervalles intergénésiques | 85 |
| Tableau 5.6 | Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum | 86 |
| Tableau 5.7 | Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum | 87 |
| Tableau 5.8 | Ménopause..... | 87 |
| Tableau 5.9 | Âge à la première naissance | 88 |
| Tableau 5.10 | Âge médian à la première naissance..... | 88 |
| Tableau 5.11 | Fécondité des adolescentes..... | 89 |
| Tableau 5.12 | Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans | 89 |
| Graphique 5.1 | Tendances de la fécondité par résidence | 76 |
| Graphique 5.2 | Tendances de la fécondité par âge pour les 3 années avant chaque enquête | 76 |
| Graphique 5.3 | Fécondité par département..... | 77 |
| Graphique 5.4 | Fécondité par niveau d'instruction | 77 |
| Graphique 5.5 | Intervalles intergénésiques | 78 |
| Graphique 5.6 | Âge médian à la première naissance par résidence..... | 80 |
| Graphique 5.7 | Grossesse et maternité des adolescentes par département | 81 |
| Graphique 5.8 | Grossesse et maternité des adolescentes par bien-être économique du ménage..... | 81 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| Graphique 5.9 | Comportements en matière de sexualité et de santé de la reproduction avant l'âge de 15 ans | 82 |
| 6 | PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ..... | 91 |
| Tableau 6.1 | Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants..... | 98 |
| Tableau 6.2.1 | Désir de limiter les naissances : Femme..... | 99 |
| Tableau 6.2.2 | Désir de limiter les naissances : Homme..... | 100 |
| Tableau 6.3 | Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants..... | 101 |
| Tableau 6.4 | Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques | 102 |
| Tableau 6.5 | Planification de la fécondité | 103 |
| Tableau 6.6 | Taux de fécondité désirée..... | 103 |
| Graphique 6.1 | Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : Tendances | 92 |
| Graphique 6.2 | Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants | 93 |
| Graphique 6.3 | Taille idéale de la famille | 94 |
| Graphique 6.4 | Taille idéale de la famille par nombre d'enfants vivants..... | 94 |
| Graphique 6.5 | Planification de la fécondité | 95 |
| Graphique 6.6 | Fécondité désirée et fécondité actuelle : Tendances..... | 96 |
| 7 | PLANIFICATION FAMILIALE | 105 |
| Tableau 7.1 | Connaissance des méthodes contraceptives..... | 115 |
| Tableau 7.2 | Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques | 116 |
| Tableau 7.3 | Utilisation actuelle de la contraception selon âge..... | 117 |
| Tableau 7.4.1 | Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques | 118 |
| Tableau 7.4.2 | Tendances de l'utilisation actuelle de la contraception | 120 |
| Tableau 7.5 | Connaissance de la période de fertilité | 120 |
| Tableau 7.6 | Connaissance de la période de fertilité par âge | 120 |
| Tableau 7.7 | Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception..... | 121 |
| Tableau 7.8 | Choix informé de la méthode contraceptive | 121 |
| Tableau 7.9 | Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois | 122 |
| Tableau 7.10 | Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives..... | 123 |
| Tableau 7.11.1 | Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union..... | 124 |
| Tableau 7.11.2 | Besoins et demande en matière de planification familiale pour l'ensemble des femmes et pour les femmes non en union sexuellement actives | 125 |
| Tableau 7.12 | Prise de décision concernant la planification familiale | 127 |
| Tableau 7.13 | Utilisation future de la contraception | 128 |
| Tableau 7.14.1 | Exposition aux messages sur la planification familiale..... | 129 |
| Tableau 7.14.2 | Acceptable de parler de la planification familiale | 131 |
| Tableau 7.15 | Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale..... | 132 |
| Graphique 7.1 | Utilisation contraceptive..... | 107 |
| Graphique 7.2 | Tendances de l'utilisation contraceptive | 107 |
| Graphique 7.3 | Utilisation d'une méthode moderne contraceptive par département | 108 |
| Graphique 7.4 | Utilisation des méthodes modernes par bien-être économique du ménage | 108 |
| Graphique 7.5 | Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception..... | 109 |
| Graphique 7.6 | Taux de discontinuation des méthodes contraceptives..... | 110 |
| Graphique 7.7 | Demande en matière de planification familiale | 111 |
| Graphique 7.8 | Tendances de la demande en matière de planification familiale | 111 |

| | | | |
|----------|-------------------------------|--|------------|
| | Graphique 7.9 | Besoins non satisfaits par département..... | 112 |
| | Graphique 7.10 | Besoins non satisfaits par bien-être économique du ménage..... | 112 |
| 8 | SANTÉ MATERNELLE | | 133 |
| | Tableau 8.1 | Soins prénatals..... | 144 |
| | Tableau 8.2 | Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite | 145 |
| | Tableau 8.3 | Composants des visites prénatales..... | 146 |
| | Tableau 8.4 | Vaccination antitétanique | 148 |
| | Tableau 8.5 | Lieu de l'accouchement..... | 149 |
| | Tableau 8.6 | Assistance au cours de l'accouchement..... | 150 |
| | Tableau 8.7 | Césarienne | 151 |
| | Tableau 8.8 | Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance..... | 152 |
| | Tableau 8.9 | Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère | 152 |
| | Tableau 8.10 | Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère | 153 |
| | Tableau 8.11 | Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né | 154 |
| | Tableau 8.12 | Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né | 155 |
| | Tableau 8.13 | Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés | 156 |
| | Tableau 8.14 | Problèmes d'accès aux soins de santé | 157 |
| | Graphique 8.1 | Tendances des couvertures en soins prénatals..... | 134 |
| | Graphique 8.2 | Composants des soins prénatals | 135 |
| | Graphique 8.3 | Lieu d'accouchement : tendances..... | 137 |
| | Graphique 8.4 | Naissances dans un établissement de santé par département..... | 138 |
| | Graphique 8.5 | Naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé par bien-être économique du ménage | 138 |
| | Graphique 8.6 | Assistance à l'accouchement | 139 |
| | Graphique 8.7 | Assistance à l'accouchement par du personnel qualifié par bien-être économique du ménage | 139 |
| | Graphique 8.8 | Soins postnatals selon le lieu de l'accouchement..... | 141 |
| 9 | SANTÉ DE L'ENFANT..... | | 159 |
| | Tableau 9.1 | Taille et poids de l'enfant à la naissance | 167 |
| | Tableau 9.2 | Vaccinations par source d'information..... | 168 |
| | Tableau 9.3 | Vaccinations par caractéristique sociodémographique..... | 169 |
| | Tableau 9.4 | Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques..... | 171 |
| | Tableau 9.5 | Prévalence et traitement des symptômes d'IRA | 172 |
| | Tableau 9.6 | Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA..... | 173 |
| | Tableau 9.7 | Prévalence et traitement de la fièvre..... | 174 |
| | Tableau 9.8 | Prévalence et traitement de la diarrhée | 175 |
| | Tableau 9.9 | Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée..... | 176 |
| | Tableau 9.10 | Pratiques alimentaires durant la diarrhée..... | 177 |
| | Tableau 9.11 | Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée..... | 178 |
| | Tableau 9.12 | Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés..... | 179 |
| | Tableau 9.13 | Évacuation des selles des enfants | 180 |
| | Graphique 9.1 | Vaccinations infantiles | 160 |
| | Graphique 9.2 | Tendances de la couverture vaccinale | 161 |
| | Graphique 9.3 | Couverture vaccinale par résidence..... | 161 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| Graphique 9.4 | Couverture vaccinale par département | 162 |
| Graphique 9.5 | Prévalence de la diarrhée par âge | 163 |
| Graphique 9.6 | Traitement de la diarrhée..... | 164 |
| Graphique 9.7 | Pratiques alimentaires pendant la diarrhée | 164 |
| Graphique 9.8 | Prévalence et traitement des maladies infantiles | 165 |
| 10 | PALUDISME..... | 181 |
| Tableau 10.1 | Possession de moustiquaires par les ménages | 195 |
| Tableau 10.2 | Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques..... | 196 |
| Tableau 10.3 | Source d'obtention des moustiquaires..... | 197 |
| Tableau 10.4 | Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) | 197 |
| Tableau 10.5 | Accès à une MII..... | 198 |
| Tableau 10.6 | Utilisation des moustiquaires par les ménages | 199 |
| Tableau 10.7 | Utilisation des MII existantes | 200 |
| Tableau 10.8 | Utilisation des moustiquaires par les enfants..... | 201 |
| Tableau 10.9 | Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes..... | 202 |
| Tableau 10.10 | Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse | 203 |
| Tableau 10.11 | Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre.... | 204 |
| Tableau 10.12 | Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre | 205 |
| Tableau 10.13 | Type d'antipaludiques utilisés | 206 |
| Tableau 10.14 | Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants..... | 207 |
| Tableau 10.15 | Niveau d'hémoglobine < 8,0 g/dl chez les enfants..... | 208 |
| Tableau 10.16 | Prévalence du paludisme | 209 |
| Graphique 10.1 | Possession de MII par le ménage | 183 |
| Graphique 10.2 | Possession de MII dans les ménages : Tendances | 183 |
| Graphique 10.3 | Possession de MII par département | 184 |
| Graphique 10.4 | Possession de MII par bien-être économique du ménage..... | 184 |
| Graphique 10.5 | Prévention du paludisme | 185 |
| Graphique 10.6 | Source d'approvisionnement des moustiquaires | 185 |
| Graphique 10.7 | Accès et utilisation des MII : Tendances..... | 186 |
| Graphique 10.8 | Accès et utilisation des MII..... | 187 |
| Graphique 10.9 | Utilisation des MII..... | 187 |
| Graphique 10.10 | Tendances de l'utilisation du TPIg par les femmes enceintes | 189 |
| Graphique 10.11 | Tendance de l'utilisation des CTA par les enfants ayant eu de la fièvre | 190 |
| Graphique 10.12 | Prévalence de faible niveau d'hémoglobine chez les enfants par niveau d'instruction de la mère | 192 |
| Graphique 10.13 | Prévalence du paludisme chez les enfants par département | 193 |
| Graphique 10.14 | Prévalence du paludisme chez les enfants par bien-être économique du ménage..... | 193 |
| 11 | NUTRITION DES ENFANTS ET DES FEMMES..... | 211 |
| Tableau 11.1 | État nutritionnel des enfants | 226 |
| Tableau 11.2 | Allaitement initial..... | 228 |
| Tableau 11.3 | Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant | 229 |
| Tableau 11.4 | Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement | 230 |
| Tableau 11.5 | Durée médiane de l'allaitement..... | 230 |
| Tableau 11.6 | Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview | 231 |
| Tableau 11.7 | Apport alimentaire minimum acceptable..... | 232 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| Tableau 11.8 | Prévalence de l'anémie chez les enfants..... | 234 |
| Tableau 11.9 | Présence de sel iodé dans le ménage | 235 |
| Tableau 11.10 | Consommation de micronutriments par les enfants..... | 236 |
| Tableau 11.11 | État nutritionnel des femmes | 238 |
| Tableau 11.12 | Prévalence de l'anémie chez les femmes..... | 239 |
| Tableau 11.13 | Consommation de micronutriments par les mères..... | 240 |
| Graphique 11.1 | Tendances de l'état nutritionnel des enfants..... | 214 |
| Graphique 11.2 | Retard de croissance chez les enfants par département | 215 |
| Graphique 11.3 | Retard de croissance chez les enfants par bien-être économique du ménage..... | 215 |
| Graphique 11.4 | Tendances de l'allaitement initial..... | 216 |
| Graphique 11.5 | Pratiques d'allaitement par âge..... | 216 |
| Graphique 11.6 | Tendances de l'allaitement exclusif | 217 |
| Graphique 11.7 | Indicateurs ANJE sur l'apport alimentaire minimal acceptable | 219 |
| Graphique 11.8 | Tendances de l'anémie chez les enfants | 220 |
| Graphique 11.9 | Anémie chez les enfants par département | 221 |
| Graphique 11.10 | Tendances de l'anémie chez les femmes | 224 |
| 12 | MORTALITÉ DES ENFANTS..... | 241 |
| Tableau 12.1 | Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans | 247 |
| Tableau 12.2 | Quotients de mortalité des enfants sur une période de 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques..... | 247 |
| Tableau 12.3 | Quotients de mortalité des enfants sur une période de 10 ans selon d'autres caractéristiques | 248 |
| Tableau 12.4 | Mortalité périnatale | 249 |
| Tableau 12.5 | Comportement procréateur à hauts risques..... | 250 |
| Graphique 12.1 | Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans..... | 242 |
| Graphique 12.2 | Mortalité infanto-juvénile par département | 243 |
| Graphique 12.3 | Mortalité infanto-juvénile par bien-être économique du ménage..... | 244 |
| Graphique 12.4 | Mortalité des enfants de moins de 5 ans selon l'intervalle avec la naissance précédente..... | 244 |
| Graphique 12.5 | Mortalité périnatale par l'âge de la mère à la naissance de l'enfant | 245 |
| 13 | CONNAISSANCE, ATTITUDES, ET COMPORTEMENTS VIS-À-VIS DU VIH/SIDA .. | 251 |
| Tableau 13.1 | Connaissance du VIH ou du sida..... | 264 |
| Tableau 13.2 | Connaissance des moyens de prévention du VIH..... | 265 |
| Tableau 13.3 | Connaissance « approfondie » sur le VIH | 266 |
| Tableau 13.4 | Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant..... | 267 |
| Tableau 13.5 | Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 268 |
| Tableau 13.6.1 | Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme | 269 |
| Tableau 13.6.2 | Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme..... | 270 |
| Tableau 13.7 | Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants | 271 |
| Tableau 13.8.1 | Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme | 272 |
| Tableau 13.8.2 | Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme..... | 273 |
| Tableau 13.9 | Femmes enceintes conseillées et ayant effectué un test du VIH | 274 |
| Tableau 13.10 | Circoncision..... | 275 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| Tableau 13.11 | Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST..... | 276 |
| Tableau 13.12 | Femmes et hommes ayant recherché un traitement contre les IST..... | 278 |
| Tableau 13.13 | Connaissance « approfondie » du VIH parmi les jeunes..... | 278 |
| Tableau 13.14 | Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes..... | 279 |
| Tableau 13.15 | Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes..... | 279 |
| Tableau 13.16.1 | Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme..... | 280 |
| Tableau 13.16.2 | Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme..... | 281 |
| Tableau 13.17 | Tests du VIH récents parmi les jeunes..... | 282 |
| Tableau 13.18 | Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH..... | 283 |
| Graphique 13.1a | Connaissance du VIH/sida par département : Femme..... | 253 |
| Graphique 13.1b | Connaissance du VIH/sida par département : Homme..... | 253 |
| Graphique 13.2 | Connaissance de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME)..... | 254 |
| Graphique 13.3 | Connaissance de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME) : Tendances..... | 255 |
| Graphique 13.4 | Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH par niveau d'instruction..... | 256 |
| Graphique 13.5 | Rapports sexuels et utilisation du condom avec un partenaire non régulier... | 257 |
| Graphique 13.6 | Test du VIH..... | 258 |
| Graphique 13.7 | Test du VIH récent : Tendances..... | 258 |
| Graphique 13.8a | Test du VIH par département : Femme..... | 259 |
| Graphique 13.8b | Test du VIH par département : Homme..... | 259 |
| Graphique 13.9 | Test du VIH récent par niveau d'instruction..... | 260 |
| Graphique 13.10 | Test du VIH pendant la grossesse : Tendances..... | 260 |
| Graphique 13.11 | Tendances de la circoncision..... | 261 |
| 14 | POUVOIR D'ACTION DES FEMMES..... | 285 |
| Tableau 14.1 | Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union..... | 296 |
| Tableau 14.2.1 | Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint.... | 297 |
| Tableau 14.2.2 | Contrôle de l'argent gagné par les hommes..... | 298 |
| Tableau 14.3 | Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains de leur mari/partenaire..... | 299 |
| Tableau 14.4.1 | Possession de biens : Femme..... | 300 |
| Tableau 14.4.2 | Possession de biens : Homme..... | 301 |
| Tableau 14.5.1 | Possession d'un titre de propriété pour une maison : Femme..... | 302 |
| Tableau 14.5.2 | Possession d'un titre de propriété pour une maison : Homme..... | 303 |
| Tableau 14.6.1 | Possession d'un titre de propriété pour des terres : Femme..... | 304 |
| Tableau 14.6.2 | Possession d'un titre de propriété pour des terres : Homme..... | 305 |
| Tableau 14.7.1 | Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Femme..... | 306 |
| Tableau 14.7.2 | Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Homme..... | 307 |
| Tableau 14.8 | Participation dans la prise de décision..... | 308 |
| Tableau 14.9.1 | Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques..... | 308 |
| Tableau 14.9.2 | Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques..... | 309 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| Tableau 14.10.1 | Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme..... | 310 |
| Tableau 14.10.2 | Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme..... | 311 |
| Tableau 14.11 | Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire..... | 312 |
| Tableau 14.12 | Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari/partenaire..... | 313 |
| Tableau 14.13 | Indicateurs du pouvoir d'action des femmes..... | 314 |
| Tableau 14.14 | Utilisation actuelle de la contraception selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes..... | 314 |
| Tableau 14.15 | Nombre idéal d'enfants et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes..... | 315 |
| Tableau 14.16 | Soins de santé maternelle, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes..... | 315 |
| Tableau 14.17 | Mortalité des enfants de moins de cinq ans selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes..... | 316 |
| Graphique 14.1 | Emploi par âge..... | 286 |
| Graphique 14.2 | Contrôle des gains de la femme..... | 287 |
| Graphique 14.3 | Possession de biens..... | 289 |
| Graphique 14.4 | Participation des femmes dans la prise de décision..... | 290 |
| Graphique 14.5 | Opinions concernant le fait de battre sa femme..... | 291 |
| 15 | MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE..... | 317 |
| Tableau 15.1 | Complétude de l'information sur les frères et sœurs..... | 323 |
| Tableau 15.2 | Taux de mortalité des adultes..... | 323 |
| Tableau 15.3 | Quotient de mortalité adulte..... | 323 |
| Tableau 15.4 | Mortalité maternelle..... | 324 |
| Tableau 15.5 | Rapport de mortalité maternelle..... | 324 |
| Tableau 15.6 | Tendances de la mortalité liée à la grossesse..... | 324 |
| Graphique 15.1 | Taux de mortalité adulte par âge..... | 319 |
| Graphique 15.2 | Tendances du Rapport de Mortalité liée à la Grossesse (RMG) avec intervalle de confiance..... | 321 |
| 16 | VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE..... | 325 |
| Tableau 16.1 | Violence physique..... | 335 |
| Tableau 16.2 | Auteurs des violences physiques..... | 336 |
| Tableau 16.3 | Violence sexuelle..... | 337 |
| Tableau 16.4 | Âge au moment de la première expérience de violence sexuelle..... | 338 |
| Tableau 16.5 | Auteurs des violences sexuelles..... | 338 |
| Tableau 16.6 | Expérience de diverses formes de violence..... | 338 |
| Tableau 16.7 | Violence pendant la grossesse..... | 339 |
| Tableau 16.8 | Contrôle exercé par les maris selon les déclarations des épouses..... | 340 |
| Tableau 16.9 | Formes de violence conjugale..... | 341 |
| Tableau 16.10 | Violence conjugale selon certaines caractéristiques sociodémographiques...342 | 342 |
| Tableau 16.11 | Violence conjugale selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme..... | 343 |
| Tableau 16.12 | Violences conjugales au cours des 12 derniers mois..... | 344 |
| Tableau 16.13 | Premier épisode de violence conjugale selon la durée de l'union..... | 345 |
| Tableau 16.14 | Blessures dues à la violence conjugale..... | 345 |
| Tableau 16.15 | Violence des enquêtées contre leurs conjoints selon les caractéristiques des enquêtées..... | 346 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| Tableau 16.16 | Violence des enquêtées contre leur conjoint selon les caractéristiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action de l'enquêtée | 347 |
| Tableau 16.17 | Recherche de l'aide pour mettre fin à la violence | 348 |
| Tableau 16.18 | Sources/personnes auprès desquelles l'aide pour mettre fin à la violence a été recherché | 349 |
| Graphique 16.1 | Violence subie par les femmes selon leur état matrimonial | 327 |
| Graphique 16.2 | Types d'actes de violence conjugale | 330 |
| Graphique 16.3 | Violence conjugale par département | 331 |
| Graphique 16.4 | Violence conjugale selon la consommation d'alcool du mari/partenaire | 332 |
| Graphique 16.5 | Recherche d'aide par type de violence subie..... | 333 |
| 17 | SANTÉ DES ADULTES ET MALADIES NON TRANSMISSIBLES | 351 |
| Tableau 17.1.1 | Prise en charge de l'hypertension artérielle : Femme..... | 357 |
| Tableau 17.1.2 | Prise en charge de l'hypertension artérielle : Homme | 358 |
| Tableau 17.2.1 | Niveaux d'hypertension : Femme..... | 359 |
| Tableau 17.2.2 | Niveaux d'hypertension : Homme..... | 360 |
| Tableau 17.3 | Type de maladies non transmissibles | 360 |
| Tableau 17.4 | Cancer du col de l'utérus..... | 361 |
| Tableau 17.5.1 | Glycémie mesurée et traitée : Femme | 362 |
| Tableau 17.5.2 | Glycémie mesurée et traitée : Homme..... | 362 |
| Graphique 17.1 | Mesure de la pression artérielle par un prestataire de soins de santé par résidence..... | 352 |
| Graphique 17.2 | Informé par un prestataire souffrant d'hypertension artérielle par bien-être économique du ménage | 353 |
| Graphique 17.3 | Prévalence de l'hypertension et niveaux d'hypertension | 354 |
| Graphique 17.4 | Femmes ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus par niveau d'instruction | 355 |
| 18 | SITUATION DE L'ENFANT | 363 |
| Tableau 18.1 | Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans | 376 |
| Tableau 18.2 | Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents | 377 |
| Tableau 18.3 | Discipline des enfants..... | 378 |
| Tableau 18.4 | Opinion concernant les châtiments corporels..... | 379 |
| Tableau 18.5 | Implication des enfants de 5-17 ans dans l'activité économique..... | 380 |
| Tableau 18.6 | Implication des enfants de 5-17 ans dans les travaux domestiques..... | 381 |
| Tableau 18.7 | Travail des enfants..... | 382 |
| Tableau 18.8 | Éducation de la petite enfance | 383 |
| Tableau 18.9 | Soutien à l'apprentissage..... | 384 |
| Tableau 18.10 | Matériel d'apprentissage..... | 385 |
| Tableau 18.11 | Encadrement inapproprié des enfants..... | 386 |
| Tableau 18.12 | Index de développement du jeune enfant | 387 |
| Graphique 18.1 | Enregistrement des naissances d'enfants à l'état civil : Tendances..... | 364 |
| Graphique 18.2 | Enregistrement des naissances à l'état civil par département..... | 365 |
| Graphique 18.3 | Enregistrement des naissances à l'état civil par bien-être économique du ménage..... | 365 |
| Graphique 18.4 | Travail des enfants..... | 369 |
| Graphique 18.5 | Ensemble du travail des enfants par bien-être économique du ménage | 370 |
| Graphique 18.6 | Enfants qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire par niveau d'instruction de la mère | 371 |
| Graphique 18.7 | Soutien à l'apprentissage par bien-être économique | 372 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| ANNEXE A | PLAN DE SONDAGE | 391 |
| Tableau A.1 | Répartition de la population par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)..... | 392 |
| Tableau A.2 | Répartition de ménages par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)..... | 392 |
| Tableau A.3 | Répartition de ZD et de leur taille moyenne en ménages par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)..... | 392 |
| Tableau A.4 | Allocation de l'échantillon grappes et ménages par département et selon milieu de résidence (EDSB-V Bénin 2017-2018) | 393 |
| Tableau A.5 | Allocation de nombres attendus de femmes et hommes enquêtés avec succès par département et selon milieu de résidence (EDSB-V Bénin 2017-2018) | 394 |
| Tableau A.6 | Résultats de l'enquête : Femme..... | 397 |
| Tableau A.7 | Résultats de l'enquête: Homme..... | 398 |
| ANNEXE B | ÉSTIMATION DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE | 399 |
| Tableau B.1 | Variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage : EDSB-V Bénin 2017-2018 | 401 |
| Tableau B.2 | Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDSB-V Bénin 2017-2018..... | 403 |
| Tableau B.3 | Erreurs de sondage : Echantillon Cotonou, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 405 |
| Tableau B.4 | Erreurs de sondage : Echantillon Autres villes, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 407 |
| Tableau B.5 | Erreurs de sondage : Echantillon Ensemble Urbain, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 409 |
| Tableau B.6 | Erreurs de sondage : Echantillon Rural, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 411 |
| Tableau B.7 | Erreurs de sondage : Echantillon Alibori, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 413 |
| Tableau B.8 | Erreurs de sondage : Echantillon Atacora, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 415 |
| Tableau B.9 | Erreurs de sondage : Echantillon Atlantique, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 417 |
| Tableau B.10 | Erreurs de sondage : Echantillon Borgou, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 419 |
| Tableau B.11 | Erreurs de sondage : Echantillon Collines, EDSB-V Bénin 2017-2018..... | 421 |
| Tableau B.12 | Erreurs de sondage : Echantillon Couffo, EDSB-V Bénin 2017-2018..... | 423 |
| Tableau B.13 | Erreurs de sondage : Echantillon Donga, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 425 |
| Tableau B.14 | Erreurs de sondage : Echantillon Littoral, EDSB-V Bénin 2017-2018..... | 427 |
| Tableau B.15 | Erreurs de sondage : Echantillon Mono, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 429 |
| Tableau B.16 | Erreurs de sondage : Echantillon Ouémé, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 431 |
| Tableau B.17 | Erreurs de sondage : Echantillon Plateau, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 433 |
| Tableau B.18 | Erreurs de sondage : Echantillon Zou, EDSB-V Bénin 2017-2018..... | 435 |
| ANNEXE C | TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES | 437 |
| Tableau C.1 | Répartition par âge de la population des ménages..... | 437 |
| Tableau C.2.1 | Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées | 438 |
| Tableau C.2.2 | Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés | 438 |
| Tableau C.3 | Complétude de l'enregistrement..... | 439 |
| Tableau C.4 | Naissances par année de naissance | 439 |
| Tableau C.5 | Enregistrement de l'âge au décès en jours..... | 440 |
| Tableau C.6 | Enregistrement de l'âge au décès en mois..... | 441 |
| Tableau C.7 | Complétude et données de qualité concernant le poids et la taille des enfants | 442 |
| Tableau C.8 | Taille de la fratrie et rapport de masculinité des frères et sœurs | 443 |
| Tableau C.9 | Mortalité liée à la grossesse..... | 443 |
| Tableau C.10 | Nombre de grappes complétées par mois d'interview et selon la région | 443 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| Tableau C.11 | Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois dont les résultats du test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme sont classés positifs, par mois et par département, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 444 |
| Tableau C.12 | Nombre d'enfant de 6 à 59 ans ayant effectué le test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme par mois et par département (non-pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018..... | 444 |
| Tableau C.13 | Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois dont les résultats du test de gouttes épaisses (Parasitémie palustre) sont classés positifs, par mois et par département, EDSB-V Bénin 2017-2018 | 444 |
| Tableau C.14 | Nombre d'enfant de 6 à 59 ans ayant effectué le test de gouttes épaisses (Parasitémie palustre) par mois et par département (non-pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018..... | 445 |

REMERCIEMENTS

La réalisation de la cinquième édition de l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-V) est le fruit d'efforts conjugués de nombreux acteurs et institutions. L'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE), sous le leadership du Ministre d'État chargé du Plan et du Développement, tient à les remercier tous.

L'enquête a bénéficié de la collaboration technique de personnes ressources de différentes Directions du Ministère de la Santé, notamment la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP), la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant à travers le Service de Planification Familiale et Santé des Adolescents et Jeunes (DSME/PFSAJ) et le Service Nutrition (DSME/SN), l'Agence Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF), l'Agence Nationale de Vaccination et de Suivi des Soins de Santé Primaire (ANV/SSP), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), la Direction de la Recherche, de la Formation et de la Médecine Traditionnelle (DRFMT), le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP/CAN), le Laboratoire de Parasitologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM), le Conseil National de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (CNLSTP), le Service de Cardiologie du CNHU-HKM et le Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT). Nous remercions également le Ministère en charge de la famille à travers la Direction de la Promotion de la Femme et du Genre (DPFG) pour sa contribution.

Nous adressons nos sincères remerciements aux Partenaires Techniques et Financiers dont l'engagement et les appuis ont rendu possible la réalisation de cette enquête.

Nous rendons un vibrant hommage à l'âme de Feu Bernard BARRERE, précédemment Directeur Adjoint de ICF International pour ses apports considérables, mais malheureusement arraché à notre affection, le 14 octobre 2018. Nous saisissons cette opportunité pour renouveler notre reconnaissance à tout le personnel de ICF International pour son appui technique aux différentes étapes de l'enquête notamment à Madame Yodit Bekele et Messieurs Sinaré Tinga, Fidèle Mutima, Michel Toukam, Amadou Sow, Traoré Metahan ainsi qu'à l'équipe de conception et de production du rapport d'analyse thématique. Par ailleurs, nous adressons un remerciement spécial à l'endroit des anciens Directeurs de l'Institut pour leurs précieuses contributions à l'amélioration de la qualité du rapport.

Nous voudrions également témoigner notre profonde gratitude et notre reconnaissance à l'égard des populations enquêtées ainsi qu'aux autorités administratives, locales, coutumières et religieuses pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé au personnel de terrain.

Enfin, nous adressons toutes nos félicitations au personnel de terrain constitué de superviseurs, d'éditeurs, de chefs d'équipe, d'agents « biomarqueurs » et d'enquêteurs pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur endurance qui ont été déterminants pour la réussite de l'enquête. Nous tenons à saluer l'expertise et le dévouement de l'équipe de l'INSAE qui s'est mobilisée pour assurer un succès à cette opération, aussi bien du point de vue technique, logistique, qu'administratif et financier.



Laurent Mahounou HOUNSA
Directeur Général

PRÉFACE

Le Bénin, dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS), vient de réaliser la cinquième édition de l'Enquête Démographique et de Santé (EDSB-V). Elle a été exécutée et coordonnée par l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) qui est sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement (MPD).

Le travail a été fait en collaboration avec des services techniques du Ministère de la Santé, le Laboratoire de Parasitologie et de Cardiologie du Centre National Hospitalier (CNHU), le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN).

Le financement de la cinquième édition de l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-V) a été assuré par le Gouvernement du Bénin, l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), par le biais d'un financement du Fonds Mondial et le SP-CAN à travers un financement de la Banque Mondiale.

Depuis l'élaboration du protocole en octobre 2016 jusqu'à la publication du présent rapport, le Bénin a bénéficié de l'assistance technique de ICF, une institution américaine en charge du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (DHS), financé par l'USAID.

Grâce à cette cinquième édition de l'EDS, le Bénin dispose d'indicateurs fiables et actualisés sur, entre autres, la fécondité, la planification familiale, l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, la mortalité des enfants et l'anémie, indispensables à la mise en place de politiques et de programmes et plus particulièrement pour le suivi des Objectifs de Développement Durable (ODD) et le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG).


La particularité de cette cinquième édition de l'EDS réside dans l'introduction de trois nouveaux modules à savoir, les maladies non transmissibles au sein de la population des femmes (30-49 ans) et des hommes (30-64 ans), les violences conjugales (pour lesquelles les questions ont été posées uniquement aux femmes, suivant un échantillon bien déterminé) et le développement du jeune enfant (enfants de moins de 5 ans).

L'INSAE a expérimenté pour la deuxième fois dans le cadre de l'EDS, l'utilisation des tablettes (mini ordinateurs portables) qui ont permis la saisie directe des données sur le terrain. Le succès avec lequel il a réalisé ce projet confirme à nouveau son leadership et la nécessité de faire confiance à l'expertise nationale. J'exprime donc ma satisfaction et adresse mes encouragements aux cadres de l'INSAE et à ICF pour leur appui technique.

J'exhorte les responsables à divers niveaux et les chercheurs à s'approprier les résultats de ce travail dans les domaines qui les concernent, comme principal cadre de référence pour l'évaluation et la mise en œuvre des programmes de population et de santé, pour une meilleure planification de leurs activités et des interventions plus efficaces en vue d'arriver à un changement réel de l'état de santé et des conditions de vie de la population.

Enfin, au nom du Gouvernement de la République du Bénin, j'exprime ma vive gratitude à l'USAID et aux représentations de l'UNICEF, de l'UNFPA, du PNL (Fonds Mondial) et du SP-CAN (Banque Mondiale) du Bénin, dont les contributions financières ont permis l'aboutissement de ce précieux travail.




Abdoulaye BIO TCHANE
Ministre d'Etat Chargé du Plan
et du Développement

LISTE DES PARTICIPANTS A L'ATELIER D'ANALYSE DE L'EDSB-V 2017-2018

INSAE

Hounsa Laurent Mahounou, Directeur Général
Ahamide Armelle, Directrice Générale Adjointe

Equipe Technique, INSAE

| | | |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Hounguevou Rémy | Houessou Assaba Gisèle | Dossou Fèmi Christian |
| Ahovey Elise | Agbangla Sévérin | Houkpodote Eudes R. O. |
| Zounon Mémounath | Houndonougbo Oscar | Lawani Mouchitaba |
| Houeha Jeannine | Djagba Bruno | Quenum Charlotte |
| Yovoga Renaud | Missihoun Kokou | Kiki Gilles |

Appui administratif et logistique de l'INSAE

| | |
|---------------------|------------------|
| Ablefonlin Eléonore | Awo Hilarion |
| Ahouangbo A. Cécile | Badjagou Solange |

Participants des structures sectorielles

| | |
|--|----------------------------|
| Dodoo Virgile, MS/ANV-SSP | Ahyi José, DSME/MS |
| Baco Mama Chabi Aminatou, DSME/MS | Yebe H. Cyrillia, DPF/MASM |
| Koukpolyi Augustin, CNHU-HKM/Parasitologie | Moussa Ibrahim, ABPF |
| Adanhoume Bernadin, DNSP/MS | Ogoudedji Georges, SP-CAN |
| Assani Salimatou, CNHU-HKM/Cardiologie | Affedjou Fiacre, SP-CAN |
| Pio Abou Bakary, PNLP | Houensou Mireille, SP-CAN |
| Goudjo Gaétan Cyriaque, PNLMT | Houindote Andréa, SP-CAN |

Personnes Ressources de l'INSAE (analystes)

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Semevo Odette | Kouchoro Georges | Dansou Justin | Atodjinou Candide |
| Somakou Etienne | Koungblenou Paterné | Ahokpossé Yédodé | Gbokli Antoinette |

Personnes Ressources de l'INSAE (lecteurs)

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Zounon Kokou | Bankole Maurice Dossou |
| Nouatin Bruno Magloire | Bankole Victor Valère O. |
| Djaton Koubadje Sourou | Kodjogbe Nicaise |
| Tohouegnon J. Thomas | Mensah Victorine |

Expert Afristat

Adechian Djabar Dine C.

Participants Partenaire, technique et financières

Onambele Agueh Bertille, USAID
Kouton Narcisse, UNICEF
Attemba Roger, SNU

SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

| | |
|-----------------|---|
| ABPF | Agence Béninoise pour la Promotion de la Famille |
| ANGC | Agence Nationale de la Gratuité de la Césarienne |
| ANV-SSP | Agence Nationale de Vaccination et des Soins de Santé Primaires |
| ANJE | Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant |
| ASC | Agent de Santé Communautaire |
| AVC | Accidents Vasculaires Cérébraux |
| BCG | Bacille de Calmette et Guérin |
| CAN | Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition |
| CAPI | Computer Assisted Personal Interviewing |
| CCC | Cadre Communal de Concertation |
| CCR | Cadre Commun de Résultats |
| CCSC | Communication pour le Changement Social et de Comportement |
| CDC | Cadre Départemental de Concertation |
| CDE | Convention Relative aux Droits de l'Enfant |
| CNERS | Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé |
| CNHU-HKM | Laboratoire de Parasitologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga |
| CNLS | Conseil National de Lutte contre le Sida |
| CNLSTP | Conseil National de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme |
| CNPERS | Comité National Provisoire d'Éthique pour la Recherche en Santé |
| CNS | Conseil National de la Statistique |
| CPN | Consultation Périnatale |
| CSAN | Comité de Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle |
| CSPPro | Census and Survey Processing System |
| CTA | Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine |
| DED | Direction des Études Démographiques |
| DHS | Demographic and Health Survey |
| DIU | Dispositif Intra-Utérin |
| DNSP | Direction Nationale de la Santé Publique |
| DPFG | Direction de la Promotion de la Femme et du Genre |
| DSME | Direction de la Santé, de la Mère et de l'Enfant |
| DTC | Diphthérie, Tétanos, Coqueluche |
| EDS | Enquête Démographique et de Santé |
| EDSB-V | Cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin |
| ET | Ecart-type |
| g/dl | Gramme par décilitre |
| GPS | Global Position System |
| GPL | Gaz Propane Liquéfié |
| HepB | Hépatite B |
| Hib | Haemophilus Influenzae type B |
| HTA | Hypertension Artérielle |
| IC | Intervalle de Confiance |
| IMC | Indice de Masse Corporelle |
| INSAE | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique |

| | |
|---------------|---|
| IPG | Indice de Parité entre les Genres |
| IRA | Infection Respiratoire Aiguë |
| ISF | Indice Synthétique de Fécondité |
| ISFD | Indice Synthétique de Fécondité Désirée |
| IST | Infections Sexuellement Transmissibles |
| MAMA | Méthode de l'Aménorrhée et de l'Allaitement Maternel |
| MICS | Multiple Indicator Cluster Survey |
| MI | Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide |
| MIILDA | Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action |
| MJF | Méthode des jours fixes |
| MNT | Maladies Non Transmissibles |
| MPD | Ministère du Plan et du Développement |
| ODD | Objectifs de Développement Durable |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| NN | Néonatal |
| PAD | Pression Artérielle Diastolique |
| PAG | Programme d'Actions du Gouvernement |
| PANAN | Plan d'Action National pour l'Alimentation et la Nutrition |
| PANBPF | Plan d'Action National Budgétisé pour la Planification Familiale |
| PANJE | Pratiques Alimentaires du Nourrisson et du Jeune Enfant |
| PAS | Pression Artérielle Systolique |
| PCIME | Prise en Charge Intégrée des Maladies des Enfants |
| PF | Planification Familiale |
| PID | Pulvérisation Intradomiciliaire d'insecticide résiduel |
| PMASN | Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition |
| PNDS | Plan National de Développement Sanitaire |
| PNLMNT | Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles |
| PNLP | Programme National de Lutte contre le Paludisme |
| PNLS | Programme National de Lutte contre le SIDA |
| PNN | Postnéonatale |
| PPG | Paludisme Pendant la Grossesse |
| PSDAN | Plan Stratégique de Développement de l'Alimentation et de la Nutrition |
| PTME | Prévention de la Transmission Mère-Enfant |
| RDV | Risque de mortalité maternelle sur la Durée de Vie |
| RGPH | Recensement Général de la Population et de l'Habitation |
| RMG | Rapport de Mortalité lié à la Grossesse |
| RMM | Rapport de Mortalité Maternelle |
| SIDA | Syndrome Immuno Déficience Acquise |
| SMR | Solution Maison Recommandée |
| SNDS | Stratégie Nationale de Développement de la Statistique |
| SONU | Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgences |
| SP | Sulfadoxine-Pyriméthamine |
| SP-CAN | Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition |
| SPC | Suivi et Promotion de la Croissance |
| SRO | Sels de Réhydratation Orale |
| TAR | Thérapies Antirétrovirales |
| TBF | Taux Brut de Fréquentation scolaire |
| TBN | Taux Brut de Natalité |
| TDR | Test de Diagnostic Rapide |


| | |
|---------------|---|
| TGFG | Taux Global de Fécondité Générale |
| TME | Transmission de la Mère à l'Enfant |
| TNF | Taux Net de Fréquentation scolaire |
| TPIg | Traitement Préventif Intermittent pendant la grossesse |
| TRO | Thérapie de Réhydratation Orale |
| | |
| USAID | Agence des États-Unis pour le Développement International |
| UNFPA | Fonds des Nations Unies pour la Population |
| UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance |
| UPS | Unités Primaires de Sondage |
| | |
| VIH | Virus de l'Immunodéficience Humaine |
| | |
| ZD | Zone de Dénombrement |

LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE LA CINQUIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU BÉNIN (EDSB-V) 2017-2018

Le nouveau format du rapport final de la Cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V) 2017-2018 est basé sur environ 200 tableaux de données. Pour une consultation facile, les tableaux se trouvent à la fin de chaque chapitre et les utilisateurs peuvent aussi y accéder à travers les liens dans le texte dans la version électronique. De plus, ce format plus convivial présente à peu près 90 graphiques qui soulignent clairement des tendances au cours du temps et les tendances départementales et des caractéristiques sociodémographiques. De grandes cartes colorées présentent les données par département au Bénin. Le texte a été simplifié pour mettre en évidence les points clés avec des puces et permettre d'identifier clairement les détails des indicateurs avec des boîtes de définition.

Bien que le texte et les graphiques présentés dans chaque chapitre mettent en évidence certains des résultats les plus importants des tableaux, chaque résultat ne peut pas être discuté ou présenté graphiquement. Pour cette raison, les utilisateurs des données de l'EDSB-V 2017-2018 doivent être à l'aise en lisant et interprétant les tableaux.

Les pages suivantes fournissent une introduction à l'organisation des tableaux de l'EDSB-V 2017-2018, la présentation des caractéristiques sociodémographiques, ainsi qu'un résumé bref de l'échantillonnage pour faciliter la compréhension des dénominateurs. En outre, cette section fournit des exercices afin que les utilisateurs pratiquent leurs nouvelles compétences en interprétation des tableaux de l'EDSB-V 2017-2018.



Exemple 1 : Exposition aux médias : Femme

Une question posée à toutes les enquêtées

| Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme 1 | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
| Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018 | | | | | | |
| Caractéristique sociodémographique 3 | Lit un journal, au moins, une fois par semaine | Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine | Écoute la radio, au moins, une fois par semaine | Les trois médias, au moins, une fois par semaine | Aucun média, au moins, une fois par semaine | Effectif de femmes 2 |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 6,5 | 22,0 | 31,0 | 2,5 | 59,4 | 3 350 |
| 20-24 | 4,7 | 22,6 | 35,6 | 2,2 | 55,2 | 2 923 |
| 25-29 | 3,3 | 22,1 | 37,5 | 2,1 | 54,8 | 2 986 |
| 30-34 | 3,5 | 21,9 | 36,8 | 2,6 | 56,5 | 2 202 |
| 35-39 | 2,7 | 19,1 | 36,9 | 2,1 | 57,7 | 1 882 |
| 40-44 | 2,1 | 17,8 | 38,0 | 1,6 | 56,8 | 1 320 |
| 45-49 | 2,2 | 14,4 | 38,0 | 1,6 | 58,4 | 1 265 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 9,1 | 60,7 | 59,2 | 7,1 | 21,6 | 958 |
| Autres villes | 6,4 | 29,8 | 38,5 | 3,7 | 50,4 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 6,8 | 34,2 | 41,4 | 4,2 | 46,3 | 6 761 |
| Rural | 1,9 | 11,0 | 31,5 | 0,7 | 64,7 | 9 167 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 1,5 | 12,4 | 26,2 | 0,7 | 69,5 | 1 878 |
| Atacora | 0,7 | 9,1 | 25,0 | 0,3 | 72,0 | 1 302 |
| Atlantique | 4,1 | 35,2 | 57,9 | 2,8 | 32,3 | 2 037 |
| Borgou | 6,3 | 14,8 | 24,7 | 2,8 | 67,9 | 1 839 |
| Collines | 1,8 | 12,4 | 27,7 | 0,8 | 67,9 | 1 151 |
| Couffo | 1,8 | 14,2 | 40,2 | 0,6 | 56,5 | 1 041 |
| Donga | 1,4 | 10,9 | 27,6 | 0,5 | 66,8 | 881 |
| Littoral | 9,1 | 60,7 | 59,2 | 7,1 | 21,6 | 958 |
| Mono | 6,6 | 20,0 | 42,5 | 3,9 | 53,5 | 759 |
| Ouémé | 7,9 | 26,6 | 38,6 | 4,8 | 50,9 | 1 507 |
| Plateau | 4,8 | 16,8 | 35,3 | 1,5 | 57,2 | 970 |
| Zou | 2,8 | 18,2 | 27,5 | 1,0 | 63,3 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 0,1 | 10,2 | 29,1 | 0,0 | 67,3 | 8 785 |
| Primaire | 2,4 | 23,7 | 39,2 | 1,2 | 52,6 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 10,1 | 33,3 | 42,7 | 4,5 | 43,8 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 23,4 | 63,0 | 59,4 | 15,9 | 20,9 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 0,5 | 2,6 | 21,1 | 0,0 | 78,0 | 2 735 |
| Second | 1,1 | 4,0 | 25,7 | 0,1 | 72,7 | 3 030 |
| Moyen | 1,9 | 7,2 | 31,6 | 0,5 | 65,4 | 3 104 |
| Quatrième | 3,6 | 20,6 | 38,7 | 1,0 | 53,2 | 3 405 |
| Le plus élevé | 11,2 | 60,2 | 55,6 | 8,1 | 24,0 | 3 654 |
| Ensemble | 4,0 | 20,8 | 35,7 | 2,2 | 56,9 | 15 928 |

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre—surlignés en orange dans l'Exemple 1. Ils vous présentent le sujet et la population de référence que le tableau décrit. Dans ce cas, le tableau porte sur les femmes de 15-49 ans et leur exposition aux médias. Ces questions ont été posées à toutes les femmes de 15-49 ans dans les ménages sélectionnés.

Étape 2 : Examinez les en-têtes des colonnes—surlignées en vert. Ils décrivent la façon dont l'information est présentée. Dans ce tableau, les trois premières colonnes de données présentent les différents types de médias auxquels les femmes peuvent être exposées hebdomadairement. La quatrième colonne présente les femmes qui accèdent aux trois médias au moins une fois par semaine et la cinquième colonne montre les femmes qui n'accèdent à aucun média hebdomadairement. La dernière colonne énumère le nombre de femmes enquêtées.

Étape 3 : Examinez les titres des lignes—la première colonne surlignée en bleu. Les lignes montrent les différentes catégories au sein desquelles les données sont réparties. Dans ce cas, le tableau présente l'exposition aux médias par âge, par milieu de résidence, par département, par niveau d'instruction et par

quintile de bien-être économique. La plupart des tableaux du rapport de l'EDSB-V 2017-2018 sont divisés selon ces mêmes catégories.

Étape 4 : Regardez la dernière ligne du tableau **surlignée en rose**. Ces pourcentages représentent les pourcentages totaux de toutes les femmes qui sont exposées à chaque type de média au moins une fois par semaine. Dans cet exemple, 4,0 %* de femmes de 15-49 ans lisent un journal au moins une fois par semaine, 20,8 % regardent la télévision au moins une fois par semaine et 35,7 % écoutent la radio au moins une fois par semaine.

Étape 5 : Pour identifier le pourcentage de femmes ayant un niveau d'instruction supérieur qui sont exposées aux trois médias au moins une fois par semaine, tracez deux lignes, comme celles qui se trouvent dans le tableau. Cela montre que 15,9 % de femmes de 15-49 ans ayant un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus sont exposées aux trois médias au moins une fois par semaine.

En regardant les variations par caractéristique, on peut voir comment l'exposition aux médias varie au Bénin. Les médias sont souvent utilisés pour communiquer des messages sur la santé. Les gérants des programmes et les décideurs politiques peuvent mieux toucher leurs populations cibles s'ils connaissent comment l'exposition aux médias varie parmi les différents groupes.

*Dans ce document, les données sont présentées exactement comme elles apparaissent dans le tableau y compris le nombre de décimales. Cependant, dans le texte (dans le reste de ce rapport), les chiffres seront arrondis au point de pourcentage entier le plus proche.

Pratique : Utilisez le tableau dans l'Exemple 1 pour répondre aux questions suivantes :

- Quel pourcentage de femmes de 15-49 ans n'accèdent à aucun média au moins une fois par semaine ?
- Dans quel groupe d'âge la proportion de femmes exposées au journal est-elle la plus élevée ?
- Comparez les femmes de Cotonou à celles du milieu rural—dans quel groupe l'exposition à la télévision est-elle la plus élevée ?
- Quels sont les pourcentages minimum et maximum (la gamme) de femmes qui accèdent aux trois médias hebdomadairement par département ?
- Est-ce qu'il y a une association claire entre l'exposition hebdomadaire à la radio et le niveau d'instruction ?
- Est-ce qu'il y a une association claire entre l'exposition hebdomadaire à la télévision et le quintile de bien-être économique ?

Réponses :

a) 56,9 %

b) Femmes de 15-19 ans : 6,5 % de femmes dans ce groupe d'âge lisent un journal hebdomadairement.

c) Femmes de Cotonou, 60,7 % regardent la télévision au moins une fois par semaine contre 11,0 % en milieu rural.

d) Le pourcentage de femmes qui accèdent aux trois médias varie d'un minimum de 0,3 % dans l'Atacora à un maximum de 7,1 % dans le Littoral.

e) L'exposition hebdomadaire à la radio augmente avec le niveau d'instruction : 29,1 % de femmes sans instruction écoutent la radio au moins une fois par semaine, comparé à 59,4 % de femmes ayant un niveau d'instruction secondaire 2^{ème} cycle ou plus.

f) L'exposition hebdomadaire à la télévision augmente avec le quintile de bien-être économique : 2,6 % de femmes du quintile le plus bas regardent la télévision au moins une fois par semaine, comparé à 60,2 % de femmes du quintile le plus élevé.

Exemple 2 : Prévalence et traitement des symptômes d'IRA

Une question posée à un sous-groupe d'enquêtés

| Tableau 9.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|--------------------|
| Caractéristique sociodémographique | Parmi les enfants de moins de 5 ans : | | Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA : | | |
| | 2 Pourcentage avec des symptômes d'IRA ¹ | Effectif d'enfants | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ² | 3 Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour suivant | Effectif d'enfants |
| Age en mois | | | | | |
| <6 | 3,6 | 1 423 | 46,5 | 12,6 | 51 |
| 6-11 | 4,2 | 1 517 | 44,6 | 17,3 | 64 |
| 12-23 | 3,3 | 2 515 | 41,9 | 15,5 | 83 |
| 24-35 | 2,7 | 2 365 | 48,3 | 16,6 | 63 |
| 36-47 | 2,2 | 2 450 | 53,4 | 24,5 | 54 |
| 48-59 | 2,0 | 2 416 | (43,7) | (8,6) | 47 |
| Sexe | | | | | |
| Masculin | 3,0 | 6 415 | 45,8 | 13,8 | 194 |
| Féminin | 2,7 | 6 271 | 46,5 | 18,6 | 167 |
| Consommation de tabac/cigarettes par la mère | | | | | |
| Fume cigarettes/tabac | 7,1 | 208 | * | * | 15 |
| Ne fume pas | 2,8 | 12 478 | 46,8 | 16,5 | 346 |
| Combustible pour cuisinier | | | | | |
| Électricité ou gaz | 1,9 | 371 | * | * | 7 |
| Kérosène | * | 6 | * | * | 1 |
| Charbon/lignite | 0,0 | 124 | * | * | 0 |
| Charbon de bois | 2,4 | 2 926 | 53,8 | 26,5 | 71 |
| Bois/paille ³ | 3,1 | 9 243 | 43,9 | 13,1 | 282 |
| Excréments d'animaux | * | 2 | * | * | 0 |
| Autres combustibles | * | 10 | * | * | 1 |
| Pas de repas préparé dans le ménage | * | 4 | * | * | 0 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 1,5 | 558 | * | * | 8 |
| Autres villes | 2,4 | 4 382 | 60,8 | 23,3 | 105 |
| Ensemble urbain | 2,3 | 4 940 | 59,7 | 24,2 | 113 |
| Rural | 3,2 | 7 746 | 39,8 | 12,3 | 248 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 5,3 | 1 718 | 14,1 | 6,9 | 92 |
| Atacora | 1,5 | 1 127 | * | * | 17 |
| Atlantique | 3,9 | 1 448 | (41,6) | (9,3) | 57 |
| Borgou | 0,8 | 1 678 | * | * | 14 |
| Collines | 1,8 | 814 | * | * | 15 |
| Couffo | 4,5 | 844 | (80,0) | (35,9) | 38 |
| Donga | 0,3 | 831 | * | * | 2 |
| Littoral | 1,5 | 558 | * | * | 8 |
| Mono | 6,8 | 565 | (48,7) | (13,8) | 39 |
| Ouémé | 1,1 | 1 131 | * | * | 13 |
| Plateau | 5,0 | 766 | (58,5) | (7,2) | 38 |
| Zou | 2,4 | 1 206 | (73,9) | (26,6) | 30 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | |
| Aucun | 3,1 | 8 301 | 42,0 | 15,7 | 253 |
| Primaire | 2,5 | 2 310 | 50,3 | 15,8 | 58 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,6 | 1 523 | (56,4) | (22,5) | 39 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,9 | 552 | * | * | 10 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 3,2 | 2 713 | 30,2 | 6,5 | 86 |
| Second | 3,8 | 2 554 | 49,2 | 18,8 | 96 |
| Moyen | 3,0 | 2 559 | 41,9 | 14,6 | 77 |
| Quatrième | 2,8 | 2 549 | 53,7 | 18,9 | 72 |
| Le plus élevé | 1,3 | 2 311 | (73,8) | (31,0) | 31 |
| Ensemble | 2,8 | 12 686 | 46,1 | 16,0 | 361 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

² Sont inclus les conseils ou traitements fournis par le secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeurs de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

³ Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles.

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre surlignés en orange dans l'Exemple 2. Dans ce cas, le tableau porte sur deux groupes séparés : tous les enfants de moins de 5 ans (a) et les enfants de moins de 5 ans qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines précédant l'interview (b).

Étape 2 : Identifiez les deux groupes de colonnes surlignés en vert. Tout d'abord, identifiez les colonnes qui se réfèrent à tous les enfants de moins de 5 ans (a), puis isolez les colonnes qui se réfèrent seulement aux enfants de moins de 5 ans qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines précédant l'interview (b).

Étape 3 : Regardez le premier groupe de colonnes. Quel pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview ? Ce sont 2,8 %.

Regardez maintenant le groupe (b). Combien d'enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview? Ce sont 361 enfants ou 2,8 % de 12 686 d'enfants de moins de 5 ans (avec chiffres arrondis). Le groupe (b) est un sous-groupe du groupe (a).

Étape 4 : Seulement 361 enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview. Quand ces enfants sont répartis par des caractéristiques sociodémographiques, il y a parfois trop peu de cas pour que ces pourcentages soient fiables.

- Parmi les enfants de moins de 5 ans du Mono qui ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview, des conseils ou un traitement ont été recherchés pour quel pourcentage ? 48,7 %. Le pourcentage est entre parenthèses parce qu'il est basé sur 25-49 enfants (non pondérés) dans cette catégorie. Les utilisateurs de données doivent utiliser ce chiffre avec prudence—il peut ne pas être fiable. (Pour plus d'information sur les chiffres pondérés et non pondérés, voyez le cas N° 4 de l'Exemple 2.)
- Parmi les enfants de moins de 5 ans du Littoral qui ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview, des conseils ou un traitement ont été recherchés pour quel pourcentage? L'astérisque mentionné dans la cellule indique qu'il y a très peu de cas (moins de 25 enfants). Le résultat pour ce groupe n'est pas présenté. Le sous-groupe est trop petit et le résultat n'aurait pas été fiable.

Note : Quand des chiffres sont présentés entre parenthèses ou quand il y a un astérisque à la place d'un chiffre dans un tableau, l'explication doit figurer au bas du tableau. S'il n'y a aucune parenthèse ou astérisque dans le tableau, vous pouvez en déduire qu'il y a suffisamment de cas dans toutes les catégories et que les données sont statistiquement représentatives.

Exemple 3 : Comprendre les pondérations de l'échantillon dans les tableaux de l'EDSB-V 2017-2018

Un échantillon est un groupe d'individus sélectionnés pour une enquête. Dans l'EDSB-V 2017-2018, l'échantillon est conçu pour représenter la population nationale de 15-49 ans. En plus des données nationales, la plupart des pays veulent collecter et présenter des données qui portent sur des plus petites zones géographiques ou administratives. Pour cela, il est nécessaire de disposer d'une taille d'échantillon minimum par zone. L'EDSB-V 2017-2018 est représentative au niveau national, aux niveaux département et milieu de résidence (urbain et rural).

Pour produire des statistiques représentatives du pays dans son ensemble et au niveau des 12 départements, le nombre de femmes enquêtées dans chaque département doit contribuer à la taille de l'échantillon total (national) en proportion de la taille du département. Cependant, dans le cas où certains départements ont des petites populations, un échantillon alloué en proportion de la population de chaque département peut ne pas inclure suffisamment de femmes de chaque département pour pouvoir fournir des résultats valables. Pour résoudre ce problème, les départements avec des populations trop petites sont sur-échantillonnés. Prenons le cas suivant : vous disposez d'assez d'argent pour interviewer 15 928 femmes et vous voulez produire des résultats représentatifs au niveau du Bénin dans son ensemble et de ses départements (comme dans le Tableau 3.1). Cependant, la population totale du Bénin n'est pas répartie de manière égale dans les départements : certains départements, comme l'Atlantique, sont très peuplés alors que d'autres comme le Littoral ne le sont pas. Par conséquent, le Littoral doit être sur-échantillonné.

Un spécialiste en sondage détermine combien de femmes doivent être enquêtées dans chaque département pour obtenir des statistiques fiables. La colonne surlignée en bleu (1) dans le tableau, à droite, présente le nombre réel de femmes interviewées dans chaque département. Dans les départements, le nombre de femmes interviewées varie de 816 dans le Mono à 1 765 dans le Borgou. Le nombre d'interviews est suffisant pour obtenir des résultats fiables dans chaque département.

Avec cette répartition d'interviews, certains départements sont sur-représentés et d'autres sont sous-représentés. Par exemple, la population de l'Atlantique représente environ 13 % de la population du Bénin, alors que celle du Littoral ne représente que 6 % de la population du Bénin. Cependant, comme le montre la colonne en bleu, le nombre de femmes interviewées dans l'Atlantique ne représente que 11 % de l'échantillon total des femmes interviewées (1 702/15 928) et le nombre de femmes interviewées dans le Littoral représente à peu près 9 % des femmes interviewées (1 415/15 928). Cette répartition non pondérée de femmes ne représente pas exactement la population du pays.

Pour obtenir des statistiques représentatives du Bénin, la répartition des femmes dans l'échantillon doit être pondérée (ou ajustée mathématiquement) de manière à ce qu'elle soit proche de la répartition réelle dans le pays. Les femmes d'un petit département, comme le Littoral, ne contribueront que peu au niveau de l'ensemble national. Les femmes d'un grand département, comme l'Atlantique, contribueront beaucoup plus. Les statisticiens calculent donc un « poids » qui est utilisé pour ajuster le nombre de femmes de chaque département pour que le poids de chaque département par rapport au total soit proportionnel à la population actuelle du département. Les nombres dans la colonne surlignée en violet (2) représentent les valeurs « pondérées ». Les valeurs pondérées peuvent être plus petites ou plus grandes que les valeurs non pondérées au niveau du département. La taille totale de l'échantillon national de 15 928 femmes n'a pas changé après

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes 15-49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | 3 Pourcentage pondéré | 2 Effectif pondéré | 1 Effectif non pondéré |
| Département | | | |
| Alibori | 11,8 | 1 878 | 1 697 |
| Atacora | 8,2 | 1 302 | 1 392 |
| Atlantique | 12,8 | 2 037 | 1 702 |
| Borgou | 11,5 | 1 839 | 1 765 |
| Collines | 7,2 | 1 151 | 1 403 |
| Couffo | 6,5 | 1 041 | 1 012 |
| Donga | 5,5 | 881 | 964 |
| Littoral | 6,0 | 958 | 1 415 |
| Mono | 4,8 | 759 | 816 |
| Ouémé | 9,5 | 1 507 | 1 260 |
| Plateau | 6,1 | 970 | 952 |
| Zou | 10,1 | 1 606 | 1 550 |
| Ensemble 15-49 | 100,0 | 15 928 | 15 928 |

la pondération, mais la distribution des femmes à travers les départements a été modifiée pour représenter leur poids dans la taille totale de la population.

Comment les statisticiens évaluent-ils le poids de chaque catégorie? Ils tiennent compte de la probabilité qu'une femme soit sélectionnée dans l'échantillon. Si vous deviez comparer la colonne en vert (3) à la répartition réelle de la population du Bénin, vous verriez que les femmes dans chaque département contribuent à l'échantillon total avec le même poids qu'elles contribuent à la population du pays. Le nombre pondéré de femmes dans l'enquête représente maintenant exactement la proportion de femmes qui vivent réellement dans le Littoral et dans l'Atlantique.

Avec l'échantillonnage et la pondération, il est possible d'interviewer suffisamment de femmes pour fournir des statistiques fiables aux niveaux national et départemental. En général, seuls les chiffres pondérés sont présentés dans chaque tableau de l'EDSB-V 2017-2018 ; ne soyez donc pas surpris si ces chiffres paraissent faibles : ils peuvent en fait représenter un plus grand nombre de femmes interviewées.

INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Indicateurs sur les objectifs de développement durable, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Indicateur | Sexe | | Ensemble | Numéro tableau DHS |
|---|------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| | Homme | Femme | | |
| 2. Éliminer la faim | | | | |
| 2.2.1 Prévalence du retard de croissance parmi les enfants de moins de 5 ans | 35,1 | 29,1 | 32,2 | 11.1 |
| 2.2.2 Prévalence de la malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans | 7,4 | 6,2 | 6,8 ^a | na |
| a) Prévalence de l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans | 5,6 | 4,3 | 5,0 ^a | 11.1 |
| b) Prévalence du surpoids (obésité) parmi les enfants de moins de 5 ans | 1,8 | 1,9 | 1,9 ^a | 11.1 |
| 3. Bonne santé et bien-être | | | | |
| 3.1.1 Taux de mortalité maternelle ¹ | na | na | 391 | 15.4 |
| 3.1.2 Proportion des naissances assistées par un professionnel qualifié | na | na | 78,1 | 8.6 |
| 3.2.1 Taux de mortalité infanto-juvénile ² | 104 | 89 | 96 | 12.2 |
| 3.2.2 Taux de mortalité néonatale ² | 36 | 24 | 30 | 12.2 |
| 3.7.1 Proportion de femmes en âge de procréer (âgées de 15-49 ans) dont les besoins en fins de planification familiale sont satisfaits à l'aide des méthodes modernes | na | 28,8 | na | 7.11.2 |
| 3.7.2 Taux de natalité parmi les adolescentes par 1000 femmes | | | | |
| a) Filles âgées de 10-14 ans ³ | na | [2] | na | 5.1 |
| b) Femmes âgées de 15-19 ans ⁴ | na | 108 | na | 5.1 |
| 3.a.1 Taux de prévalence ajustée selon l'âge de l'utilisation actuelle de tabac parmi les personnes âgées de 15 et plus ⁵ | 6,9 | 1,4 | 4,1 ^a | 3.10.1 et 3.10.2 |
| 3.b.1 Proportion de la population cible couverte par tous les vaccins inclus dans leur programme national ⁶ | | | | |
| a) Couverture du vaccin contre le DTC (3 ^{ème} dose) ⁷ | 53,1 | 49,5 | 51,3 | 9.3 |
| b) Couverture du vaccin contre le pneumocoque (dernière dose du calendrier vaccinal) ⁸ | 73,5 | 72,5 | 73,0 | 9.3 |
| | 71,5 | 70,1 | 70,8 | 9.3 |
| 4. Éducation de qualité | | | | |
| 4.2.1 Proportion d'enfants de moins de 5 ans qui sont sur une bonne voie de développement en matière de santé, d'apprentissage et de bien-être psycho-social en fonction du sexe ⁹ | 55,3 | 57,7 | 56,5 | 18.12 |
| 5. Égalité entre les sexes | | | | |
| 5.2.1 Proportion de femmes ayant déjà vécu en couple et de filles âgées de 15 ans et plus, victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commis par un partenaire intime actuel ou ancien, dans les 12 mois précédant l'enquête ^{10,11} | na | 31,9 | na | 16.12 |
| a) Violence physique | na | 11,2 | na | 16.12 |
| b) Violence sexuelle | na | 6,1 | na | 16.12 |
| c) Violence psychologique | na | 28,7 | na | 16.12 |
| 5.3.1 Proportion de femmes âgées de 20-24 ans ayant été mariées ou en union avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 18 ans | | | | |
| a) Avant l'âge de 15 ans | na | 9,4 | na | 4.3 |
| b) Avant l'âge de 18 ans | na | 30,6 | na | 4.3 |
| 5.6.1 Proportion de femmes âgées de 15-49 ans qui prennent des décisions informées concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et les soins de santé génésique ¹² | na | 25,2 | na | na |
| 5.b.1 Proportion d'individus possédant un téléphone portable ¹³ | 79,5 | 51,1 | 65,3 ^a | 14.7.1 et 14.7.2 |
| | Résidence | | | |
| | Urbain | Rural | | |
| 6. Eau propre et assainissement | | | | |
| 6.1.1 Proportion de la population utilisant des services d'eau potable à gestion sécurisée ¹⁴ | 75,0 | 63,0 | 67,8 | 2.1 |
| 6.2.1 Proportion de la population utilisant des services de sanitation à gestion sécurisée, y compris une installation pour le lavage des mains avec eau et savon ¹⁵ | 22,4 | 6,3 | 12,8 | 2.3 |
| 7. Énergie propre et à coût abordable | | | | |
| 7.1.1 Proportion de la population ayant accès à l'électricité | 54,2 | 21,2 | 34,5 | 2.4 |
| 7.1.2 Proportion de la population ayant une dépendance primaire sur les carburants et la technologie ¹⁶ | 8,0 | 1,0 | 3,8 | 2.4 |
| | Sexe | | | |
| | Homme | Femme | | |
| 8. Travail décent et croissance économique | | | | |
| 8.7.1 Proportion et nombre d'enfants âgés de 5-17 impliqués dans le travail juvénile | 32,6 | 33,2 | 32,9 | 18.7 |
| 8.10.2 Proportion d'adultes (15 ans et plus) ayant un compte dans une banque, dans une autre institution financière, ou avec un fournisseur de service mobile et de transfert d'argent ¹³ | 14,3 | 6,4 | 10,3 ^a | 14.7.1 et 14.7.2 |
| 16. Paix, justice et institutions fortes | | | | |
| 16.2.1 Pourcentage d'enfants âgés de 1-17 ans ayant subi une forme quelconque de punition corporelle et/ou agression psychologique commis par leurs soignants durant le mois précédent l'enquête ¹⁷ | 91,1 | 91,2 | 91,2 | 18.3 |
| 16.9.1 Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil | 85,4 | 85,9 | 85,6 | 18.1 |
| 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs | | | | |
| 17.8.1 Proportion d'individus utilisant l'internet ¹⁸ | 20,3 | 6,3 | 13,3 ^a | 3.5.1 et 3.5.2 |

na = Non applicable. Les estimations entre crochets sont tronquées.

¹ Exprimés en termes de mortalité maternelle par 100 000 naissances vivantes durant la période de 7 ans précédant l'enquête

- ² Exprimés en termes de mortalité par 1000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédant l'enquête
- ³ Equivalent au taux de fécondité par âge pour les filles âgées de 10-14 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en terme de naissances par 1000 filles âgées de 10-14 ans
- ⁴ Equivalent au taux de fécondités par âge des femmes âgées de 15-19 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en terme de naissances par 1000 filles âgées de 15-19 ans
- ⁵ Les données ne sont pas standardisées pour l'âge et sont disponibles pour seulement les femmes et hommes de 15-49 ans.
- ⁶ Les données sont présentées pour les enfants de 12-23 mois qui ont reçu tous les vaccins appropriés à leur âge qui sont inclus dans le programme national: BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 4 doses du vaccin oral contre la polio, 3 doses du vaccin contre le pneumocoque, 1 dose de vaccin anti-rougeoleux, et une dose du vaccin contre la fièvre jaune.
- ⁷ Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu les 3 doses de vaccin contre le DTC
- ⁸ Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu les 3 doses de vaccin contre le pneumocoque
- ⁹ Mesurés pour enfants de 36-59 mois
- ¹⁰ Les données sont disponibles seulement pour les femmes âgées de 15-49 ans qui ont déjà été en union.
- ¹¹ Dans le DHS, la violence psychologique est nommée violence émotionnelle.
- ¹² Données disponibles seulement pour les femmes actuellement en union qui ne sont pas enceintes
- ¹³ Données disponibles seulement pour hommes et femmes âgés de 15-49 ans
- ¹⁴ Mesuré comme le pourcentage de la population utilisant une source d'eau améliorée: le pourcentage de la population de droit dont la source principale d'eau potable est un robinet dans le logement, robinet public ou fontaine, puits à pompe ou forage, puits protégé, source protégée, ou collecte d'eau de pluie. Les ménages utilisant le l'eau en bouteille pour la boisson sont classés comme utilisant une source améliorée ou non-améliorée dépendant de leur source d'eau pour la cuisson et le lavage des mains.
- ¹⁵ Mesuré comme le pourcentage de la population utilisant une installation sanitaire améliorée : pourcentage de la population de droit dont le ménage contient une chasse d'eau ou une chasse manuelle connectée à un système d'égout, un tank septique ou une fosse d'aisance ; fosse d'aisance améliorée auto-aérée ; fosse d'aisance avec dalle ; ou une toilette à compostage et ne partage pas cette installation avec d'autres ménages.
- ¹⁶ Mesuré comme le pourcentage de la population utilisant de l'énergie non polluante pour la cuisson
- ¹⁷ Données disponibles seulement pour enfants âgés de 1-14 ans
- ¹⁸ Les données sont disponibles pour les femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont utilisé l'internet dans les 12 mois précédents.
- ⁹ Le total est calculé comme une moyenne arithmétique simple des pourcentages des colonnes hommes et femmes.
-

BÉNIN



Dans le souci de mieux opérationnaliser les indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour le Bénin et d'en faire un meilleur suivi, le gouvernement béninois a réalisé en 2017-2018 la cinquième édition de l'Enquête Démographique et de Santé (EDSB-V). Cette enquête, qui s'inscrit dans le dispositif permanent d'enquêtes auprès des ménages, répond à la mise en œuvre du programme d'actions de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS 2014-2016) défini notamment dans l'objectif 3.2¹ de l'axe stratégique. Elle va aussi permettre de disposer des indicateurs pour l'évaluation des progrès accomplis à mi-parcours de l'exécution du Programme d'Action du Gouvernement (PAG 2016-2021). L'organisation de l'EDSB-V est assurée par l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et l'assistance technique d'ICF par le biais du programme international DHS (The Demographic and Health Survey).

L'EDSB-V 2017-2018 a été financée par le gouvernement de la République du Bénin appuyé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) pour l'organisation, la réalisation et l'analyse des résultats. D'autres agences et organisations ont aussi contribué à la réussite de l'enquête par leur appui financier ou technique telles que la Banque Mondiale par le biais du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition assurée par le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (PMASN/SP-CAN), le Fonds Mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Laboratoire de Parasitologie Mycologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) pour la prise en charge du traitement des échantillons de sang et le dépistage du paludisme.

L'EDSB-V s'est déroulée du 6 novembre 2017 au 28 février 2018, soit un peu plus de 3 mois de collecte de données.

1.1 OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE

L'objectif principal de l'EDSB-V 2017-2018 est de produire des indicateurs démographiques et de santé à partir d'un échantillon national représentatif de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-64 ans. En particulier au cours de l'EDSB-V, des données ont été collectées sur plusieurs indicateurs spécifiques au Bénin tels que :

- le taux de fécondité et l'Indice Synthétique de Fécondité ;
- les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile ;
- la fécondité et la mortalité infanto-juvénile ;
- l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes ;
- la santé maternelle, en particulier les soins prénatals et postnatals et les conditions d'accouchement ;
- la santé de l'enfant : vaccination, prévalence et traitement de la diarrhée, de la fièvre et des infections respiratoires chez les enfants de moins de cinq ans ;
- les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris l'allaitement ;

¹ Objectif stratégique : Assurer la production régulière de statistiques de qualité répondant aux engagements internationaux et nationaux pris (OMD, SCRP, MAEP, EPT, CIPD, etc.).

- l'état nutritionnel des femmes et des enfants en mesurant leur poids et taille ;
- la prévalence de l'anémie chez les femmes et les enfants par le biais d'un test d'hémoglobine ;
- la teneur en iode du sel utilisé pour la cuisine dans les ménages ;
- la prévention et le traitement du paludisme, en particulier la possession et l'utilisation de moustiquaires ;
- la prévalence du paludisme chez les enfants de 6-59 mois par le biais d'un test rapide et de goutte épaisse au laboratoire ;
- la prévalence de l'hypertension chez les femmes de 30-49 ans et les hommes de 30-64 ans en mesurant leur pression artérielle ;
- la connaissance et les attitudes des femmes et des hommes au sujet des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du sida ;
- les maladies non transmissibles chez les adultes ;
- la protection des enfants (travail, discipline, et développement) ;
- la violence basée sur le genre, y compris violence conjugale.

Plus précisément, les indicateurs de l'EDSB-V permettront aux responsables politiques, décideurs et gestionnaires de programme de faire une planification stratégique adéquate pour l'amélioration de l'état de la santé de la population.


1.2 CONCEPTION DE L'ÉCHANTILLON

L'échantillon de l'EDSB-V est représentatif au niveau national et des 12 départements, pour la ville de Cotonou et les autres villes et pour le milieu urbain et le milieu rural. Le territoire national a été découpé en 12 domaines d'études correspondant aux 12 départements administratifs et, dans chaque domaine d'études (sauf le département du Littoral qui n'a pas de milieu rural), 2 strates ont été créées : la strate du milieu urbain et celle du milieu rural.

Le tirage de l'échantillon de l'EDSB-V a été fait, strate par strate, à travers un sondage aréolaire stratifié et à 2 degrés. Au premier degré, 555 Unités Primaires de Sondage (UPS) ou grappes ont été tirées à partir de la liste des zones de dénombrement (ZD) établies au cours du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation effectué au Bénin en 2013 (RGPH4 2013), en procédant à un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille de l'UPS (la taille de l'UPS est le nombre de ménages). Ensuite, un dénombrement des ménages dans chacune de ces grappes a permis d'obtenir une liste des ménages à partir de laquelle a été tiré, au second degré, un échantillon de 26 ménages par grappe aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, avec un tirage systématique à probabilité égale.

Un total de 14 435 ménages (6 528 en milieu urbain dans 251 grappes et 7 907 en milieu rural dans 304 grappes) ont été sélectionnés. Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant habituellement dans les ménages sélectionnés et présentes la nuit précédant l'enquête, étaient éligibles pour être interviewées (Graphique 1.1).

Graphique 1.1 Organisation de l'EDSB-V Bénin



Dans tous les ménages, les enfants de moins de 5 ans ont été pesés et mesurés de façon à déterminer leur état nutritionnel (émaciation, insuffisance pondérale et retard de croissance). Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, l'ensemble des enfants de 6-59 mois étaient éligibles pour les tests d'anémie et du paludisme (TDR, goutte épaisse), ainsi que toutes les femmes de 15-49 ans, pour la prise des mesures anthropométriques et le test d'anémie. En outre, dans ce sous-échantillon, les questions sur les violences basées sur le genre ont également été administrées.

De plus, dans le second sous-échantillon d'un ménage sur deux, tous les hommes de 15-64 ans étaient éligibles pour être enquêtés. Dans ce sous-échantillon, toutes les femmes de 30-49 ans et tous les hommes de 30-64 ans étaient éligibles pour la mesure de la pression artérielle.

1.3 QUESTIONNAIRES

Quatre questionnaires ont été utilisés pour la collecte des données de l'EDSB-V 2017-2018 : le questionnaire ménage, le questionnaire femme, le questionnaire homme et le questionnaire biomarqueur.

1.3.1 Questionnaire ménage

Le questionnaire ménage a permis de dresser la liste de tous les membres des ménages et de collecter des informations sur leurs caractéristiques sociodémographiques de base et des logements. Les données collectées au niveau du ménage permettent de mesurer la distribution de la population par âge et par sexe, la taille et la composition des ménages, la proportion de femmes chef de ménage, la proportion d'enfants orphelins, la proportion d'enfants dont la naissance a été enregistrée à l'état civil, la distribution de la population par niveau d'instruction, le taux de scolarisation par niveau d'études, la proportion de ménages possédant des moustiquaires et par type de moustiquaire, l'utilisation des moustiquaires par les enfants et les femmes. En outre, l'établissement de cette liste des membres des ménages permet l'identification des personnes éligibles pour l'enquête individuelle à savoir : les femmes de 15-49 ans et les hommes de 15-64 ans.

Par ailleurs, le questionnaire ménage a permis aussi de collecter des données sur les caractéristiques des logements à savoir : le type d'approvisionnement en eau, le type de toilettes, les matériaux de construction du logement, le type de combustible, la disponibilité en électricité, la possession de biens durables et de moyens de transport. Ces informations permettent en outre de classer la population en quintiles de bien-être économique, selon la méthodologie développée par ICF. Ces quintiles sont ensuite utilisés comme variables explicatives dans l'analyse de tous les indicateurs démographiques et de santé.

1.3.2 Questionnaire femme

Le questionnaire individuel femme constitue le questionnaire central des enquêtes EDS. Il comprend 15 sections qui permettent d'estimer des indicateurs socio-économiques et démographiques à savoir : le niveau d'instruction, les indicateurs de fécondité, les déterminants de la fécondité, la Planification Familiale, les indicateurs de mortalité des enfants, la santé de la mère, la santé de l'enfant, l'allaitement et la nutrition, le paludisme, le VIH/sida et les IST, autres problèmes de santé, le statut de la femme, ainsi que, le ménage et l'activité sexuelle.

1.3.3 Questionnaire homme

Le questionnaire individuel homme comprend 8 sections qui permettent de collecter les informations sur les caractéristiques socio-économiques et démographiques des hommes pour l'estimation de certains indicateurs sur la fécondité et les préférences en matière de fécondité (en particulier le nombre idéal d'enfants, les préférences sur le sexe des enfants) et des mêmes indicateurs que pour les femmes en matière de VIH/sida et des IST, des autres problèmes de santé, des maladies non transmissibles, l'emploi et autres.

1.3.4 Questionnaire biomarqueur

Le questionnaire biomarqueur a servi à enregistrer les résultats des mesures anthropométriques (poids et taille), des tests d'anémie et du paludisme. La réalisation des tests ou des mesures anthropométriques est soumise à l'accord des enquêtés qui remplissent des formulaires de consentement éclairé permettant aux agents enquêteurs et enquêtrices d'expliquer les objectifs de ces tests.

Par ailleurs, des modules additionnels ont été ajoutés aux questionnaires de base du programme DHS de façon à répondre à des besoins spécifiques. Il s'agit des modules portant sur le travail des enfants et la discipline, ainsi que le développement des enfants, basés sur les informations collectées à l'aide du questionnaire ménage. En outre, les modules comme les maladies non transmissibles, la mortalité adulte, la violence basée sur le genre, y compris violence conjugale ainsi que, le développement des jeunes enfants,

conçus à partir des informations collectées au cours de l'enquête individuelle, ont été ajoutés au questionnaire femme. Enfin, un module concernant les maladies non transmissibles a été ajouté au questionnaire homme.

Tous ces questionnaires ont été adaptés à partir des questionnaires modèles de DHS Program pour tenir compte des problèmes démographiques et de santé spécifiques au Bénin.

Enfin, des informations ont été collectées sur les agents de terrain au moyen d'un questionnaire d'agent de terrain auto-administré. Ce dernier a permis de connaître les caractéristiques de base des personnes en charge de la collecte des données sur le terrain à savoir : les chefs d'équipes, les éditeurs, les enquêtrices/enquêteurs et les techniciens de santé.

Par ailleurs, le lancement de la collecte des données a été subordonné d'une part, à une autorisation du Conseil National de la Statistique (CNS) pour l'obtention du visa statistique d'opportunité et de conformité et d'autre part, à celle du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé pour l'obtention de l'avis scientifique et éthique exécutoire de l'enquête. Ces deux instances nationales ont étudié et validé les documents méthodologiques, financiers et les outils de collectes. Le protocole d'enquête, y compris la collecte de biomarqueur, a été aussi examiné et approuvé par le comité d'éthique d'ICF.

1.4 ANTHROPOMÉTRIE, TEST D'ANÉMIE, TEST DU PALUDISME ET MESURE DE LA TENSION ARTÉRIELLE

1.4.1 Mesures anthropométriques

Dans tous les ménages, tous les enfants de moins de 5 ans ont été pesés et mesurés de façon à déterminer leur état nutritionnel (émaciation, insuffisance pondérale et retard de croissance). Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, toutes les femmes de 15-49 ans ont également été pesées et mesurées de façon à déterminer leur état nutritionnel à l'aide de l'Indice de Masse Corporelle (IMC).

1.4.2 Test d'anémie

Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, toutes les femmes de 15-49 ans et tous les enfants de 6-59 mois ont subi un test pour déterminer le niveau d'hémoglobine dans le sang afin d'évaluer la prévalence et le niveau d'anémie.

1.4.3 Test du paludisme

Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, l'ensemble des enfants de 6-59 mois étaient éligibles pour les tests du paludisme (TDR, goutte épaisse).

1.4.4 Mesure de la tension artérielle

Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, les enquêteurs ont mesuré la pression artérielle de toutes les femmes de 30-49 ans et de tous les hommes de 30-64 ans. Trois mesures ont été prises au cours de l'interview (au début, au milieu et à la fin) et une valeur moyenne a été calculée.

1.5 PRÉTEST

Les travaux (formation des agents et collecte de données) du pré-test de l'EDSB-V se sont déroulés du 3 au 25 juillet 2017. Cette étape du processus de réalisation de l'enquête s'inscrit dans le dispositif de finalisation des outils de collectes, manuels et validation du dispositif de collecte, en vue de la réalisation de l'enquête principale. Cette phase a nécessité la collaboration de 25 agents enquêteurs occasionnels dont 4 techniciens de santé, répartis dans 4 grappes (2 en milieu urbain et 2 en milieu rural) ne faisant pas partie de l'échantillon national. Les 4 grappes ont été choisies dans les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou.

Aux termes des travaux de collecte qui ont duré du 21 au 25 juillet 2018, 104 ménages sur 112 attendus ont été enquêtés avec succès. Ces ménages ont permis d'identifier :

- 152 femmes éligibles dont : 117 interviewées avec succès ;
- 65 hommes éligibles dont : 47 interviewés avec succès ;
- 89 enfants éligibles pour les biomarqueurs : dont 85 ont été pesés et mesurés avec succès.

1.6 FORMATION DU PERSONNEL DE COLLECTE

La formation du personnel de collecte dans le cadre de la phase principale de l'EDSB-V s'est déroulée du 6 octobre au 5 novembre 2017 dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle a concerné 144 candidats enquêteurs, enquêtrices et chef d'équipes, 27 agents de santé et 7 éditeurs de terrain. Globalement, la formation des agents a regroupé plusieurs sessions qui portaient sur les techniques d'interview, le remplissage des questionnaires, le Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), les techniques de prise des mesures anthropométriques et les tests d'anémie et de paludisme.

L'objectif est la maîtrise des différents protocoles et outils de collecte. Ainsi, l'approche utilisée a consisté en i) une lecture concomitante des manuels d'instructions et des questionnaires, ii) des jeux de rôle en salle entre personnel en formation, iii) des pratiques sur le terrain dans des ménages réels et dans des formations sanitaires et iv) l'organisation régulière des évaluations des connaissances acquises. Les différentes phases de la formation étaient accompagnées de discussions en salle.

Au terme de la formation des agents, 88 enquêteurs et enquêtrices, 22 agents biomarqueurs, 22 chefs d'équipe et 7 éditeurs de terrain ont été retenus et déployés sur toute l'étendue du territoire national pour la collecte des données.

1.7 COLLECTE DES DONNÉES

Les travaux de terrain de l'enquête principale ont été réalisés du 6 novembre 2017 au 28 février 2018, par 132 agents répartis en 22 équipes de travail à raison de 6 personnes dont un chef d'équipe, trois enquêtrices, un enquêteur et un agent de santé.

Les 22 équipes ont été placées sous la responsabilité de 7 éditeurs de terrain, 6 superviseurs de terrain dont un provenant du laboratoire du CNHU-HKM en charge des tests du paludisme et le reste de l'INSAE.

1.8 TRAITEMENT DES DONNÉES

Le traitement des données de l'EDSB-V a été facilité en raison de l'utilisation des tablettes comme outils de collecte par la saisie automatique des données au moyen du logiciel CSPro intégré aux tablettes. Pendant toute la durée de la collecte, un dispositif de contrôle de qualité des données, à travers le suivi de certains indicateurs clés (taux de couverture, âge des enquêtés, âges au décès des enfants, etc.), a été mis en place en association avec l'équipe d'édition composée de 7 éditeurs, qui constituent le premier niveau de contrôle. Les erreurs détectées à l'occasion de ces contrôles étaient systématiquement partagées avec les équipes de terrain à l'occasion des missions de supervision technique et par contact téléphonique permanent. La vérification de la cohérence interne des données saisies et l'apurement final de l'ensemble des données ont été réalisés entre avril et mai 2018.

Parallèlement, les travaux d'analyse des prélèvements de sang, en ce qui concerne le test du paludisme et de l'anémie, ont été réalisés par le Laboratoire de parasitologie-mycologie du Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou (CNHU-HKM). Le traitement des échantillons des gouttes épaisses de sang s'est fait au fur et à mesure de la collecte des données sur le terrain.

1.9 TAUX DE RÉPONSE

Au cours de l'EDSB-V, 14 435 ménages ont été sélectionnés dont 14 293 identifiés au moment de l'enquête. Parmi ces 14 293 ménages, 14 156 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 99 % (Tableau 1.1). Les taux de réponses des ménages, en milieu urbain ne sont pas très différents de ceux du milieu rural.

En outre, pour les 14 156 ménages visités, 16 233 femmes de 15-49 ans étaient éligibles pour l'interview individuelle et a été menée avec succès pour 15 928 d'entre elles. Globalement, le taux de réponse des femmes éligibles est de 98 %. Ce taux ne varie pas entre les milieux de résidence (98 % pour chacun).

L'enquête homme a été réalisée dans un ménage sur deux soit 7 782 hommes de 15-64 ans éligibles et identifiés pour 7 595 d'entre eux, l'interview a été menée avec succès. Le taux de réponse s'établit également à 98 % et varie très peu entre les milieux de résidence.

Tableau 1.1 Résultats des interviews ménage et individuelle

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse par milieu de résidence (non pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Résultat | Résidence | | |
|---|-----------|-------|----------|
| | Urbain | Rural | Ensemble |
| Interviews Ménages | | | |
| Ménages sélectionnés | 6 528 | 7 907 | 14 435 |
| Ménages occupés | 6 447 | 7 846 | 14 293 |
| Ménages interviewés | 6 364 | 7 792 | 14 156 |
| Taux de réponse des ménages ¹ | 98,7 | 99,3 | 99,0 |
| Interviews des femmes de 15-49 ans | | | |
| Effectif de femmes éligibles | 7 208 | 9 025 | 16 233 |
| Effectif de femmes éligibles interviewées | 7 045 | 8 883 | 15 928 |
| Taux de réponse des femmes éligibles ² | 97,7 | 98,4 | 98,1 |
| Interviews des hommes de 15-64 ans | | | |
| Effectif d'hommes éligibles | 3 491 | 4 291 | 7 782 |
| Effectif d'hommes éligibles interviewés | 3 383 | 4 212 | 7 595 |
| Taux de réponse des hommes éligibles ² | 96,9 | 98,2 | 97,6 |

¹ Ménages enquêtés/ménages occupés

² Enquêtés interviewés/enquêtés éligibles

Résultats clés

- Un peu plus de sept ménages sur dix (71 %) consomment de l'eau provenant d'une source améliorée. Cependant, cette proportion varie selon le milieu de résidence, 78 % pour le milieu urbain à 66 % pour le milieu rural. En outre, plus de trois ménages sur dix (37 %) disposent d'eau sur place.
- Au Bénin, un peu plus d'un ménage sur dix (13 %), utilise des installations sanitaires améliorées ; à l'opposé environ neuf ménages sur dix (87 %), utilisent des installations sanitaires non améliorées, cette proportion variant de 78 % en milieu urbain à 94 % en milieu rural. Dans plus d'un cas sur deux (54 %), les ménages ne disposent d'aucun type de toilettes : cette proportion est nettement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (69 % contre 34 %).
- Un peu plus de six ménages sur dix (62 %) utilisent le bois pour cuisiner, cette proportion variant de 40 % en milieu urbain à 79 % en milieu rural.
- Au cours de l'enquête, l'endroit pour se laver les mains a été observé dans 55 % des ménages. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un endroit mobile (46 % contre 9 % quand l'endroit est fixe).
- Au Bénin, un ménage comprend en moyenne 5,2 personnes et ce nombre moyen varie de 4,8 en milieu urbain à 5,5 en milieu rural.
- Globalement un peu plus de la moitié des femmes (51 %) n'ont aucun niveau d'instruction. Chez les hommes, cette proportion est de 34 %.

Les informations collectées au cours de l'EDSB-V 2017-2018 sur les caractéristiques socio-économiques de la population des ménages sont utiles pour interpréter les indicateurs démographiques ; en outre, elles peuvent fournir une indication approximative de la représentativité de l'enquête. Ces informations permettent aussi de mieux connaître les conditions de vie dans lesquelles vivent les populations.

Ce chapitre a pour objectif de présenter les données sur la source d'approvisionnement de l'eau de boisson, l'utilisation de toilettes, l'exposition à la fumée à l'intérieur du logement, le niveau de bien-être économique, le lavage des mains, la composition de la population des ménages, le niveau d'instruction atteint et la fréquentation scolaire.

2.1 SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DE BOISSON ET TRAITEMENT

Sources d'approvisionnement améliorées en eau de boisson

Comprennent l'eau de robinet, robinet public/borne fontaine, les puits à pompe/forage, les puits creusés protégés, les sources protégées et l'eau de pluie. Les ménages qui utilisent de l'eau en bouteille pour boire sont considérés comme utilisant une source d'eau améliorée seulement si l'eau qu'ils utilisent pour cuisiner ou se laver les mains provient aussi d'une source améliorée.

Échantillon : Ménages

Les résultats de l'EDSB-V 2017-2018 montrent qu'environ sept ménages sur dix (71 %) consomment de l'eau provenant d'une source améliorée. Cette proportion est plus élevée en milieu urbain (78 %) qu'en milieu rural (66 %). Les puits à pompe/forage (29 %) constituent la source d'approvisionnement améliorée la plus utilisée (**Graphique 2.1**). À l'opposé, les ménages dont l'eau de consommation ne provient pas d'une source améliorée représentent 28 %. Dans leur majorité, ces ménages utilisent l'eau des puits creusés non protégés (21 %) et cette proportion varie de 18 % en milieu urbain à 23 % en milieu rural (**Tableau 2.1**).

Près de quatre ménages sur dix (37 %), disposent d'eau pour boire sur place¹, cette proportion étant nettement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (57 % contre 22 %). Le temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson est estimé à moins de 30 minutes dans 42 % des cas mais dans 20 % des cas, il excède 30 minutes (13 % en milieu urbain et 25 % en milieu rural).

Concernant le traitement de l'eau, les résultats de l'enquête révèlent que, globalement, 92 % des ménages béninois n'utilisent aucun moyen pour traiter l'eau. Ce pourcentage ne varie pratiquement pas entre milieux de résidence (92 % en milieu urbain et 93 % en milieu rural). L'ajout d'aquatab dans l'eau est le moyen de traitement de l'eau le plus utilisé (4 % en milieu urbain et 3 % en milieu rural).


Les résultats montrent aussi que 23 % des ménages ont déclaré que l'eau n'a pas été disponible pendant au moins une journée au cours des deux semaines précédant l'enquête (**Tableau 2.2**).

Tendances : Globalement, de 2001 à 2017-2018, on note une tendance à la hausse de l'utilisation d'eau de boisson provenant de source améliorée au Bénin, passant de 67 % en 2001 à 71 % en 2017-2018.

De même, dans la même période, la proportion de ménages disposant de l'eau sur place a augmenté, passant dans l'ensemble, de 26 % à 37 %. Par contre, depuis 2006, on ne note pas de changement de la proportion de ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau, passant dans l'ensemble, de 3 % à 7 %.

Graphique 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire, par résidence

Répartition (en %) des ménages par provenance de l'eau de boisson



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

¹ Y compris l'eau provenant d'un robinet chez le voisin

2.2 INSTALLATIONS SANITAIRES

Installations sanitaires améliorées

Comprennent les types suivants d'installations sanitaires non partagées : chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout, chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique, chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances, fosse d'aisances améliorée ventilée, fosse d'aisances avec dalle, toilettes à compostage.

Échantillon : Ménages


L'accès à des installations sanitaires adéquates et la promotion de pratiques hygiéniques constituent des objectifs importants pour la réalisation des Objectifs de Développement Durables (ODD).

Globalement, seulement 13 % des ménages utilisent des installations sanitaires améliorées. Cette proportion est nettement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (22 % contre 6 %). Dans 4 % des cas, les ménages utilisent une chasse d'eau ou une chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique (**Tableau 2.3** et **Graphique 2.2**).

Au Bénin, 87 % des ménages utilisent des installations sanitaires non améliorées (78 % en milieu urbain et 94 % en milieu rural). Dans un cinquième des cas (21 %), les ménages partagent les toilettes avec d'autres, 12 % utilisent des toilettes non améliorées et enfin 54 % n'ont aucun type de toilettes. En milieu rural, la proportion de ménages n'utilisant aucun type de toilettes atteint 69 %.

Graphique 2.2 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages, par résidence

Répartition (en %) des ménages par type d'installations sanitaires



En outre, les résultats montrent que les installations sanitaires se trouvent surtout dans la cour/parcelle (29 % contre 9 % dans le logement).

Tendances : De 2001 à 2017-2018, on constate que la proportion des ménages utilisant les installations sanitaires améliorées, non partagées, est en nette progression (3 % en 2001, 6 % en 2006 puis 13 % en 2017-2018).

2.3 EXPOSITION À LA FUMÉE À L'INTÉRIEUR DU LOGEMENT

Au Bénin, 9 % des ménages sont exposés tous les jours à la fumée de cigarette dans le logement. Les ménages du milieu rural sont beaucoup plus exposés à la fumée que ceux du milieu urbain (11 % contre 6 %) (**Tableau 2.4**). Par ailleurs, 94 % des ménages utilisent des combustibles polluants pour la cuisine. Cette proportion varie considérablement selon le milieu de résidence. En effet, en milieu urbain la proportion des ménages utilisant un combustible polluant est de 88 % contre 98 % en milieu rural.

Autres caractéristiques du logement

Le **Tableau 2.4** présente aussi la répartition des ménages selon certaines caractéristiques du logement. Les résultats révèlent que dans l'ensemble, 36 % des ménages vivent dans un logement pourvu d'électricité. Ce pourcentage varie de manière importante selon le milieu de résidence. En effet, plus de cinq ménages sur dix (56 %) en milieu urbain disposent d'électricité contre environ deux ménages sur dix (21 %) en milieu rural.

Au Bénin, la grande majorité des ménages (63 %), habitent dans un logement dont le sol est recouvert de ciment et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (72 %) qu'en milieu rural (57 %). De plus, 5 % des ménages ont un logement dont le sol est en carrelage, la proportion variant de 9 % en milieu urbain à 1 % en milieu rural. Par contre, dans 29 % des cas, les ménages vivent dans un logement dont le sol est recouvert de terre/sable et ce pourcentage varie de 16 % en milieu urbain à 39 % en milieu rural.

Biens durables du ménage

Le **Tableau 2.5** présente, par milieu de résidence, le pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport, de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme. On constate que les biens électroménagers et de télécommunication sont plus fréquemment possédés par les ménages du milieu urbain que ceux du milieu rural. En milieu rural, la possession de terres agricoles (72 % en milieu rural contre 57 % pour l'ensemble national) et d'animaux de ferme (66 % en milieu rural contre 53 % pour l'ensemble) est plus répandue.

Dans l'ensemble du pays, les résultats de l'enquête montrent que 84 % des ménages possèdent un téléphone portable. En milieu urbain, ce pourcentage est de 89 % contre 80 % en milieu rural.

Tendances : De 2006 à 2017-2018, la proportion de ménages possédant un téléphone portable a augmenté (24 % à 84 %). La possession du téléphone portable est en nette progression aussi bien en milieu urbain (45 % en 2006, 85 % en 2011-2012 et 89 % en 2017-2018) qu'en milieu rural où l'accroissement est plus remarquable (9 % en 2006, 61 % en 2011-2012 et 80 % en 2017-2018).

2.4 BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE DU MÉNAGE

Indice de bien-être économique


Indice de bien-être économique

On attribue aux ménages des scores basés sur le nombre et le type de biens de consommation possédés, les biens allant de la télévision à une bicyclette ou un vélo, et sur les caractéristiques du logement comme la source d'approvisionnement en eau de boisson, le type de toilettes utilisées et le matériau de revêtement du sol. Ces scores sont générés en utilisant l'analyse en composantes principales. Les quintiles de bien-être économique nationaux sont construits en attribuant le score du ménage à chaque membre habituel (de droit) du ménage, classant chaque personne dans la population des ménages en fonction de son score et en divisant la distribution en cinq catégories égales, chacune représentant 20 % de la population.

Échantillon : Ménages

Le **Tableau 2.6** présente la répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique, selon le milieu de résidence et le département. Le **Graphique 2.3** met en évidence le contraste existant entre les milieux urbain et rural en termes de bien-être économique de la population. En effet, en milieu urbain, un peu plus de trois ménages sur cinq (64 %) se situent dans les deux derniers quintiles de bien-être économique, alors qu'en milieu rural, cette proportion est de 24 %. En milieu rural, 51 % de la population sont classés dans les deux derniers quintiles contre 24 % en milieu urbain.

Graphique 2.3 Quintiles de bien-être économique par résidence



Les résultats par département mettent en évidence un écart important entre le département du Littoral et les autres départements. Dans le littoral, 98 % de la population sont classés dans les deux derniers quintiles de bien-être économique. Par comparaison, dans l'Alibori et l'Atacora, respectivement 63 % et 66 % de la population sont classés dans les deux quintiles les plus pauvres. Cette proportion est également élevée dans le Borgou et le Couffo car elle concerne un peu plus de la moitié de la population, soit respectivement 55 % et 51 %.

2.5 LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains est une action hygiénique importante qui permet d'éviter la transmission de germes cutanés et qui a donc des implications sur la santé de tous les membres du ménage et, en particulier, sur celle des enfants. Au cours de l'enquête, on a demandé à voir l'endroit où les membres du ménage se lavent le plus souvent les mains. L'agent enquêteur devait aussi noter si l'eau et certains produits nettoyants étaient disponibles à cet endroit.

Les résultats du **Tableau 2.7** montrent que dans 55 % des cas, les ménages disposent d'un endroit pour se laver les mains qui a été, en outre, observé. Dans la majorité des cas, cet endroit est mobile (46 % contre 9 % pour un endroit fixe). Parmi les ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, plus de la moitié (57 %) ne disposait ni d'eau, ni de savon ou ni d'un autre produit nettoyant.

Une analyse selon le département montre que c'est dans le département du Littoral que la proportion de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé et qui ne disposaient ni d'eau, ni de savon et ni de produit nettoyant est la plus faible (34 %). À l'opposé, dans l'Atacora, la proportion est de 83 %. De plus, on note que du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, la proportion des ménages ne disposant ni d'eau et ni d'un quelconque produit nettoyant diminue, passant de 66 % à 39 %.

2.6 POPULATION DES MÉNAGES ET COMPOSITION

Ménage

Une personne ou un groupe de personnes apparentées ou non qui vivent ensemble dans le même logement, qui reconnaissent un adulte, femme ou homme, comme chef de ménage, qui partagent les mêmes arrangements ménagers et qui sont considérés comme une seule unité.

Population de fait

Toutes les personnes qui sont restées dans les ménages sélectionnés la nuit avant l'interview (qu'elles soient des résidents habituels ou des visiteurs).

Population de droit

Toutes les personnes qui sont des résidents habituels des ménages sélectionnés, qu'elles aient passé ou non, la nuit avant l'interview dans le ménage.

Comment les données sont-elles calculées

Sauf indication contraire, tous les tableaux sont calculés sur la population de fait.

Le **Tableau 2.8** présente la répartition par âge, par sexe et selon le milieu de résidence de la population de fait des ménages enquêtés. La population des ménages de l'enquête est composée de 48 % d'hommes et 52 % de femmes (Données non affichées). La structure par grands groupes d'âges de la population met en évidence la jeunesse de la population béninoise, un peu moins de la moitié de la population (48 %) étant âgée de moins de 15 ans. Les personnes de 65 ans et plus représentent environ 4 % de la population.

La pyramide des âges de la population (**Graphique 2.4**) présente une base élargie qui se rétrécit rapidement, caractéristique des populations à fécondité et à mortalité élevée.

Tendances : Par rapport aux enquêtes précédentes, on ne note aucun changement important, les moins de 15 ans représentaient 49 % de la population en 1996, 48 % en 2001 et 49 % en 2006 et en 2011-2012 et à 48 % en 2017-2018.


Taille et composition des ménages

Dans l'ensemble, les résultats du **Tableau 2.9** montrent que 75 % des ménages béninois sont dirigés par un homme et 25 % par une femme. La proportion de ménages ayant à leur tête une femme a varié un peu depuis 1996, passant de 18 % à 25 % en 2017-2018.

Si la taille moyenne des ménages est de 5,2 personnes (4,8 en milieu urbain à 5,5 en milieu rural), l'enquête indique que, 26 % des ménages comptent cependant plus de 7 personnes.

Graphique 2.4 Pyramide des âges de la population

Répartition (en %) de la population des ménages



Par ailleurs, la proportion de ménages comprenant des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents est de 24 %. Dans 29 % des cas, les ménages comptent des enfants orphelins et/ou vivant sans leurs parents. Par contre, 1 % des ménages comptent parmi leurs membres des enfants dont le père et la mère sont décédés (orphelins doubles).

2.7 INSTRUCTION

2.7.1 Niveau d'instruction atteint

Nombre médian d'années d'instruction complétées

La moitié de la population a complété moins du nombre médian d'années d'instruction et l'autre moitié a complété plus du nombre médian d'années d'instruction.

Échantillon : Population de fait des ménages âgée de 6 ans et plus.

L'instruction pour tous, l'un des Objectifs de Développement Durable (ODD), constitue un enjeu majeur du développement économique et une pierre angulaire de l'amélioration des conditions de vie des populations. L'éducation influence tous les secteurs de l'économie et la vie des individus. Au cours de l'enquête ménage, des informations relatives au niveau d'instruction atteint et à la dernière classe achevée à ce niveau ont été collectées pour toutes les personnes âgées de 6 ans et plus.

Selon les résultats de l'enquête (**Tableaux 2.10.1 et 2.10.2**), on constate que globalement 51 % des femmes contre 34 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction. Un peu plus de trois femmes sur dix (32 %) a un niveau primaire, complet ou incomplet. Chez les hommes, cette proportion est de 39 %. En outre, 16 % des femmes contre 22 % des hommes ont atteint un niveau secondaire complet ou incomplet. Le nombre médian d'années complétées est estimé à 0,0 chez les femmes et 1,9 chez les hommes.

Variations par caractéristiques

- Des générations les plus anciennes aux plus récentes, on remarque que le pourcentage de personnes sans niveau d'instruction a diminué de manière importante, passant, chez les femmes, de 93 % parmi celles de 65 ans et plus à 65 % pour les 30-34 ans et à 26 % à 10-14 ans. Chez les hommes, ces pourcentages sont respectivement de 74 %, 40 % et 19 %. Il est important de noter que dans les générations les plus jeunes (âgées de 6-9 ans), plus de trois enfants sur dix (34 %) parmi les filles et plus de deux enfants sur dix (29 %) parmi les garçons, sont toujours sans instruction.
- La proportion de la population sans aucun niveau d'instruction est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain, ceci aussi bien chez les hommes que chez les femmes. En milieu urbain, 39 % des femmes et 23 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction contre respectivement 59 % et 41 % en milieu rural.
- Les résultats par département montrent que c'est dans l'Alibori (77 % pour les femmes et 67 % pour les hommes), le Borgou (63 % pour les femmes et 50 % pour les hommes) et l'Atacora (62 % pour les femmes et 46 % pour les hommes) que les proportions de la population sans aucun niveau d'instruction sont les plus élevées.

2.7.2 Fréquentation Scolaire

Taux net de fréquentation scolaire (TNF)

Pourcentage de la population d'âge de fréquentation scolaire qui fréquente le niveau primaire ou le niveau secondaire.

Échantillon : Enfants de 6-11 ans pour le TNF niveau primaire et enfants de 12-18 ans pour le TNF niveau secondaire

Taux brut de fréquentation scolaire (TBF)

Nombre total d'enfants fréquentant le niveau primaire divisé par la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire et nombre total d'enfants fréquentant le niveau secondaire divisé par la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire.

Échantillon : Enfants de 6-11 ans pour le TBF niveau primaire et enfants de 12-18 ans pour le TBF niveau secondaire

L'EDSB-V 2017-2018 a collecté des données sur la fréquentation scolaire de toutes les personnes âgées de 5 à 24 ans dans les ménages. Si le taux brut de fréquentation scolaire au primaire est de 89 % (94 % chez les garçons et 84 % chez les filles), le taux net s'établit à 65 % (68 % chez les garçons et 62 % chez les filles). Les taux de fréquentation au secondaire sont plus faibles, 46 % pour le taux brut et 34 % pour le taux net (**Tableau 2.11**).


Variations par caractéristiques

- Le taux net de fréquentation scolaire diffère peu selon le sexe au niveau primaire (62 % chez les femmes contre 68 % chez les hommes). Par contre, au niveau secondaire, il est plus élevé chez les garçons que chez les filles (38 % contre 29 %) (**Tableau 2.11**).
- Les taux nets, quel que soit le cycle d'enseignement, sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural : 74 % des enfants de 6-11 ans fréquentent l'école au niveau primaire en milieu urbain contre 60 % en milieu rural. Pour ce qui est du niveau secondaire, ces taux sont respectivement de 43 % en milieu urbain et 27 % en milieu rural.
- Les taux de fréquentation scolaire, qu'ils soient nets ou bruts, augmentent avec le quintile de bien-être économique. En effet, au primaire, le taux net de fréquentation passe de 40 % dans le quintile le plus bas à 83 % dans le plus élevé. Au niveau du secondaire, il passe respectivement de 8 % à 56 % chez les filles et de 15 % à 66 % chez les garçons (**Graphique 2.5**).

Graphique 2.5 Fréquentation scolaire au niveau secondaire par bien-être économique du ménage

Taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire parmi les enfants de 12-18 ans

■ Fille ■ Garçon



Indice de parité entre les genres (IPG)

Ratio des filles par rapport aux garçons qui fréquentent le niveau primaire et ratio des filles par rapport aux garçons qui fréquentent l'école secondaire. L'indice traduit l'importance de l'écart entre les genres.

Échantillon : Élèves de l'école primaire et élèves de l'école secondaire

- Au niveau primaire, l'indice de parité entre les genres (IPG) est de 0,91 pour le taux net. Au niveau secondaire l'écart se creuse avec un IPG de 0,78. Ces résultats montrent donc qu'au Bénin, les filles fréquentent l'école moins que les garçons, que ce soit au niveau primaire ou au niveau secondaire.
- L'IPG varie entre les départements. Au niveau primaire, tous les départements ont un indice de parité inférieur à 1 ; seuls, les départements des Collines et du Mono s'approchent de la parité, avec un IPG de 0,99. Le département du Couffo détient l'indice de parité le plus faible (0,84). Au niveau secondaire, on observe la même situation, l'indice de parité entre les genres étant inférieur à 1 dans tous les départements ; il varie de 0,86 dans l'Atacora à 0,47 dans l'Alibori.

Tendances : L'IPG au niveau primaire pour le taux net a légèrement augmenté passant de 0,88 en 2006 à 0,91 en 2017-2018. Au niveau secondaire, cet indice est passé de 0,69 à 0,78 sur la même période. Ces résultats montrent une amélioration de la fréquentation scolaire des filles et un timide resserrement des écarts entre les genres.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques de la population des ménages et du logement, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 2.1** Eau utilisée par les ménages pour boire
- **Tableau 2.2** Disponibilité de l'eau
- **Tableau 2.3** Type d'installations sanitaires utilisées par les ménages
- **Tableau 2.4** Caractéristiques du logement
- **Tableau 2.5** Biens possédés par les ménages
- **Tableau 2.6** Quintiles de bien-être économique
- **Tableau 2.7** Lavage des mains
- **Tableau 2.8** Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence
- **Tableau 2.9** Composition des ménages
- **Tableau 2.10.1** Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme
- **Tableau 2.10.2** Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme
- **Tableau 2.11** Taux de fréquentation scolaire

Tableau 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par provenance de l'eau pour boire et en fonction du temps pour s'approvisionner en eau et pourcentage utilisant une méthode appropriée pour le traitement de l'eau, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique | Ménages | | | Population | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Urbain | Rural | Ensemble | Urbain | Rural | Ensemble |
| Source d'approvisionnement en eau de boisson | | | | | | |
| Source améliorée | 77,8 | 66,1 | 71,2 | 75,0 | 63,0 | 67,8 |
| Robinet dans logement/cour/parcelle | 19,4 | 1,6 | 9,3 | 17,4 | 1,3 | 7,8 |
| Robinet chez le voisin | 24,2 | 7,8 | 14,9 | 21,4 | 6,4 | 12,5 |
| Robinet public/borne fontaine | 7,9 | 16,9 | 13,0 | 8,3 | 15,4 | 12,6 |
| Puits à pompe/forage | 21,1 | 34,8 | 28,9 | 22,5 | 34,5 | 29,7 |
| Puits creusé protégé | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 4,5 | 4,7 |
| Source protégée | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Eau de pluie | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Eau en bouteille, source non améliorée pour la cuisine/se laver les mains ¹ | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Source non améliorée | 21,8 | 33,5 | 28,4 | 24,7 | 36,7 | 31,9 |
| Puits creusé non protégé | 17,8 | 23,1 | 20,8 | 20,0 | 26,0 | 23,6 |
| Source d'eau non protégée | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,3 |
| Camion-citerne/charrette avec petite citerne/tonneau | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Eau de surface | 2,7 | 8,2 | 5,8 | 3,2 | 8,5 | 6,4 |
| Eau en bouteille, source non améliorée pour la cuisine/se laver les mains ¹ | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Autre source | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson (aller-retour) | | | | | | |
| Eau sur place ² | 57,3 | 22,0 | 37,2 | 53,0 | 20,5 | 33,6 |
| Moins de 30 minutes | 29,1 | 52,2 | 42,2 | 31,8 | 53,2 | 44,6 |
| 30 minutes ou plus | 12,9 | 25,1 | 19,9 | 14,6 | 25,8 | 21,3 |
| Ne sait pas/manquant | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moyen de traitement de l'eau pour boire³ | | | | | | |
| Ébullition | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Ajout d'eau de Javel/chlore | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
| Passée à travers un linge | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Céramique, sable ou autre filtre | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Aquatab | 4,4 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | 2,8 | 3,5 |
| Laisser reposer et se déposer | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Autre | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Aucun traitement | 91,7 | 92,6 | 92,2 | 91,4 | 92,8 | 92,2 |
| Pourcentage utilisant une méthode appropriée de traitement ⁴ | 7,1 | 6,1 | 6,5 | 7,4 | 6,0 | 6,5 |
| Effectif ¹ | 6 104 | 8 052 | 14 156 | 29 518 | 43 902 | 73 420 |

¹ Les ménages qui consomment de l'eau en bouteille sont classés comme utilisant de l'eau d'une source améliorée ou non améliorée en fonction de la provenance de l'eau utilisée pour cuisiner et pour se laver les mains.² Y compris l'eau provenant d'un robinet chez le voisin.³ Les enquêtés peuvent déclarer plusieurs méthodes de traitement de l'eau et, par conséquent, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %.⁴ Les méthodes appropriées de traitement de l'eau comprennent l'ébullition, l'ajout de chlore, Aquatab et le filtrage.

Tableau 2.2 Disponibilité de l'eau

Parmi les ménages et la population de droit utilisant de l'eau d'un robinet ou de l'eau provenant d'un puits à pompe ou d'un forage, pourcentage ayant été confronté à un manque d'eau dans les 2 dernières semaines, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Disponibilité de l'eau dans les 2 dernières semaines | Ménages | | | Population | | |
|--|---------|-------|----------|------------|--------|----------|
| | Urbain | Rural | Ensemble | Urbain | Rural | Ensemble |
| Non disponible pendant au moins un jour | 21,8 | 23,7 | 22,8 | 21,8 | 22,2 | 22,0 |
| Disponible sans interruption pendant au moins un jour | 76,4 | 75,8 | 76,1 | 76,8 | 77,3 | 77,1 |
| Ne sait pas/manquant | 1,8 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 0,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif utilisant de l'eau d'un robinet ou de l'eau d'un puits à pompe ¹ | 4 439 | 4 915 | 9 353 | 20 575 | 25 329 | 45 903 |

¹ Y compris les ménages déclarant que l'eau utilisée pour boire provient principalement d'un robinet ou d'un puits à pompe ou d'un forage ainsi que ceux qui déclarent que l'eau utilisée pour boire est de l'eau en bouteille tant que leur source principale d'eau utilisée pour la cuisine et pour se laver les mains provient d'un robinet ou d'un puits à pompe ou d'un forage.

Tableau 2.3 Type d'installations sanitaires utilisées par les ménages

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par type d'installations sanitaires et répartition (en %) des ménages et de la population de droit disposant d'installations sanitaires par endroit où se trouvent ces installations, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Type d'installations sanitaires et endroit où elles sont situées | Ménages | | | Population | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Urbain | Rural | Ensemble | Urbain | Rural | Ensemble |
| Installations sanitaires améliorées | 22,4 | 6,4 | 13,3 | 22,4 | 6,3 | 12,8 |
| Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique | 9,3 | 0,6 | 4,4 | 8,3 | 0,5 | 3,6 |
| Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 0,8 |
| Fosse d'aisances améliorées ventilée | 3,4 | 1,4 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 2,4 |
| Fosse d'aisances avec dalle | 8,2 | 3,9 | 5,7 | 8,6 | 3,8 | 5,7 |
| Toilettes à compostage | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Installations sanitaires non améliorées | 77,6 | 93,6 | 86,7 | 77,6 | 93,7 | 87,2 |
| Toilettes partagées¹ | 31,2 | 13,4 | 21,0 | 26,5 | 11,4 | 17,4 |
| Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| Fosse d'aisances améliorée ventilée | 11,3 | 3,8 | 7,1 | 9,2 | 3,3 | 5,7 |
| Fosse d'aisances avec dalle | 18,4 | 9,0 | 13,1 | 16,1 | 7,7 | 11,1 |
| Toilettes à compostage | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toilettes non améliorées | 12,2 | 11,5 | 11,8 | 12,9 | 11,8 | 12,2 |
| Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle non reliée à des égouts/fosse septiques/fosses d'aisances | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Fosse d'aisances sans dalle/trou ouvert | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 11,4 | 10,7 | 11,0 |
| Seau/tinette | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toilettes/latrines suspendues | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| Autre | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
| Défécation en plein air (pas de toilettes/nature) | 34,3 | 68,8 | 53,9 | 38,2 | 70,5 | 57,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de ménages/population | 6 104 | 8 052 | 14 156 | 29 518 | 43 902 | 73 420 |
| Endroit où se trouvent les installations sanitaires | | | | | | |
| Dans le logement | 15,8 | 3,2 | 8,6 | 14,7 | 2,7 | 7,5 |
| Dans la cour/parcelle | 42,1 | 18,5 | 28,7 | 39,6 | 18,2 | 26,8 |
| Ailleurs | 7,8 | 9,5 | 8,8 | 7,5 | 8,6 | 8,1 |
| Défécation en plein air | 34,3 | 68,8 | 53,9 | 38,2 | 70,5 | 57,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de ménages/population disposant d'installations sanitaires | 6 104 | 8 052 | 14 156 | 29 518 | 43 902 | 73 420 |

¹ Toilettes qui seraient considérées comme « améliorées » si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus.

Tableau 2.4 Caractéristiques du logement

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par certaines caractéristiques du logement, pourcentage utilisant du combustible solide pour cuisiner, et répartition (en %) des ménages par fréquence à laquelle on fume dans le logement, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique du logement | Ménages | | | Population | | |
|--|---------|-------|----------|------------|--------|----------|
| | Urbain | Rural | Ensemble | Urbain | Rural | Ensemble |
| Électricité | | | | | | |
| Oui | 55,5 | 20,5 | 35,6 | 54,2 | 21,2 | 34,5 |
| Non | 44,5 | 79,5 | 64,4 | 45,8 | 78,8 | 65,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Matériau de revêtement du sol | | | | | | |
| Terre /sable | 16,1 | 39,0 | 29,1 | 17,5 | 40,1 | 31,0 |
| Boue | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 1,2 |
| Planche en bois | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
| Palme/bambou | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Parquet ou bois ciré | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Band de Vinyle ou d'asphalte | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Carrelage | 9,1 | 1,0 | 4,5 | 9,2 | 1,0 | 4,3 |
| Ciment | 71,9 | 56,5 | 63,1 | 70,6 | 55,6 | 61,6 |
| Moquette | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,4 |
| Autre | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Pièces utilisées pour dormir | | | | | | |
| Une | 34,1 | 31,8 | 32,8 | 21,1 | 18,4 | 19,5 |
| Deux | 41,1 | 38,8 | 39,8 | 40,4 | 35,2 | 37,3 |
| Trois ou plus | 24,9 | 29,4 | 27,5 | 38,5 | 46,4 | 43,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Endroit pour cuisiner | | | | | | |
| Dans le logement | 39,9 | 30,0 | 34,2 | 36,3 | 28,7 | 31,7 |
| Dans un bâtiment séparé | 16,3 | 12,1 | 13,9 | 17,2 | 12,0 | 14,1 |
| À l'extérieur | 42,1 | 56,1 | 50,1 | 45,6 | 57,5 | 52,7 |
| Pas de repas préparé dans le ménage | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Autre | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Combustible utilisé pour cuisiner | | | | | | |
| Électricité | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| GPL/gaz naturel/biogaz | 9,7 | 0,9 | 4,7 | 7,5 | 0,7 | 3,4 |
| Kérosène | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Charbon/lignite | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | 0,9 |
| Charbon de bois | 43,9 | 13,7 | 26,7 | 41,4 | 11,0 | 23,2 |
| Bois | 39,9 | 78,5 | 61,9 | 45,7 | 82,9 | 68,0 |
| Paille/branchages/herbes | 2,2 | 5,2 | 3,9 | 2,3 | 4,4 | 3,5 |
| Résidus agricoles | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Boue | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Autres combustibles | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Pas de repas préparé dans le ménage | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Pourcentage utilisant un combustible solide pour cuisiner ¹ | 87,9 | 97,9 | 93,6 | 91,3 | 98,8 | 95,8 |
| Pourcentage utilisant un combustible non polluant pour cuisiner ² | 10,2 | 1,1 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 3,8 |
| Fréquence à laquelle on fume dans le logement | | | | | | |
| Tous les jours | 5,5 | 10,7 | 8,5 | 6,8 | 13,7 | 10,9 |
| Une fois par semaine | 5,1 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 6,0 | 5,7 |
| Une fois par mois | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Moins d'une fois par mois | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Jamais | 88,6 | 82,9 | 85,3 | 87,2 | 79,7 | 82,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de ménages/population | 6 104 | 8 052 | 14 156 | 29 518 | 43 902 | 73 420 |

GPL = Gaz propane liquéfié.

¹ Y compris le charbon/lignite, le charbon de bois, le bois, la paille/branchages/herbes, les résidus agricoles et la boue.

² Y compris l'électricité, le gaz de pétrole liquéfié/gaz naturel/biogaz et le kérosène.

Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages

Pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport, de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme, par milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Possession | Résidence | | |
|--|-----------|-------|----------|
| | Urbain | Rural | Ensemble |
| Biens possédés par le ménage | | | |
| Radio | 59,2 | 50,1 | 54,0 |
| Télévision | 44,7 | 16,6 | 28,7 |
| Téléphone portable | 89,1 | 79,9 | 83,9 |
| Téléphone fixe | 1,3 | 0,6 | 0,9 |
| Réfrigérateur | 8,9 | 1,4 | 4,6 |
| Groupe électrogène | 6,7 | 7,7 | 7,2 |
| Cuisinière | 3,7 | 0,4 | 1,8 |
| Chaîne HI-FI | 11,3 | 2,6 | 6,3 |
| Lecteur VCD/DVD | 34,1 | 11,7 | 21,3 |
| Magnétoscope | 2,3 | 0,8 | 1,5 |
| Machine à laver | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Ordinateur | 9,3 | 1,2 | 4,7 |
| Connexion internet | 8,1 | 1,9 | 4,6 |
| Montre | 38,4 | 22,1 | 29,2 |
| Moyens de transport | | | |
| Bicyclette | 14,2 | 23,3 | 19,4 |
| Charette tirée par un animal | 2,0 | 4,2 | 3,2 |
| Motocyclette/scooter | 58,6 | 54,2 | 56,1 |
| Voiture/camion | 7,2 | 2,0 | 4,2 |
| Bateau à moteur | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Pirogue | 0,8 | 3,2 | 2,2 |
| Possession de terres agricoles | | | |
| | 37,5 | 71,5 | 56,8 |
| Possession d'animaux de ferme¹ | | | |
| | 37,3 | 65,5 | 53,3 |
| Effectif de ménages | 6 104 | 8 052 | 14 156 |

¹ Vaches, taureaux, autre bétail, chevaux, ânes, chèvres, moutons, poulets ou autre volaille, porcs, ou lapins.

Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique et coefficient de Gini, selon le milieu de résidence et le département, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Résidence/département | Quintile de bien-être économique | | | | | Total | Effectif de personnes | Coefficient de Gini |
|-----------------------|----------------------------------|--------|-------|-----------|---------------|-------|-----------------------|---------------------|
| | Le plus bas | Second | Moyen | Quatrième | Le plus élevé | | | |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 12,5 | 85,8 | 100,0 | 3 682 | 0,27 |
| Autres villes | 17,4 | 9,6 | 14,1 | 24,7 | 34,3 | 100,0 | 25 836 | 0,29 |
| Ensemble urbain | 15,2 | 8,4 | 12,5 | 23,2 | 40,7 | 100,0 | 29 518 | 0,30 |
| Rural | 23,2 | 27,8 | 25,1 | 17,9 | 6,1 | 100,0 | 43 902 | 0,32 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 34,6 | 28,1 | 20,5 | 12,5 | 4,3 | 100,0 | 9 154 | 0,24 |
| Atacora | 43,0 | 22,9 | 18,5 | 10,2 | 5,4 | 100,0 | 6 369 | 0,25 |
| Atlantique | 8,2 | 14,7 | 20,4 | 24,8 | 32,0 | 100,0 | 8 723 | 0,40 |
| Borgou | 34,0 | 20,6 | 17,8 | 15,2 | 12,5 | 100,0 | 9 300 | 0,31 |
| Collines | 10,9 | 26,6 | 29,1 | 22,5 | 10,9 | 100,0 | 4 763 | 0,27 |
| Couffo | 22,2 | 28,7 | 22,8 | 16,4 | 9,8 | 100,0 | 5 099 | 0,33 |
| Donga | 13,0 | 18,1 | 28,6 | 27,3 | 13,0 | 100,0 | 4 824 | 0,28 |
| Littoral | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 12,5 | 85,8 | 100,0 | 3 682 | 0,27 |
| Mono | 19,9 | 24,0 | 17,6 | 20,9 | 17,7 | 100,0 | 3 449 | 0,37 |
| Ouémé | 6,4 | 10,5 | 15,2 | 28,0 | 39,9 | 100,0 | 6 795 | 0,32 |
| Plateau | 21,1 | 21,9 | 19,1 | 24,7 | 13,3 | 100,0 | 4 545 | 0,35 |
| Zou | 8,4 | 19,5 | 25,4 | 28,1 | 18,7 | 100,0 | 6 716 | 0,34 |
| Ensemble | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 73 420 | 0,28 |

Tableau 2.7 Lavage des mains

Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit le plus souvent utilisé pour se laver les mains a été observé selon que l'endroit est fixe ou mobile et pourcentage total de ménages dont on a observé l'endroit utilisé pour le lavage des mains ; Parmi ces ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, répartition (en %) par disponibilité d'eau, de savon et d'autres produits nettoyants, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristiques socioéconomiques | Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé : | | | Effectif de ménages | Parmi les ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, pourcentage ayant : | | | | | | Effectif de ménages dans lesquels l'endroit utilisé pour se laver les mains a été observé | |
|--|--|--|-------|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|---|--|---|-------|
| | et dont l'endroit pour se laver les mains est fixe | et dont l'endroit pour se laver les mains est mobile | Total | | Savon et eau ¹ | Eau et un produit nettoyant autre que le savon seulement ² | Eau seulement | Savon mais pas d'eau ³ | Produit nettoyant autre que le savon seulement ² | Pas d'eau, pas de savon, pas d'autre produit nettoyant | | Total |
| Résidence | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 27,3 | 30,8 | 58,1 | 852 | 49,6 | 0,2 | 14,0 | 1,8 | 0,1 | 34,3 | 100,0 | 495 |
| Autres villes | 10,7 | 44,8 | 55,5 | 5 252 | 20,4 | 0,4 | 20,0 | 2,2 | 0,3 | 56,6 | 100,0 | 2 916 |
| Ensemble urbain | 13,0 | 42,9 | 55,9 | 6 104 | 24,7 | 0,4 | 19,2 | 2,1 | 0,3 | 53,4 | 100,0 | 3 411 |
| Rural | 6,6 | 47,9 | 54,5 | 8 052 | 13,4 | 0,7 | 23,1 | 1,5 | 1,2 | 60,0 | 100,0 | 4 386 |
| Département | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 5,5 | 58,3 | 63,8 | 1 192 | 12,9 | 0,6 | 17,4 | 0,1 | 0,0 | 69,0 | 100,0 | 760 |
| Atacora | 2,6 | 58,6 | 61,2 | 923 | 6,7 | 0,0 | 9,5 | 0,5 | 0,0 | 83,3 | 100,0 | 565 |
| Atlantique | 15,0 | 30,5 | 45,5 | 1 969 | 40,1 | 0,3 | 10,0 | 3,7 | 0,0 | 45,9 | 100,0 | 896 |
| Borgou | 17,4 | 58,0 | 75,3 | 1 498 | 15,8 | 2,0 | 40,1 | 0,5 | 0,1 | 41,4 | 100,0 | 1 128 |
| Collines | 6,3 | 69,9 | 76,2 | 981 | 18,0 | 1,1 | 35,4 | 0,1 | 0,0 | 45,2 | 100,0 | 748 |
| Couffo | 5,9 | 34,7 | 40,6 | 1 108 | 24,0 | 0,0 | 12,2 | 0,5 | 0,0 | 63,3 | 100,0 | 450 |
| Donga | 1,5 | 49,8 | 51,3 | 740 | 10,8 | 0,0 | 19,4 | 0,8 | 0,0 | 69,0 | 100,0 | 380 |
| Littoral | 27,3 | 30,8 | 58,1 | 852 | 49,6 | 0,2 | 14,0 | 1,8 | 0,1 | 34,3 | 100,0 | 495 |
| Mono | 3,0 | 11,4 | 14,4 | 879 | 30,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 100,0 | 127 |
| Ouémé | 10,1 | 47,0 | 57,0 | 1 633 | 13,0 | 0,2 | 14,1 | 0,8 | 0,0 | 71,8 | 100,0 | 931 |
| Plateau | 3,5 | 64,4 | 67,8 | 984 | 2,2 | 0,0 | 10,8 | 8,9 | 0,7 | 77,5 | 100,0 | 668 |
| Zou | 6,0 | 40,5 | 46,5 | 1 399 | 8,3 | 0,2 | 40,7 | 1,9 | 8,8 | 40,1 | 100,0 | 650 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 4,1 | 50,3 | 54,4 | 2 501 | 7,0 | 0,5 | 24,2 | 0,7 | 1,2 | 66,3 | 100,0 | 1 360 |
| Second | 4,4 | 49,7 | 54,1 | 2 675 | 10,1 | 0,9 | 22,5 | 1,1 | 0,7 | 64,8 | 100,0 | 1 451 |
| Moyen | 5,2 | 49,6 | 54,8 | 2 798 | 11,7 | 0,4 | 24,2 | 1,4 | 1,1 | 61,2 | 100,0 | 1 531 |
| Quatrième | 7,9 | 46,6 | 54,5 | 2 951 | 15,8 | 0,5 | 21,2 | 2,1 | 1,1 | 59,3 | 100,0 | 1 609 |
| Le plus élevé | 22,4 | 34,8 | 57,2 | 3 231 | 40,9 | 0,5 | 16,4 | 3,0 | 0,2 | 39,1 | 100,0 | 1 847 |
| Ensemble | 9,4 | 45,7 | 55,1 | 14 156 | 18,4 | 0,6 | 21,4 | 1,7 | 0,8 | 57,1 | 100,0 | 7 797 |

¹ Comprend le savon ou un produit nettoyant en morceau, liquide, en poudre ou sous forme de pâte. Cette colonne inclut les ménages ayant du savon et de l'eau seulement ainsi que ceux qui ont du savon et de l'eau et un autre produit nettoyant.

² les produits nettoyants autres que le savon comprennent des produits disponibles localement comme la cendre, la boue ou le sable.

³ Y compris les ménages disposant de savon seulement ainsi que ceux ayant du savon et un autre produit nettoyant.

Tableau 2.8 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par différents groupes d'âges et pourcentage de la population de fait des ménages de 10-19 ans, selon le sexe et le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Urbain | | | Rural | | | Total | | |
|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | Masculin | Féminin | Ensemble | Masculin | Féminin | Ensemble | Masculin | Féminin | Ensemble |
| <5 | 18,4 | 17,2 | 17,8 | 20,1 | 18,1 | 19,1 | 19,4 | 17,7 | 18,5 |
| 5-9 | 16,3 | 15,3 | 15,8 | 18,3 | 16,6 | 17,4 | 17,5 | 16,1 | 16,8 |
| 10-14 | 13,2 | 12,2 | 12,7 | 14,5 | 12,0 | 13,2 | 14,0 | 12,1 | 13,0 |
| 15-19 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,1 |
| 20-24 | 6,8 | 8,1 | 7,5 | 6,2 | 7,7 | 7,0 | 6,5 | 7,9 | 7,2 |
| 25-29 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 6,1 | 7,7 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 7,3 |
| 30-34 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 5,1 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 6,0 | 5,8 |
| 35-39 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,0 |
| 40-44 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 45-49 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 50-54 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,7 |
| 55-59 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 2,2 |
| 60-64 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 65-69 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
| 70-74 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| 75-79 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 80 + | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Groupe d'âge dépendants | | | | | | | | | |
| 0-14 | 48,0 | 44,6 | 46,2 | 52,8 | 46,7 | 49,7 | 50,9 | 45,9 | 48,3 |
| 15-64 | 48,4 | 51,9 | 50,2 | 42,9 | 49,1 | 46,1 | 45,1 | 50,2 | 47,7 |
| 65+ | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Populations des enfants et des adultes | | | | | | | | | |
| 0-17 | 53,8 | 50,4 | 52,0 | 58,8 | 52,3 | 55,4 | 56,8 | 51,5 | 54,1 |
| 18+ | 46,2 | 49,6 | 48,0 | 41,2 | 47,7 | 44,6 | 43,2 | 48,5 | 45,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Adolescents 10-19 | 22,5 | 21,5 | 22,0 | 23,4 | 20,9 | 22,1 | 23,0 | 21,1 | 22,1 |
| Effectif | 14 064 | 15 312 | 29 376 | 21 241 | 22 481 | 43 722 | 35 306 | 37 793 | 73 098 |

Tableau 2.9 Composition des ménages

Répartition (en %) des ménages par sexe du chef de ménage et par taille du ménage ; Taille moyenne des ménages ; pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leur parent, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique | Résidence | | Ensemble |
|--|-----------|-------|----------|
| | Urbain | Rural | |
| Chef de ménage | | | |
| Homme | 75,3 | 75,0 | 75,1 |
| Femme | 24,7 | 25,0 | 24,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nombre de membres habituels | | | |
| 1 | 11,2 | 8,7 | 9,8 |
| 2 | 10,7 | 9,3 | 9,9 |
| 3 | 14,0 | 13,4 | 13,7 |
| 4 | 15,4 | 14,4 | 14,8 |
| 5 | 15,0 | 13,7 | 14,3 |
| 6 | 11,4 | 11,5 | 11,5 |
| 7 | 7,9 | 8,5 | 8,2 |
| 8 | 5,0 | 6,1 | 5,6 |
| 9+ | 9,3 | 14,4 | 12,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Taille moyenne du ménage | 4,8 | 5,5 | 5,2 |
| Pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents | | | |
| Orphelin double | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Orphelin simple ¹ | 9,8 | 11,2 | 10,6 |
| Enfants vivant sans leur parent ² | 23,3 | 24,9 | 24,2 |
| Enfant orphelin et/ou enfant vivant sans leurs parents | 27,1 | 29,5 | 28,5 |
| Effectif de ménages | 6 104 | 8 052 | 14 156 |

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

¹ Comprend les enfants dont l'un des parents est décédé et dont l'état de survie de l'autre est inconnu.

² Les enfants vivant sans leur parent sont les enfants de moins de 18 ans qui vivent dans un ménage dans lequel il n'y a ni leur père, ni leur mère, et dont le père et/ou la mère sont en vie.

Tableau 2.10.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme

Répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de 6 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Aucun | Primaire incomplet | Primaire complet ¹ | Secondaire incomplet | Secondaire complet ² | Supérieur | Ne sait pas/ manquant | Total | Effectif de femmes | Nombre médian d'années complétées |
|--|-------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | |
| 6-9 | 33,6 | 66,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 4 852 | 0,3 |
| 10-14 | 26,3 | 55,0 | 3,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 4 562 | 2,8 |
| 15-19 | 26,7 | 26,5 | 2,8 | 42,6 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 100,0 | 3 429 | 4,6 |
| 20-24 | 40,4 | 20,5 | 1,7 | 32,0 | 1,2 | 3,9 | 0,3 | 100,0 | 2 974 | 3,2 |
| 25-29 | 56,3 | 18,2 | 1,8 | 19,8 | 0,8 | 2,9 | 0,2 | 100,0 | 3 039 | 0,0 |
| 30-34 | 65,4 | 16,8 | 1,2 | 12,7 | 0,6 | 3,0 | 0,3 | 100,0 | 2 279 | 0,0 |
| 35-39 | 72,7 | 16,8 | 0,7 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 100,0 | 1 929 | 0,0 |
| 40-44 | 73,9 | 18,4 | 0,8 | 5,9 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 1 327 | 0,0 |
| 45-49 | 75,8 | 12,9 | 1,0 | 9,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 100,0 | 1 223 | 0,0 |
| 50-54 | 80,9 | 8,6 | 1,0 | 8,1 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 100,0 | 1 145 | 0,0 |
| 55-59 | 85,5 | 8,0 | 1,3 | 3,7 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 100,0 | 954 | 0,0 |
| 60-64 | 85,5 | 8,3 | 0,8 | 4,2 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 679 | 0,0 |
| 65+ | 92,8 | 4,3 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 100,0 | 1 484 | 0,0 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 20,0 | 36,0 | 4,1 | 29,6 | 2,0 | 7,6 | 0,7 | 100,0 | 1 644 | 4,3 |
| Autres villes | 41,7 | 33,2 | 1,7 | 20,5 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 100,0 | 10 586 | 1,2 |
| Ensemble urbain | 38,8 | 33,6 | 2,1 | 21,7 | 0,8 | 2,7 | 0,3 | 100,0 | 12 229 | 1,6 |
| Rural | 59,0 | 28,8 | 1,2 | 10,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 100,0 | 17 647 | 0,0 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 76,9 | 15,8 | 0,8 | 6,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 3 490 | 0,0 |
| Atacora | 61,5 | 26,0 | 1,1 | 11,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 2 515 | 0,0 |
| Atlantique | 37,7 | 37,5 | 2,0 | 18,2 | 1,1 | 3,1 | 0,4 | 100,0 | 3 632 | 1,5 |
| Borgou | 62,9 | 22,6 | 1,3 | 11,6 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 100,0 | 3 607 | 0,0 |
| Collines | 43,9 | 36,0 | 0,7 | 18,9 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 1 982 | 0,8 |
| Couffo | 51,7 | 33,9 | 1,2 | 12,7 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 100,0 | 2 137 | 0,0 |
| Donga | 53,4 | 33,8 | 1,7 | 10,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 100,0 | 1 856 | 0,0 |
| Littoral | 20,0 | 36,0 | 4,1 | 29,6 | 2,0 | 7,6 | 0,7 | 100,0 | 1 644 | 4,3 |
| Mono | 41,1 | 37,2 | 3,6 | 17,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | 1 417 | 1,1 |
| Ouémé | 37,0 | 37,0 | 1,5 | 22,9 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 100,0 | 2 782 | 1,7 |
| Plateau | 54,5 | 33,4 | 0,9 | 10,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 1 940 | 0,0 |
| Zou | 46,3 | 32,8 | 1,2 | 18,8 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 100,0 | 2 874 | 0,3 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 76,3 | 19,4 | 0,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 5 737 | 0,0 |
| Second | 62,2 | 29,3 | 0,9 | 7,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 5 954 | 0,0 |
| Moyen | 54,1 | 32,8 | 1,4 | 11,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 5 891 | 0,0 |
| Quatrième | 41,5 | 36,6 | 2,0 | 19,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 100,0 | 6 108 | 1,1 |
| Le plus élevé | 21,9 | 35,0 | 2,6 | 33,0 | 1,5 | 5,6 | 0,5 | 100,0 | 6 186 | 4,2 |
| Ensemble | 50,7 | 30,7 | 1,5 | 15,2 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 100,0 | 29 876 | 0,0 |

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 2.10.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme

Répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de 6 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Aucun | Primaire incomplet | Primaire complet ¹ | Secondaire incomplet | Secondaire complet ² | Supérieur | Ne sait pas/ manquant | Total | Effectif d'hommes | Nombre médian d'années complétées |
|--|-------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | |
| 6-9 | 28,5 | 71,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 4 859 | 0,3 |
| 10-14 | 19,0 | 59,8 | 3,2 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100,0 | 4 938 | 3,1 |
| 15-19 | 19,6 | 21,5 | 3,3 | 53,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 100,0 | 3 191 | 6,0 |
| 20-24 | 25,0 | 17,7 | 2,0 | 42,5 | 2,2 | 9,9 | 0,7 | 100,0 | 2 283 | 6,5 |
| 25-29 | 33,4 | 20,0 | 2,4 | 30,2 | 2,0 | 10,9 | 1,0 | 100,0 | 2 312 | 4,4 |
| 30-34 | 39,7 | 22,5 | 2,3 | 21,4 | 2,2 | 10,2 | 1,8 | 100,0 | 1 965 | 2,7 |
| 35-39 | 46,2 | 24,5 | 3,0 | 14,6 | 1,8 | 7,8 | 2,0 | 100,0 | 1 710 | 0,9 |
| 40-44 | 47,9 | 27,2 | 2,6 | 14,8 | 1,3 | 3,9 | 2,4 | 100,0 | 1 308 | 0,1 |
| 45-49 | 45,2 | 27,2 | 3,1 | 18,3 | 1,1 | 3,0 | 2,0 | 100,0 | 1 157 | 1,3 |
| 50-54 | 42,9 | 21,9 | 1,8 | 22,9 | 1,8 | 5,8 | 2,9 | 100,0 | 834 | 1,8 |
| 55-59 | 57,7 | 19,3 | 1,8 | 12,1 | 1,5 | 6,2 | 1,4 | 100,0 | 646 | 0,0 |
| 60-64 | 64,5 | 16,3 | 1,4 | 9,2 | 1,5 | 4,5 | 2,6 | 100,0 | 515 | 0,0 |
| 65+ | 74,3 | 14,0 | 2,0 | 6,1 | 0,7 | 2,5 | 0,5 | 100,0 | 1 416 | 0,0 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 6,4 | 32,7 | 3,2 | 34,6 | 2,9 | 17,1 | 3,1 | 100,0 | 1 351 | 6,6 |
| Autres villes | 25,3 | 38,3 | 2,4 | 25,2 | 1,5 | 6,3 | 1,0 | 100,0 | 9 652 | 3,2 |
| Ensemble urbain | 23,0 | 37,6 | 2,5 | 26,3 | 1,6 | 7,6 | 1,3 | 100,0 | 11 002 | 3,6 |
| Rural | 40,9 | 36,9 | 2,0 | 17,7 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 100,0 | 16 132 | 0,9 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 67,1 | 19,1 | 1,9 | 10,5 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 100,0 | 3 407 | 0,0 |
| Atacora | 45,5 | 32,9 | 0,9 | 18,1 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 100,0 | 2 441 | 0,0 |
| Atlantique | 16,0 | 45,5 | 2,9 | 25,4 | 1,8 | 6,6 | 1,8 | 100,0 | 3 257 | 3,7 |
| Borgou | 50,2 | 27,0 | 2,2 | 15,6 | 0,6 | 3,3 | 1,1 | 100,0 | 3 416 | 0,0 |
| Collines | 25,1 | 42,4 | 1,1 | 27,2 | 0,9 | 2,9 | 0,4 | 100,0 | 1 751 | 3,0 |
| Couffo | 25,7 | 48,5 | 1,9 | 19,5 | 0,9 | 2,7 | 0,7 | 100,0 | 1 786 | 2,0 |
| Donga | 34,8 | 40,9 | 3,3 | 17,4 | 1,0 | 2,2 | 0,4 | 100,0 | 1 884 | 1,6 |
| Littoral | 6,4 | 32,7 | 3,2 | 34,6 | 2,9 | 17,1 | 3,1 | 100,0 | 1 351 | 6,6 |
| Mono | 18,4 | 43,3 | 4,6 | 26,5 | 1,7 | 4,6 | 1,0 | 100,0 | 1 335 | 3,7 |
| Ouémé | 17,6 | 45,4 | 2,4 | 27,6 | 0,6 | 5,3 | 1,0 | 100,0 | 2 532 | 3,6 |
| Plateau | 33,5 | 45,2 | 1,7 | 15,8 | 0,6 | 2,7 | 0,6 | 100,0 | 1 614 | 1,6 |
| Zou | 26,2 | 40,3 | 1,3 | 28,1 | 0,5 | 3,2 | 0,3 | 100,0 | 2 360 | 2,7 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 60,8 | 28,8 | 1,3 | 8,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 100,0 | 5 338 | 0,0 |
| Second | 46,4 | 36,1 | 2,0 | 14,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 100,0 | 5 339 | 0,0 |
| Moyen | 34,1 | 42,3 | 2,1 | 19,3 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 100,0 | 5 403 | 1,6 |
| Quatrième | 21,6 | 44,2 | 2,4 | 26,9 | 0,9 | 2,7 | 1,3 | 100,0 | 5 403 | 3,2 |
| Le plus élevé | 7,0 | 34,4 | 3,1 | 36,2 | 2,9 | 14,7 | 1,8 | 100,0 | 5 650 | 6,2 |
| Ensemble | 33,6 | 37,2 | 2,2 | 21,2 | 1,0 | 4,0 | 0,9 | 100,0 | 27 134 | 1,9 |

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.

² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 2.11 Taux de fréquentation scolaire

Taux Net de Fréquentation scolaire (TNF) et Taux Brut de Fréquentation scolaire (TBF) de la population de fait des ménages, par sexe et niveau d'études, et indice de parité entre les genres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Taux net de fréquentation scolaire ¹ | | | | Taux brut de fréquentation scolaire ² | | | |
|--|---|---------|----------|--|--|---------|----------|--|
| | Masculin | Féminin | Ensemble | Indice de parité entre les genres ³ | Masculin | Féminin | Ensemble | Indice de parité entre les genres ³ |
| NIVEAU PRIMAIRE | | | | | | | | |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 85,4 | 79,6 | 82,3 | 0,93 | 115,5 | 104,7 | 109,7 | 0,91 |
| Autres villes | 75,9 | 69,6 | 72,7 | 0,92 | 106,2 | 94,0 | 100,1 | 0,89 |
| Ensemble urbain | 76,9 | 70,8 | 73,8 | 0,92 | 107,2 | 95,3 | 101,2 | 0,89 |
| Rural | 63,1 | 56,8 | 60,1 | 0,90 | 86,9 | 77,1 | 82,2 | 0,89 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 34,4 | 32,5 | 33,5 | 0,94 | 49,2 | 42,1 | 45,6 | 0,85 |
| Atacora | 59,2 | 51,2 | 55,2 | 0,87 | 89,5 | 71,9 | 80,7 | 0,80 |
| Atlantique | 84,2 | 75,3 | 79,9 | 0,89 | 117,0 | 99,3 | 108,5 | 0,85 |
| Borgou | 47,2 | 43,2 | 45,2 | 0,92 | 66,7 | 59,4 | 63,1 | 0,89 |
| Collines | 78,1 | 77,3 | 77,8 | 0,99 | 108,2 | 103,4 | 106,0 | 0,96 |
| Couffo | 77,6 | 65,4 | 71,7 | 0,84 | 105,2 | 86,0 | 95,9 | 0,82 |
| Donga | 74,5 | 69,5 | 72,1 | 0,93 | 106,0 | 96,8 | 101,6 | 0,91 |
| Littoral | 85,4 | 79,6 | 82,3 | 0,93 | 115,5 | 104,7 | 109,7 | 0,91 |
| Mono | 86,8 | 86,1 | 86,5 | 0,99 | 120,6 | 119,9 | 120,3 | 0,99 |
| Ouémé | 84,0 | 80,1 | 82,1 | 0,95 | 112,4 | 110,4 | 111,4 | 0,98 |
| Plateau | 75,5 | 70,6 | 73,0 | 0,94 | 100,5 | 92,2 | 96,3 | 0,92 |
| Zou | 77,7 | 70,0 | 73,9 | 0,90 | 101,6 | 97,8 | 99,7 | 0,96 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 43,7 | 36,3 | 40,1 | 0,83 | 61,8 | 48,7 | 55,4 | 0,79 |
| Second | 60,5 | 58,1 | 59,3 | 0,96 | 84,5 | 79,0 | 81,8 | 0,93 |
| Moyen | 74,2 | 62,8 | 68,6 | 0,85 | 101,6 | 87,6 | 94,7 | 0,86 |
| Quatrième | 84,2 | 80,0 | 82,2 | 0,95 | 117,0 | 106,1 | 111,6 | 0,91 |
| Le plus élevé | 85,0 | 80,2 | 82,6 | 0,94 | 115,5 | 108,0 | 111,7 | 0,94 |
| Ensemble | 68,2 | 62,3 | 65,3 | 0,91 | 94,4 | 84,3 | 89,4 | 0,89 |
| NIVEAU SECONDAIRE | | | | | | | | |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 66,8 | 52,0 | 58,5 | 0,78 | 91,3 | 72,3 | 80,6 | 0,79 |
| Autres villes | 44,6 | 37,8 | 41,2 | 0,85 | 62,4 | 51,5 | 56,9 | 0,83 |
| Ensemble urbain | 47,1 | 39,7 | 43,3 | 0,84 | 65,6 | 54,3 | 59,7 | 0,83 |
| Rural | 31,9 | 22,0 | 27,0 | 0,69 | 44,4 | 27,9 | 36,3 | 0,63 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 16,3 | 7,6 | 12,3 | 0,47 | 22,6 | 10,5 | 17,0 | 0,47 |
| Atacora | 24,3 | 20,9 | 22,6 | 0,86 | 38,9 | 27,6 | 33,3 | 0,71 |
| Atlantique | 48,2 | 38,0 | 43,2 | 0,79 | 63,3 | 50,0 | 56,8 | 0,79 |
| Borgou | 26,1 | 22,1 | 24,1 | 0,85 | 37,6 | 28,3 | 32,9 | 0,75 |
| Collines | 56,3 | 32,6 | 43,7 | 0,58 | 74,6 | 41,3 | 56,8 | 0,55 |
| Couffo | 32,5 | 23,8 | 28,0 | 0,73 | 45,2 | 29,3 | 36,9 | 0,65 |
| Donga | 29,7 | 24,1 | 27,4 | 0,81 | 43,2 | 33,0 | 38,9 | 0,76 |
| Littoral | 66,8 | 52,0 | 58,5 | 0,78 | 91,3 | 72,3 | 80,6 | 0,79 |
| Mono | 45,4 | 32,5 | 39,1 | 0,72 | 69,3 | 47,8 | 58,7 | 0,69 |
| Ouémé | 55,8 | 46,3 | 50,8 | 0,83 | 74,0 | 60,8 | 67,1 | 0,82 |
| Plateau | 31,3 | 25,0 | 28,2 | 0,80 | 40,8 | 34,3 | 37,6 | 0,84 |
| Zou | 52,1 | 37,7 | 44,3 | 0,72 | 75,1 | 49,6 | 61,4 | 0,66 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 15,1 | 8,3 | 11,9 | 0,55 | 21,8 | 10,6 | 16,4 | 0,49 |
| Second | 27,1 | 13,8 | 20,5 | 0,51 | 37,7 | 17,6 | 27,7 | 0,47 |
| Moyen | 34,5 | 24,9 | 29,8 | 0,72 | 47,7 | 30,3 | 39,3 | 0,64 |
| Quatrième | 47,5 | 37,6 | 42,6 | 0,79 | 63,7 | 51,4 | 57,6 | 0,81 |
| Le plus élevé | 65,9 | 55,9 | 60,4 | 0,85 | 94,0 | 75,7 | 84,0 | 0,81 |
| Ensemble | 37,9 | 29,4 | 33,6 | 0,78 | 52,7 | 38,9 | 45,8 | 0,74 |

¹ Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire (12-18 ans) qui fréquente l'école secondaire. Par définition le taux net de fréquentation ne peut excéder 100 %.

² Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves du niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire. Le taux brut de fréquentation scolaire au niveau secondaire est le nombre total d'élèves du niveau secondaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire. S'il y a pour un niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce niveau, le TBF peut excéder 100 %.

³ L'indice de parité entre les genres au niveau primaire est le ratio du TBF au niveau primaire des filles sur le TBF des garçons. L'indice de parité entre les genres au niveau secondaire est le ratio du TBF au niveau secondaire des filles sur le TBF des garçons.

Résultats clés

- **Niveau d'instruction** : Un peu plus d'une femme sur deux (55 %) et plus du tiers des hommes (36 %) sont sans instruction.
- **Exposition aux médias** : Près d'une femme sur six (57 %) et 42 % des hommes de 15-49 ans ne sont exposés régulièrement à aucun média.
- **Emploi** : Trois quarts des femmes (76 %) et un peu plus de huit hommes sur dix (84 %) travaillaient au cours des sept jours précédant l'enquête.
- **Occupation** : Près d'une femme sur deux (46 %) qui travaillait au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête était occupée dans le commerce. Dans 45 % des cas, les hommes travaillaient dans l'agriculture.
- **Assurance médicale** : Seulement 1 % des femmes et des hommes ont déclaré être couverts par une assurance médicale.
- **Consommation de tabac** : Parmi les femmes de 15-49 ans, 1 % ont déclaré fumer contre 7 % chez les hommes.

Ce chapitre présente les résultats concernant les caractéristiques démographiques et socio-économiques des enquêtés comme l'âge, le niveau d'instruction, le lieu de résidence, l'état matrimonial, l'emploi et le niveau de bien-être économique. Ces informations sont particulièrement utiles pour comprendre les facteurs qui influencent l'utilisation des services de santé reproductive, le recours à la contraception et les comportements en matière de santé.

3.1 CARACTÉRISTIQUES DE BASE DES ENQUÊTÉS

Le **Tableau 3.1** présente la répartition des femmes et des hommes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, notamment l'âge, la religion, l'état matrimonial, le milieu de résidence et le niveau d'instruction. Au cours de l'EDSB-V, un échantillon de 15 928 femmes et 6 727 hommes de 15-49 ont été enquêtés. Les caractéristiques principales de la population sont les suivantes :

- La population est relativement jeune : 58 % des femmes et 57 % des hommes ont moins de 30 ans. Les jeunes de 15-19 ans représentent 21 % des femmes et 23 % des hommes.
- La population âgée de 40 ans ou plus constitue 16 % des femmes et 18 % des hommes.
- Les religions les plus pratiquées sont l'Islam (30 % des femmes et 33 % des hommes) et le catholicisme (25 % des femmes et 26 % des hommes).
- Les résultats selon l'état matrimonial montrent qu'au moment de l'enquête, sept femmes sur dix (70 %) et un peu plus de quatre hommes sur dix (55 %) étaient en union. Par ailleurs, 24 % des femmes et 43 % des hommes étaient célibataires.

- La répartition selon le milieu de résidence montre que la proportion de population vivant en milieu rural est plus élevée qu'en milieu urbain (58 % des femmes et 57 % des hommes contre respectivement 42 % et 43 %).
- La population masculine (64 %) est plus instruite (primaire, secondaire et supérieur) que la population féminine (45 %) (**Tableau 3.1**).
- La répartition par département montre que trois départements concentrent 36 % de la population des femmes et 38 % de la population des hommes : il s'agit de l'Alibori (12 % des femmes et 14 % des hommes), de l'Atlantique (13 % des femmes et 12 % des hommes) et du Borgou (12 % des femmes et des hommes, dans chaque cas).
- Selon le niveau de bien-être économique des ménages, on constate que 17 % des femmes et 19 % des hommes appartiennent au quintile le plus bas, tandis que 23 % des femmes et des hommes, dans chaque cas, appartiennent à des ménages du quintile le plus élevé.

3.2 NIVEAU D'INSTRUCTION ET ALPHABÉTISATION

3.2.1 Niveau d'instruction


Globalement, les femmes sont moins instruites que les hommes. Un peu plus de la moitié des femmes (55 %) et un peu plus du tiers des hommes (36 %) sont sans niveau d'instruction (**Tableaux 3.2.1 et 3.2.2**). Une femme sur cinq (20 %) à un niveau primaire, contre 23 % chez les hommes (**Graphique 3.1**). Dans l'ensemble, le nombre médian d'années d'études achevées est de 4,1 ans pour les hommes de 15-49 ans.

Tendances : La proportion de femmes de 15-49 ans sans instruction a diminué dans le temps, passant de 64 % en 2006 à 55 % en 2017-2018. Par contre chez les hommes de 15-49 ans, on n'observe peu de changement, la proportion n'ayant aucun niveau d'instruction étant passée de 33 % en 2006 à 36 % en 2017-2018.

Variations par caractéristique

- Le niveau d'instruction s'améliore chez les enquêtés des deux sexes, des générations les plus anciennes aux générations les plus récentes. En effet, le pourcentage de femmes sans instruction passe de 77 % dans le groupe d'âges 45-49 ans à 35 % parmi celles de 15-24 ans.
- Le niveau d'instruction varie de manière importante selon le milieu de résidence. Quel que soit le sexe, le niveau d'instruction est sensiblement meilleur en milieu urbain qu'en milieu rural. En effet, 43 % des femmes et 25 % des hommes vivant en milieu urbain n'ont aucun niveau d'instruction contre respectivement 64 % et 44 % en milieu rural. On retrouve cet écart entre milieu de résidence quel que


Graphique 3.1 Niveau d'instruction des enquêtés



soit le niveau d'instruction : en milieu urbain, 6 % des femmes ont atteint un niveau secondaire complet ou un niveau supérieur contre moins d'un pour cent en milieu rural. Chez les hommes, ces proportions sont respectivement de 14 % et 4 % (Graphique 3.2).

Graphique 3.2 Niveau d'instruction secondaire par résidence

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant un niveau d'instruction secondaire complet ou supérieur




- Au niveau départemental, on observe d'importantes variations du niveau d'instruction atteint par les enquêtés. Le département de l'Alibori enregistre la plus forte proportion de femmes sans niveau d'instruction (85 %) tandis que celui du Littoral a la plus faible (23 %). Dans le Littoral, 14 % des femmes ont atteint un niveau secondaire complet ou supérieur contre 1 % dans l'Alibori. Notons que les départements de l'Atacora, du Borgou, du Plateau et de la Donga connaissent des proportions de femmes sans instruction au-dessus de la moyenne nationale (55 %) avec respectivement 67 %, 65 %, 62 % et 61 %). Chez les hommes, c'est aussi dans l'Alibori que l'on enregistre la plus forte proportion d'hommes non instruits (69 %) et dans le Littoral la plus faible (7 %) (Graphique 3.3).

Graphique 3.3 Sans niveau d'instruction par département

Pourcentage de femmes de 15-49 ans sans niveau d'instruction

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans sans niveau d'instruction



- Les proportions de femmes et d'hommes sans niveau d'instruction diminuent au fur et à mesure que le niveau de bien-être économique du ménage augmente, variant chez les femmes de 82 % dans le quintile le plus bas à 25 % dans le quintile le plus élevé, et respectivement de 66 % à 10 % chez les hommes (Tableaux 3.2.1 et 3.2.2).

3.2.2 Niveau d'alphabétisation

Alphabétisation

On suppose que les enquêtés qui ont fréquenté un niveau d'instruction supérieur au niveau secondaire sont alphabétisés. Tous les autres enquêtés, qui ont lu à haute voix une phrase préparée qui leur a été montrée sont considérés comme alphabétisés s'ils ont pu lire toute la phrase ou une partie de la phrase.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Globalement, le taux d'alphabétisation est plus élevé chez les hommes (54 %) que chez les femmes (34 %) (Tableaux 3.3.1 et 3.3.2).

Variations par caractéristique

- Les générations les plus anciennes sont moins alphabétisées que les plus récentes. En effet, la proportion de femmes alphabétisées passe de 17 % chez les 45-49 ans à 51 % dans le groupe d'âges 15-24 ans. Chez les hommes, la proportion des alphabétisés passe respectivement de 43 % à 67 %.
- Quel que soit le sexe, le taux d'alphabétisation est plus élevé en milieu urbain (46 % pour les femmes et 65 % pour les hommes) qu'en milieu rural (25 % des femmes et 46 % des hommes).
- Au niveau départemental, c'est l'Alibori qui enregistre le plus faible pourcentage de femmes alphabétisées (14 %) et le Littoral le plus fort (67 %). Chez les hommes, le pourcentage de ceux qui sont alphabétisés varie d'un minimum de 36 % dans le Plateau à un maximum de 88 % dans le Littoral.
- Les proportions d'enquêtés alphabétisés augmentent du quintile le plus bas au quintile plus élevé, passant chez les femmes de 11 % à 65 %, et chez les hommes de 30 % à 83 %.

3.3 EXPOSITION AUX MEDIAS

Exposition aux médias

On demande aux enquêtés combien de fois ils ont lu un journal, écouté la radio ou regardé la télévision. Ceux qui déclarent *au moins une fois par semaine* sont considérés comme étant exposés régulièrement à ce type de média.


Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Les données sur l'exposition aux différents médias (Tableaux 3.4.1 et 3.4.2) sont particulièrement importantes et peuvent aider à la mise en place de programmes d'éducation, de sensibilisation et de diffusion d'informations. Elles permettent d'évaluer l'accès de la population à l'information. Globalement les femmes sont moins exposées aux médias (57 %) que les hommes (42 %).

Quel que soit le sexe, la radio est le média le plus utilisé : un peu plus de la moitié des hommes (51 %) et plus du tiers des femmes (36 %) écoutent la radio au moins une fois par semaine (**Graphique 3.4**).

Graphique 3.4 Exposition aux médias

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des médias chaque semaine



Tendances : Depuis 2001, le pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans exposés à aucun média a augmenté passant, chez les femmes, de 33 % en 2001 à 46 % à 2011-2012 et à 57 % en 2017-2018 et, chez les hommes de respectivement 13 % à 30 % et à 42 %.

Variations par caractéristique

- L'exposition aux médias varie de manière importante en fonction du milieu de résidence. En effet près de sept femmes sur dix (65 %) vivant en milieu rural ne sont exposées à aucun média, contre 46 % de celles qui vivent en milieu urbain. Le constat est le même chez les hommes, les pourcentages étant respectivement de 49 % et 34 %.
- Au niveau des départements on observe aussi des disparités importantes. En effet dans le département de l'Atacora, 72 % des femmes et 79 % des hommes ne sont exposés à aucun média ; dans le Littoral, ces proportions sont respectivement de 22 % et 11 %.
- L'exposition aux médias augmente avec le niveau d'instruction. La proportion de femmes non exposées aux médias varie de 67 % chez celle n'ayant aucun niveau à 21 % chez celles ayant atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou supérieur. La tendance est identique chez les hommes parmi lesquels on observe des proportions de respectivement 57 % et 20 %.
- Les proportions d'hommes et de femmes exposés à aucun média diminuent du quintile le plus bas (78 % chez les femmes et 65 % chez les hommes) au quintile le plus élevé (respectivement 24 % et 20 %).
- Moins d'une femme sur dix (6 %) interviewées a déclaré avoir utilisé l'internet au cours des douze derniers mois. Parmi ces femmes, 59 % l'utilisent presque chaque jour. Chez les hommes du même groupe d'âge, ces proportions sont respectivement de 20 % et 62 % (**Tableaux 3.5.1 et 3.5.2**).
- L'exposition à l'internet varie selon les départements. C'est dans le Couffo et l'Alibori que la proportion de femmes ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois est la plus faible (2 % dans chaque cas). À l'opposé, c'est le Littoral qui enregistre le plus fort pourcentage avec 29 %. Chez les hommes ces proportions varient de 7 % dans l'Alibori à 66 % dans le Littoral.
- L'utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois augmente avec le niveau d'instruction, passant de 3 % pour le niveau primaire à 53 % pour le niveau secondaire 2^d cycle ou plus chez les femmes. Chez les hommes, ces proportions sont respectivement de 8 % et 67 %.
- Le niveau de bien-être économique a une influence sur l'utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois. Chez les femmes, cette proportion varie de 22 % dans le quintile le plus élevé à moins de 1 % dans le quintile le plus bas. Chez les hommes ces proportions sont respectivement de 55 % et 2 %.

3.4 EMPLOI

Travaille actuellement

Les enquêtés qui travaillaient dans les 7 jours qui précédaient l'enquête

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Lors de l'enquête, des questions relatives à l'activité ont été posées aux hommes et aux femmes. Ces questions ont permis d'identifier les hommes et les femmes qui travaillaient au moment de l'enquête, c'est-à-dire au cours des sept jours précédant l'enquête, et ceux qui avaient effectué un travail quelconque, à un certain moment, au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête.


Trois quarts des femmes (76 %) et plus de huit hommes sur dix (84 %) de 15-49 ans ont déclaré qu'ils travaillaient actuellement, c'est-à-dire au cours des 7 jours avant l'enquête. En outre, 22 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré qu'ils n'avaient pas travaillé au cours des 12 mois avant l'enquête (**Tableaux 3.6.1 et 3.6.2**).

Tendances : Entre 1996 et 2011-2012, le pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant déclaré avoir travaillé au cours des 12 derniers mois avant l'enquête et qui travaillaient encore au moment de l'enquête a baissé, passant de 86 % à 82 % en 2001 puis à 79 % en 2006 et à 64 % en 2011-2012. Par contre, entre 2011-2012 et l'enquête actuelle, la tendance ne s'est pas poursuivie et on constate une augmentation, le pourcentage étant passé de 64 % à 76 %. Dans la même période, chez les hommes de 15-49 ans, on constate la même tendance, la proportion étant passée de 87 % à 79 % puis à 71 % et à 73 % pour augmenter ensuite et atteindre 84 % à l'enquête actuelle.

Variations par caractéristique

- Les résultats selon l'état matrimonial montrent que ce sont les célibataires qui travaillaient le moins fréquemment au cours des 7 derniers jours. (53 % des femmes et 66 % des hommes). Chez les hommes, c'est parmi ceux en union que l'on observe le pourcentage le plus élevé de ceux qui travaillaient (98 %) ; Par contre, chez les femmes, c'est parmi celles en rupture d'union que le pourcentage est le plus élevé (91 %) (**Graphique 3.5**).

Graphique 3.5 Statut de l'emploi par état matrimonial



- En s'intéressant au nombre d'enfants vivant des enquêtés, on note que plus le nombre d'enfant augmente plus la proportion des femmes qui travaillaient au moment de l'enquête augmente. Elle passe de 54 % pour celles n'ayant pas d'enfant à 89 % pour les femmes ayant cinq enfants et plus. Chez les hommes elles passent respectivement de 68 % à 97 %.
- La proportion de femmes qui travaillaient au cours des 7 jours avant l'enquête varie sensiblement selon le milieu de résidence : 73 % des femmes en milieu urbain contre 78 % en milieu rural. Chez les hommes, ces proportions représentent respectivement 81 % et 87 %.
- Les résultats par département mettent aussi en évidence des disparités : parmi les hommes, on constate que dans l'Alibori (97 %), le Borgou (93 %) et l'Atacora (90 %), la quasi-totalité travaillait dans les 7 jours avant l'enquête. Par contre, dans le Couffo et le Mono, ces proportions sont plus faibles (73 % dans les deux cas) et c'est dans le Littoral que la proportion est la plus faible (69 %). Chez les femmes, on constate un écart entre l'Alibori qui enregistre la plus faible proportion de femmes qui travaillaient au cours des 7 derniers jours (70 %) et les Collines qui enregistrent la plus forte proportion (83 %).
- Chez les femmes comme chez les hommes, la proportion de ceux qui travaillaient au cours des 7 derniers jours a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant chez les femmes de 82 % parmi celles sans niveau d'instruction à 55 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus ; chez les hommes, cette proportion passe respectivement de 96 % à 70 % (**Tableaux 3.6.1 et 3.6.2**).

- Chez les hommes, les proportions d'enquêtés qui travaillaient au cours des 7 jours avant l'enquête diminuent du quintile le plus bas au quintile le plus élevé, passant de 93 % à 76 %. Chez les femmes, on constate un écart entre le quintile le plus élevé et les autres, la proportion de celles qui travaillaient au cours des 7 derniers jours variant de 77 % dans les quatre premiers quintiles à 72 % dans le plus élevé.

3.5 OCCUPATION

Occupation :

Classés dans les catégories agriculture, industrie, commerce, information et communication, activités financières et d'assurance, activités professionnelles, administration, autres activités de services et autre

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans qui travaillaient actuellement ou qui ont travaillé dans les 12 mois qui précédaient l'enquête


Parmi les femmes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois précédant l'enquête, la majorité était occupée dans le commerce avec 46 % suivi de l'agriculture (23 %) et de l'industrie (15 %). Chez les hommes de 15-49 ans, c'est l'agriculture qui occupe la première place (45 %) suivi du commerce (19 %) et de l'industrie (11 %) (**Tableaux 3.7.1 et 3.7.2**) (**Graphique 3.6**).

Variations par caractéristique

- Les pourcentages de femmes qui sont occupées dans le commerce diminuent du quintile le plus élevé au quintile le plus bas, passant, de 57 % à 30 %.
- L'agriculture constitue l'occupation principale des hommes du quintile de bien-être économique le plus bas (84 %). Les proportions diminuent au fur et à mesure que le niveau de bien-être augmente passant de 84 % dans le quintile le plus bas à 4 % dans le plus élevé.

Graphique 3.6 Occupation

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois précédant l'enquête par type d'activités



Le **Tableau 3.8** présente la répartition des femmes ayant eu un emploi au cours des 12 derniers mois en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi selon le secteur d'activité (agricole ou non-agricole). Dans le secteur non agricole, les femmes travaillent plus fréquemment à leur propre compte que dans le secteur agricole (83 % contre 58 %). En outre, il est plus fréquent que les femmes travaillent toute l'année dans le secteur non agricole que dans le secteur agricole (81 % contre 31 %). Dans 35 % des cas pour le secteur agricole contre 16 % pour le secteur non agricole, les femmes n'ont pas été payées pour le travail effectué. Seulement, 26 % des femmes travaillant dans le secteur agricole ont été rémunérées en argent contre 78 % dans le secteur non agricole.

3.6 COUVERTURE PAR UNE ASSURANCE MÉDICALE

Les **Tableaux 3.9.1 et 3.9.2** présentent les données relatives à la couverture par une assurance médicale des femmes et des hommes enquêtés. On observe que la quasi-totalité des femmes comme des hommes, ne sont pas couverts par une assurance médicale quelconque (99 % dans les deux cas).

3.7 UTILISATION DE TABAC

Au Bénin, la quasi-totalité des femmes et des hommes de 15-49 ans ne fument pas de tabac (respectivement 99 % et 93 %). Chez les hommes, 7 % fument des cigarettes tandis que chez les femmes, la proportion est de 1 % (**Tableaux 3.10.1 et 3.10.2**). Concernant la fréquence, 5 % des hommes déclarent fumer du tabac quotidiennement et 2 % le font occasionnellement.

Tendances : Chez les femmes, la proportion celles qui ne fument pas n'a pas beaucoup varié de 2001 à 2017-2018, passant de 97 % à 99 %. Chez les hommes, les proportions sont passées de 89 % en 2011-2012 à 93 % en 2017-2018.

Variations par caractéristique

- On constate que chez les hommes les proportions de fumeurs de n'importe quel type de tabac diminuent des générations anciennes aux plus récentes, passant de 10 % parmi ceux de 40-49 ans à 1 % parmi ceux de 15-19 ans. Chez les femmes, on ne note pas de variation importante.
- La proportion de fumeurs est plus élevée en milieu rural (8 % chez les hommes et 2 % chez les femmes) qu'en milieu urbain (5 % pour les hommes et 1 % pour les femmes).
- Le département de l'Alibori enregistre la proportion la plus élevée de femmes qui fument n'importe quel type de tabac (6 %). Chez les hommes, les proportions les plus élevées s'observent dans les départements de l'Atacora (14 %), du Borgou (13 %) et du Plateau (11 %).
- La proportion d'hommes qui fument n'importe quel type de tabac diminue avec le niveau d'instruction : elle passe de 11 % parmi ceux sans niveau d'instruction à 2 % pour ceux du niveau secondaire 2^d cycle ou supérieur.
- La proportion d'hommes qui fument n'importe quel type de tabac diminue avec le niveau de bien-être économique, passant de 13 % dans le quintile le plus bas à 3 % dans le quintile le plus élevé.

Parmi les hommes de 15-49 ans fumeurs de cigarettes, un peu moins de la moitié (48 %) en fume moins de 5 par jour et 9 % ont déclaré en fumer au moins 25 par jour (**Tableau 3.11**).

Au Bénin, les proportions de femmes et d'hommes qui consomment n'importe quel type de tabac non fumé sont respectivement de 1 % et 7 % (**Tableau 3.12**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques des enquêtés, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 3.1** **Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés**
- **Tableau 3.2.1** **Niveau d'instruction : Femme**
- **Tableau 3.2.2** **Niveau d'instruction : Homme**
- **Tableau 3.3.1** **Alphabétisation : Femme**
- **Tableau 3.3.2** **Alphabétisation : Homme**
- **Tableau 3.4.1** **Exposition aux médias : Femme**
- **Tableau 3.4.2** **Exposition aux médias : Homme**
- **Tableau 3.5.1** **Utilisation de l'internet : Femme**
- **Tableau 3.5.2** **Utilisation de l'internet : Homme**
- **Tableau 3.6.1** **Emploi : Femme**
- **Tableau 3.6.2** **Emploi : Homme**
- **Tableau 3.7.1** **Occupation : Femme**
- **Tableau 3.7.2** **Occupation : Homme**
- **Tableau 3.8** **Type d'emploi : Femme**
- **Tableau 3.9.1** **Couverture médicale : Femme**
- **Tableau 3.9.2** **Assurance médicale : Homme**
- **Tableau 3.10.1** **Consommation de tabac à fumer : Femme**
- **Tableau 3.10.2** **Consommation de tabac à fumer : Homme**
- **Tableau 3.11** **Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme**
- **Tableau 3.12** **Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme**

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | Homme | | |
|--|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | Pourcentage pondéré | Effectif pondéré | Effectif non pondéré | Pourcentage pondéré | Effectif pondéré | Effectif non pondéré |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 21,0 | 3 350 | 3 335 | 23,0 | 1 548 | 1 559 |
| 20-24 | 18,4 | 2 923 | 2 916 | 16,6 | 1 118 | 1 137 |
| 25-29 | 18,7 | 2 986 | 2 971 | 17,2 | 1 156 | 1 140 |
| 30-34 | 13,8 | 2 202 | 2 195 | 13,1 | 881 | 883 |
| 35-39 | 11,8 | 1 882 | 1 905 | 12,1 | 812 | 798 |
| 40-44 | 8,3 | 1 320 | 1 333 | 9,2 | 620 | 621 |
| 45-49 | 7,9 | 1 265 | 1 273 | 8,8 | 592 | 593 |
| Religion | | | | | | |
| Vodoun | 8,4 | 1 331 | 1 332 | 10,7 | 717 | 715 |
| Autre traditionnelles | 0,8 | 131 | 137 | 1,1 | 71 | 70 |
| Islam | 29,6 | 4 721 | 4 677 | 33,2 | 2 236 | 2 200 |
| Catholique | 24,7 | 3 928 | 3 945 | 25,9 | 1 739 | 1 727 |
| Protestante | | | | | | |
| Methodiste | 4,9 | 785 | 786 | 3,0 | 205 | 219 |
| Autres Protestants | 3,8 | 609 | 610 | 4,3 | 292 | 307 |
| Célestes | 8,0 | 1 281 | 1 238 | 6,1 | 409 | 389 |
| Autres chrétiens | 13,6 | 2 169 | 2 205 | 8,7 | 586 | 614 |
| Autres religions | 1,1 | 174 | 165 | 1,1 | 76 | 73 |
| Aucune | 5,0 | 798 | 833 | 5,9 | 396 | 417 |
| État matrimonial | | | | | | |
| Célibataire | 24,4 | 3 889 | 3 897 | 42,5 | 2 860 | 2 892 |
| Marié | 55,1 | 8 772 | 8 828 | 44,5 | 2 991 | 2 977 |
| Vivant ensemble | 15,0 | 2 396 | 2 342 | 10,2 | 684 | 667 |
| Divorcé/séparé | 3,4 | 545 | 539 | 2,5 | 169 | 171 |
| Veuf | 2,0 | 325 | 322 | 0,3 | 23 | 24 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 6,0 | 958 | 1 415 | 5,8 | 390 | 592 |
| Autres villes | 36,4 | 5 803 | 5 630 | 37,0 | 2 487 | 2 413 |
| Ensemble urbain | 42,4 | 6 761 | 7 045 | 42,8 | 2 877 | 3 005 |
| Rural | 57,6 | 9 167 | 8 883 | 57,2 | 3 849 | 3 726 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 11,8 | 1 878 | 1 697 | 13,6 | 917 | 826 |
| Atacora | 8,2 | 1 302 | 1 392 | 8,3 | 560 | 604 |
| Atlantique | 12,8 | 2 037 | 1 702 | 12,2 | 822 | 681 |
| Borgou | 11,5 | 1 839 | 1 765 | 12,2 | 823 | 798 |
| Collines | 7,2 | 1 151 | 1 403 | 6,7 | 448 | 554 |
| Couffo | 6,5 | 1 041 | 1 012 | 6,1 | 409 | 398 |
| Donga | 5,5 | 881 | 964 | 6,6 | 445 | 480 |
| Littoral | 6,0 | 958 | 1 415 | 5,8 | 390 | 592 |
| Mono | 4,8 | 759 | 816 | 5,3 | 354 | 372 |
| Ouémé | 9,5 | 1 507 | 1 260 | 9,2 | 618 | 519 |
| Plateau | 6,1 | 970 | 952 | 5,1 | 340 | 329 |
| Zou | 10,1 | 1 606 | 1 550 | 8,9 | 600 | 578 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 55,2 | 8 785 | 8 762 | 36,1 | 2 426 | 2 403 |
| Primaire | 19,8 | 3 148 | 3 116 | 23,2 | 1 562 | 1 515 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 17,9 | 2 847 | 2 827 | 22,9 | 1 538 | 1 550 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 7,2 | 1 147 | 1 223 | 17,9 | 1 201 | 1 263 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 17,2 | 2 735 | 2 856 | 18,6 | 1 248 | 1 280 |
| Second | 19,0 | 3 030 | 2 976 | 19,5 | 1 315 | 1 285 |
| Moyen | 19,5 | 3 104 | 2 985 | 19,1 | 1 282 | 1 231 |
| Quatrième | 21,4 | 3 405 | 3 281 | 19,6 | 1 317 | 1 291 |
| Le plus élevé | 22,9 | 3 654 | 3 830 | 23,3 | 1 565 | 1 644 |
| Ensemble 15-49 | 100,0 | 15 928 | 15 928 | 100,0 | 6 727 | 6 731 |
| 50-64 | na | na | na | na | 868 | 864 |
| Ensemble 15-64 | na | na | na | 100,0 | 7 595 | 7 595 |

Note : Le niveau d'instruction correspond au plus haut niveau d'instruction atteint, qu'il ait été achevé ou non.

na = Non applicable

Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Plus haut niveau d'instruction atteint | | | | | | Total | Nombre médian d'années complétées | Effectif de femmes |
|--|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| | Aucun niveau | Primaire incomplet | Primaire complet ¹ | Secondaire incomplet | Secondaire complet ² | Supérieur | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-24 | 34,8 | 22,1 | 2,1 | 37,9 | 0,9 | 2,2 | 100,0 | 4,1 | 6 273 |
| 15-19 | 28,6 | 24,6 | 2,4 | 43,1 | 0,5 | 0,8 | 100,0 | 4,6 | 3 350 |
| 20-24 | 42,0 | 19,1 | 1,8 | 32,1 | 1,3 | 3,7 | 100,0 | 3,1 | 2 923 |
| 25-29 | 57,9 | 16,9 | 1,8 | 19,8 | 0,6 | 2,9 | 100,0 | 0,0 | 2 986 |
| 30-34 | 67,5 | 16,0 | 1,0 | 12,2 | 0,7 | 2,7 | 100,0 | 0,0 | 2 202 |
| 35-39 | 74,7 | 14,9 | 1,1 | 7,3 | 0,7 | 1,4 | 100,0 | 0,0 | 1 882 |
| 40-44 | 76,2 | 16,1 | 0,8 | 5,9 | 0,1 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 1 320 |
| 45-49 | 77,0 | 13,0 | 0,8 | 8,5 | 0,4 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 1 265 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 22,8 | 24,2 | 3,1 | 36,3 | 2,3 | 11,4 | 100,0 | 5,5 | 958 |
| Autres villes | 46,0 | 19,6 | 1,6 | 28,7 | 1,1 | 3,2 | 100,0 | 1,8 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 42,7 | 20,2 | 1,8 | 29,7 | 1,2 | 4,3 | 100,0 | 2,7 | 6 761 |
| Rural | 64,3 | 16,7 | 1,4 | 16,9 | 0,3 | 0,4 | 100,0 | 0,0 | 9 167 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 84,9 | 4,3 | 1,1 | 9,1 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 1 878 |
| Atacora | 66,7 | 13,4 | 1,4 | 17,9 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 1 302 |
| Atlantique | 40,7 | 25,8 | 2,0 | 25,1 | 1,7 | 4,7 | 100,0 | 2,4 | 2 037 |
| Borgou | 65,4 | 11,3 | 1,6 | 19,1 | 0,5 | 2,1 | 100,0 | 0,0 | 1 839 |
| Collines | 48,9 | 22,3 | 1,0 | 27,0 | 0,4 | 0,5 | 100,0 | 0,9 | 1 151 |
| Couffo | 53,8 | 23,1 | 0,9 | 21,5 | 0,2 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 1 041 |
| Donga | 60,5 | 18,7 | 2,2 | 17,7 | 0,3 | 0,6 | 100,0 | 0,0 | 881 |
| Littoral | 22,8 | 24,2 | 3,1 | 36,3 | 2,3 | 11,4 | 100,0 | 5,5 | 958 |
| Mono | 44,2 | 22,3 | 3,2 | 28,1 | 0,9 | 1,3 | 100,0 | 1,9 | 759 |
| Ouémé | 43,3 | 24,0 | 1,2 | 29,1 | 0,2 | 2,2 | 100,0 | 2,0 | 1 507 |
| Plateau | 62,2 | 18,1 | 1,1 | 18,1 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 970 |
| Zou | 51,4 | 19,4 | 1,1 | 26,7 | 0,4 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 1 606 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 82,1 | 10,5 | 0,9 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2 735 |
| Second | 69,6 | 16,7 | 1,2 | 12,4 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 3 030 |
| Moyen | 60,4 | 19,7 | 1,3 | 18,2 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 3 104 |
| Quatrième | 48,5 | 20,8 | 2,0 | 27,6 | 0,4 | 0,6 | 100,0 | 1,0 | 3 405 |
| Le plus élevé | 24,8 | 21,6 | 2,2 | 41,0 | 2,2 | 8,2 | 100,0 | 5,7 | 3 654 |
| Ensemble | 55,2 | 18,2 | 1,6 | 22,4 | 0,7 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 15 928 |

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Plus haut niveau d'instruction atteint | | | | | | Total | Nombre médian d'années complétées | Effectif d'hommes |
|--|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-------------------|
| | Aucun niveau | Primaire incomplet | Primaire complet ¹ | Secondaire incomplet | Secondaire complet ² | Supérieur | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-24 | 23,2 | 18,2 | 2,2 | 50,1 | 1,2 | 5,0 | 100,0 | 6,3 | 2 666 |
| 15-19 | 20,8 | 19,1 | 2,5 | 55,8 | 0,8 | 1,1 | 100,0 | 6,3 | 1 548 |
| 20-24 | 26,6 | 16,8 | 1,9 | 42,3 | 1,9 | 10,5 | 100,0 | 6,5 | 1 118 |
| 25-29 | 36,9 | 19,8 | 2,5 | 28,0 | 2,0 | 10,8 | 100,0 | 4,1 | 1 156 |
| 30-34 | 41,5 | 20,7 | 2,5 | 22,5 | 2,4 | 10,5 | 100,0 | 2,8 | 881 |
| 35-39 | 51,6 | 22,4 | 2,6 | 14,3 | 1,6 | 7,5 | 100,0 | 0,0 | 812 |
| 40-44 | 50,1 | 27,3 | 2,1 | 15,9 | 1,0 | 3,6 | 100,0 | 0,0 | 620 |
| 45-49 | 48,4 | 26,7 | 2,0 | 18,1 | 1,6 | 3,1 | 100,0 | 0,9 | 592 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 6,7 | 14,1 | 1,7 | 49,4 | 3,9 | 24,3 | 100,0 | 9,4 | 390 |
| Autres villes | 28,4 | 21,4 | 2,2 | 36,1 | 2,1 | 9,9 | 100,0 | 5,1 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 25,4 | 20,4 | 2,1 | 37,9 | 2,3 | 11,9 | 100,0 | 5,8 | 2 877 |
| Rural | 44,0 | 21,3 | 2,5 | 28,3 | 1,0 | 2,9 | 100,0 | 2,2 | 3 849 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 69,4 | 8,5 | 2,2 | 17,4 | 0,9 | 1,7 | 100,0 | 0,0 | 917 |
| Atacora | 47,4 | 17,5 | 1,4 | 28,6 | 1,5 | 3,6 | 100,0 | 2,0 | 560 |
| Atlantique | 15,7 | 30,2 | 1,9 | 39,8 | 2,1 | 10,3 | 100,0 | 5,6 | 822 |
| Borgou | 48,9 | 16,0 | 1,8 | 25,8 | 0,9 | 6,6 | 100,0 | 0,9 | 823 |
| Collines | 29,7 | 23,7 | 1,4 | 38,3 | 1,5 | 5,4 | 100,0 | 4,6 | 448 |
| Couffo | 26,8 | 28,1 | 3,6 | 33,3 | 2,9 | 5,4 | 100,0 | 4,5 | 409 |
| Donga | 39,1 | 23,3 | 5,4 | 26,4 | 1,8 | 4,0 | 100,0 | 3,1 | 445 |
| Littoral | 6,7 | 14,1 | 1,7 | 49,4 | 3,9 | 24,3 | 100,0 | 9,4 | 390 |
| Mono | 17,9 | 21,5 | 5,7 | 43,7 | 2,8 | 8,4 | 100,0 | 6,5 | 354 |
| Ouémé | 30,9 | 24,2 | 1,1 | 34,9 | 0,6 | 8,4 | 100,0 | 4,4 | 618 |
| Plateau | 43,3 | 29,3 | 1,4 | 21,6 | 1,3 | 3,1 | 100,0 | 2,0 | 340 |
| Zou | 24,9 | 24,1 | 2,5 | 43,1 | 0,9 | 4,6 | 100,0 | 5,2 | 600 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 65,8 | 17,0 | 2,0 | 14,7 | 0,1 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 1 248 |
| Second | 48,4 | 22,7 | 1,8 | 25,8 | 0,6 | 0,8 | 100,0 | 0,9 | 1 315 |
| Moyen | 36,3 | 24,3 | 3,1 | 33,0 | 0,8 | 2,5 | 100,0 | 3,5 | 1 282 |
| Quatrième | 26,8 | 24,7 | 3,0 | 40,0 | 1,8 | 3,7 | 100,0 | 4,8 | 1 317 |
| Le plus élevé | 9,6 | 16,5 | 1,9 | 45,2 | 4,0 | 22,7 | 100,0 | 8,8 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 36,1 | 20,9 | 2,3 | 32,4 | 1,6 | 6,7 | 100,0 | 4,1 | 6 727 |
| 50-64 | 52,9 | 20,4 | 1,3 | 18,3 | 1,5 | 5,6 | 100,0 | 0,0 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 38,0 | 20,8 | 2,2 | 30,8 | 1,6 | 6,6 | 100,0 | 3,7 | 7 595 |

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pas d'instruction, niveau primaire ou secondaire | | | | | | Total | Pourcentage alphabétisée ¹ | Effectif de femmes |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------|---|---------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|
| | Supérieur | Peut lire une phrase entière | Peut lire une partie de phrase | Ne peut pas lire | Pas de carte dans la langue de l'enquêtée | Aveugle/ malvoyante | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-24 | 2,2 | 39,4 | 9,6 | 48,7 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 51,1 | 6 273 |
| 15-19 | 0,8 | 45,1 | 11,1 | 42,8 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 57,0 | 3 350 |
| 20-24 | 3,7 | 32,8 | 7,8 | 55,5 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 44,3 | 2 923 |
| 25-29 | 2,9 | 20,6 | 6,4 | 69,5 | 0,6 | 0,1 | 100,0 | 29,8 | 2 986 |
| 30-34 | 2,7 | 16,0 | 5,4 | 75,4 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 24,1 | 2 202 |
| 35-39 | 1,4 | 12,6 | 5,6 | 79,6 | 0,7 | 0,2 | 100,0 | 19,6 | 1 882 |
| 40-44 | 1,0 | 11,5 | 3,6 | 83,3 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 16,1 | 1 320 |
| 45-49 | 0,3 | 12,1 | 4,9 | 82,1 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 17,3 | 1 265 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 11,4 | 45,8 | 9,9 | 31,8 | 1,0 | 0,2 | 100,0 | 67,0 | 958 |
| Autres villes | 3,2 | 32,8 | 6,8 | 56,6 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 42,8 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 4,3 | 34,7 | 7,3 | 53,1 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 46,3 | 6 761 |
| Rural | 0,4 | 17,8 | 6,9 | 74,6 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 25,1 | 9 167 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 0,1 | 10,4 | 3,1 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 13,6 | 1 878 |
| Atacora | 0,3 | 20,3 | 4,3 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | 1 302 |
| Atlantique | 4,7 | 32,3 | 7,0 | 55,5 | 0,3 | 0,1 | 100,0 | 44,0 | 2 037 |
| Borgou | 2,1 | 19,1 | 9,6 | 68,4 | 0,8 | 0,1 | 100,0 | 30,8 | 1 839 |
| Collines | 0,5 | 26,8 | 10,2 | 62,3 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 37,5 | 1 151 |
| Couffo | 0,5 | 20,8 | 8,7 | 69,7 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 30,1 | 1 041 |
| Donga | 0,6 | 21,0 | 5,1 | 73,2 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 26,7 | 881 |
| Littoral | 11,4 | 45,8 | 9,9 | 31,8 | 1,0 | 0,2 | 100,0 | 67,0 | 958 |
| Mono | 1,3 | 32,1 | 8,8 | 56,3 | 1,3 | 0,1 | 100,0 | 42,3 | 759 |
| Ouémé | 2,2 | 34,5 | 5,2 | 57,8 | 0,1 | 0,2 | 100,0 | 41,9 | 1 507 |
| Plateau | 0,3 | 18,0 | 5,9 | 75,2 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 24,2 | 970 |
| Zou | 1,0 | 26,3 | 8,7 | 63,4 | 0,6 | 0,0 | 100,0 | 35,9 | 1 606 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 0,0 | 7,6 | 3,7 | 88,5 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 11,3 | 2 735 |
| Second | 0,0 | 12,6 | 7,1 | 79,7 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 19,8 | 3 030 |
| Moyen | 0,2 | 19,8 | 6,6 | 72,9 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 26,6 | 3 104 |
| Quatrième | 0,6 | 29,9 | 8,8 | 60,3 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 39,3 | 3 405 |
| Le plus élevé | 8,2 | 48,1 | 8,2 | 34,8 | 0,5 | 0,2 | 100,0 | 64,5 | 3 654 |
| Ensemble | 2,0 | 25,0 | 7,1 | 65,5 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 34,1 | 15 928 |

¹ C'est-à-dire les femmes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et celles qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage d'hommes alphabétisés selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pas d'instruction, niveau primaire ou secondaire | | | | | | Total | Pourcentage alphabétisé ¹ | Effectif d'hommes |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| | Supérieur | Peut lire une phrase entière | Peut lire une partie de phrase | Ne peut pas lire | Pas de carte dans la langue de l'enquêté | Aveugle/ malvoyant | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-24 | 5,0 | 53,1 | 8,6 | 32,6 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 66,8 | 2 666 |
| 15-19 | 1,1 | 58,8 | 8,3 | 31,2 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 68,3 | 1 548 |
| 20-24 | 10,5 | 45,3 | 8,9 | 34,5 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 64,7 | 1 118 |
| 25-29 | 10,8 | 32,1 | 10,3 | 45,1 | 1,4 | 0,3 | 100,0 | 53,2 | 1 156 |
| 30-34 | 10,5 | 27,9 | 12,0 | 46,6 | 2,8 | 0,3 | 100,0 | 50,3 | 881 |
| 35-39 | 7,5 | 22,2 | 8,9 | 58,7 | 2,5 | 0,2 | 100,0 | 38,6 | 812 |
| 40-44 | 3,6 | 25,4 | 9,8 | 57,9 | 3,2 | 0,0 | 100,0 | 38,8 | 620 |
| 45-49 | 3,1 | 30,6 | 9,3 | 54,5 | 2,0 | 0,5 | 100,0 | 43,0 | 592 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 24,3 | 57,4 | 6,6 | 10,6 | 0,7 | 0,4 | 100,0 | 88,3 | 390 |
| Autres villes | 9,9 | 42,0 | 9,6 | 36,6 | 1,8 | 0,1 | 100,0 | 61,5 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 11,9 | 44,1 | 9,2 | 33,1 | 1,6 | 0,2 | 100,0 | 65,1 | 2 877 |
| Rural | 2,9 | 33,3 | 9,8 | 52,2 | 1,6 | 0,2 | 100,0 | 46,1 | 3 849 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 1,7 | 21,2 | 16,0 | 60,9 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 39,0 | 917 |
| Atacora | 3,6 | 35,6 | 3,1 | 57,3 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 42,3 | 560 |
| Atlantique | 10,3 | 47,9 | 7,3 | 33,1 | 1,0 | 0,4 | 100,0 | 65,5 | 822 |
| Borgou | 6,6 | 27,6 | 7,5 | 55,5 | 2,6 | 0,1 | 100,0 | 41,8 | 823 |
| Collines | 5,4 | 43,5 | 6,5 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,5 | 448 |
| Couffo | 5,4 | 49,5 | 7,8 | 36,7 | 0,0 | 0,7 | 100,0 | 62,7 | 409 |
| Donga | 4,0 | 39,3 | 3,8 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 47,2 | 445 |
| Littoral | 24,3 | 57,4 | 6,6 | 10,6 | 0,7 | 0,4 | 100,0 | 88,3 | 390 |
| Mono | 8,4 | 47,7 | 16,6 | 26,9 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 72,6 | 354 |
| Ouémé | 8,4 | 36,2 | 14,8 | 38,0 | 2,4 | 0,2 | 100,0 | 59,4 | 618 |
| Plateau | 3,1 | 24,6 | 8,5 | 47,4 | 16,5 | 0,0 | 100,0 | 36,1 | 340 |
| Zou | 4,6 | 44,1 | 12,0 | 39,0 | 0,2 | 0,1 | 100,0 | 60,7 | 600 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 0,5 | 20,2 | 9,3 | 67,5 | 2,1 | 0,4 | 100,0 | 29,9 | 1 248 |
| Second | 0,8 | 29,2 | 9,6 | 58,0 | 2,2 | 0,2 | 100,0 | 39,6 | 1 315 |
| Moyen | 2,5 | 38,0 | 9,0 | 48,3 | 2,1 | 0,1 | 100,0 | 49,6 | 1 282 |
| Quatrième | 3,7 | 47,2 | 10,9 | 36,5 | 1,5 | 0,1 | 100,0 | 61,9 | 1 317 |
| Le plus élevé | 22,7 | 51,6 | 8,9 | 16,2 | 0,4 | 0,2 | 100,0 | 83,2 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 6,7 | 37,9 | 9,5 | 44,0 | 1,6 | 0,2 | 100,0 | 54,2 | 6 727 |
| 50-64 | 5,6 | 27,3 | 6,3 | 58,2 | 2,1 | 0,4 | 100,0 | 39,3 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 6,6 | 36,7 | 9,2 | 45,6 | 1,6 | 0,2 | 100,0 | 52,5 | 7 595 |

¹ C'est-à-dire les hommes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et ceux qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Lit un journal, au moins, une fois par semaine | Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine | Écoute la radio, au moins, une fois par semaine | Les trois médias, au moins, une fois par semaine | Aucun média, au moins, une fois par semaine | Effectif de femmes |
|--|--|---|---|--|---|--------------------|
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 6,5 | 22,0 | 31,0 | 2,5 | 59,4 | 3 350 |
| 20-24 | 4,7 | 22,6 | 35,6 | 2,2 | 55,2 | 2 923 |
| 25-29 | 3,3 | 22,1 | 37,5 | 2,1 | 54,8 | 2 986 |
| 30-34 | 3,5 | 21,9 | 36,8 | 2,6 | 56,5 | 2 202 |
| 35-39 | 2,7 | 19,1 | 36,9 | 2,1 | 57,7 | 1 882 |
| 40-44 | 2,1 | 17,8 | 38,0 | 1,6 | 56,8 | 1 320 |
| 45-49 | 2,2 | 14,4 | 38,0 | 1,6 | 58,4 | 1 265 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 9,1 | 60,7 | 59,2 | 7,1 | 21,6 | 958 |
| Autres villes | 6,4 | 29,8 | 38,5 | 3,7 | 50,4 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 6,8 | 34,2 | 41,4 | 4,2 | 46,3 | 6 761 |
| Rural | 1,9 | 11,0 | 31,5 | 0,7 | 64,7 | 9 167 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 1,5 | 12,4 | 26,2 | 0,7 | 69,5 | 1 878 |
| Atacora | 0,7 | 9,1 | 25,0 | 0,3 | 72,0 | 1 302 |
| Atlantique | 4,1 | 35,2 | 57,9 | 2,8 | 32,3 | 2 037 |
| Borgou | 6,3 | 14,8 | 24,7 | 2,8 | 67,9 | 1 839 |
| Collines | 1,8 | 12,4 | 27,7 | 0,8 | 67,9 | 1 151 |
| Couffo | 1,8 | 14,2 | 40,2 | 0,6 | 56,5 | 1 041 |
| Donga | 1,4 | 10,9 | 27,6 | 0,5 | 66,8 | 881 |
| Littoral | 9,1 | 60,7 | 59,2 | 7,1 | 21,6 | 958 |
| Mono | 6,6 | 20,0 | 42,5 | 3,9 | 53,5 | 759 |
| Ouémé | 7,9 | 26,6 | 38,6 | 4,8 | 50,9 | 1 507 |
| Plateau | 4,8 | 16,8 | 35,3 | 1,5 | 57,2 | 970 |
| Zou | 2,8 | 18,2 | 27,5 | 1,0 | 63,3 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 0,1 | 10,2 | 29,1 | 0,0 | 67,3 | 8 785 |
| Primaire | 2,4 | 23,7 | 39,2 | 1,2 | 52,6 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 10,1 | 33,3 | 42,7 | 4,5 | 43,8 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 23,4 | 63,0 | 59,4 | 15,9 | 20,9 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 0,5 | 2,6 | 21,1 | 0,0 | 78,0 | 2 735 |
| Second | 1,1 | 4,0 | 25,7 | 0,1 | 72,7 | 3 030 |
| Moyen | 1,9 | 7,2 | 31,6 | 0,5 | 65,4 | 3 104 |
| Quatrième | 3,6 | 20,6 | 38,7 | 1,0 | 53,2 | 3 405 |
| Le plus élevé | 11,2 | 60,2 | 55,6 | 8,1 | 24,0 | 3 654 |
| Ensemble | 4,0 | 20,8 | 35,7 | 2,2 | 56,9 | 15 928 |

Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Lit un journal, au moins, une fois par semaine | Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine | Écoute la radio, au moins, une fois par semaine | Les trois médias, au moins, une fois par semaine | Aucun média, au moins, une fois par semaine | Effectif d'hommes |
|--|--|---|---|--|---|-------------------|
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 3,5 | 25,9 | 41,6 | 1,3 | 48,5 | 1 548 |
| 20-24 | 5,9 | 27,4 | 50,3 | 3,5 | 42,6 | 1 118 |
| 25-29 | 7,6 | 28,0 | 51,8 | 4,2 | 40,7 | 1 156 |
| 30-34 | 8,8 | 29,2 | 54,1 | 5,4 | 39,8 | 881 |
| 35-39 | 6,0 | 24,5 | 53,3 | 4,4 | 41,7 | 812 |
| 40-44 | 6,5 | 29,2 | 59,1 | 5,2 | 36,7 | 620 |
| 45-49 | 5,8 | 24,1 | 56,1 | 3,4 | 39,0 | 592 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 15,2 | 73,7 | 67,6 | 11,7 | 10,6 | 390 |
| Autres villes | 7,7 | 37,4 | 53,8 | 5,3 | 37,1 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 8,7 | 42,3 | 55,6 | 6,2 | 33,5 | 2 877 |
| Rural | 4,1 | 15,4 | 47,1 | 1,7 | 48,9 | 3 849 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 5,9 | 11,7 | 35,4 | 1,2 | 58,7 | 917 |
| Atacora | 0,9 | 8,0 | 17,6 | 0,5 | 78,7 | 560 |
| Atlantique | 9,1 | 37,4 | 59,1 | 6,7 | 30,4 | 822 |
| Borgou | 4,5 | 30,5 | 50,6 | 3,1 | 40,2 | 823 |
| Collines | 7,2 | 30,9 | 70,3 | 3,7 | 25,0 | 448 |
| Couffo | 6,9 | 29,6 | 66,5 | 3,3 | 30,0 | 409 |
| Donga | 3,7 | 9,6 | 21,0 | 1,3 | 73,5 | 445 |
| Littoral | 15,2 | 73,7 | 67,6 | 11,7 | 10,6 | 390 |
| Mono | 5,6 | 22,0 | 46,0 | 3,8 | 47,9 | 354 |
| Ouémé | 6,8 | 24,5 | 40,2 | 4,3 | 53,0 | 618 |
| Plateau | 2,6 | 28,4 | 66,6 | 2,2 | 30,6 | 340 |
| Zou | 5,2 | 30,7 | 84,2 | 3,2 | 13,5 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 0,2 | 11,1 | 39,8 | 0,0 | 57,2 | 2 426 |
| Primaire | 2,2 | 22,4 | 53,2 | 0,9 | 41,5 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 6,7 | 33,7 | 52,6 | 3,0 | 37,2 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 22,3 | 56,1 | 67,2 | 15,3 | 19,7 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 1,3 | 6,8 | 32,7 | 0,2 | 65,1 | 1 248 |
| Second | 3,2 | 8,4 | 48,2 | 0,7 | 49,3 | 1 315 |
| Moyen | 2,5 | 15,8 | 48,7 | 0,9 | 47,4 | 1 282 |
| Quatrième | 6,6 | 31,0 | 56,0 | 3,3 | 35,4 | 1 317 |
| Le plus élevé | 14,8 | 64,3 | 64,5 | 11,3 | 19,9 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 6,1 | 26,9 | 50,7 | 3,6 | 42,3 | 6 727 |
| 50-64 | 7,1 | 22,5 | 61,4 | 4,5 | 35,2 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 6,2 | 26,4 | 52,0 | 3,7 | 41,5 | 7 595 |

Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et pourcentage qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en %) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | A déjà utilisé l'internet | A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois | Effectif de femmes | Parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé : | | | | Total | Effectif de femmes |
|--|---------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|
| | | | | Presque chaque jour | Au moins une fois par semaine | Moins d'une fois par semaine | N'a pas utilisé du tout | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-19 | 6,7 | 5,8 | 3 350 | 44,8 | 33,2 | 20,5 | 1,4 | 100,0 | 194 |
| 20-24 | 10,7 | 9,8 | 2 923 | 59,0 | 21,6 | 15,1 | 4,3 | 100,0 | 285 |
| 25-29 | 8,3 | 7,3 | 2 986 | 58,7 | 28,7 | 9,7 | 2,8 | 100,0 | 217 |
| 30-34 | 7,1 | 6,5 | 2 202 | 70,6 | 20,5 | 6,9 | 2,0 | 100,0 | 144 |
| 35-39 | 5,3 | 4,8 | 1 882 | 68,1 | 24,2 | 7,8 | 0,0 | 100,0 | 91 |
| 40-44 | 4,5 | 3,8 | 1 320 | 79,6 | 15,0 | 5,4 | 0,0 | 100,0 | 50 |
| 45-49 | 2,6 | 2,3 | 1 265 | (43,9) | (34,5) | (21,6) | (0,0) | 100,0 | 29 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 30,0 | 28,7 | 958 | 69,4 | 21,7 | 6,2 | 2,7 | 100,0 | 275 |
| Autres villes | 10,8 | 9,7 | 5 803 | 60,2 | 25,7 | 12,4 | 1,7 | 100,0 | 561 |
| Ensemble urbain | 13,5 | 12,4 | 6 761 | 63,2 | 24,4 | 10,4 | 2,0 | 100,0 | 836 |
| Rural | 2,4 | 1,9 | 9 167 | 40,4 | 30,8 | 24,8 | 4,0 | 100,0 | 175 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 1,9 | 1,7 | 1 878 | (66,7) | (21,5) | (11,7) | (0,0) | 100,0 | 31 |
| Atacora | 4,4 | 4,1 | 1 302 | (52,4) | (30,3) | (13,0) | (4,3) | 100,0 | 53 |
| Atlantique | 13,4 | 11,9 | 2 037 | 66,3 | 21,9 | 10,3 | 1,5 | 100,0 | 242 |
| Borgou | 6,0 | 5,0 | 1 839 | 61,1 | 25,2 | 10,8 | 2,9 | 100,0 | 93 |
| Collines | 3,1 | 2,6 | 1 151 | (29,6) | (37,0) | (30,9) | (2,6) | 100,0 | 30 |
| Couffo | 1,6 | 1,6 | 1 041 | * | * | * | * | 100,0 | 17 |
| Donga | 3,6 | 2,8 | 881 | (47,2) | (47,3) | (2,5) | (3,0) | 100,0 | 25 |
| Littoral | 30,0 | 28,7 | 958 | 69,4 | 21,7 | 6,2 | 2,7 | 100,0 | 275 |
| Mono | 5,0 | 4,4 | 759 | (50,3) | (32,7) | (16,9) | (0,0) | 100,0 | 33 |
| Ouémé | 8,4 | 7,7 | 1 507 | 49,4 | 26,8 | 19,5 | 4,3 | 100,0 | 115 |
| Plateau | 4,5 | 3,7 | 970 | (43,2) | (30,9) | (25,9) | (0,0) | 100,0 | 35 |
| Zou | 4,7 | 3,9 | 1 606 | 40,8 | 29,0 | 27,9 | 2,3 | 100,0 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucun | 0,5 | 0,3 | 8 785 | (46,9) | (30,7) | (22,4) | (0,0) | 100,0 | 29 |
| Primaire | 3,4 | 2,9 | 3 148 | 60,1 | 22,4 | 16,2 | 1,3 | 100,0 | 92 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 11,8 | 9,8 | 2 847 | 44,0 | 32,9 | 19,1 | 4,0 | 100,0 | 280 |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | 56,2 | 53,2 | 1 147 | 66,7 | 22,3 | 9,0 | 1,9 | 100,0 | 610 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 0,4 | 0,3 | 2 735 | * | * | * | * | 100,0 | 8 |
| Second | 0,7 | 0,5 | 3 030 | * | * | * | * | 100,0 | 15 |
| Moyen | 1,5 | 1,2 | 3 104 | (26,4) | (29,9) | (34,6) | (9,1) | 100,0 | 37 |
| Quatrième | 5,1 | 4,1 | 3 405 | 47,4 | 27,3 | 21,9 | 3,4 | 100,0 | 141 |
| Le plus élevé | 24,1 | 22,2 | 3 654 | 63,9 | 24,6 | 9,5 | 2,0 | 100,0 | 811 |
| Ensemble | 7,1 | 6,3 | 15 928 | 59,3 | 25,5 | 12,9 | 2,4 | 100,0 | 1 011 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur au moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et pourcentage qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en %) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | A déjà utilisé l'internet | A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois | Effectif d'hommes | Parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé : | | | | Total | Effectif d'hommes |
|--|---------------------------|--|-------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| | | | | Presque chaque jour | Au moins une fois par semaine | Moins d'une fois par semaine | N'a pas utilisé du tout | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-19 | 20,0 | 18,4 | 1 548 | 49,0 | 30,6 | 16,5 | 3,8 | 100,0 | 285 |
| 20-24 | 33,6 | 31,3 | 1 118 | 61,3 | 30,7 | 6,3 | 1,6 | 100,0 | 350 |
| 25-29 | 26,8 | 24,6 | 1 156 | 63,7 | 26,4 | 7,8 | 2,2 | 100,0 | 285 |
| 30-34 | 22,3 | 21,7 | 881 | 66,1 | 26,1 | 6,9 | 0,9 | 100,0 | 191 |
| 35-39 | 15,9 | 15,0 | 812 | 72,5 | 17,7 | 8,9 | 0,9 | 100,0 | 122 |
| 40-44 | 13,6 | 12,1 | 620 | 66,7 | 15,3 | 13,6 | 4,4 | 100,0 | 75 |
| 45-49 | 10,2 | 10,0 | 592 | 74,8 | 13,4 | 11,8 | 0,0 | 100,0 | 59 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 68,6 | 65,6 | 390 | 68,4 | 20,4 | 8,3 | 3,0 | 100,0 | 256 |
| Autres villes | 29,8 | 28,2 | 2 487 | 64,7 | 23,1 | 9,9 | 2,3 | 100,0 | 700 |
| Ensemble urbain | 35,0 | 33,2 | 2 877 | 65,7 | 22,4 | 9,5 | 2,5 | 100,0 | 957 |
| Rural | 11,9 | 10,7 | 3 849 | 52,8 | 35,8 | 10,1 | 1,3 | 100,0 | 410 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 8,1 | 7,3 | 917 | 59,9 | 36,4 | 3,7 | 0,0 | 100,0 | 67 |
| Atacora | 11,4 | 10,5 | 560 | 80,8 | 11,1 | 4,7 | 3,3 | 100,0 | 59 |
| Atlantique | 32,3 | 30,6 | 822 | 60,5 | 28,2 | 10,2 | 1,0 | 100,0 | 252 |
| Borgou | 13,3 | 12,7 | 823 | 71,2 | 17,3 | 2,6 | 8,9 | 100,0 | 104 |
| Collines | 21,8 | 19,6 | 448 | 56,0 | 35,9 | 6,8 | 1,3 | 100,0 | 88 |
| Couffo | 18,1 | 15,0 | 409 | 41,1 | 42,5 | 13,5 | 2,9 | 100,0 | 61 |
| Donga | 16,5 | 15,9 | 445 | 69,1 | 14,9 | 16,1 | 0,0 | 100,0 | 71 |
| Littoral | 68,6 | 65,6 | 390 | 68,4 | 20,4 | 8,3 | 3,0 | 100,0 | 256 |
| Mono | 22,8 | 21,4 | 354 | 63,6 | 29,2 | 7,1 | 0,0 | 100,0 | 76 |
| Ouémé | 25,7 | 24,0 | 618 | 61,4 | 17,9 | 19,6 | 1,1 | 100,0 | 148 |
| Plateau | 14,8 | 13,8 | 340 | (61,7) | (31,5) | (6,8) | (0,0) | 100,0 | 47 |
| Zou | 24,8 | 23,1 | 600 | 46,4 | 41,1 | 10,2 | 2,3 | 100,0 | 139 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucun | 2,6 | 2,2 | 2 426 | 48,8 | 38,5 | 12,7 | 0,0 | 100,0 | 53 |
| Primaire | 8,9 | 8,1 | 1 562 | 48,4 | 34,2 | 13,6 | 3,8 | 100,0 | 126 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 27,2 | 24,7 | 1 538 | 51,3 | 32,6 | 13,1 | 3,1 | 100,0 | 380 |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | 70,3 | 67,3 | 1 201 | 69,7 | 21,4 | 7,3 | 1,6 | 100,0 | 808 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 2,5 | 2,3 | 1 248 | (49,7) | (38,5) | (8,9) | (2,8) | 100,0 | 28 |
| Second | 5,8 | 5,0 | 1 315 | 34,9 | 43,6 | 17,9 | 3,6 | 100,0 | 66 |
| Moyen | 12,7 | 11,2 | 1 282 | 57,9 | 34,2 | 6,1 | 1,8 | 100,0 | 144 |
| Quatrième | 22,3 | 20,0 | 1 317 | 48,0 | 35,6 | 12,5 | 3,9 | 100,0 | 263 |
| Le plus élevé | 57,5 | 55,3 | 1 565 | 69,1 | 20,6 | 8,8 | 1,5 | 100,0 | 866 |
| Ensemble 15-49 | 21,8 | 20,3 | 6 727 | 61,8 | 26,4 | 9,7 | 2,1 | 100,0 | 1 367 |
| 50-64 | 8,5 | 7,7 | 868 | 69,1 | 19,1 | 8,1 | 3,7 | 100,0 | 67 |
| Ensemble 15-64 | 20,3 | 18,9 | 7 595 | 62,2 | 26,0 | 9,6 | 2,2 | 100,0 | 1 434 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 3.6.1 Emploi : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du fait qu'elles travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête | | N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête | Total | Effectif de femmes |
|--|--|-------------------------------|--|-------|--------------------|
| | Travaille actuellement ¹ | Ne travaille pas actuellement | | | |
| Groupe d'âges | | | | | |
| 15-19 | 49,1 | 2,7 | 48,3 | 100,0 | 3 350 |
| 20-24 | 68,7 | 2,8 | 28,6 | 100,0 | 2 923 |
| 25-29 | 81,8 | 2,5 | 15,7 | 100,0 | 2 986 |
| 30-34 | 86,5 | 1,9 | 11,5 | 100,0 | 2 202 |
| 35-39 | 88,7 | 1,9 | 9,4 | 100,0 | 1 882 |
| 40-44 | 92,5 | 1,2 | 6,4 | 100,0 | 1 320 |
| 45-49 | 91,7 | 1,4 | 6,9 | 100,0 | 1 265 |
| État matrimonial | | | | | |
| Célibataire | 53,0 | 3,0 | 44,0 | 100,0 | 3 889 |
| En union | 82,3 | 2,0 | 15,6 | 100,0 | 11 168 |
| En rupture d'union | 90,9 | 1,3 | 7,8 | 100,0 | 871 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | |
| 0 | 54,4 | 3,0 | 42,6 | 100,0 | 4 244 |
| 1-2 | 76,1 | 2,5 | 21,5 | 100,0 | 4 464 |
| 3-4 | 87,2 | 1,8 | 11,0 | 100,0 | 3 863 |
| 5+ | 88,6 | 1,5 | 9,9 | 100,0 | 3 357 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 71,0 | 2,9 | 26,1 | 100,0 | 958 |
| Autres villes | 73,1 | 2,0 | 24,9 | 100,0 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 72,8 | 2,2 | 25,0 | 100,0 | 6 761 |
| Rural | 77,7 | 2,3 | 20,0 | 100,0 | 9 167 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 69,7 | 0,2 | 30,1 | 100,0 | 1 878 |
| Atacora | 81,2 | 3,7 | 15,1 | 100,0 | 1 302 |
| Atlantique | 75,0 | 3,5 | 21,5 | 100,0 | 2 037 |
| Borgou | 72,3 | 1,1 | 26,6 | 100,0 | 1 839 |
| Collines | 82,6 | 1,9 | 15,6 | 100,0 | 1 151 |
| Couffo | 80,8 | 5,0 | 14,2 | 100,0 | 1 041 |
| Donga | 60,0 | 2,9 | 37,1 | 100,0 | 881 |
| Littoral | 71,0 | 2,9 | 26,1 | 100,0 | 958 |
| Mono | 77,5 | 3,2 | 19,3 | 100,0 | 759 |
| Ouémé | 80,1 | 0,9 | 19,0 | 100,0 | 1 507 |
| Plateau | 80,4 | 1,8 | 17,8 | 100,0 | 970 |
| Zou | 77,9 | 1,8 | 20,2 | 100,0 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 82,0 | 1,7 | 16,2 | 100,0 | 8 785 |
| Primaire | 78,6 | 2,7 | 18,8 | 100,0 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 61,0 | 2,8 | 36,2 | 100,0 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 55,0 | 3,4 | 41,6 | 100,0 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 77,1 | 1,7 | 21,2 | 100,0 | 2 735 |
| Second | 76,7 | 2,5 | 20,8 | 100,0 | 3 030 |
| Moyen | 77,3 | 2,8 | 19,9 | 100,0 | 3 104 |
| Quatrième | 76,3 | 2,0 | 21,7 | 100,0 | 3 405 |
| Le plus élevé | 71,6 | 2,1 | 26,3 | 100,0 | 3 654 |
| Ensemble | 75,6 | 2,2 | 22,1 | 100,0 | 15 928 |

¹ « Travaille actuellement » signifie que les femmes ont travaillé au cours des 7 derniers jours. En outre, les femmes qui n'ont pas travaillé au cours des 7 derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absentes parce qu'elles étaient en congé, malades ou en vacances ou encore pour d'autres raisons sont incluses ici.

Tableau 3.6.2 Emploi : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du fait qu'ils travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête | | N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête | Total | Effectif d'hommes |
|--|--|-------------------------------|--|-------|-------------------|
| | Travaille actuellement ¹ | Ne travaille pas actuellement | | | |
| Groupe d'âges | | | | | |
| 15-19 | 56,4 | 6,0 | 37,6 | 100,0 | 1 548 |
| 20-24 | 77,0 | 5,2 | 17,8 | 100,0 | 1 118 |
| 25-29 | 94,2 | 2,2 | 3,6 | 100,0 | 1 156 |
| 30-34 | 97,2 | 1,7 | 1,1 | 100,0 | 881 |
| 35-39 | 98,5 | 1,1 | 0,5 | 100,0 | 812 |
| 40-44 | 97,2 | 1,9 | 0,9 | 100,0 | 620 |
| 45-49 | 96,2 | 2,3 | 1,4 | 100,0 | 592 |
| État matrimonial | | | | | |
| Célibataire | 65,8 | 5,4 | 28,8 | 100,0 | 2 860 |
| En union | 97,6 | 1,8 | 0,6 | 100,0 | 3 675 |
| En rupture d'union | 95,6 | 2,2 | 2,1 | 100,0 | 191 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | |
| 0 | 68,3 | 5,0 | 26,7 | 100,0 | 3 089 |
| 1-2 | 96,3 | 2,7 | 1,0 | 100,0 | 1 232 |
| 3-4 | 98,4 | 1,3 | 0,3 | 100,0 | 1 038 |
| 5+ | 97,4 | 1,8 | 0,8 | 100,0 | 1 367 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 69,4 | 5,6 | 25,0 | 100,0 | 390 |
| Autres villes | 82,2 | 2,4 | 15,4 | 100,0 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 80,5 | 2,8 | 16,7 | 100,0 | 2 877 |
| Rural | 86,7 | 3,7 | 9,6 | 100,0 | 3 849 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 97,0 | 1,0 | 2,0 | 100,0 | 917 |
| Atacora | 89,9 | 2,6 | 7,4 | 100,0 | 560 |
| Atlantique | 77,3 | 3,2 | 19,4 | 100,0 | 822 |
| Borgou | 92,7 | 2,8 | 4,5 | 100,0 | 823 |
| Collines | 80,6 | 10,8 | 8,6 | 100,0 | 448 |
| Couffo | 72,7 | 7,4 | 19,9 | 100,0 | 409 |
| Donga | 87,4 | 0,7 | 12,0 | 100,0 | 445 |
| Littoral | 69,4 | 5,6 | 25,0 | 100,0 | 390 |
| Mono | 73,2 | 3,1 | 23,7 | 100,0 | 354 |
| Ouémé | 79,2 | 1,5 | 19,4 | 100,0 | 618 |
| Plateau | 84,3 | 0,1 | 15,6 | 100,0 | 340 |
| Zou | 84,4 | 4,4 | 11,2 | 100,0 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 96,3 | 1,1 | 2,6 | 100,0 | 2 426 |
| Primaire | 89,1 | 2,8 | 8,1 | 100,0 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 70,5 | 5,3 | 24,2 | 100,0 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 69,8 | 6,2 | 24,0 | 100,0 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 92,7 | 2,2 | 5,1 | 100,0 | 1 248 |
| Second | 88,8 | 3,0 | 8,2 | 100,0 | 1 315 |
| Moyen | 83,1 | 3,4 | 13,5 | 100,0 | 1 282 |
| Quatrième | 80,9 | 4,1 | 15,0 | 100,0 | 1 317 |
| Le plus élevé | 76,3 | 3,8 | 19,9 | 100,0 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 84,0 | 3,3 | 12,7 | 100,0 | 6 727 |
| 50-64 | 91,7 | 2,2 | 6,1 | 100,0 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 84,9 | 3,2 | 11,9 | 100,0 | 7 595 |

¹ « Travaille actuellement » signifie que les hommes ont travaillé au cours des 7 derniers jours. En outre, les hommes qui n'ont pas travaillé au cours des 7 derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absents parce qu'ils étaient en congé, malades ou en vacances ou encore pour d'autres raisons sont inclus ici.

Tableau 3.7.1 Occupation : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'activités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Agriculture ¹ | Industrie ² | Commerce ³ | Activités financières et d'assurance | Activités professionnelles ⁴ | Administration ⁵ | Autres activités de services | Manquant | Total | Effectif de femmes |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------|-------|--------------------|
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 19,7 | 27,0 | 22,9 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 16,8 | 11,8 | 100,0 | 1 732 |
| 20-24 | 21,6 | 22,2 | 34,7 | 0,1 | 2,8 | 2,1 | 5,8 | 10,6 | 100,0 | 2 088 |
| 25-29 | 21,9 | 14,9 | 47,4 | 0,1 | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 7,9 | 100,0 | 2 517 |
| 30-34 | 24,6 | 9,8 | 52,4 | 0,3 | 4,5 | 1,5 | 1,8 | 5,1 | 100,0 | 1 948 |
| 35-39 | 24,9 | 9,5 | 55,5 | 0,2 | 3,1 | 1,1 | 1,8 | 3,8 | 100,0 | 1 705 |
| 40-44 | 27,1 | 10,0 | 56,8 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 1,6 | 100,0 | 1 236 |
| 45-49 | 25,8 | 8,4 | 60,9 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 100,0 | 1 177 |
| État matrimonial | | | | | | | | | | |
| Célibataire | 11,5 | 26,7 | 27,8 | 0,2 | 3,1 | 2,5 | 16,3 | 11,9 | 100,0 | 2 177 |
| En union | 26,3 | 13,0 | 49,0 | 0,1 | 2,8 | 1,1 | 2,1 | 5,6 | 100,0 | 9 424 |
| En rupture d'union | 19,4 | 9,2 | 59,5 | 0,1 | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 5,1 | 100,0 | 802 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | | | |
| 0 | 14,2 | 25,9 | 27,7 | 0,2 | 3,9 | 2,1 | 14,9 | 11,0 | 100,0 | 2 436 |
| 1-2 | 20,8 | 17,6 | 42,6 | 0,2 | 4,3 | 2,0 | 2,9 | 9,8 | 100,0 | 3 506 |
| 3-4 | 23,0 | 11,7 | 54,5 | 0,1 | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 4,9 | 100,0 | 3 439 |
| 5+ | 33,7 | 7,7 | 54,9 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 1,4 | 100,0 | 3 023 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 0,0 | 8,8 | 59,2 | 1,0 | 8,0 | 2,6 | 8,2 | 12,1 | 100,0 | 707 |
| Autres villes | 12,4 | 15,5 | 53,1 | 0,2 | 4,7 | 1,8 | 4,9 | 7,4 | 100,0 | 4 360 |
| Ensemble urbain | 10,6 | 14,6 | 54,0 | 0,3 | 5,2 | 1,9 | 5,3 | 8,0 | 100,0 | 5 068 |
| Rural | 32,0 | 15,6 | 40,4 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | 4,1 | 5,7 | 100,0 | 7 336 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 33,7 | 11,7 | 47,7 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 2,4 | 3,0 | 100,0 | 1 313 |
| Atacora | 51,5 | 12,4 | 22,6 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 8,7 | 3,4 | 100,0 | 1 105 |
| Atlantique | 6,3 | 15,9 | 56,1 | 0,2 | 5,3 | 2,0 | 4,1 | 10,2 | 100,0 | 1 598 |
| Borgou | 39,2 | 16,8 | 31,6 | 0,1 | 1,8 | 1,6 | 6,1 | 2,7 | 100,0 | 1 349 |
| Collines | 33,1 | 19,3 | 30,2 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | 7,0 | 6,6 | 100,0 | 972 |
| Couffo | 41,4 | 13,4 | 36,7 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 5,0 | 100,0 | 894 |
| Donga | 21,1 | 20,2 | 48,4 | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 4,5 | 2,9 | 100,0 | 554 |
| Littoral | 0,0 | 8,8 | 59,2 | 1,0 | 8,0 | 2,6 | 8,2 | 12,1 | 100,0 | 707 |
| Mono | 13,6 | 20,7 | 48,2 | 0,0 | 4,2 | 1,4 | 2,7 | 9,3 | 100,0 | 613 |
| Ouémé | 3,2 | 12,8 | 68,1 | 0,1 | 4,3 | 0,9 | 1,1 | 9,5 | 100,0 | 1 221 |
| Plateau | 16,3 | 18,2 | 53,0 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 7,7 | 100,0 | 797 |
| Zou | 14,5 | 15,9 | 50,2 | 0,0 | 3,0 | 1,8 | 6,7 | 8,0 | 100,0 | 1 281 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucun | 33,5 | 12,8 | 47,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 2,1 | 4,1 | 100,0 | 7 358 |
| Primaire | 11,1 | 24,2 | 45,5 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 3,6 | 13,9 | 100,0 | 2 557 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 7,0 | 16,1 | 45,6 | 0,0 | 5,6 | 4,9 | 12,8 | 8,0 | 100,0 | 1 818 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,3 | 3,9 | 37,3 | 1,9 | 30,0 | 8,6 | 13,5 | 3,4 | 100,0 | 670 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 53,5 | 10,4 | 30,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 3,3 | 2,0 | 100,0 | 2 156 |
| Second | 37,9 | 15,4 | 36,1 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 3,4 | 5,8 | 100,0 | 2 401 |
| Moyen | 23,1 | 16,9 | 47,4 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 5,0 | 6,4 | 100,0 | 2 487 |
| Quatrième | 8,0 | 19,8 | 55,4 | 0,1 | 2,2 | 1,8 | 4,4 | 8,2 | 100,0 | 2 666 |
| Le plus élevé | 1,3 | 12,6 | 56,6 | 0,4 | 9,7 | 3,1 | 6,6 | 9,7 | 100,0 | 2 693 |
| Ensemble | 23,3 | 15,2 | 46,0 | 0,1 | 2,9 | 1,3 | 4,6 | 6,6 | 100,0 | 12 403 |

¹ Comprend : Agriculture, sylviculture et pêche² Comprend : Activités de fabrication, activités extractives et autres activités industrielles³ Comprend : Commerce de gros et détails, transport et entreposage, activités d'hébergements et de restauration⁴ Comprend : Activités professionnelles, scientifiques et techniques administration et appui administratif & support⁵ Comprend : Administration publique et défense, éducation, santé humaine et activités d'action

Tableau 3.7.2 Occupation : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans qui travaillent au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'activités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Agriculture ¹ | Industrie ² | Commerce ³ | Information et communication | Activités financières et d'assurance | Activités professionnelles ⁴ | Administration ⁵ | Autre | Manquant | Total | Effectif d'hommes |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|-------|-------------------|
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 45,9 | 9,4 | 16,2 | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 23,1 | 2,5 | 100,0 | 965 |
| 20-24 | 43,4 | 11,5 | 20,4 | 4,6 | 0,6 | 3,1 | 1,5 | 11,7 | 3,1 | 100,0 | 919 |
| 25-29 | 43,7 | 11,0 | 20,3 | 7,6 | 0,3 | 8,7 | 2,3 | 3,9 | 2,1 | 100,0 | 1 114 |
| 30-34 | 42,0 | 10,6 | 17,5 | 10,1 | 0,3 | 11,5 | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 100,0 | 871 |
| 35-39 | 43,7 | 11,4 | 19,9 | 8,7 | 0,2 | 9,9 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 100,0 | 808 |
| 40-44 | 45,7 | 12,4 | 21,1 | 7,9 | 0,6 | 6,4 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 100,0 | 614 |
| 45-49 | 54,8 | 12,0 | 17,5 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 1,9 | 2,3 | 1,3 | 100,0 | 583 |
| État matrimonial | | | | | | | | | | | |
| Célibataire | 41,7 | 10,3 | 19,5 | 2,7 | 0,5 | 4,4 | 1,4 | 16,7 | 2,7 | 100,0 | 2 035 |
| En union | 47,2 | 11,3 | 18,4 | 8,4 | 0,2 | 7,8 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 100,0 | 3 653 |
| En rupture d'union | 40,6 | 13,5 | 24,0 | 8,3 | 0,2 | 7,1 | 1,5 | 3,5 | 1,4 | 100,0 | 187 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | | | | |
| 0 | 41,9 | 10,5 | 19,7 | 2,8 | 0,5 | 4,7 | 1,5 | 15,6 | 2,8 | 100,0 | 2 264 |
| 1-2 | 40,6 | 10,7 | 20,4 | 8,8 | 0,4 | 11,2 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 100,0 | 1 220 |
| 3-4 | 43,3 | 12,1 | 19,1 | 9,4 | 0,3 | 8,0 | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 100,0 | 1 035 |
| 5+ | 55,7 | 11,5 | 16,5 | 8,1 | 0,0 | 4,4 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 100,0 | 1 356 |
| Résidence | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 1,4 | 13,1 | 32,9 | 7,7 | 3,1 | 20,6 | 4,4 | 9,3 | 7,5 | 100,0 | 293 |
| Autres villes | 28,4 | 11,6 | 26,6 | 9,2 | 0,4 | 9,3 | 2,8 | 8,6 | 3,0 | 100,0 | 2 104 |
| Ensemble urbain | 25,1 | 11,8 | 27,4 | 9,0 | 0,7 | 10,7 | 3,0 | 8,7 | 3,5 | 100,0 | 2 397 |
| Rural | 58,8 | 10,5 | 13,2 | 4,6 | 0,0 | 3,7 | 1,1 | 6,7 | 1,3 | 100,0 | 3 479 |
| Département | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 78,2 | 4,9 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 1,6 | 1,3 | 5,9 | 0,2 | 100,0 | 898 |
| Atacora | 70,8 | 8,5 | 8,6 | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | 5,9 | 0,4 | 100,0 | 518 |
| Atlantique | 23,7 | 22,3 | 22,6 | 9,2 | 0,2 | 8,5 | 2,5 | 7,1 | 3,8 | 100,0 | 662 |
| Borgou | 59,3 | 6,2 | 16,3 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 1,9 | 8,1 | 0,7 | 100,0 | 786 |
| Collines | 52,0 | 5,3 | 15,3 | 4,6 | 0,0 | 5,6 | 0,9 | 15,2 | 1,0 | 100,0 | 410 |
| Couffo | 32,8 | 14,8 | 22,7 | 10,7 | 0,6 | 10,2 | 2,8 | 0,8 | 4,5 | 100,0 | 328 |
| Donga | 55,7 | 5,3 | 13,9 | 8,1 | 0,7 | 5,1 | 1,1 | 9,3 | 0,8 | 100,0 | 392 |
| Littoral | 1,4 | 13,1 | 32,9 | 7,7 | 3,1 | 20,6 | 4,4 | 9,3 | 7,5 | 100,0 | 293 |
| Mono | 27,5 | 25,6 | 23,2 | 4,0 | 0,0 | 10,9 | 1,0 | 4,6 | 3,3 | 100,0 | 271 |
| Ouémé | 13,6 | 15,9 | 36,3 | 10,8 | 0,5 | 10,8 | 2,7 | 4,8 | 4,7 | 100,0 | 499 |
| Plateau | 47,3 | 11,2 | 24,0 | 5,9 | 0,0 | 5,6 | 2,9 | 1,8 | 1,2 | 100,0 | 287 |
| Zou | 25,3 | 10,4 | 27,0 | 11,6 | 0,2 | 6,7 | 1,8 | 14,4 | 2,6 | 100,0 | 533 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 69,9 | 9,0 | 11,8 | 6,1 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 100,0 | 2 362 |
| Primaire | 37,2 | 16,6 | 27,1 | 9,5 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 2,8 | 3,3 | 100,0 | 1 435 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 28,9 | 12,2 | 25,1 | 6,3 | 0,2 | 4,6 | 3,1 | 16,6 | 2,9 | 100,0 | 1 165 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 13,7 | 6,0 | 17,0 | 2,7 | 1,8 | 30,8 | 5,0 | 20,2 | 2,8 | 100,0 | 913 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 83,8 | 4,8 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | 0,6 | 100,0 | 1 185 |
| Second | 64,9 | 10,8 | 10,0 | 4,1 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 7,6 | 0,8 | 100,0 | 1 208 |
| Moyen | 48,6 | 11,9 | 18,6 | 7,2 | 0,0 | 3,2 | 1,3 | 7,4 | 1,8 | 100,0 | 1 109 |
| Quatrième | 24,6 | 15,3 | 27,9 | 10,9 | 0,3 | 7,6 | 2,7 | 8,4 | 2,3 | 100,0 | 1 120 |
| Le plus élevé | 4,4 | 12,6 | 33,7 | 8,2 | 1,3 | 19,6 | 4,0 | 11,0 | 5,2 | 100,0 | 1 254 |
| Ensemble 15-49 | 45,1 | 11,0 | 19,0 | 6,4 | 0,3 | 6,6 | 1,9 | 7,5 | 2,2 | 100,0 | 5 875 |
| 50-64 | 56,9 | 9,6 | 13,7 | 4,3 | 0,0 | 7,5 | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 100,0 | 816 |
| Ensemble 15-64 | 46,5 | 10,9 | 18,3 | 6,2 | 0,3 | 6,7 | 2,0 | 7,0 | 2,1 | 100,0 | 6 691 |

¹ Comprend : Agriculture, sylviculture et pêche

² Comprend : Activités de fabrication, activités extractives et autres activités industrielles

³ Comprend : Commerce de gros et détails, transport et entreposage, activités d'hébergements et de restauration

⁴ Comprend : Activités professionnelles, scientifiques et techniques administration et appui administratif & support

⁵ Comprend : Administration publique et défense, éducation, santé humaine et activités d'action

Tableau 3.8 Type d'emploi : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi, selon le secteur d'activité (agricole ou non-agricole), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique de l'emploi | Travail agricole | Travail non agricole | Manquant | Ensemble |
|--|------------------|----------------------|----------|----------|
| Type de rémunération | | | | |
| En argent seulement | 25,7 | 78,0 | 74,3 | 65,6 |
| En argent et en nature | 34,9 | 6,0 | 1,5 | 12,4 |
| En nature seulement | 4,2 | 0,5 | 0,0 | 1,3 |
| Pas payée | 35,3 | 15,5 | 24,2 | 20,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Type d'employeur | | | | |
| Employée par un membre de la famille | 38,9 | 7,9 | 4,0 | 14,8 |
| Employée par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille | 3,0 | 9,0 | 15,6 | 8,1 |
| Travaille à son propre compte | 58,0 | 83,1 | 80,4 | 77,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Régularité de l'emploi | | | | |
| Toute l'année | 31,2 | 80,5 | 84,1 | 69,3 |
| Saisonnier | 61,5 | 9,7 | 5,2 | 21,4 |
| Occasionnel | 7,3 | 9,8 | 10,7 | 9,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de femmes qui travaillaient au cours des 12 derniers mois | 2 885 | 8 695 | 823 | 12 403 |

Note : L'ensemble comprend les femmes dont l'information sur le type d'emploi est manquante et qui ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.9.1 Couverture médicale : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant une assurance médicale selon certaines caractéristiques, sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Sécurité sociale | Autre assurance fournie par l'employeur | Mutuelle de santé/ assurance communautaire | Souscription individuelle à une assurance privée/autre | Aucune | Effectif de femmes |
|--|------------------|---|--|--|--------|--------------------|
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 99,4 | 3 350 |
| 20-24 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 99,4 | 2 923 |
| 25-29 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 99,0 | 2 986 |
| 30-34 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 98,4 | 2 202 |
| 35-39 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 99,0 | 1 882 |
| 40-44 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 98,3 | 1 320 |
| 45-49 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 98,4 | 1 265 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 0,3 | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 95,7 | 958 |
| Autres villes | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 98,6 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 98,2 | 6 761 |
| Rural | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 99,5 | 9 167 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 1 878 |
| Atacora | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 99,5 | 1 302 |
| Atlantique | 0,2 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 97,7 | 2 037 |
| Borgou | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 99,0 | 1 839 |
| Collines | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 99,5 | 1 151 |
| Couffo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 041 |
| Donga | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 881 |
| Littoral | 0,3 | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 95,7 | 958 |
| Mono | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 98,3 | 759 |
| Ouémé | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 99,1 | 1 507 |
| Plateau | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 99,3 | 970 |
| Zou | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,6 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 99,8 | 8 785 |
| Primaire | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 99,1 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 98,6 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 0,9 | 4,4 | 0,5 | 0,9 | 93,3 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 2 735 |
| Second | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 99,7 | 3 030 |
| Moyen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 99,8 | 3 104 |
| Quatrième | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 99,5 | 3 405 |
| Le plus élevé | 0,4 | 2,5 | 0,2 | 0,5 | 96,4 | 3 654 |
| Ensemble | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 99,0 | 15 928 |

Tableau 3.9.2 Assurance médicale : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans ayant une assurance médicale, selon certaines caractéristiques, sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Sécurité sociale | Autre assurance fournie par l'employeur | Mutuelle de santé/ assurance communautaire | Souscription individuelle à une assurance privée/autre | Aucune | Effectif d'hommes |
|--|------------------|---|--|--|--------|-------------------|
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 99,3 | 1 548 |
| 20-24 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 98,9 | 1 118 |
| 25-29 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 99,3 | 1 156 |
| 30-34 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 97,7 | 881 |
| 35-39 | 0,2 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 97,3 | 812 |
| 40-44 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 98,5 | 620 |
| 45-49 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 98,1 | 592 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 1,0 | 4,2 | 1,1 | 0,9 | 93,2 | 390 |
| Autres villes | 0,1 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 98,4 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 97,7 | 2 877 |
| Rural | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 99,3 | 3 849 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 99,9 | 917 |
| Atacora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 560 |
| Atlantique | 0,1 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 96,5 | 822 |
| Borgou | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 97,9 | 823 |
| Collines | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 98,7 | 448 |
| Couffo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 409 |
| Donga | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 445 |
| Littoral | 1,0 | 4,2 | 1,1 | 0,9 | 93,2 | 390 |
| Mono | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 354 |
| Ouémé | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 618 |
| Plateau | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 340 |
| Zou | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 98,8 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 99,7 | 2 426 |
| Primaire | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 99,5 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 98,7 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 0,5 | 3,6 | 0,8 | 0,2 | 95,2 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 99,9 | 1 248 |
| Second | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 99,4 | 1 315 |
| Moyen | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 99,4 | 1 282 |
| Quatrième | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 99,0 | 1 317 |
| Le plus élevé | 0,4 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 95,9 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 98,6 | 6 727 |
| 50-64 | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 97,6 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 98,5 | 7 595 |

Tableau 3.10.1 Consommation de tabac à fumer : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui fument du tabac sous différentes formes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage qui fume : ¹ | | | Effectif de femmes |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Des cigarettes ² | D'autres types de tabac ³ | N'importe quel type de tabac | |
| Groupe d'âges | | | | |
| 15-19 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 3 350 |
| 20-24 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 2 923 |
| 25-29 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 2 986 |
| 30-34 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 2 202 |
| 35-39 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 1 882 |
| 40-44 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 1 320 |
| 45-49 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1 265 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 958 |
| Autres villes | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 6 761 |
| Rural | 1,7 | 0,1 | 1,7 | 9 167 |
| Département | | | | |
| Alibori | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 1 878 |
| Atacora | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1 302 |
| Atlantique | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 037 |
| Borgou | 2,9 | 0,9 | 3,1 | 1 839 |
| Collines | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1 151 |
| Couffo | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1 041 |
| Donga | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 881 |
| Littoral | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 958 |
| Mono | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 759 |
| Ouémé | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1 507 |
| Plateau | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 970 |
| Zou | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucun | 1,9 | 0,2 | 2,0 | 8 785 |
| Primaire | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 1,9 | 0,5 | 2,0 | 2 735 |
| Second | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 3 030 |
| Moyen | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 3 104 |
| Quatrième | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 3 405 |
| Le plus élevé | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 3 654 |
| Ensemble | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 15 928 |

¹ Y compris un usage quotidien et occasionnel (pas tous les jours).

² Les cigarettes incluent les kreteks.

³ Comprend les pipes à tabac, les cigares, les cheroots, les cigarillos et les pipes à eau

Tableau 3.10.2 Consommation de tabac à fumer : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui fument du tabac sous différentes formes et répartition (en %) des hommes en fonction de la fréquence de consommation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage qui fume : ¹ | | | Fréquence | | | Total | Effectif d'hommes |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------|-------------------|
| | Des cigarettes ² | D'autres types de tabac ³ | N'importe quel type de tabac | Quotidienne | Occasionnel ⁴ | Non-fumeur | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | |
| 15-19 | 1,3 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 98,6 | 100,0 | 1 548 |
| 20-24 | 4,5 | 0,5 | 4,7 | 2,9 | 1,8 | 95,3 | 100,0 | 1 118 |
| 25-29 | 7,4 | 0,9 | 7,7 | 5,0 | 2,8 | 92,2 | 100,0 | 1 156 |
| 30-34 | 9,4 | 0,7 | 9,9 | 6,2 | 3,8 | 90,0 | 100,0 | 881 |
| 35-39 | 9,5 | 1,4 | 10,5 | 7,9 | 2,7 | 89,4 | 100,0 | 812 |
| 40-44 | 10,0 | 0,6 | 10,5 | 7,1 | 3,4 | 89,5 | 100,0 | 620 |
| 45-49 | 10,4 | 0,3 | 10,7 | 8,7 | 2,1 | 89,3 | 100,0 | 592 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 2,9 | 1,4 | 3,7 | 1,2 | 2,8 | 96,0 | 100,0 | 390 |
| Autres villes | 5,3 | 0,4 | 5,5 | 3,7 | 1,8 | 94,5 | 100,0 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 5,0 | 0,5 | 5,2 | 3,3 | 1,9 | 94,7 | 100,0 | 2 877 |
| Rural | 7,7 | 0,7 | 8,1 | 5,7 | 2,5 | 91,8 | 100,0 | 3 849 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 2,9 | 0,7 | 3,6 | 3,0 | 0,7 | 96,2 | 100,0 | 917 |
| Atacora | 14,1 | 0,1 | 14,1 | 11,6 | 2,4 | 85,9 | 100,0 | 560 |
| Atlantique | 6,7 | 0,6 | 7,0 | 3,7 | 3,3 | 93,0 | 100,0 | 822 |
| Borgou | 11,9 | 2,1 | 13,2 | 9,7 | 3,6 | 86,7 | 100,0 | 823 |
| Collines | 9,2 | 0,7 | 9,2 | 5,4 | 3,8 | 90,8 | 100,0 | 448 |
| Couffo | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 2,9 | 2,6 | 94,5 | 100,0 | 409 |
| Donga | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 6,0 | 0,4 | 93,6 | 100,0 | 445 |
| Littoral | 2,9 | 1,4 | 3,7 | 1,2 | 2,8 | 96,0 | 100,0 | 390 |
| Mono | 1,9 | 0,3 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 98,1 | 100,0 | 354 |
| Ouémé | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 99,0 | 100,0 | 618 |
| Plateau | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 5,8 | 5,6 | 88,6 | 100,0 | 340 |
| Zou | 4,7 | 0,4 | 4,7 | 2,9 | 1,7 | 95,3 | 100,0 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 10,3 | 1,1 | 11,0 | 8,3 | 2,8 | 88,9 | 100,0 | 2 426 |
| Primaire | 7,9 | 0,3 | 8,0 | 5,2 | 3,0 | 91,8 | 100,0 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 3,0 | 0,3 | 3,2 | 1,8 | 1,3 | 96,8 | 100,0 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,7 | 0,3 | 1,8 | 0,6 | 1,3 | 98,1 | 100,0 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 11,4 | 1,8 | 12,5 | 9,7 | 3,0 | 87,3 | 100,0 | 1 248 |
| Second | 9,9 | 0,4 | 10,1 | 7,6 | 2,6 | 89,8 | 100,0 | 1 315 |
| Moyen | 5,7 | 0,1 | 5,7 | 3,5 | 2,2 | 94,3 | 100,0 | 1 282 |
| Quatrième | 3,6 | 0,4 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | 96,2 | 100,0 | 1 317 |
| Le plus élevé | 3,1 | 0,5 | 3,3 | 1,2 | 2,2 | 96,6 | 100,0 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 6,5 | 0,6 | 6,9 | 4,7 | 2,2 | 93,0 | 100,0 | 6 727 |
| 50-64 | 9,5 | 0,3 | 9,6 | 7,6 | 2,1 | 90,3 | 100,0 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 6,9 | 0,6 | 7,2 | 5,0 | 2,2 | 92,7 | 100,0 | 7 595 |

¹ Y compris un usage quotidien et occasionnel (pas tous les jours).

² Les cigarettes incluent les kreteks.

³ Comprend les pipes à tabac, les cigares, les cheroots, les cigarillos et les pipes à eau

⁴ Occasionnel comprenant un usage moins que quotidien

Tableau 3.11 Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme

Parmi les hommes de 15-49 ans qui fument des cigarettes tous les jours, répartition (en %) par nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹ | | | | | Total | Effectif d'hommes qui fument des cigarettes tous les jours ¹ |
|--|---|--------|--------|-------|--------|-------|---|
| | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-24 | ≥25 | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | |
| 15-19 | * | * | * | * | * | 100,0 | 10 |
| 20-24 | (59,5) | (22,3) | (5,5) | (0,0) | (12,7) | 100,0 | 31 |
| 25-29 | 37,1 | 28,7 | 10,7 | 7,1 | 16,3 | 100,0 | 56 |
| 30-34 | 40,8 | 35,7 | 13,2 | 5,6 | 4,7 | 100,0 | 53 |
| 35-39 | 54,2 | 25,8 | 6,8 | 4,4 | 8,8 | 100,0 | 59 |
| 40-44 | (50,0) | (30,0) | (10,5) | (5,3) | (4,2) | 100,0 | 40 |
| 45-49 | 54,0 | 29,1 | 9,3 | 3,3 | 4,3 | 100,0 | 50 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | * | * | * | * | * | 100,0 | 4 |
| Autres villes | 53,0 | 28,7 | 6,5 | 6,7 | 5,1 | 100,0 | 84 |
| Ensemble urbain | 53,3 | 28,9 | 6,6 | 6,4 | 4,8 | 100,0 | 89 |
| Rural | 46,2 | 28,3 | 11,0 | 3,6 | 10,9 | 100,0 | 209 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | * | * | * | * | * | 100,0 | 22 |
| Atacora | 46,5 | 30,6 | 14,5 | 6,6 | 1,8 | 100,0 | 62 |
| Atlantique | * | * | * | * | * | 100,0 | 30 |
| Borgou | 55,3 | 24,1 | 16,6 | 2,8 | 1,1 | 100,0 | 73 |
| Collines | (33,8) | (36,3) | (8,9) | (4,2) | (16,8) | 100,0 | 24 |
| Couffo | * | * | * | * | * | 100,0 | 12 |
| Donga | (42,3) | (32,4) | (12,2) | (7,0) | (6,1) | 100,0 | 27 |
| Littoral | * | * | * | * | * | 100,0 | 4 |
| Mono | * | * | * | * | * | 100,0 | 5 |
| Ouémé | * | * | * | * | * | 100,0 | 3 |
| Plateau | * | * | * | * | * | 100,0 | 20 |
| Zou | * | * | * | * | * | 100,0 | 16 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucun | 49,3 | 26,8 | 10,6 | 5,3 | 8,0 | 100,0 | 187 |
| Primaire | 42,7 | 35,1 | 10,8 | 0,0 | 11,4 | 100,0 | 78 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | * | * | * | * | * | 100,0 | 25 |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | * | * | * | * | * | 100,0 | 7 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 42,2 | 25,1 | 9,6 | 9,3 | 13,8 | 100,0 | 105 |
| Second | 55,3 | 24,7 | 11,8 | 1,2 | 7,0 | 100,0 | 99 |
| Moyen | (42,2) | (40,3) | (7,2) | (0,0) | (10,3) | 100,0 | 43 |
| Quatrième | (55,1) | (31,8) | (5,8) | (7,4) | (0,0) | 100,0 | 31 |
| Le plus élevé | * | * | * | * | * | 100,0 | 19 |
| Ensemble 15-49 | 48,3 | 28,5 | 9,7 | 4,5 | 9,1 | 100,0 | 298 |
| 50-64 | 42,2 | 23,5 | 21,8 | 9,2 | 3,3 | 100,0 | 65 |
| Ensemble 15-64 | 47,2 | 27,6 | 11,8 | 5,3 | 8,1 | 100,0 | 362 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur au moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Comprend les cigarettes achetées en commerce, les cigarettes roulées à la main et les kreteks.

Tableau 3.12 Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui consomment actuellement du tabac non fumé par type de tabac et pourcentage qui consomme du tabac sous n'importe quelle forme, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Type de tabac | Femme | Homme |
|--|--------|-------|
| Tabac à prise, par la bouche | 0,9 | 1,0 |
| Tabac à prise, par voie nasale | 0,1 | 6,3 |
| Tabac à chiquer | 0,1 | 0,2 |
| Autre type de tabac non fumé | 0,0 | 0,1 |
| N'importe quel type de tabac non fumé ¹ | 1,0 | 6,9 |
| N'importe quel type de tabac ² | 2,7 | 12,9 |
| Effectif | 15 928 | 6 727 |

Note : Le tableau comprend les femmes et les hommes qui consomment du tabac non fumé tous les jours ou de manière occasionnelle (pas tous les jours).

¹ Comprend le tabac à priser dans la bouche, le tabac à prisé par voie nasale, le tabac à chiquer.

² Comprend tous les types de tabac non fumé figurant dans ce tableau plus les cigarettes, les kreteks, les pipes, les cigares, cheroots, cigarillos et pipes à eau

Résultats clés

- **État matrimonial actuel** : Sept femmes de 15-49 ans sur dix (70 %) et un peu plus de la moitié des hommes du même groupe d'âges (55 %) étaient en union au moment de l'enquête. Environ deux adolescentes (15-19 ans) sur dix (18 %) étaient déjà en union.
- **Polygamie** : Environ deux femmes de 15-49 ans en union sur cinq (38 %) ont déclaré vivre en union polygamique et environ un homme sur cinq (22 %) a déclaré être polygame.
- **Âge à la première union** : Les hommes entrent en première union à un âge plus tardif que les femmes. Avant d'atteindre 18 ans exacts, 37 % des femmes de 25-49 ans avaient déjà contracté une première union contre 7 % parmi les hommes du même groupe d'âges. L'âge médian à la première union des femmes de 25-49 ans est estimé à 19,4 ans. Chez les hommes de 30-64 ans, il est estimé à 25,6 ans.
- **Âge aux premiers rapports sexuels** : Les femmes ont leurs premiers rapports sexuels à un âge plus précoce que les hommes : parmi les jeunes femmes de 15-19 ans, 12 % avaient déjà commencé leur vie sexuelle avant d'atteindre l'âge exact de 15 ans contre 6 % chez les jeunes hommes de 15-19 ans. Avant d'atteindre 18 ans exacts, 59 % des femmes du groupe d'âges 25-49 ans avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels contre 39 % chez les hommes du même groupe d'âges. L'âge médian aux premiers rapports sexuels est estimé à 17,3 ans chez les femmes de 20-49 ans et à 18,7 ans chez les hommes de la même tranche d'âges.

L'union et l'activité sexuelle permettent de déterminer dans quelle mesure les femmes sont exposées au risque de grossesse. Ce sont donc des déterminants importants du niveau de la fécondité. Bien que l'âge à la première union ne constitue pas toujours une indication du début d'exposition au risque de grossesse, l'âge aux premiers rapports sexuels ne coïncidant pas forcément avec l'âge à la première union, il n'en demeure pas moins un indicateur démographique important et tous les changements qui affectent les comportements matrimoniaux peuvent avoir une répercussion sur l'évolution du niveau de la fécondité.

Précisons qu'au Bénin, la Loi N°2002-07 du 24 août 2004 portant Code des Personnes et de la Famille en son article 123, fixe l'âge minimal au mariage à 18 ans.


4.1 ÉTAT MATRIMONIAL

Actuellement en union

Les femmes et les hommes qui ont déclaré qu'ils étaient mariés ou qu'ils vivaient ensemble avec un partenaire comme s'ils étaient mariés au moment de l'enquête.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Au Bénin, sept femmes de 15-49 ans sur dix (70 %) et près de six hommes du même groupe d'âges sur dix (55 %) étaient en union au moment de l'enquête. Près d'un quart des femmes était célibataire (24 %). Par comparaison, ce pourcentage est de 43 % chez les hommes. Parmi les femmes qui vivaient en union, 55 % étaient mariées et 15 % vivaient en union consensuelle (**Graphique 4.1** et **Tableau 4.1**).



Les résultats montrent également que les proportions de femmes célibataires diminuent très rapidement avec l'âge, passant de 81 % chez celles de 15-19 ans à 1 % chez celles de 45-49 ans. À l'instar des femmes, la proportion d'hommes célibataires diminue rapidement avec l'âge, passant de 99 % parmi ceux de 15-19 ans à 1 % chez ceux de 45-49 ans.

On note que dans le groupe d'âges 15-19 ans, 18 % des femmes sont en union contre seulement 1 % chez les hommes (**Tableau 4.1**).

Tendances : Depuis 1996, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on constate une diminution dans la situation matrimoniale des femmes et des hommes de 15-49 ans. Le pourcentage de femmes en union a baissé passant, de 77 % en 1996 à 70 % en 2017-2018. Parmi les hommes, ce pourcentage est passé de 70 % à 55 %.

4.2 POLYGAMIE

Polygamie

Les femmes qui ont déclaré que leur mari ou partenaire a d'autres épouses sont considérées comme vivant en union polygame. De même que les hommes qui ont déclaré avoir plus d'une femme.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union.

Au Bénin, environ deux femmes de 15-49 ans en union sur cinq (38 %) ont déclaré vivre en union polygame, alors que seulement un homme de 15-49 ans en union sur cinq (22 %) a déclaré avoir deux épouses ou plus (**Tableaux 4.2.1** et **4.2.2**).

Parmi les femmes vivant en union polygame, 28 % ont une seule coépouse et 10 % en ont au moins deux.


Tendances : Le pourcentage de femmes en union polygamique a diminué de onze points de pourcentage entre 1996 et 2017-2018, passant de 49 % à 38 % (Graphique 4.2).

Variations par caractéristique

- Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les unions polygamiques ont tendance à augmenter avec l'âge. Dans la tranche d'âges 40-44 ans, près de la moitié des femmes en union (49 %) ont des coépouses contre 19 % à 15-19 ans. Chez les hommes, le pourcentage ayant deux épouses ou plus est de 33 % à 45-49 ans contre 8 % à 20-24 ans.
- La polygamie est plus fréquemment pratiquée en milieu rural (41 % pour les femmes et 24 % chez les hommes) qu'en milieu urbain (32 % pour les femmes et 20 % pour les hommes). Les unions polygames sont aussi moins courantes à Cotonou (20 % pour les femmes et 7 % pour les hommes) que dans les autres villes (34 % pour les femmes et 21 % pour les hommes) (Tableaux 4.2.1 et 4.2.2).
- Les pourcentages de femmes et d'hommes vivant en union polygame varient selon le département. C'est dans le département du Couffo que la polygamie est le plus fréquemment pratiquée (51 % pour les femmes et 37 % pour les hommes) et, à l'opposé, c'est dans le département du Littoral que cette pratique est la moins courante (20 % pour les femmes et 7 % pour les hommes) (Graphique 4.3).
- La pratique de la polygamie varie fortement avec le niveau d'instruction, le pourcentage de femmes en union polygame variant de 43 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 14 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. La même tendance s'observe chez les hommes : 11 % de ceux qui ont le niveau secondaire 2^d cycle ou plus sont polygames contre 27 % de ceux qui n'ont aucun niveau d'instruction.


Graphique 4.2 Tendances de la polygamie

Parmi les femmes de 15-49 ans en union, pourcentage en union polygame



Graphique 4.3 Polygamie par département

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union, pourcentage en union polygame



4.3 ÂGE À LA PREMIÈRE UNION

Âge médian à la première union

Âge auquel la moitié des enquêtés sont entrés en première union.

Échantillon : Femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et hommes de 20-49 ans, 25-49 ans, 20-64 ans, 25-64 ans, 30-49 ans et 30-64 ans

Les résultats montrent que les femmes entrent en première union à un âge plus précoce que les hommes. En effet, parmi les femmes âgées de 20-24 ans à l'enquête, 31 % avaient déjà contracté une première union en atteignant 18 ans exacts contre seulement 5 % chez les hommes. Parmi les femmes de 20-49 ans, 14 % avaient déjà contracté une première union avant d'atteindre 15 ans exacts contre pratiquement aucun homme. L'âge médian à la première union est estimé à 19,4 ans pour les femmes de 25-49 ans et à 25,1 ans pour les hommes de 30-49 ans.


On peut souligner que bien que le Code des Personnes et de la Famille du Bénin fixe, en son article 123, l'âge minimal au mariage à 18 ans, 4 % des jeunes femmes de 15-19 ans et 9 % de celles de 20-24 ans avaient déjà contracté une première union avant d'atteindre 15 ans exacts. Cependant, on constate que des générations anciennes âgées de 45-49 ans à l'enquête aux plus récentes âgées de 15-19 ans, le pourcentage en première union avant 15 ans exacts passe de 13 % à 4 % (**Tableau 4.3**). Cependant, ce résultat, plus qu'indiquer une tendance à la baisse, pourrait résulter du fait que ou les femmes les plus jeunes ne déclarent pas bien les enfants qu'elles ont eu avant 15 ans, parce c'est un événement très récent qui nés pas bien vu culturellement, ou les femmes le plus âgées éloignent dans le passé les dates des naissances des enfants plus grands.

Tendances : L'âge médian à la première union chez les femmes de 25-49 ans a varié peu entre 1996 et 2017-2018, passant de 18,4 ans à 19,4 ans.

Variations par caractéristique

- Les femmes de 25-49 ans vivant à Cotonou entrent en union plus tard (âge médian de 22,8 ans) que les femmes vivant dans les autres villes (âge médian de 20,1 ans) et dans les zones rurales (âge médian de 18,8 ans) (**Graphique 4.4** et **Tableau 4.4**).
- Le niveau d'instruction influence l'âge médian à la première union. Plus le niveau d'instruction augmente, plus l'âge médian à la première union est retardé. Parmi les femmes de 25-49 ans, l'âge médian à la première union de celles qui ont un niveau d'instruction « secondaire 1^{er} cycle » est de 21,3 ans contre 20,4 ans pour celles qui ont le niveau d'instruction « primaire » et 18,6 ans pour celles qui n'ont aucun niveau d'instruction.
- L'âge médian à la première union augmente avec le niveau de bien-être économique. Parmi les femmes de 25-49 ans, il varie de 18,0 ans pour les femmes dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas à 21,9 ans parmi celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé (**Tableau 4.4**).

Graphique 4.4 Âge médian des femmes à la première union par résidence



4.4 ÂGE AUX PREMIERS RAPPORTS SEXUELS

Age médian aux premiers rapports sexuels

Âge auquel la moitié des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels.

Échantillon : Femmes de 15-24 ans, 20-49 ans et de 25-49 ans et hommes de 15-24 ans, 20-49 ans, 25-49 ans, 20-64 ans, et 25-64 ans.

Au Bénin, l'âge médian aux premiers rapports sexuels chez les femmes âgées de 25-49 ans est de 17,3 ans, soit légèrement inférieur à celui de l'âge d'entrée en première union (19,4 ans). Parmi les hommes du même groupe d'âges, l'âge médian aux premiers rapports sexuels estimé à 18,7 ans est plus élevé que chez les femmes. Que ce soit chez les femmes ou les hommes, les premiers rapports sexuels n'ont pas toujours lieu dans le cadre de l'union (Graphique 4.5).


Les premiers rapports sexuels sont plus précoces chez les femmes que chez les hommes : 12 % d'adolescentes (15-19 ans) contre 6 % d'adolescents avaient déjà eu leur premier rapport sexuel avant leur 15^{ème} anniversaire. Plus d'un tiers des jeunes hommes âgés de 20-24 ans (38 %), avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, contre 61 % des jeunes filles (Tableau 4.5).

Tendances : L'âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes et des hommes est resté quasiment le même entre 1996 et 2017-2018 (Graphique 4.6).


Variations par caractéristique

- Les femmes (25-49 ans) des départements de l'Atacora (16,4 ans), de l'Alibori (16,5 ans), des Collines (16,5 ans), du Borgou (16,7 ans) et du Zou (16,8 ans) sont celles qui débute le plus tôt leur vie sexuelle. À l'inverse, c'est dans les départements de l'Ouémé (18,5 ans), du Couffo (18,4 ans), du Littoral (18,3 ans) et du Mono (18 ans) que cet âge médian est le plus tardif.
- Chez les femmes de 25-49 ans, l'âge médian aux premiers rapports sexuels augmente légèrement avec le niveau d'instruction, il est de 16,9 ans chez les femmes sans niveau d'instruction contre 18,8 ans chez celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. Par contre chez les hommes, le niveau d'instruction n'a pratiquement aucune influence sur l'âge médian aux premiers rapports sexuels (Tableau 4.6).

Graphique 4.5 Âge médian aux premiers rapports sexuels et âge médian à la première union



Graphique 4.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels : Tendances



4.5 ACTIVITÉ SEXUELLE RÉCENTE

La fréquence des rapports sexuels est un facteur important de l'exposition au risque de grossesse et de transmission des infections et maladies sexuellement transmissibles si des mesures de protections ne sont pas prises. Près de la moitié des femmes (49 %) et plus de six hommes sur dix (61 %) de 15-49 ans ont déclaré avoir eu leurs derniers rapports sexuels dans les quatre dernières semaines avant l'enquête. Pour 29 % des femmes et 14 % des hommes, les derniers rapports sexuels avaient eu lieu au cours de l'année. En outre, pour 10 % de femmes et 5 % des hommes, les derniers rapports sexuels ont eu lieu il y a un an et plus. En outre, 12 % des femmes et 20 % des hommes ont déclaré n'avoir jamais eu de rapports sexuels (**Tableaux 4.7.1 et 4.7.2**).

Variations par caractéristique

- Près de la moitié des adolescentes (48 %) sont sexuellement actives. Dans 22 % des cas, les derniers rapports sexuels avaient eu lieu dans les quatre semaines avant l'enquête et dans 21 % des cas, dans la dernière année. Par contre chez les adolescents, 71 % n'ont jamais eu de rapports sexuels.
- L'activité sexuelle récente des femmes sexuellement actives varie selon l'état matrimonial. Plus de six femmes en union sur dix (62 %) ont eu leurs rapports sexuels les quatre dernières semaines contre 18 % pour les célibataires. Par contre, la tendance est plus prononcée chez les hommes que chez les femmes : plus de neuf hommes en union sur dix (93 %) ont eu leurs rapports sexuels les quatre dernières semaines contre 21 % parmi les célibataires pour la même période (**Tableaux 4.7.1 et 4.7.2**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur l'union et l'activité sexuelle, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 4.1** État matrimonial actuel
- **Tableau 4.2.1** Nombre de coépouses des femmes
- **Tableau 4.2.2** Nombre d'épouses des hommes
- **Tableau 4.3** Âge à la première union
- **Tableau 4.4** Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques
- **Tableau 4.5** Âge aux premiers rapports sexuels
- **Tableau 4.6** Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques
- **Tableau 4.7.1** Activité sexuelle récente : Femme
- **Tableau 4.7.2** Activité sexuelle récente : Homme

Tableau 4.1 État matrimonial actuel

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par état matrimonial actuel, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | État matrimonial | | | | | | Total | Pourcentage d'enquêtés actuellement en union | Effectif d'enquêtés |
|----------------|------------------|-------|-----------------|---------|--------|------|-------|--|---------------------|
| | Célibataire | Marié | Vivant ensemble | Divorcé | Séparé | Veuf | | | |
| FEMME | | | | | | | | | |
| 15-19 | 81,3 | 14,5 | 3,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 18,5 | 3 350 |
| 20-24 | 30,0 | 52,9 | 14,3 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | 100,0 | 67,3 | 2 923 |
| 25-29 | 6,6 | 68,8 | 20,2 | 1,1 | 2,7 | 0,6 | 100,0 | 89,0 | 2 986 |
| 30-34 | 1,8 | 72,9 | 19,6 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 100,0 | 92,4 | 2 202 |
| 35-39 | 1,1 | 71,4 | 19,2 | 2,0 | 3,6 | 2,8 | 100,0 | 90,6 | 1 882 |
| 40-44 | 1,1 | 70,6 | 17,7 | 1,7 | 4,0 | 4,8 | 100,0 | 88,3 | 1 320 |
| 45-49 | 1,4 | 63,4 | 17,2 | 1,8 | 5,2 | 10,9 | 100,0 | 80,6 | 1 265 |
| Ensemble 15-49 | 24,4 | 55,1 | 15,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 100,0 | 70,1 | 15 928 |
| HOMME | | | | | | | | | |
| 15-19 | 99,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,6 | 1 548 |
| 20-24 | 73,3 | 20,2 | 5,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 25,4 | 1 118 |
| 25-29 | 33,1 | 50,8 | 12,7 | 1,0 | 2,1 | 0,2 | 100,0 | 63,5 | 1 156 |
| 30-34 | 8,2 | 70,2 | 18,1 | 0,6 | 2,8 | 0,3 | 100,0 | 88,2 | 881 |
| 35-39 | 3,2 | 75,8 | 17,1 | 1,0 | 2,5 | 0,4 | 100,0 | 92,9 | 812 |
| 40-44 | 2,6 | 76,6 | 16,0 | 1,1 | 3,3 | 0,5 | 100,0 | 92,6 | 620 |
| 45-49 | 1,1 | 78,0 | 13,7 | 1,5 | 3,7 | 1,9 | 100,0 | 91,8 | 592 |
| Ensemble 15-49 | 42,5 | 44,5 | 10,2 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | 100,0 | 54,6 | 6 727 |
| 50-64 | 1,7 | 72,8 | 17,3 | 1,9 | 3,6 | 2,7 | 100,0 | 90,1 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 37,9 | 47,7 | 11,0 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 100,0 | 58,7 | 7 595 |

Tableau 4.2.1 Nombre de coépouses des femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en union par nombre de coépouses et pourcentage de femmes actuellement en union ayant une coépouse ou plus, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Nombre de coépouses | | | | Total | Pourcentage ayant une coépouse ou plus ¹ | Effectif de femmes |
|--|---------------------|------|------|-------------|-------|---|--------------------|
| | 0 | 1 | 2+ | Ne sait pas | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | |
| 15-19 | 80,5 | 16,9 | 2,2 | 0,4 | 100,0 | 19,1 | 618 |
| 20-24 | 72,4 | 23,1 | 3,8 | 0,7 | 100,0 | 26,9 | 1 966 |
| 25-29 | 64,0 | 27,8 | 7,2 | 1,0 | 100,0 | 34,9 | 2 658 |
| 30-34 | 58,4 | 29,6 | 11,0 | 0,9 | 100,0 | 40,6 | 2 035 |
| 35-39 | 53,9 | 30,6 | 14,2 | 1,4 | 100,0 | 44,8 | 1 706 |
| 40-44 | 50,2 | 31,8 | 16,7 | 1,2 | 100,0 | 48,6 | 1 166 |
| 45-49 | 51,9 | 29,9 | 17,0 | 1,2 | 100,0 | 46,9 | 1 020 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 76,8 | 16,4 | 3,3 | 3,4 | 100,0 | 19,8 | 551 |
| Autres villes | 64,5 | 25,3 | 8,8 | 1,4 | 100,0 | 34,1 | 3 881 |
| Ensemble urbain | 66,1 | 24,2 | 8,1 | 1,6 | 100,0 | 32,3 | 4 431 |
| Rural | 58,1 | 30,1 | 11,2 | 0,6 | 100,0 | 41,2 | 6 737 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | 60,2 | 29,6 | 10,2 | 0,0 | 100,0 | 39,8 | 1 550 |
| Atacora | 63,9 | 27,2 | 7,2 | 1,7 | 100,0 | 34,4 | 892 |
| Atlantique | 68,1 | 21,5 | 8,7 | 1,7 | 100,0 | 30,2 | 1 311 |
| Borgou | 54,9 | 35,7 | 9,0 | 0,4 | 100,0 | 44,7 | 1 381 |
| Collines | 62,9 | 27,2 | 9,6 | 0,3 | 100,0 | 36,8 | 738 |
| Couffo | 48,3 | 31,4 | 19,9 | 0,3 | 100,0 | 51,4 | 743 |
| Donga | 54,9 | 34,6 | 9,7 | 0,7 | 100,0 | 44,3 | 716 |
| Littoral | 76,8 | 16,4 | 3,3 | 3,4 | 100,0 | 19,8 | 551 |
| Mono | 64,8 | 23,9 | 10,9 | 0,4 | 100,0 | 34,8 | 514 |
| Ouémé | 68,5 | 22,5 | 6,0 | 3,1 | 100,0 | 28,5 | 985 |
| Plateau | 59,9 | 30,8 | 8,8 | 0,6 | 100,0 | 39,5 | 709 |
| Zou | 57,3 | 26,4 | 15,6 | 0,6 | 100,0 | 42,0 | 1 080 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucun | 56,5 | 30,9 | 11,9 | 0,7 | 100,0 | 42,8 | 7 409 |
| Primaire | 67,3 | 24,0 | 7,5 | 1,2 | 100,0 | 31,5 | 1 984 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 71,1 | 20,8 | 5,8 | 2,3 | 100,0 | 26,6 | 1 294 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 84,1 | 12,6 | 1,4 | 1,8 | 100,0 | 14,1 | 481 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 60,2 | 29,9 | 9,2 | 0,7 | 100,0 | 39,1 | 2 165 |
| Second | 56,8 | 32,6 | 10,0 | 0,6 | 100,0 | 42,6 | 2 220 |
| Moyen | 58,4 | 28,6 | 12,5 | 0,4 | 100,0 | 41,1 | 2 233 |
| Quatrième | 61,0 | 27,4 | 11,1 | 0,5 | 100,0 | 38,5 | 2 330 |
| Le plus élevé | 69,9 | 20,3 | 6,9 | 2,8 | 100,0 | 27,2 | 2 221 |
| Ensemble | 61,3 | 27,7 | 10,0 | 1,0 | 100,0 | 37,7 | 11 168 |

¹ Non compris les femmes qui ont répondu « Ne sait pas » quand on leur a demandé si leur conjoint avait d'autres épouses/partenaires

Tableau 4.2.2 Nombre d'épouses des hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en union par nombre d'épouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Nombre d'épouses | | Total | Effectif d'hommes |
|--|------------------|------|-------|-------------------|
| | 1 | 2+ | | |
| Groupe d'âges | | | | |
| 15-19 | * | * | 100,0 | 9 |
| 20-24 | 91,9 | 8,1 | 100,0 | 284 |
| 25-29 | 86,1 | 13,9 | 100,0 | 735 |
| 30-34 | 81,6 | 18,4 | 100,0 | 777 |
| 35-39 | 75,5 | 24,5 | 100,0 | 754 |
| 40-44 | 68,7 | 31,3 | 100,0 | 574 |
| 45-49 | 66,6 | 33,4 | 100,0 | 543 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 92,8 | 7,2 | 100,0 | 182 |
| Autres villes | 78,8 | 21,2 | 100,0 | 1 326 |
| Ensemble urbain | 80,5 | 19,5 | 100,0 | 1 509 |
| Rural | 76,0 | 24,0 | 100,0 | 2 167 |
| Département | | | | |
| Alibori | 76,1 | 23,9 | 100,0 | 494 |
| Atacora | 82,5 | 17,5 | 100,0 | 300 |
| Atlantique | 78,0 | 22,0 | 100,0 | 446 |
| Borgou | 74,2 | 25,8 | 100,0 | 493 |
| Collines | 82,4 | 17,6 | 100,0 | 239 |
| Couffo | 62,9 | 37,1 | 100,0 | 222 |
| Donga | 76,9 | 23,1 | 100,0 | 246 |
| Littoral | 92,8 | 7,2 | 100,0 | 182 |
| Mono | 78,5 | 21,5 | 100,0 | 158 |
| Ouémé | 88,9 | 11,1 | 100,0 | 351 |
| Plateau | 70,3 | 29,7 | 100,0 | 219 |
| Zou | 73,2 | 26,8 | 100,0 | 325 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucun | 72,7 | 27,3 | 100,0 | 1 693 |
| Primaire | 77,2 | 22,8 | 100,0 | 926 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 83,9 | 16,1 | 100,0 | 535 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 89,4 | 10,6 | 100,0 | 521 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 75,6 | 24,4 | 100,0 | 762 |
| Second | 76,3 | 23,7 | 100,0 | 715 |
| Moyen | 73,0 | 27,0 | 100,0 | 680 |
| Quatrième | 77,8 | 22,2 | 100,0 | 718 |
| Le plus élevé | 85,4 | 14,6 | 100,0 | 800 |
| Ensemble 15-49 | 77,8 | 22,2 | 100,0 | 3 675 |
| 50-64 | 65,4 | 34,6 | 100,0 | 782 |
| Ensemble 15-64 | 75,6 | 24,4 | 100,0 | 4 457 |

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 4.3 Âge à la première union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui étaient en première union avant d'atteindre certains âges exacts et âge médian à la première union, selon l'âge actuel, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge actuel | Pourcentage en première union avant d'atteindre l'âge exact de : | | | | | Pourcentage de célibataires | Effectif d'enquêtés | Âge médian à la première union |
|--------------|--|------|------|------|------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | | | |
| FEMME | | | | | | | | |
| 15-19 | 4,2 | na | na | na | na | 81,3 | 3 350 | a |
| 20-24 | 9,4 | 30,6 | 52,2 | na | na | 30,0 | 2 923 | 19,8 |
| 25-29 | 14,1 | 37,4 | 55,7 | 71,9 | 87,8 | 6,6 | 2 986 | 19,4 |
| 30-34 | 17,4 | 38,4 | 56,0 | 70,3 | 84,6 | 1,8 | 2 202 | 19,3 |
| 35-39 | 14,0 | 35,4 | 54,3 | 70,1 | 83,4 | 1,1 | 1 882 | 19,5 |
| 40-44 | 17,6 | 38,5 | 54,7 | 68,5 | 83,1 | 1,1 | 1 320 | 19,4 |
| 45-49 | 13,4 | 34,1 | 52,1 | 66,4 | 78,6 | 1,4 | 1 265 | 19,8 |
| 20-49 | 13,9 | 35,5 | 54,3 | na | na | 9,3 | 12 578 | 19,5 |
| 25-49 | 15,2 | 37,0 | 54,9 | 70,0 | 84,4 | 3,0 | 9 655 | 19,4 |
| HOMME | | | | | | | | |
| 15-19 | 0,0 | na | na | na | na | 99,3 | 1 548 | a |
| 20-24 | 0,0 | 4,8 | 13,0 | na | na | 73,3 | 1 118 | a |
| 25-29 | 0,0 | 6,0 | 14,6 | 28,5 | 51,6 | 33,1 | 1 156 | 24,8 |
| 30-34 | 0,0 | 10,4 | 17,7 | 29,1 | 52,3 | 8,2 | 881 | 24,7 |
| 35-39 | 0,0 | 6,9 | 16,0 | 27,6 | 50,0 | 3,2 | 812 | 25,0 |
| 40-44 | 0,0 | 6,1 | 11,9 | 22,5 | 49,5 | 2,6 | 620 | 25,1 |
| 45-49 | 0,0 | 5,5 | 10,9 | 20,6 | 41,2 | 1,1 | 592 | 26,1 |
| 20-49 | 0,0 | 6,6 | 14,3 | na | na | 25,5 | 5 179 | a |
| 25-49 | 0,0 | 7,1 | 14,6 | 26,4 | 49,6 | 12,4 | 4 061 | a |
| 20-64 | 0,0 | 6,2 | 13,5 | na | na | 22,1 | 6 047 | a |
| 25-64 | 0,0 | 6,6 | 13,6 | 24,6 | 46,7 | 10,5 | 4 929 | a |
| 30-49 | 0,0 | 7,5 | 14,6 | 25,6 | 48,8 | 4,1 | 2 904 | 25,1 |
| 30-64 | 0,0 | 6,7 | 13,3 | 23,4 | 45,2 | 3,6 | 3 773 | 25,6 |

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

na = Non applicable pour cause de troncature

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.4 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques

Âge médian à la première union parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et, âge médian à la première union parmi les hommes de 25-64 ans et de 30-64 ans, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique | Âge des femmes | | Âge des hommes | |
|--|----------------|-------|----------------|-------|
| | 20-49 | 25-49 | 25-64 | 30-64 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | a | 22,8 | a | 28,9 |
| Autres villes | a | 20,1 | a | 26,0 |
| Ensemble urbain | a | 20,4 | a | 26,4 |
| Rural | 18,8 | 18,8 | 24,7 | 25,0 |
| Département | | | | |
| Alibori | 17,8 | 17,7 | 24,8 | 25,0 |
| Atacora | 18,6 | 18,3 | 24,7 | 25,3 |
| Atlantique | a | 20,0 | a | 25,1 |
| Borgou | 18,5 | 18,4 | a | 25,8 |
| Collines | 19,1 | 18,9 | a | 26,5 |
| Couffo | 19,6 | 19,5 | a | 25,4 |
| Donga | 19,6 | 19,7 | a | 26,3 |
| Littoral | a | 22,8 | a | 28,9 |
| Mono | a | 20,2 | a | 25,5 |
| Ouémé | a | 20,6 | a | 26,1 |
| Plateau | 19,9 | 19,8 | 24,4 | 24,4 |
| Zou | 19,5 | 19,4 | 24,7 | 24,8 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucun | 18,6 | 18,6 | 24,8 | 25,1 |
| Primaire | a | 20,4 | a | 25,3 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | a | 21,3 | a | 26,3 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | a | a | a | 27,9 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 18,0 | 18,0 | 24,4 | 24,7 |
| Second | 18,7 | 18,6 | 24,7 | 25,0 |
| Moyen | 19,0 | 18,9 | a | 25,3 |
| Quatrième | 19,9 | 19,8 | a | 25,6 |
| Le plus élevé | a | 21,9 | a | 27,1 |
| Ensemble | 19,5 | 19,4 | a | 25,6 |

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.5 Âge aux premiers rapports sexuels

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels, selon l'âge actuel, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge actuel | Pourcentage ayant déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge exact de : | | | | | Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels | Effectif | Âge médian aux premiers rapports sexuels |
|--------------|--|------|------|------|------|---|----------|--|
| | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | | | |
| FEMME | | | | | | | | |
| 15-19 | 12,0 | na | na | na | na | 52,1 | 3 350 | a |
| 20-24 | 12,4 | 61,0 | 85,0 | na | na | 6,5 | 2 923 | 17,4 |
| 25-29 | 15,0 | 60,3 | 83,7 | 94,2 | 98,4 | 0,7 | 2 986 | 17,3 |
| 30-34 | 15,2 | 60,1 | 82,6 | 93,5 | 97,6 | 0,1 | 2 202 | 17,2 |
| 35-39 | 14,4 | 57,9 | 80,8 | 94,0 | 98,3 | 0,1 | 1 882 | 17,4 |
| 40-44 | 16,1 | 59,1 | 80,8 | 93,1 | 97,7 | 0,1 | 1 320 | 17,3 |
| 45-49 | 14,7 | 56,0 | 81,1 | 93,7 | 97,7 | 0,0 | 1 265 | 17,6 |
| 20-49 | 14,4 | 59,5 | 82,8 | na | na | 1,7 | 12 578 | 17,3 |
| 25-49 | 15,0 | 59,1 | 82,2 | 93,8 | 98,0 | 0,3 | 9 655 | 17,3 |
| 15-24 | 12,2 | na | na | na | na | 30,8 | 6 273 | a |
| HOMME | | | | | | | | |
| 15-19 | 6,2 | na | na | na | na | 70,9 | 1 548 | a |
| 20-24 | 9,5 | 38,2 | 67,2 | na | na | 17,9 | 1 118 | 18,7 |
| 25-29 | 10,6 | 38,7 | 68,9 | 86,2 | 95,0 | 2,8 | 1 156 | 18,7 |
| 30-34 | 10,5 | 43,6 | 65,6 | 84,5 | 93,2 | 0,8 | 881 | 18,4 |
| 35-39 | 9,0 | 41,7 | 63,0 | 82,4 | 92,6 | 0,2 | 812 | 18,7 |
| 40-44 | 8,3 | 39,0 | 63,4 | 79,7 | 90,2 | 0,1 | 620 | 18,8 |
| 45-49 | 7,0 | 31,9 | 55,2 | 74,4 | 87,7 | 0,2 | 592 | 19,4 |
| 20-49 | 9,4 | 39,2 | 64,8 | na | na | 4,7 | 5 179 | 18,7 |
| 25-49 | 9,4 | 39,4 | 64,2 | 82,4 | 92,3 | 1,0 | 4 061 | 18,7 |
| 15-24 | 7,6 | na | na | na | na | 48,7 | 2 666 | a |
| 20-64 | 9,0 | 37,7 | 62,8 | na | na | 4,0 | 6 047 | 18,8 |
| 25-64 | 8,9 | 37,6 | 61,8 | 80,7 | 91,2 | 0,9 | 4 929 | 18,9 |

na = Non applicable pour cause de troncature

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques

Âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les hommes de 20-64 ans et de 25-64 ans, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique | Âge des femmes | | Âge des hommes | |
|--|----------------|-------|----------------|-------|
| | 20-49 | 25-49 | 20-64 | 25-64 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 18,3 | 18,3 | 18,6 | 18,7 |
| Autres villes | 17,7 | 17,7 | 18,9 | 18,9 |
| Ensemble urbain | 17,8 | 17,8 | 18,8 | 18,8 |
| Rural | 17,0 | 17,0 | 18,8 | 18,9 |
| Département | | | | |
| Alibori | 16,6 | 16,5 | a | 20,4 |
| Atacora | 16,5 | 16,4 | 19,4 | 19,5 |
| Atlantique | 17,7 | 17,7 | 18,0 | 18,0 |
| Borgou | 16,7 | 16,7 | 19,2 | 19,3 |
| Collines | 16,6 | 16,5 | 19,3 | 19,7 |
| Couffo | 18,4 | 18,4 | 17,7 | 17,7 |
| Donga | 17,6 | 17,5 | a | 20,1 |
| Littoral | 18,3 | 18,3 | 18,6 | 18,7 |
| Mono | 18,0 | 18,0 | 19,4 | 19,5 |
| Ouémé | 18,4 | 18,5 | 17,3 | 16,7 |
| Plateau | 17,7 | 17,7 | 18,7 | 18,8 |
| Zou | 16,9 | 16,8 | 17,0 | 17,0 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucun | 16,9 | 16,9 | 19,0 | 19,0 |
| Primaire | 17,7 | 17,9 | 18,6 | 18,6 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 18,0 | 18,2 | 18,6 | 18,7 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 16,5 | 16,5 | 19,0 | 19,1 |
| Second | 16,9 | 16,9 | 18,7 | 18,7 |
| Moyen | 17,1 | 17,0 | 19,0 | 19,1 |
| Quatrième | 17,6 | 17,6 | 18,7 | 18,8 |
| Le plus élevé | 18,3 | 18,3 | 18,7 | 18,7 |
| Ensemble | 17,3 | 17,3 | 18,8 | 18,9 |

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.7.1 Activité sexuelle récente : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Derniers rapports sexuels ont eu lieu : | | | N'a jamais eu de rapports sexuels | Total | Effectif de femmes |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| | Dans les 4 dernières semaines | Dans la dernière année ¹ | Il y a un an ou plus | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 22,4 | 20,5 | 5,0 | 52,1 | 100,0 | 3 350 |
| 20-24 | 52,3 | 32,1 | 9,1 | 6,5 | 100,0 | 2 923 |
| 25-29 | 58,2 | 32,2 | 8,8 | 0,7 | 100,0 | 2 986 |
| 30-34 | 62,4 | 29,4 | 8,1 | 0,1 | 100,0 | 2 202 |
| 35-39 | 60,1 | 28,8 | 11,0 | 0,1 | 100,0 | 1 882 |
| 40-44 | 57,5 | 30,5 | 12,0 | 0,1 | 100,0 | 1 320 |
| 45-49 | 43,3 | 33,7 | 23,0 | 0,0 | 100,0 | 1 265 |
| État matrimonial | | | | | | |
| Célibataire | 18,2 | 24,0 | 7,3 | 50,5 | 100,0 | 3 889 |
| En union | 62,2 | 30,0 | 7,7 | 0,0 | 100,0 | 11 168 |
| En rupture d'union | 20,0 | 36,0 | 44,0 | 0,0 | 100,0 | 871 |
| Durée de l'union² | | | | | | |
| 0-4 ans | 63,0 | 30,2 | 6,8 | 0,0 | 100,0 | 2 379 |
| 5-9 ans | 63,8 | 29,7 | 6,5 | 0,0 | 100,0 | 2 240 |
| 10-14 ans | 63,5 | 29,7 | 6,9 | 0,0 | 100,0 | 1 695 |
| 15-19 ans | 61,9 | 28,7 | 9,4 | 0,0 | 100,0 | 1 502 |
| 20-24 ans | 63,1 | 28,3 | 8,6 | 0,0 | 100,0 | 975 |
| 25 ans+ | 54,3 | 35,5 | 10,2 | 0,0 | 100,0 | 992 |
| Marié plus d'une fois | 62,1 | 29,6 | 8,3 | 0,0 | 100,0 | 1 385 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 47,6 | 27,4 | 10,2 | 14,8 | 100,0 | 958 |
| Autres villes | 46,9 | 30,1 | 9,5 | 13,6 | 100,0 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 47,0 | 29,7 | 9,6 | 13,7 | 100,0 | 6 761 |
| Rural | 50,8 | 28,3 | 9,6 | 11,3 | 100,0 | 9 167 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 68,1 | 22,0 | 2,5 | 7,4 | 100,0 | 1 878 |
| Atacora | 46,9 | 28,6 | 15,5 | 9,0 | 100,0 | 1 302 |
| Atlantique | 46,6 | 28,9 | 10,1 | 14,3 | 100,0 | 2 037 |
| Borgou | 43,4 | 33,7 | 13,1 | 9,8 | 100,0 | 1 839 |
| Collines | 49,7 | 31,3 | 7,8 | 11,3 | 100,0 | 1 151 |
| Couffo | 40,5 | 31,1 | 10,8 | 17,6 | 100,0 | 1 041 |
| Donga | 51,0 | 26,0 | 14,3 | 8,7 | 100,0 | 881 |
| Littoral | 47,6 | 27,4 | 10,2 | 14,8 | 100,0 | 958 |
| Mono | 41,2 | 33,5 | 10,3 | 14,9 | 100,0 | 759 |
| Ouémé | 44,6 | 30,9 | 8,8 | 15,7 | 100,0 | 1 507 |
| Plateau | 51,0 | 28,3 | 7,7 | 13,0 | 100,0 | 970 |
| Zou | 50,7 | 27,4 | 7,7 | 14,1 | 100,0 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 55,0 | 29,2 | 10,9 | 5,0 | 100,0 | 8 785 |
| Primaire | 46,0 | 27,7 | 9,5 | 16,9 | 100,0 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 37,2 | 28,8 | 7,0 | 27,0 | 100,0 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 43,1 | 30,3 | 6,8 | 19,8 | 100,0 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 50,7 | 29,1 | 11,1 | 9,2 | 100,0 | 2 735 |
| Second | 48,9 | 28,8 | 10,5 | 11,9 | 100,0 | 3 030 |
| Moyen | 50,6 | 29,5 | 9,2 | 10,8 | 100,0 | 3 104 |
| Quatrième | 49,2 | 28,9 | 9,2 | 12,7 | 100,0 | 3 405 |
| Le plus élevé | 46,9 | 28,5 | 8,6 | 16,0 | 100,0 | 3 654 |
| Ensemble | 49,2 | 28,9 | 9,6 | 12,3 | 100,0 | 15 928 |

¹ Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines.² Non compris les femmes qui ne sont pas actuellement en union.

Tableau 4.7.2 Activité sexuelle récente : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Derniers rapports sexuels ont eu lieu : | | | N'a jamais eu de rapports sexuels | Total | Effectif d'hommes |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| | Dans les 4 dernières semaines | Dans la dernière année ¹ | Il y a un an ou plus | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 9,9 | 12,0 | 7,1 | 70,9 | 100,0 | 1 548 |
| 20-24 | 45,4 | 23,5 | 13,2 | 17,9 | 100,0 | 1 118 |
| 25-29 | 75,1 | 16,6 | 5,5 | 2,8 | 100,0 | 1 156 |
| 30-34 | 87,6 | 10,5 | 1,1 | 0,8 | 100,0 | 881 |
| 35-39 | 90,7 | 8,2 | 0,9 | 0,2 | 100,0 | 812 |
| 40-44 | 89,9 | 9,6 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 620 |
| 45-49 | 89,9 | 8,5 | 1,4 | 0,2 | 100,0 | 592 |
| État matrimonial | | | | | | |
| Célibataire | 21,2 | 20,4 | 11,5 | 46,9 | 100,0 | 2 860 |
| En union | 92,7 | 7,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 3 675 |
| En rupture d'union | 58,0 | 35,6 | 6,3 | 0,0 | 100,0 | 191 |
| Durée de l'union² | | | | | | |
| 0-4 ans | 89,0 | 10,6 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 889 |
| 5-9 ans | 95,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 824 |
| 10-14 ans | 93,6 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 621 |
| 15-19 ans | 92,9 | 6,9 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 532 |
| 20-24 ans | 93,4 | 6,4 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 293 |
| 25 ans+ | 95,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 129 |
| Marié plus d'une fois | 92,5 | 7,3 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 386 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 60,2 | 15,0 | 8,0 | 16,7 | 100,0 | 390 |
| Autres villes | 60,9 | 13,4 | 5,7 | 20,0 | 100,0 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 60,8 | 13,6 | 6,0 | 19,5 | 100,0 | 2 877 |
| Rural | 61,7 | 13,5 | 4,6 | 20,2 | 100,0 | 3 849 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 62,7 | 9,5 | 3,0 | 24,8 | 100,0 | 917 |
| Atacora | 59,1 | 17,2 | 4,0 | 19,6 | 100,0 | 560 |
| Atlantique | 64,6 | 11,0 | 5,5 | 18,9 | 100,0 | 822 |
| Borgou | 64,1 | 10,4 | 7,1 | 18,4 | 100,0 | 823 |
| Collines | 62,5 | 15,1 | 3,4 | 19,0 | 100,0 | 448 |
| Couffo | 56,7 | 15,6 | 10,1 | 17,6 | 100,0 | 409 |
| Donga | 56,1 | 17,5 | 2,7 | 23,7 | 100,0 | 445 |
| Littoral | 60,2 | 15,0 | 8,0 | 16,7 | 100,0 | 390 |
| Mono | 52,3 | 18,3 | 6,7 | 22,7 | 100,0 | 354 |
| Ouémé | 60,5 | 13,0 | 3,0 | 23,5 | 100,0 | 618 |
| Plateau | 67,2 | 18,3 | 2,6 | 11,8 | 100,0 | 340 |
| Zou | 62,7 | 12,6 | 7,6 | 17,1 | 100,0 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 71,6 | 11,7 | 3,0 | 13,7 | 100,0 | 2 426 |
| Primaire | 64,6 | 12,8 | 4,1 | 18,5 | 100,0 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 45,8 | 13,1 | 6,7 | 34,4 | 100,0 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^o cycle ou plus | 56,3 | 18,6 | 9,2 | 15,9 | 100,0 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 64,4 | 12,9 | 4,5 | 18,2 | 100,0 | 1 248 |
| Second | 58,4 | 13,1 | 5,3 | 23,2 | 100,0 | 1 315 |
| Moyen | 60,8 | 13,4 | 4,6 | 21,2 | 100,0 | 1 282 |
| Quatrième | 60,9 | 14,1 | 4,9 | 20,0 | 100,0 | 1 317 |
| Le plus élevé | 62,2 | 13,9 | 6,5 | 17,4 | 100,0 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 61,3 | 13,5 | 5,2 | 19,9 | 100,0 | 6 727 |
| 50-64 | 77,8 | 21,0 | 1,2 | 0,0 | 100,0 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 63,2 | 14,4 | 4,8 | 17,7 | 100,0 | 7 595 |

¹ Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines.² Non compris les hommes qui ne sont pas actuellement en union.

Résultats clés

- **Indice synthétique de fécondité** : Au Bénin, l'indice synthétique de fécondité est de 5,7 enfants par femme.
- **Espacement des naissances** : Le nombre médian de mois depuis la naissance précédente est 34,1 mois.
- **Âge médian à la première naissance** : Parmi les femmes de 25-49 ans, l'âge médian à la première naissance est estimé à 20,5 ans.

Le nombre d'enfants qu'a une femme dépend de plusieurs facteurs, comme l'âge auquel elle commence à avoir des enfants, l'intervalle entre les naissances et son aptitude à la reproduction. Le report de la première naissance et l'allongement de l'intervalle intergénérisique ont joué un rôle important dans la réduction des niveaux de fécondité dans de nombreux pays. Ces facteurs ont aussi des conséquences positives en termes de santé. À l'opposé, des intervalles intergénérisiques courts (de moins de 24 mois) peuvent avoir des effets néfastes pour les nouveau-nés et pour leurs mères, comme des naissances avant terme, des faibles poids à la naissance et le décès. La maternité à un âge très jeune est associée à un risque accru de complications durant la grossesse et la naissance de l'enfant et à des niveaux élevés de mortalité néonatale.

Ce chapitre présente les niveaux et tendances de la fécondité au Bénin et certains déterminants proches de la fécondité. Plus précisément, il présente l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF), l'intervalle intergénérisique, l'insusceptibilité de tomber enceinte (à cause de l'aménorrhée post-partum, de l'abstinence post-partum ou de la ménopause), l'âge à la première naissance et la fécondité des adolescentes.

5.1 FÉCONDITÉ ACTUELLE**Indice synthétique de fécondité**

Nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants conformément aux taux de fécondité par âge actuels. Les taux de fécondité par âge sont calculés pour la période des trois années qui précèdent l'enquête, basés sur l'historique détaillé des naissances fourni par les femmes.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Le niveau de la fécondité au Bénin est estimé à 5,7 enfants par femme. Il varie selon le milieu de résidence, de 5,2 enfants par femme en milieu urbain à 6,1 enfants par femme en milieu rural (**Tableau 5.1**). Les taux de fécondité par groupe d'âges augmentent rapidement pour atteindre un maximum de 285 ‰ chez les femmes de 25-29 ans. Ces données montrent aussi que les taux de fécondité les plus élevés sont observés dans le groupe d'âges 20-29 ans quel que soit le milieu de résidence.


Le taux global de fécondité générale, c'est-à-dire le nombre annuel moyen de naissances vivantes dans la population des femmes en âge de procréer, est estimé à 197 ‰ (**Tableau 5.1**). Il est plus élevé en milieu rural (210 ‰) qu'en milieu urbain (180 ‰). Le pourcentage de femmes enceintes est de 11 ‰ au niveau national, 9 ‰ en milieu urbain et 12 ‰ en milieu rural et le nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans est de 6,0 (**Tableau 5.2**).

Tendances : Globalement, on ne constate pas de changement important depuis 1996. En effet le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 6,0 en 1996 à 5,7 enfants par femmes en 2017-2018 (**Tableau 5.3.1** et **Graphique 5.1**). Les mêmes tendances sont observées quel que soit le milieu de résidence.

En outre, la comparaison des résultats avec les éditions précédentes montre que les courbes des taux de fécondité par âge présentent une allure similaire. En effet, la fécondité augmente très rapidement pour atteindre son maximum à 25-29 ans et diminue ensuite régulièrement avec l'âge (**Tableau 5.3.2** et **Graphique 5.2**).

Graphique 5.1 Tendances de la fécondité par résidence


Indice synthétique de fécondité pour les 3 années avant chaque enquête



EDSB-I 1996 EDSB-II 2001 EDSB-III 2006 EDSB-IV 2011-2012 EDSB-V 2017-2018

Graphique 5.2 Tendances de la fécondité par âge pour les 3 années avant chaque enquête

Naissances pour 1 000 femmes




Variations par caractéristiques

- Le niveau de la fécondité varie selon le département de résidence des femmes. L'indice synthétique de fécondité le plus faible est enregistré dans le département du Littoral (en moyenne, 4,0 enfants par femme). Par contre, les niveaux les plus élevés sont enregistrés dans les départements de la Donga (6,8 enfants par femme) et de l'Atacora (6,7 enfants par femme) (**Tableau 5.2** et **Graphique 5.3**).
- L'indice synthétique de fécondité varie selon le niveau d'instruction de la femme. En effet, plus le niveau d'instruction est faible, plus l'indice synthétique de fécondité est élevé. Il passe de 3,6 enfants chez les femmes de niveau secondaire 2^d cycle ou plus à 6,4 enfants chez les femmes de niveau secondaire 2^d cycle ou plus à 6,4 enfants chez celles qui n'ont aucun niveau d'instruction (**Tableau 5.2** et **Graphique 5.4**).
- Les résultats de l'enquête montrent que plus le quintile de bien-être économique est faible plus l'indice synthétique de fécondité est élevé. Il passe de 4,2 enfants chez les femmes des ménages du quintile le plus élevé à 7,0 chez celles des ménages du quintile le plus bas.


Graphique 5.3 Fécondité par département

ISF pour les 3 années avant l'enquête



Graphique 5.4 Fécondité par niveau d'instruction

ISF pour les 3 années avant l'enquête



5.2 ENFANTS DÉJÀ NÉS ET ENFANTS SURVIVANTS

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des données ont été collectées sur le nombre d'enfants déjà nés des femmes de 15-49 ans et sur ceux qui sont survivants. En moyenne, les femmes de 45-49 ans ont donné naissance à 6,1 enfants au cours de leur vie et, parmi eux, 5,3 étaient en vie au moment de l'enquête. Parmi les femmes en union du même groupe d'âges, ces nombres moyens sont respectivement de 6,4 et 5,5 (Tableau 5.4).

Au Bénin, environ 1 % des femmes âgées de 45-49 ans actuellement en union n'ont pas eu d'enfants. Étant donné que, dans la culture béninoise, il est assez rare que les femmes restent volontairement sans enfants, ce résultat peut être interprété comme une mesure de la stérilité primaire.

5.3 INTERVALLE INTERGÉNÉSIQUE

Intervalle intergénésique médian

Nombre de mois écoulés entre deux naissances successives pour la moitié des naissances.

Échantillon : Naissances autres que les naissances de rang 1 qui ont eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.


L'intervalle intergénésique médian est de 34,1 mois. En outre, 40 % des naissances ont eu lieu entre 24 et 35 mois après la naissance précédente. Cependant, on constate toujours qu'une proportion élevée de naissances ont eu lieu avant l'intervalle intergénésique recommandé qui est inférieur à 24 mois (16 %) (Tableau 5.5 et Graphique 5.5).

Variations par caractéristiques

- La longueur de l'intervalle intergénésique est influencée par l'état de survie de la naissance précédente. En effet, il est de 28,9 mois quand l'enfant précédent est décédé contre 34,5 mois quand il est en vie.
- L'intervalle intergénésique médian varie entre les départements, d'un minimum de 32,8 mois dans le département de l'Atlantique à un maximum de 37,1 mois pour le département des Collines.

Graphique 5.5 Intervalles intergénésiques

Répartition (en %) des naissances autres que les naissances de rang un par nombre de mois depuis la naissance précédente



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

5.4 INSUSCEPTIBILITÉ DE TOMBER ENCEINTE

Aménorrhée post-partum

Période entre la naissance de l'enfant et le retour des règles.

Abstinence post-partum

Période entre la naissance de l'enfant et la reprise des rapports sexuels.

Insusceptibilité post-partum

Période pendant laquelle on considère qu'une femme ne court pas de risque de tomber enceinte, soit parce qu'elle est en aménorrhée post-partum et/ou en abstinence post-partum.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance dans les trois années au cours des trois années ayant précédé l'enquête.

Durée médiane de l'aménorrhée post-partum

Nombre de mois écoulés entre la naissance d'un enfant et le retour des règles pour la moitié des femmes.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance au cours des trois années ayant précédé l'enquête.

Durée médiane de l'insusceptibilité post-partum

Nombre de mois suivant une naissance après lesquels la moitié des femmes ne sont plus protégées contre le risque de grossesse, du fait de l'aménorrhée post-partum ou de l'abstinence post-partum.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance dans les trois années ayant précédé l'enquête.

L'insusceptibilité de tomber enceinte dépend, entre autres facteurs, du retour de l'ovulation, qui est influencé par la durée et l'intensité de l'allaitement et de l'abstinence sexuelle post-partum. Pour 38 % des naissances ayant eu lieu au cours des trois années ayant précédé l'enquête, les mères étaient en insusceptibilité de tomber enceinte ; pour 32 % des naissances, les mères étaient en aménorrhée et pour 24 % des naissances, les mères étaient en abstinence post-partum. En moyenne, les femmes restent 14,1 mois sans être susceptibles de tomber enceinte après une naissance. Pour la moitié des naissances, les femmes restent en insusceptibilité de tomber enceinte jusqu'à 12,2 mois (**Tableau 5.6**).

Variations par caractéristiques

- Le nombre de mois médian d'insusceptibilité post-partum varie en fonction des départements de résidence. Avec 6,6 mois, c'est dans le département de l'Alibori que la durée médiane de mois d'insusceptibilité post-partum est la plus faible, suivi du département du Littoral avec 8,3 mois. À l'opposé, avec 18,0 mois, le département de l'Atacora est celui où la moitié des femmes restent le plus longtemps en période d'insusceptibilité de tomber enceinte. C'est dans les départements de l'Atacora (12,4 mois) et du Couffo (11,7 mois) que la durée de l'aménorrhée post-partum est la plus élevée (**Tableau 5.7**). Concernant la durée médiane de l'abstinence post-partum, on constate qu'elle varie de 11,5 mois dans l'Atacora à 3,2 mois dans l'Atlantique.
- La durée d'insusceptibilité post-partum diminue avec le niveau d'instruction des femmes, passant de 12,8 mois parmi celles sans niveau d'instruction à 8,3 mois parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle.
- La durée médiane de l'aménorrhée post-partum diminue avec l'augmentation du niveau de bien-être économique : 12,3 mois parmi les femmes vivant dans un ménage du quintile le plus bas à 7,1 mois parmi celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé.

Ménopause

Les femmes sont considérées comme ayant atteint la ménopause si elles ne sont ni enceintes, ni en aménorrhée post-partum et si elles n'ont pas eu de règles pendant une période de six mois avant l'enquête ou si elles déclarent qu'elles sont en ménopause ou qu'elles ont eu une hystérectomie, ou si elles n'ont jamais eu de règles.

Échantillon : Femmes de 30-49 ans

Au Bénin, 11 % des femmes âgées de 30-49 ans sont considérées comme étant en ménopause. Le pourcentage de femmes en ménopause augmente avec l'âge, passant de 1 % parmi celles âgées de 30-34 ans à 53 % pour les 48-49 ans (**Tableau 5.8**).

5.5 ÂGE À LA PREMIÈRE NAISSANCE

Âge médian à la première naissance

Âge auquel la moitié des femmes ont eu leur premier enfant.

Échantillon : Femmes de 20-49 ans et 25-49 ans


Au Bénin, 25 % des femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance avant l'âge exact de 18 ans et 83 % avant l'âge exact de 25 ans. L'âge médian à la première naissance des femmes âgées de 25-49 ans est de 20,5 ans. Cela signifie que la moitié des femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance avant 20,5 ans (**Tableau 5.9**).

Variations par caractéristiques

- En milieu urbain, les femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance à un âge plus tardif que celles vivant en milieu rural, soit respectivement 21,2 ans et 19,9 ans (**Tableau 5.10** et **Graphique 5.6**).
- L'âge médian à la première naissance varie pour les femmes de 25-49 ans selon le département, de 23,2 ans dans le département du Littoral à 18,9 ans dans le département de l'Atacora.
- L'âge médian à la première naissance augmente avec le niveau d'instruction de la femme, passant de 19,8 ans parmi les femmes sans niveau d'instruction à 22,0 ans parmi celles ayant le niveau secondaire 1^{er} cycle.
- Par ailleurs, l'âge médian à la première naissance des femmes âgées de 25-49 ans tend à augmenter des ménages de quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, variant de 19,4 ans parmi les femmes dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas à 22,6 ans parmi celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé (**Tableau 5.10**).

Graphique 5.6 Âge médian à la première naissance par résidence

Âge médian à la première naissance parmi les femmes de 25-49 ans



5.6 FÉCONDITÉ DES ADOLESCENTES

Fécondité des adolescentes

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont donné naissance à leur premier enfant ou qui sont enceintes de leur premier enfant

Échantillon : Femmes de 15-19 ans

5.6.1 Fécondité des adolescentes


Au Bénin, 20 % des femmes âgées de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie procréative : 15 % ont déjà eu, au moins, une naissance vivante et 5 % sont enceintes de leur premier enfant (**Tableau 5.11**).

Variations par caractéristiques

- Les résultats selon le milieu de résidence révèlent que la fécondité est plus élevée chez les adolescentes qui vivent dans le milieu rural que chez celles vivant dans le milieu urbain. Environ, 24 % des femmes âgées de 15-19 ans, résidant en milieu rural ont déjà commencé leur vie procréative alors qu'en milieu urbain, ce pourcentage n'est que de 15 %.
- La fécondité des adolescentes varie selon le département de résidence. En effet, le pourcentage d'adolescentes qui ont déjà commencé leur vie procréative est de 8 % dans le département du Littoral et Ouémé (dans chaque cas) et atteint 38 % dans le département de l'Alibori (**Graphique 5.7**).
- Plus le niveau d'instruction est élevé, plus la proportion d'adolescentes ayant commencé leur vie procréative est faible. Chez les adolescentes qui n'ont aucun niveau d'instruction, 34 % ont déjà commencé leur vie procréative. Par contre, parmi celles qui ont un niveau secondaire 2^d cycle, le pourcentage est de 7 %.
- Le niveau de fécondité chez les adolescentes est influencé par le niveau de bien-être économique. En effet, 31 % des adolescentes vivant dans un ménage appartenant au quintile de bien-être économique le plus bas, ont déjà commencé leur vie procréative alors que parmi celles des ménages du quintile le plus élevé, ce pourcentage est de seulement 9 % (**Graphique 5.8**).


Graphique 5.7 Grossesse et maternité des adolescentes par département

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont commencé leur vie procréative



Graphique 5.8 Grossesse et maternité des adolescentes par bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont commencé leur vie procréative




5.6.2 Comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Parmi les adolescents de 15-19 ans, 12 % des femmes et 6 % des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Dans ce même groupe d'âges, 4 % des femmes, mais aucun homme, avaient déjà contracté une union avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Environ 1 % des femmes et aucun homme n'avait eu d'enfant avant l'âge de 15 ans (**Tableau 5.12** et **Graphique 5.9**).

Graphique 5.9 Comportements en matière de sexualité et de santé de la reproduction avant l'âge de 15 ans

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-19 ans

■ Femme ■ Homme



LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les niveaux de fécondité et sur certains déterminants proches de la fécondité, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 5.1** Fécondité actuelle
- **Tableau 5.2** Fécondité selon certaines caractéristiques
- **Tableau 5.3.1** Tendances de la fécondité par âge
- **Tableau 5.3.2** Tendances de la fécondité par âge et de l'Indice Synthétique de Fécondité
- **Tableau 5.4** Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes
- **Tableau 5.5** Intervalles intergénéraliques
- **Tableau 5.6** Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum
- **Tableau 5.7** Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum
- **Tableau 5.8** Ménopause
- **Tableau 5.9** Âge à la première naissance
- **Tableau 5.10** Âge médian à la première naissance
- **Tableau 5.11** Fécondité des adolescentes
- **Tableau 5.12** Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Tableau 5.1 Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), et Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années ayant précédé l'enquête par milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Résidence | | | | Ensemble |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-------|----------|
| | Cotonou | Autres villes | Ensemble urbain | Rural | |
| <15 | - | [2] | [2] | [2] | [2] |
| 15-19 | 57 | 91 | 87 | 124 | 108 |
| 20-24 | 170 | 233 | 225 | 279 | 256 |
| 25-29 | 233 | 287 | 280 | 288 | 285 |
| 30-34 | 180 | 223 | 216 | 247 | 234 |
| 35-39 | 116 | 156 | 149 | 159 | 155 |
| 40-44 | 44 | 62 | 59 | 86 | 75 |
| 45-49 | - | [22] | [19] | [28] | [24] |
| ISF (15-49 ans) | 4,0 | 5,4 | 5,2 | 6,1 | 5,7 |
| TGFG (15-44 ans) | 140 | 187 | 180 | 210 | 197 |
| TBN | 34,0 | 39,9 | 39,1 | 41,4 | 40,5 |

Notes : Les taux sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux correspondent à la période 1-36 mois précédant l'enquête. Les taux pour le groupe d'âges <15 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15-17 ans. ISF : Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme.

TGFG : Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15-44 ans.

TBN : Taux Brut de natalité exprimé pour 1 000 individus.

Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques

Indice Synthétique de Fécondité pour les 3 années précédant l'enquête, pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique | Indice Synthétique de Fécondité | Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes | Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans |
|--|---------------------------------|---|--|
| Résidence | | | |
| Cotonou | 4,0 | 6,8 | 3,9 |
| Autres villes | 5,4 | 9,7 | 5,4 |
| Ensemble urbain | 5,2 | 9,3 | 5,1 |
| Rural | 6,1 | 11,7 | 6,5 |
| Département | | | |
| Alibori | 6,2 | 11,3 | 7,0 |
| Atacora | 6,7 | 10,4 | 7,1 |
| Atlantique | 4,9 | 9,6 | 5,5 |
| Borgou | 6,2 | 13,4 | 6,5 |
| Collines | 5,4 | 11,3 | 6,2 |
| Couffo | 5,9 | 11,7 | 6,3 |
| Donga | 6,8 | 13,7 | 6,2 |
| Littoral | 4,0 | 6,8 | 3,9 |
| Mono | 5,7 | 9,6 | 5,8 |
| Ouémé | 5,1 | 7,2 | 5,1 |
| Plateau | 5,7 | 12,6 | 5,6 |
| Zou | 5,6 | 10,6 | 5,9 |
| Niveau d'instruction | | | |
| Aucun | 6,4 | 11,7 | 6,4 |
| Primaire | 5,4 | 10,6 | 5,1 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,5 | 8,8 | 3,8 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 3,6 | 7,8 | 2,8 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 7,0 | 11,5 | 7,1 |
| Second | 6,2 | 11,2 | 6,7 |
| Moyen | 6,1 | 11,9 | 6,3 |
| Quatrième | 5,3 | 10,9 | 5,7 |
| Le plus élevé | 4,2 | 8,4 | 4,1 |
| Ensemble | 5,7 | 10,7 | 6,0 |

Note : L'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période de 1-36 mois précédant l'enquête.

Tableau 5.3.1 Tendence de la fécondité par âge

Taux de fécondité par âge par période de 5 ans précédant l'enquête selon les groupes d'âges, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge de la mère à la naissance | Nombre d'années précédant l'enquête | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 |
| <15 | [2] | [6] | [10] | [11] |
| 15-19 | 108 | 114 | 124 | 124 |
| 20-24 | 257 | 268 | 259 | 253 |
| 25-29 | 288 | 287 | 286 | 283 |
| 30-34 | 238 | 249 | 255 | [263] |
| 35-39 | 162 | 198 | [204] | - |
| 40-44 | 83 | [116] | - | - |
| 45-49 | [25] | - | - | - |

Note : Les taux de fécondité par groupe d'âges sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux excluent le mois de l'interview. Pour la période 0-4 ans, les taux pour le groupe d'âges <15 ans sont basées sur des données retrospectives provenant des femmes âgées de 15-19 ans.

Tableau 5.3.2 Tendence de la fécondité par âge et Indice Synthétique de Fécondité

Taux de fécondité par âge et l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) pour la période des 3 années précédant l'EDSB-I 1996, l'EDSB-II 2001, l'EDSB-III 2006, l'EDSB-IV 2011-2012, et l'EDSB-V 2017-2018, selon les groupes d'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge de la mère à la naissance | EDSB-I 1996 | EDSB-II 2001 | EDSB-III 2006 | EDSB-IV 2011-2012 | EDSB-V 2017-2018 |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|
| 15-19 | 119 | 109 | 112 | 94 | 108 |
| 20-24 | 266 | 261 | 266 | 230 | 256 |
| 25-29 | 263 | 260 | 278 | 251 | 285 |
| 30-34 | 244 | 233 | 239 | 200 | 234 |
| 35-39 | 195 | 154 | 155 | 126 | 155 |
| 40-44 | 78 | 78 | 65 | 63 | 75 |
| 45-49 | [27] | [27] | [32] | [17] | [24] |
| ISF (15-49 ans) | 6,0 | 5,6 | 5,7 | 4,9 | 5,7 |

Note : Les taux par âge sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux pour le groupe d'âges 45-49 ans peuvent être légèrement biaisés pour cause de troncature et, par conséquent, sont présentés entre crochets.

Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15-49 ans et des femmes de 15-49 ans en union par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre moyen d'enfants survivants, par groupe d'âges, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Nombre moyen d'enfants nés vivants | | | | | | | | | | | Total | Effectif de femmes | Nombre moyen d'enfants nés vivants | Nombre moyen d'enfants survivants |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | | | | |
| TOUTES LES FEMMES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 84,8 | 12,8 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 3 350 | 0,18 | 0,17 |
| 20-24 | 32,5 | 32,5 | 23,2 | 9,5 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2 923 | 1,17 | 1,07 |
| 25-29 | 8,0 | 14,6 | 23,3 | 25,0 | 18,0 | 7,2 | 2,7 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2 986 | 2,69 | 2,45 |
| 30-34 | 2,1 | 5,7 | 12,2 | 17,7 | 22,7 | 17,8 | 12,1 | 6,6 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 100,0 | 2 202 | 4,09 | 3,62 |
| 35-39 | 1,7 | 3,6 | 6,7 | 12,1 | 17,2 | 18,6 | 14,9 | 13,1 | 7,8 | 2,5 | 1,9 | 100,0 | 1 882 | 5,00 | 4,43 |
| 40-44 | 1,1 | 2,7 | 4,3 | 8,9 | 11,6 | 17,2 | 16,8 | 13,3 | 11,1 | 6,8 | 6,2 | 100,0 | 1 320 | 5,79 | 4,96 |
| 45-49 | 1,6 | 2,2 | 4,3 | 6,9 | 10,9 | 13,8 | 15,5 | 14,6 | 13,2 | 8,0 | 9,1 | 100,0 | 1 265 | 6,13 | 5,25 |
| Ensemble | 26,0 | 13,0 | 12,3 | 11,6 | 10,7 | 8,6 | 6,6 | 4,9 | 3,2 | 1,6 | 1,5 | 100,0 | 15 928 | 2,88 | 2,54 |
| FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 33,6 | 55,6 | 10,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 618 | 0,78 | 0,74 |
| 20-24 | 11,9 | 39,3 | 32,0 | 13,6 | 2,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 966 | 1,57 | 1,44 |
| 25-29 | 4,0 | 13,3 | 24,1 | 27,0 | 19,4 | 8,0 | 2,9 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2 658 | 2,87 | 2,61 |
| 30-34 | 1,4 | 4,5 | 11,9 | 18,0 | 23,3 | 18,4 | 12,3 | 6,9 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 100,0 | 2 035 | 4,18 | 3,70 |
| 35-39 | 1,2 | 2,9 | 6,0 | 12,2 | 17,1 | 19,1 | 15,3 | 13,3 | 8,2 | 2,7 | 2,0 | 100,0 | 1 706 | 5,11 | 4,53 |
| 40-44 | 0,9 | 2,6 | 4,3 | 7,9 | 10,6 | 17,5 | 17,1 | 13,9 | 11,2 | 7,4 | 6,7 | 100,0 | 1 166 | 5,90 | 5,08 |
| 45-49 | 0,7 | 1,5 | 3,3 | 5,9 | 11,2 | 13,4 | 16,7 | 14,9 | 13,3 | 8,8 | 10,3 | 100,0 | 1 020 | 6,38 | 5,47 |
| Ensemble | 5,5 | 14,8 | 15,8 | 15,4 | 14,1 | 11,3 | 8,6 | 6,4 | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 100,0 | 11 168 | 3,74 | 3,31 |

Tableau 5.5 Intervalles intergénéraliques

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang 1, ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente et nombre médian de mois depuis la naissance précédente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Mois depuis la naissance précédente | | | | | | Total | Effectifs de naissances autres que de premier rang | Nombre médian de mois depuis la naissance précédente |
|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|--|
| | 7-17 | 18-23 | 24-35 | 36-47 | 48-59 | 60+ | | | |
| Âge de la mère | | | | | | | | | |
| 15-19 | 13,9 | 20,9 | 45,0 | 13,4 | 5,9 | 0,8 | 100,0 | 79 | 27,6 |
| 20-29 | 5,2 | 14,6 | 44,7 | 21,7 | 8,1 | 5,7 | 100,0 | 4 732 | 31,7 |
| 30-39 | 4,2 | 10,0 | 37,2 | 25,0 | 11,3 | 12,4 | 100,0 | 4 694 | 35,6 |
| 40-49 | 3,3 | 6,8 | 28,1 | 26,7 | 13,5 | 21,6 | 100,0 | 1 133 | 40,5 |
| Sexe de l'enfant précédent | | | | | | | | | |
| Masculin | 4,7 | 12,2 | 39,9 | 22,8 | 9,6 | 10,7 | 100,0 | 5 389 | 33,8 |
| Féminin | 4,5 | 11,3 | 39,3 | 24,4 | 10,5 | 9,9 | 100,0 | 5 249 | 34,4 |
| État de survie de la naissance précédente | | | | | | | | | |
| Vivante | 3,3 | 11,3 | 40,4 | 24,2 | 10,4 | 10,4 | 100,0 | 9 584 | 34,5 |
| Décédée | 16,2 | 16,5 | 32,5 | 18,2 | 7,1 | 9,6 | 100,0 | 1 054 | 28,9 |
| Rang de naissance | | | | | | | | | |
| 2-3 | 4,7 | 13,4 | 41,4 | 21,8 | 9,1 | 9,6 | 100,0 | 4 930 | 33,1 |
| 4-6 | 4,6 | 10,6 | 37,6 | 24,8 | 11,0 | 11,4 | 100,0 | 4 212 | 35,0 |
| 7+ | 4,5 | 9,8 | 39,4 | 26,2 | 10,5 | 9,6 | 100,0 | 1 496 | 34,7 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 5,6 | 12,7 | 33,8 | 17,4 | 13,0 | 17,5 | 100,0 | 417 | 35,3 |
| Autres villes | 4,3 | 11,4 | 38,7 | 22,8 | 11,1 | 11,8 | 100,0 | 3 582 | 34,5 |
| Ensemble urbain | 4,4 | 11,5 | 38,2 | 22,2 | 11,3 | 12,4 | 100,0 | 4 000 | 34,6 |
| Rural | 4,8 | 11,9 | 40,5 | 24,4 | 9,3 | 9,1 | 100,0 | 6 638 | 33,9 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 5,7 | 11,8 | 36,9 | 26,2 | 10,0 | 9,4 | 100,0 | 1 418 | 34,6 |
| Atacora | 4,0 | 11,3 | 40,8 | 24,7 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | 958 | 34,2 |
| Atlantique | 4,4 | 11,6 | 44,0 | 19,1 | 10,0 | 10,9 | 100,0 | 1 236 | 32,8 |
| Borgou | 5,1 | 13,9 | 39,4 | 23,8 | 9,9 | 8,0 | 100,0 | 1 394 | 33,4 |
| Collines | 3,0 | 8,6 | 35,4 | 27,0 | 12,3 | 13,7 | 100,0 | 668 | 37,1 |
| Couffo | 5,9 | 10,0 | 36,2 | 28,8 | 9,9 | 9,2 | 100,0 | 716 | 35,4 |
| Donga | 5,1 | 11,2 | 40,6 | 21,8 | 10,2 | 11,1 | 100,0 | 705 | 34,2 |
| Littoral | 5,6 | 12,7 | 33,8 | 17,4 | 13,0 | 17,5 | 100,0 | 417 | 35,3 |
| Mono | 5,4 | 15,8 | 35,6 | 22,7 | 10,3 | 10,2 | 100,0 | 484 | 33,4 |
| Ouémé | 3,4 | 11,1 | 43,1 | 21,2 | 8,9 | 12,3 | 100,0 | 939 | 33,1 |
| Plateau | 4,0 | 11,9 | 41,0 | 24,0 | 10,7 | 8,4 | 100,0 | 705 | 33,4 |
| Zou | 3,9 | 11,6 | 41,9 | 24,5 | 8,7 | 9,4 | 100,0 | 998 | 33,8 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | |
| Aucun | 4,6 | 11,5 | 39,2 | 24,4 | 10,2 | 10,1 | 100,0 | 7 596 | 34,3 |
| Primaire | 4,0 | 11,5 | 42,1 | 22,7 | 9,8 | 10,0 | 100,0 | 1 808 | 33,3 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 5,5 | 14,3 | 39,2 | 20,6 | 8,6 | 11,9 | 100,0 | 934 | 32,5 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 5,1 | 12,8 | 37,4 | 18,6 | 12,7 | 13,3 | 100,0 | 301 | 34,8 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 5,5 | 13,7 | 42,0 | 22,5 | 8,8 | 7,5 | 100,0 | 2 451 | 32,5 |
| Second | 6,1 | 11,9 | 38,3 | 24,9 | 10,0 | 8,9 | 100,0 | 2 239 | 34,2 |
| Moyen | 3,4 | 11,2 | 40,0 | 24,1 | 11,2 | 10,1 | 100,0 | 2 141 | 34,6 |
| Quatrième | 3,4 | 9,9 | 41,9 | 23,5 | 9,8 | 11,6 | 100,0 | 2 078 | 34,3 |
| Le plus élevé | 4,4 | 11,9 | 34,7 | 23,1 | 11,0 | 14,9 | 100,0 | 1 728 | 35,5 |
| Ensemble | 4,6 | 11,8 | 39,6 | 23,6 | 10,1 | 10,3 | 100,0 | 10 638 | 34,1 |

Note : Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.

Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum

Pourcentage de naissances des 3 années ayant précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois depuis la naissance et durées médiane et moyenne, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Nombre de mois depuis la naissance | Pourcentage de naissances dont les mères sont : | | | Effectif de naissances |
|------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|------------------------|
| | En aménorrhée | En abstinence | En insusceptibilité ¹ | |
| < 2 | 89,8 | 94,7 | 98,7 | 511 |
| 2-3 | 82,6 | 67,3 | 90,7 | 482 |
| 4-5 | 70,4 | 43,2 | 78,6 | 439 |
| 6-7 | 60,2 | 35,4 | 70,1 | 535 |
| 8-9 | 53,5 | 32,0 | 62,7 | 550 |
| 10-11 | 44,1 | 23,2 | 53,4 | 471 |
| 12-13 | 36,6 | 21,0 | 46,0 | 427 |
| 14-15 | 28,7 | 18,3 | 38,1 | 364 |
| 16-17 | 21,5 | 18,7 | 30,8 | 458 |
| 18-19 | 17,1 | 14,1 | 26,5 | 414 |
| 20-21 | 9,5 | 9,1 | 16,5 | 460 |
| 22-23 | 8,8 | 6,9 | 12,0 | 478 |
| 24-25 | 3,5 | 5,6 | 8,4 | 438 |
| 26-27 | 1,9 | 4,3 | 5,1 | 400 |
| 28-29 | 1,4 | 2,6 | 3,4 | 391 |
| 30-31 | 1,4 | 2,6 | 3,3 | 402 |
| 32-33 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 407 |
| 34-35 | 3,3 | 2,2 | 5,0 | 470 |
| Ensemble | 31,7 | 23,9 | 38,3 | 8 098 |
| Médiane | 9,8 | 4,8 | 12,2 | na |
| Moyenne | 11,7 | 9,1 | 14,1 | na |

Note : Les estimations sont basées sur le statut au moment de l'enquête.

na = Non applicable

¹ Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance.

Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum

Nombre médian de mois d'aménorrhée post-partum, d'abstinence post-partum et d'insusceptibilité post-partum à la suite d'une naissance ayant eu lieu au cours des 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Aménorrhée post-partum | Abstinence post-partum | Insusceptibilité post-partum ¹ |
|--|------------------------|------------------------|---|
| Âge de la mère | | | |
| 15-29 | 9,6 | 4,7 | 11,8 |
| 30-49 | 10,2 | 5,2 | 12,8 |
| Résidence | | | |
| Cotonou | 6,9 | 3,5 | 8,3 |
| Autres villes | 8,8 | 4,6 | 11,5 |
| Ensemble urbain | 8,6 | 4,5 | 11,1 |
| Rural | 10,7 | 5,2 | 12,8 |
| Département | | | |
| Alibori | 5,4 | 3,5 | 6,6 |
| Atacora | 12,4 | 11,5 | 18,0 |
| Atlantique | 7,4 | 3,2 | 10,0 |
| Borgou | 11,2 | 9,7 | 14,1 |
| Collines | 11,0 | 5,8 | 12,2 |
| Couffo | 11,7 | 5,5 | 13,7 |
| Donga | 11,6 | 9,6 | 13,8 |
| Littoral | 6,9 | 3,5 | 8,3 |
| Mono | 6,9 | 4,5 | 8,6 |
| Ouémé | 11,2 | 3,9 | 12,2 |
| Plateau | 10,3 | 4,1 | 12,4 |
| Zou | 10,0 | 4,3 | 10,7 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | |
| Aucun | 10,7 | 5,0 | 12,8 |
| Primaire | 8,7 | 4,7 | 11,5 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 9,0 | 4,6 | 11,4 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 5,8 | 4,0 | 8,3 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 12,3 | 7,0 | 14,2 |
| Second | 11,2 | 4,7 | 14,0 |
| Moyen | 9,9 | 5,3 | 12,4 |
| Quatrième | 7,9 | 4,5 | 10,4 |
| Le plus élevé | 7,1 | 3,9 | 9,4 |
| Ensemble | 9,8 | 4,8 | 12,2 |

Note : Les médianes sont basées sur le statut au moment de l'enquête (statut actuel).

¹ Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance.

Tableau 5.8 Ménopause

Pourcentage de femmes de 30-49 ans qui sont en ménopause, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Pourcentage en ménopause ¹ | Effectif de femmes |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| Âge | | |
| 30-34 | 1,3 | 2 202 |
| 35-39 | 3,0 | 1 882 |
| 40-41 | 8,3 | 587 |
| 42-43 | 15,8 | 598 |
| 44-45 | 20,9 | 504 |
| 46-47 | 35,5 | 431 |
| 48-49 | 52,6 | 464 |
| Ensemble | 11,0 | 6 670 |

¹ Le pourcentage de femmes qui 1) ne sont pas enceintes, 2) ont eu une naissance dans les 5 dernières années et ne sont pas en aménorrhée post-partum et 3) celles qui présentent les caractéristiques suivantes : a) les dernières règles ont eu lieu 6 mois ou plus avant l'interview ou b) elles ont déclaré qu'elles étaient en ménopause ou qu'elles avaient eu une hystérectomie ou c) elles n'avaient jamais eu de règles.

Tableau 5.9 Âge à la première naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant donné naissance avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais donné naissance et âge médian à la première naissance, selon l'âge actuel, EDSB-V Bénin 2017-18

| Âge actuel | Pourcentage ayant donné naissance avant d'atteindre l'âge exact de : | | | | | Pourcentage n'ayant jamais donné naissance | Effectif de femmes | Âge médian à la première naissance |
|------------|--|------|------|------|------|--|--------------------|------------------------------------|
| | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | | | |
| 15-19 | 1,2 | na | na | na | na | 84,8 | 3 350 | a |
| 20-24 | 2,5 | 18,7 | 44,2 | na | na | 32,5 | 2 923 | a |
| 25-29 | 5,1 | 23,7 | 45,2 | 66,9 | 84,9 | 8,0 | 2 986 | 20,4 |
| 30-34 | 5,7 | 26,3 | 46,4 | 64,7 | 83,4 | 2,1 | 2 202 | 20,4 |
| 35-39 | 5,1 | 24,1 | 44,3 | 62,3 | 82,1 | 1,7 | 1 882 | 20,6 |
| 40-44 | 4,9 | 29,4 | 46,8 | 62,8 | 80,9 | 1,1 | 1 320 | 20,3 |
| 45-49 | 4,9 | 24,6 | 43,4 | 62,2 | 79,5 | 1,6 | 1 265 | 20,7 |
| 20-49 | 4,6 | 23,7 | 45,0 | na | na | 10,4 | 12 578 | a |
| 25-49 | 5,2 | 25,3 | 45,3 | 64,3 | 82,7 | 3,7 | 9 655 | 20,5 |

na = Non applicable

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes ont donné naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges .

Tableau 5.10 Âge médian à la première naissance

Âge médian à la première naissance parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-18

| Caractéristique | Femmes de 20-49 | Femmes de 25-49 |
|--|-----------------|-----------------|
| Résidence | | |
| Cotonou | a | 23,2 |
| Autres villes | a | 20,9 |
| Ensemble urbain | a | 21,2 |
| Rural | 19,9 | 19,9 |
| Département | | |
| Alibori | 19,1 | 19,0 |
| Atacora | 19,2 | 18,9 |
| Atlantique | a | 20,9 |
| Borgou | 19,9 | 19,9 |
| Collines | 19,7 | 19,6 |
| Couffo | a | 20,5 |
| Donga | a | 20,6 |
| Littoral | a | 23,2 |
| Mono | a | 21,2 |
| Ouémé | a | 21,5 |
| Plateau | a | 20,8 |
| Zou | a | 20,5 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucun | 19,7 | 19,8 |
| Primaire | a | 21,0 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | a | 22,0 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | a | a |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 19,3 | 19,4 |
| Second | 19,7 | 19,6 |
| Moyen | a | 20,1 |
| Quatrième | a | 20,6 |
| Le plus élevé | a | 22,6 |
| Ensemble | a | 20,5 |

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes ont donné naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.11 Fécondité des adolescentes

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant et pourcentage ayant commencé leur vie procréative, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-18

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui : | | | Effectif de femmes |
|--|--|------------------------------------|---|--------------------|
| | ont eu une naissance vivante | sont enceintes d'un premier enfant | Pourcentage ayant commencé leur vie procréative | |
| Âge | | | | |
| 15-17 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 2 097 |
| 15 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 799 |
| 16 | 4,3 | 3,5 | 7,8 | 624 |
| 17 | 13,2 | 5,1 | 18,3 | 673 |
| 18 | 25,1 | 7,5 | 32,7 | 727 |
| 19 | 38,0 | 8,7 | 46,8 | 526 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 191 |
| Autres villes | 12,4 | 3,7 | 16,0 | 1 223 |
| Ensemble urbain | 11,5 | 3,4 | 14,9 | 1 414 |
| Rural | 17,9 | 6,0 | 23,9 | 1 935 |
| Département | | | | |
| Alibori | 28,5 | 9,4 | 37,9 | 379 |
| Atacora | 24,1 | 7,3 | 31,4 | 311 |
| Atlantique | 10,4 | 3,3 | 13,6 | 413 |
| Borgou | 20,9 | 6,6 | 27,5 | 391 |
| Collines | 13,2 | 6,7 | 19,9 | 305 |
| Couffo | 9,0 | 2,2 | 11,2 | 220 |
| Donga | 24,1 | 4,6 | 28,7 | 148 |
| Littoral | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 191 |
| Mono | 11,1 | 0,6 | 11,7 | 160 |
| Ouémé | 7,0 | 1,4 | 8,3 | 289 |
| Plateau | 6,9 | 5,6 | 12,5 | 173 |
| Zou | 11,9 | 4,5 | 16,4 | 368 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucun | 25,7 | 7,8 | 33,5 | 957 |
| Primaire | 14,3 | 4,8 | 19,1 | 906 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 9,8 | 3,2 | 13,1 | 1 214 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 4,8 | 2,6 | 7,4 | 273 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 23,4 | 7,5 | 30,9 | 511 |
| Second | 19,7 | 5,2 | 25,0 | 680 |
| Moyen | 16,6 | 7,2 | 23,8 | 664 |
| Quatrième | 13,2 | 3,6 | 16,8 | 711 |
| Le plus élevé | 6,5 | 2,1 | 8,6 | 783 |
| Ensemble | 15,2 | 4,9 | 20,1 | 3 350 |

Tableau 5.12 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Parmi les femmes et les hommes de 15-19 ans, pourcentage qui ont commencé leur vie sexuelle, qui étaient en union et qui avaient donné naissance/engendré un enfant avant l'âge de 15 ans, selon le sexe, EDSB-V Bénin 2017-18

| Sexe | A eu des rapports sexuels avant 15 ans | En union avant 15 ans | A donné naissance/engendré un enfant avant 15 ans | Effectif |
|----------|--|-----------------------|---|----------|
| | | | | |
| Féminin | 12,0 | 4,2 | 1,2 | 3 350 |
| Masculin | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1 548 |

Résultats clés

- **Désir d'un autre enfant :** Plus de six femmes sur dix (64 %) désirent avoir un ou un enfant supplémentaire : 24 % le souhaitent dans les deux prochaines années, 34 % le désirent dans deux ans ou plus et 6 % le souhaitent mais elles sont indécises sur le moment. Parmi les hommes, le pourcentage de ceux qui veulent un enfant ou un enfant supplémentaire est de 76 % : 33 % le souhaitent dans les deux prochaines années, 37 % le désirent dans les deux ans ou plus et 7 % le ne savent pas quand.
- **Limitation des naissances :** Parmi les hommes et les femmes de 15-49 ans actuellement en union, près d'un homme sur cinq (19 %) et d'une femme sur quatre (25 %), ne veulent plus d'enfants ou sont stérilisés.
- **Nombre idéal d'enfants :** Le nombre idéal d'enfants est de 5,1 en moyenne pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans et de 7,0 pour l'ensemble des hommes du même groupe d'âges.
- **Planification de la fécondité :** Plus de neuf naissances sur dix (94 %) ayant eu lieu au cours des cinq dernières années étaient désirées : 77 % ont eu lieu au moment voulu et dans 17 % des cas, les femmes auraient souhaité qu'elles se produisent plus tard. Par contre, les naissances non désirées représentent 6 %.
- **Fécondité désirée :** Pour les trois années précédant l'enquête, l'Indice Synthétique de Fécondité Désirée (4,9 enfants) est inférieur à l'Indice Synthétique de Fécondité (5,7 enfants).

Les informations sur les préférences en matière de fécondité peuvent aider les responsables des programmes de planification familiale à évaluer le nombre d'enfants désirés, les grossesses qui ne se sont pas produites au moment voulu et celles qui n'étaient pas souhaitées. Ces informations peuvent également permettre d'évaluer la demande contraceptive, qu'elle soit orientée vers l'espacement ou la limitation des naissances et les tendances de la fécondité dans le futur.

Ce chapitre présente les résultats concernant le souhait d'avoir ou non un enfant, le moment où cet enfant était souhaité, le nombre idéal d'enfants. Il présente aussi la situation des dernières naissances (si elles étaient désirées ou non). En outre, dans ce chapitre figure le taux de fécondité théorique, si toutes les naissances non voulues avaient été évitées.

6.1 DÉSIR D'AVOIR UN AUTRE ENFANT

Désir d'avoir un autre enfant

On a demandé aux femmes et aux hommes s'ils souhaitaient plus d'enfants et, si oui, combien de temps ils voulaient attendre avant la naissance du prochain enfant. On considère que les femmes et les hommes qui sont stérilisés ne veulent plus d'enfants.


Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union

Une femme de 15-49 ans actuellement en union sur quatre (25 %) au Bénin, ne veut plus avoir d'enfants ou est stérilisée. A l'opposé, plus de six femmes sur dix (64 %) souhaitent avoir un ou un enfant supplémentaire : 24 % le voudraient dans les deux prochaines années, 34 % souhaitent attendre deux ans ou plus avant la naissance désirée et 6 % ne savent pas quand elles souhaitent cet enfant. La proportion d'hommes de 15-49 ans actuellement en union, désirant avoir un ou un enfant supplémentaire est plus élevée que celle des femmes, tandis que la proportion d'hommes ne voulant plus d'enfants (y compris ceux qui sont stérilisés) est plus faible que celle des femmes. En effet, 19 % des hommes ne désirent plus avoir d'enfants et, à l'opposé, dans 76 % des cas, les hommes veulent avoir un ou un autre enfant : 33 % dans les deux prochaines années, 37 % dans au moins deux ans et 7 % ne savent pas exactement quand ils veulent cet enfant (**Tableau 6.1**).

Tendances : Globalement, la proportion de femmes actuellement en union ne désirant plus d'enfants a augmenté de 2 points de pourcentage entre 1996 et 2017-2018 (passant de 23 % en 1996 à 25 % en 2017-2018). De même, la proportion d'hommes actuellement en union ne désirant plus d'enfants a globalement augmenté dans le temps, passant de 14 % en 1996 à 19 % en 2017-2018. Cette tendance s'observe à toutes les parités : par exemple, à la parité 4, la proportion de femmes actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants est passée de 25 % en 1996 à 30 % en 2017-2018 (**Graphique 6.1**).

Graphique 6.1 Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : Tendances

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants




Variations par caractéristiques

- Quel que soit le sexe, le désir de ne plus avoir d'enfants augmente avec le nombre d'enfants vivants. La proportion de femmes en union qui ne veulent plus d'enfants passe de moins de 1 % chez les femmes n'ayant aucun enfant à 17 % chez celles ayant déjà trois enfants. Elle atteint 57 % chez les femmes ayant six enfants ou plus (Tableaux 6.2.1 et Graphique 6.2). C'est le même schéma qui est observé chez les hommes de 15-49 ans. En effet, la proportion d'hommes en union qui ne veulent plus d'enfants passe de 1 % chez ceux n'ayant aucun enfant à 16 % chez ceux ayant trois enfants et à 32 % chez ceux en ayant six ou plus (Tableau 6.2.2).

Graphique 6.2 Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants



- Les proportions d'hommes et de femmes en union qui ne veulent plus d'enfants sont plus élevées en milieu urbain (23 % pour les hommes et 27 % pour les femmes) qu'en milieu rural (15 % pour les hommes et 23 % pour les femmes) (Tableaux 6.2.1 et 6.2.2).
- Les proportions d'hommes et de femmes en union qui ne désirent plus avoir d'enfants varient nettement en fonction du département. Les résultats concernant les femmes montrent que les plus fortes proportions sont observées dans les départements des Collines (37 %), de l'Atlantique (36 %), du Mono (35 %) et du Littoral (35 %), alors que les plus faibles sont enregistrées dans la Donga (13 %) et l'Alibori (7 %). Chez les hommes, c'est dans les départements de l'Ouémé (39 %), du Littoral (35 %) et de l'Atlantique (30 %) que les proportions de ceux qui ne veulent plus d'enfants sont les plus élevées ; à l'opposé, c'est dans la Donga (9 %) et l'Alibori (3 %), comme chez les femmes, que l'on enregistre les plus faibles.
- Le désir de ne plus avoir d'enfants augmente avec l'amélioration du niveau de vie des ménages. En effet, les proportions d'hommes et de femmes en union ne souhaitant plus avoir d'enfants passent de 20 % chez les femmes et 11 % chez les hommes dans le quintile le plus bas à 30 % chez les femmes et 29 % chez les hommes dans le quintile le plus élevé.

6.2 NOMBRE IDEAL D'ENFANTS

Nombre idéal d'enfants

On a demandé aux enquêtés qui n'avaient pas d'enfants, « Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? » Aux enquêtés qui avaient des enfants, on a demandé : « Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfants et choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? »

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Le nombre idéal moyen d'enfants varie selon le statut matrimonial des femmes de 15-49 ans. Il est de 5,1 dans l'ensemble des femmes et de 5,4 chez celles actuellement en union. Chez les hommes, le nombre idéal moyen d'enfants est beaucoup plus élevé que chez les femmes : Il est de 7,0 parmi tous les hommes de 15-49 ans et de 7,8 parmi ceux actuellement en union du même groupe d'âges (**Graphique 6.3**).

Dans l'ensemble, un peu plus d'une femme de 15-49 ans sur trois (37 %) désirent avoir 6 enfants ou plus. Cette proportion augmente avec le nombre d'enfants vivants, passant de 24 % chez les femmes n'ayant aucun enfant à 64 % chez celles en ayant six ou plus (**Tableau 6.3**).

Tendances : En comparant les résultats des différentes EDS réalisées au Bénin, on constate que le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes est passé de 5,5 enfants en 1996, à 5,1 en 2017-2018. Pour l'ensemble des hommes de 15-49 ans, cet indicateur n'a pas changé, passant de 7,1 en 1996, à 7,0 en 2017-2018.


Variations par caractéristique

- L'analyse de la distribution des femmes et des hommes en union de 15-49 ans par nombre idéal moyen d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants révèle que dans l'ensemble, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, le nombre idéal moyen d'enfants augmente avec le nombre d'enfants vivants. En effet, il passe de 5,1 chez les femmes en union n'ayant pas encore d'enfants à 6,7 chez celles ayant six enfants ou plus. Chez les hommes en union, il varie respectivement de 6,4 à 10,9. En outre, quel que soit le nombre d'enfants vivants, le nombre idéal moyen d'enfants est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (**Tableau 6.3 et Graphique 6.4**).

- La demande d'enfants augmente avec l'âge. Les jeunes désirent moins d'enfants que leurs aînés. En effet, le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans passe de 4,6 chez les 15-19 ans à 5,9 chez les 45-49 ans (**Tableau 6.3**).
- Le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans varie en fonction du département. C'est dans le Littoral que le nombre moyen idéal d'enfants est le plus faible (3,9) et à l'opposé, avec 6,4 enfants, c'est dans l'Atacora qu'il est le plus élevé.
- Les résultats du **Tableau 6.4** montrent également que, le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans diminue régulièrement avec l'augmentation du niveau d'instruction. Ce nombre passe de 5,8 enfants chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 3,7 chez celles ayant le niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus.


Graphique 6.3 Taille idéale de la famille

Nombre moyen idéal d'enfants parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans



Graphique 6.4 Taille idéale de la famille par nombre d'enfants vivants

Nombre moyen idéal d'enfants parmi les femmes et les hommes actuellement en union de 15-49 ans



6.3 PLANIFICATION DE LA FÉCONDITÉ

Planification des naissances/grossesses

Les femmes ont déclaré soit que leurs dernières naissances/grossesses étaient voulues au moment où elles se sont produites (naissance planifiée), ou plus tard (naissance mal planifiée) soit qu'elles n'étaient pas souhaitées (naissance non désirée).

Échantillon : Grossesses actuelles ou dernières naissances des cinq années ayant précédé l'enquête des femmes de 15-49 ans

Plus de neuf naissances sur dix (94 %) ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête étaient désirées : 77 % ont eu lieu au moment voulu et dans 17 % des cas, les femmes auraient souhaité qu'elles se produisent plus tard. Par contre, les naissances non désirées représentent 6 % (**Tableau 6.5** et **Graphique 6.5**).


Tendances : La comparaison des données de toutes les EDS réalisées au Bénin révèle que, la proportion des naissances voulues au moment où elles se sont produites a d'abord augmenté de 8 points de pourcentage sur la période 1996 à 2006, passant de 74 % à 82 % avant de diminuer de 5 points de pourcentage sur la période de 2006 à 2017-2018, passant de 82 % à 77 %. La proportion de naissances que les femmes auraient souhaitées plus tard et la proportion des naissances non désirées ont suivi la même tendance dans le temps que la proportion des naissances voulues au moment où elles se sont produites. Ainsi, la proportion de naissances que les femmes auraient souhaitées plus tard est passée de 19 % en 1996, à 14 % en 2006 et à 17 % en 2017-2018. La proportion des naissances non désirées est passée de 6 % en 1996, à 4 % en 2006 et à 6 % en 2017-2018.

Variations par caractéristique

- Les naissances de rang 2 et 3 sont mieux planifiées (79 % dans chaque cas) que celles de rang 1 et 4 ou plus avec respectivement 77 % et 75 % (**Tableau 6.5**).
- Les naissances voulues plus tard diminuent avec l'âge, tandis que celles non désirées augmentent avec l'âge. En effet, les naissances voulues pour plus tard passent de 26 % chez les femmes âgées de moins de 20 ans à 6 % chez celles âgées de 45-49 ans, alors que les naissances non désirées passent de respectivement 2 % à 20 %.

Graphique 6.5 Planification de la fécondité

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des cinq années précédant l'enquête (y compris la grossesse actuelle) par planification de la grossesse



6.4 TAUX DE FÉCONDITÉ DÉSIRÉ

Naissances non désirées

Toutes les naissances qui dépassent le nombre idéal d'enfants déclaré par la femme.

Naissances désirées

Toutes les naissances dont le nombre est inférieur ou égal au nombre idéal d'enfants déclaré par la femme.

Taux de fécondité désiré

Nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants aux taux de fécondité par âge actuels, en excluant les naissances non désirées.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Au Bénin, si toutes les naissances non désirées étaient évitées, le nombre moyen d'enfants par femme serait de 4,9 au lieu de 5,7, soit un écart de 0,8 enfant (**Tableau 6.6**).

Tendances : L'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) a légèrement baissé dans le temps, passant de 6,0 enfants en 1996 à 5,7 enfants en 2017-2018. L'Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) est passé de 5,0 enfants en 1996, à 4,8 enfants en 2006 et à 4,9 enfants en 2017-2018. L'écart entre l'ISF et l'ISFD est resté stable dans le temps (**Graphique 6.6**).

Graphique 6.6 Fécondité désirée et fécondité actuelle : Tendances

Nombre désiré et nombre actuel d'enfants par femme



Variations par caractéristique

- L'ISFD est plus élevé en milieu rural (5,2 enfants) qu'en milieu urbain (3,5 enfants à Cotonou et 4,7 enfants dans les autres villes). L'écart entre l'ISF et l'ISFD est plus grand en milieu rural (0,9 enfant) qu'en milieu urbain (0,5 enfant à Cotonou et 0,7 enfant dans les autres villes) (**Tableau 6.6**).
- L'ISFD varie en fonction du département. L'ISFD le plus élevé est observé dans l'Atacora (6,1 enfants), tandis que le plus faible est enregistré dans le Littoral (3,5 enfants).
- Le niveau d'instruction influence aussi l'ISFD. En effet, l'ISFD passe de 5,4 chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 3,3 chez celles ayant le niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus. L'écart entre l'ISF et l'ISFD est plus grand chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction (1,0 enfant) que chez celles ayant le niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus (0,3 enfant).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les préférences en matière de fécondité, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 6.1** Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants
- **Tableau 6.2.1** Désir de limiter les naissances : Femme
- **Tableau 6.2.2** Désir de limiter les naissances : Homme
- **Tableau 6.3** Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants
- **Tableau 6.4** Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 6.5** Planification de la fécondité
- **Tableau 6.6** Taux de fécondité désirée

Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des hommes de 15-49 ans actuellement en union par désir d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Désir d'enfants | Nombre d'enfants vivants | | | | | | | Ensemble 15-49 | Ensemble 15-64 |
|--------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | | |
| FEMME¹ | | | | | | | | | |
| Veut un autre bientôt ² | 76,8 | 29,3 | 30,1 | 22,6 | 20,5 | 14,7 | 11,0 | 23,6 | na |
| Veut un autre plus tard ³ | 5,2 | 56,4 | 47,7 | 41,5 | 30,3 | 18,1 | 13,6 | 34,4 | na |
| Veut un autre, ne sait pas quand | 8,6 | 6,2 | 8,1 | 8,3 | 4,6 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | na |
| Indécise | 3,8 | 4,8 | 6,1 | 8,7 | 11,6 | 9,6 | 10,2 | 8,3 | na |
| Ne veut plus d'enfant | 0,3 | 1,2 | 6,3 | 16,4 | 29,7 | 47,2 | 56,7 | 24,3 | na |
| Stérilisé ⁴ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | na |
| S'est déclarée stérile | 5,2 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 4,9 | 5,3 | 3,2 | na |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | na |
| Effectif de femmes | 374 | 1 844 | 1 990 | 1 928 | 1 761 | 1 332 | 1 940 | 11 168 | na |
| HOMME⁵ | | | | | | | | | |
| Veut un autre bientôt ² | 80,6 | 36,4 | 36,7 | 29,5 | 28,9 | 25,6 | 28,2 | 32,8 | 30,1 |
| Veut un autre plus tard ³ | 11,7 | 49,0 | 45,8 | 43,0 | 33,2 | 34,1 | 28,1 | 36,7 | 32,1 |
| Veut un autre, ne sait pas quand | 4,3 | 10,8 | 9,7 | 6,5 | 5,9 | 4,6 | 4,6 | 6,7 | 6,1 |
| Indécis | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 5,8 | 4,2 | 4,0 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,5 | 1,7 | 4,9 | 15,1 | 25,8 | 27,3 | 31,5 | 18,2 | 25,4 |
| Stérilisé ⁴ | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| S'est déclaré stérile | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif d'hommes | 151 | 533 | 565 | 547 | 464 | 425 | 991 | 3 675 | 4 457 |

na = Non applicable

¹ Le nombre d'enfants vivants exclut la grossesse actuelle.² Veut une autre naissance dans les deux ans.³ Veut espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus.⁴ Y compris la stérilisation féminine et masculine.⁵ Le nombre d'enfants vivants pour les hommes comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte pour les hommes ayant actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Nombre d'enfants vivants ¹ | | | | | | | Ensemble |
|--|---------------------------------------|-----|------|------|--------|------|--------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | (0,0) | 2,0 | 16,7 | 39,3 | 58,1 | 79,7 | (82,1) | 34,9 |
| Autres villes | 0,0 | 0,7 | 7,3 | 20,3 | 35,5 | 51,3 | 60,2 | 25,7 |
| Ensemble urbain | 0,0 | 0,9 | 8,6 | 23,3 | 38,4 | 54,3 | 61,1 | 26,9 |
| Rural | 0,4 | 1,5 | 4,6 | 11,1 | 24,1 | 43,4 | 55,2 | 22,9 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | 9,0 | 11,1 | 18,2 | 6,7 |
| Atacora | (0,0) | 2,4 | 3,2 | 3,9 | 14,7 | 24,9 | 49,2 | 18,3 |
| Atlantique | (0,0) | 1,2 | 10,2 | 24,2 | 44,9 | 75,4 | 76,9 | 36,0 |
| Borgou | (2,1) | 0,4 | 2,9 | 13,5 | 22,4 | 31,3 | 46,6 | 18,9 |
| Collines | * | 1,0 | 12,3 | 30,9 | 46,8 | 69,2 | 80,8 | 37,0 |
| Couffo | * | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 18,2 | 38,9 | 58,0 | 20,2 |
| Donga | (0,0) | 1,9 | 3,9 | 4,1 | 9,0 | 25,1 | 41,4 | 12,7 |
| Littoral | (0,0) | 2,0 | 16,7 | 39,3 | 58,1 | 79,7 | (82,1) | 34,9 |
| Mono | * | 2,4 | 10,8 | 26,2 | 50,3 | 55,3 | 73,0 | 35,1 |
| Ouémé | * | 0,0 | 6,3 | 23,6 | 37,8 | 69,7 | 76,0 | 32,5 |
| Plateau | (0,0) | 1,3 | 3,5 | 13,0 | 21,8 | 44,6 | 78,4 | 27,4 |
| Zou | (0,0) | 2,4 | 7,8 | 16,1 | 41,6 | 59,8 | 72,4 | 31,3 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 0,5 | 1,7 | 4,9 | 12,0 | 25,0 | 43,4 | 54,9 | 26,0 |
| Primaire | 0,0 | 1,3 | 5,5 | 24,5 | 41,7 | 61,3 | 74,0 | 26,0 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 0,4 | 8,4 | 17,9 | 42,3 | 73,4 | (63,1) | 16,0 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | (0,0) | 1,0 | 15,4 | 36,5 | (57,5) | * | * | 17,8 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 8,0 | 18,7 | 31,5 | 46,4 | 20,3 |
| Second | 1,1 | 0,7 | 3,9 | 7,7 | 19,3 | 38,2 | 55,4 | 22,2 |
| Moyen | 0,0 | 2,3 | 5,7 | 12,8 | 26,3 | 43,7 | 63,9 | 24,6 |
| Quatrième | 0,0 | 1,6 | 6,3 | 19,0 | 30,4 | 55,7 | 61,8 | 25,4 |
| Le plus élevé | 0,0 | 0,6 | 11,2 | 30,0 | 52,8 | 71,8 | 73,3 | 29,9 |
| Ensemble | 0,3 | 1,2 | 6,4 | 16,6 | 29,9 | 47,6 | 57,0 | 24,5 |

Note : Les femmes stérilisées ou celles dont le partenaire/mari est stérilisé sont considérées comme ne voulant plus d'enfant. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur au moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle

Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Nombre d'enfants vivants ¹ | | | | | | | Ensemble |
|--|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | * | (4,1) | 20,1 | 47,9 | (54,3) | * | * | 35,3 |
| Autres villes | 0,0 | 2,6 | 6,1 | 21,4 | 33,7 | 29,7 | 36,3 | 21,6 |
| Ensemble urbain | 0,0 | 2,7 | 8,5 | 26,4 | 37,0 | 32,9 | 36,7 | 23,3 |
| Rural | 0,8 | 1,0 | 3,3 | 7,4 | 17,8 | 24,3 | 29,3 | 15,3 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | * | 2,5 | 0,0 | 0,9 | (1,7) | (9,7) | 5,4 | 3,1 |
| Atacora | * | 0,0 | (0,0) | (18,4) | (3,9) | (1,1) | 33,5 | 12,2 |
| Atlantique | * | 2,5 | 7,1 | 21,8 | 44,7 | (53,5) | 50,8 | 30,2 |
| Borgou | * | 0,0 | 1,1 | 7,5 | (22,6) | 13,6 | 22,9 | 12,4 |
| Collines | * | (0,0) | (12,3) | (12,5) | (20,4) | (31,1) | 39,3 | 21,1 |
| Couffo | * | * | (0,0) | * | (16,7) | (20,5) | 27,5 | 15,2 |
| Donga | * | (0,0) | (2,4) | (2,9) | (3,9) | (14,7) | 22,2 | 9,1 |
| Littoral | * | (4,1) | 20,1 | 47,9 | (54,3) | * | * | 35,3 |
| Mono | * | (0,0) | (5,7) | (13,8) | * | * | (56,5) | 21,8 |
| Ouémé | * | (7,9) | (15,7) | 42,8 | (53,1) | (47,3) | 61,6 | 38,7 |
| Plateau | * | * | (0,0) | (0,0) | (17,0) | * | 27,1 | 15,7 |
| Zou | * | (2,1) | 3,6 | (1,4) | (22,3) | (28,9) | 38,6 | 18,4 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 7,7 | 14,1 | 18,1 | 22,8 | 13,7 |
| Primaire | (0,0) | 0,4 | 3,6 | 13,8 | 34,2 | 40,2 | 44,4 | 24,5 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | (0,0) | 2,2 | 5,4 | 23,1 | 29,4 | 26,0 | 50,0 | 21,1 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | * | 0,0 | 9,0 | 27,8 | (38,1) | * | (42,9) | 21,6 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | (0,0) | 2,3 | 0,0 | 6,5 | 12,8 | 7,8 | 22,5 | 11,1 |
| Second | (0,0) | 0,4 | 5,6 | 3,3 | 18,6 | 21,1 | 30,8 | 15,7 |
| Moyen | * | 1,9 | 2,1 | 12,7 | 18,4 | 23,2 | 31,9 | 16,7 |
| Quatrième | * | 2,0 | 5,2 | 15,9 | 23,9 | 34,0 | 34,1 | 19,8 |
| Le plus élevé | (0,0) | 2,1 | 11,3 | 32,8 | 48,0 | 51,0 | 50,7 | 28,9 |
| Ensemble 15-49 | 0,5 | 1,7 | 5,7 | 15,6 | 26,0 | 27,9 | 31,9 | 18,6 |
| 50-64 | * | * | * | (64,6) | 65,0 | 64,1 | 60,9 | 61,0 |
| Ensemble 15-64 | 1,9 | 3,1 | 7,0 | 19,5 | 30,2 | 34,0 | 42,3 | 26,0 |

Note : Les hommes stérilisés ou qui ont déclaré à la question concernant le désir d'enfants que leur épouse/partenaire était stérilisée sont considérés comme ne voulant plus d'enfant. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur au moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse/partenaire de l'enquêté est enceinte (ou si une des épouses est enceinte, pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par nombre idéal d'enfants et nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des enquêtés et pour les enquêtés actuellement en union, selon le nombre d'enfants vivants, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Nombre idéal d'enfants | Nombre d'enfants vivants | | | | | | | Ensemble |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
| FEMME¹ | | | | | | | | |
| 0 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 4,6 | 4,1 | 5,0 | 3,7 |
| 1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2 | 7,4 | 5,6 | 4,7 | 3,8 | 2,4 | 1,4 | 1,0 | 4,3 |
| 3 | 11,4 | 9,2 | 4,9 | 6,0 | 2,1 | 3,1 | 1,4 | 6,3 |
| 4 | 38,4 | 37,9 | 38,9 | 31,9 | 26,9 | 20,5 | 12,8 | 31,2 |
| 5 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | 14,8 | 8,8 | 12,1 | 7,4 | 11,0 |
| 6+ | 23,5 | 26,2 | 30,5 | 34,6 | 48,5 | 51,8 | 64,4 | 37,2 |
| Réponse non numérique | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 6,7 | 7,9 | 6,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de femmes | 3 839 | 2 360 | 2 201 | 2 083 | 1 904 | 1 440 | 2 101 | 15 928 |
| Nombre idéal d'enfants pour :² | | | | | | | | |
| Ensemble des femmes | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 6,7 | 5,1 |
| Effectif de femmes | 3 618 | 2 232 | 2 097 | 1 966 | 1 779 | 1 343 | 1 936 | 14 971 |
| Femmes actuellement en union | | | | | | | | |
| Effectif de femmes actuellement en union | 339 | 1 740 | 1 894 | 1 816 | 1 648 | 1 239 | 1 793 | 10 469 |
| HOMME³ | | | | | | | | |
| 0 | 1,9 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,7 |
| 1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 2 | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 1,4 | 3,5 |
| 3 | 9,0 | 8,3 | 4,7 | 7,3 | 1,9 | 3,8 | 1,8 | 6,5 |
| 4 | 24,3 | 24,6 | 28,3 | 17,6 | 17,8 | 14,8 | 9,6 | 20,8 |
| 5 | 16,4 | 16,0 | 12,3 | 15,4 | 10,3 | 9,5 | 5,7 | 13,4 |
| 6+ | 40,5 | 43,0 | 43,0 | 49,0 | 56,5 | 58,8 | 68,3 | 48,2 |
| Réponse non numérique | 3,4 | 3,6 | 5,7 | 4,4 | 8,8 | 9,8 | 11,1 | 5,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif | 2 986 | 621 | 615 | 575 | 480 | 445 | 1 005 | 6 727 |
| Nombre idéal d'enfants pour les hommes de 15-49 ans :² | | | | | | | | |
| Ensemble des hommes | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,6 | 10,8 | 7,0 |
| Effectif d'hommes | 2 886 | 599 | 580 | 550 | 438 | 401 | 894 | 6 347 |
| Hommes actuellement en union | | | | | | | | |
| Effectif d'hommes actuellement en union | 146 | 514 | 532 | 521 | 422 | 384 | 882 | 3 401 |
| Nombre idéal d'enfants pour les hommes de 15-64 ans :² | | | | | | | | |
| Ensemble des hommes | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,4 | 10,7 | 7,2 |
| Effectif d'hommes | 2 900 | 623 | 599 | 601 | 499 | 496 | 1 398 | 7 116 |
| Hommes actuellement en union | | | | | | | | |
| Effectif d'hommes actuellement en union | 150 | 531 | 547 | 564 | 475 | 465 | 1 367 | 4 099 |

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle pour les femmes.

² Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont fourni des réponses non numériques.

³ Pour les hommes, le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte si l'homme a actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.4 Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Nombre idéal d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Nombre moyen | Effectif de femmes ¹ |
|--|--------------|---------------------------------|
| Groupe d'âges | | |
| 15-19 | 4,6 | 3 151 |
| 20-24 | 4,8 | 2 778 |
| 25-29 | 5,0 | 2 826 |
| 30-34 | 5,4 | 2 070 |
| 35-39 | 5,6 | 1 741 |
| 40-44 | 5,8 | 1 232 |
| 45-49 | 5,9 | 1 172 |
| Résidence | | |
| Cotonou | 3,9 | 915 |
| Autres villes | 4,8 | 5 393 |
| Ensemble urbain | 4,7 | 6 308 |
| Rural | 5,5 | 8 663 |
| Département | | |
| Alibori | 5,2 | 1 761 |
| Atacora | 6,4 | 1 282 |
| Atlantique | 4,5 | 1 904 |
| Borgou | 6,3 | 1 698 |
| Collines | 4,7 | 1 114 |
| Couffo | 6,2 | 992 |
| Donga | 6,0 | 731 |
| Littoral | 3,9 | 915 |
| Mono | 4,5 | 747 |
| Ouémé | 4,5 | 1 350 |
| Plateau | 4,7 | 920 |
| Zou | 4,8 | 1 556 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucun | 5,8 | 8 156 |
| Primaire | 4,8 | 2 951 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,3 | 2 737 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 3,7 | 1 127 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 6,2 | 2 578 |
| Second | 5,6 | 2 821 |
| Moyen | 5,4 | 2 916 |
| Quatrième | 4,8 | 3 197 |
| Le plus élevé | 4,1 | 3 458 |
| Ensemble | 5,1 | 14 971 |

¹ Effectif de femmes ayant donné une réponse numérique.

Tableau 6.5 Planification de la fécondité

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête (y compris les grossesses actuelles), par planification de la grossesse, selon le rang de naissance et l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Rang de naissance et âge de la mère à la naissance de l'enfant | Planification de la grossesse | | | Total | Effectif de naissances |
|--|-------------------------------|------------------|-------------|-------|------------------------|
| | Voulue au moment | Voulue plus tard | Non désirée | | |
| Rang de naissance | | | | | |
| 1 | 76,9 | 22,0 | 1,1 | 100,0 | 3 377 |
| 2 | 79,1 | 19,5 | 1,4 | 100,0 | 2 939 |
| 3 | 78,6 | 18,7 | 2,7 | 100,0 | 2 588 |
| 4+ | 75,0 | 13,2 | 11,8 | 100,0 | 6 441 |
| Âge de la mère à la naissance de l'enfant | | | | | |
| <20 | 72,2 | 26,3 | 1,5 | 100,0 | 1 929 |
| 20-24 | 76,3 | 21,9 | 1,8 | 100,0 | 4 246 |
| 25-29 | 79,8 | 16,1 | 4,2 | 100,0 | 4 276 |
| 30-34 | 78,1 | 12,5 | 9,4 | 100,0 | 2 737 |
| 35-39 | 75,2 | 9,1 | 15,7 | 100,0 | 1 484 |
| 40-44 | 71,9 | 7,5 | 20,6 | 100,0 | 582 |
| 45-49 | 74,4 | 5,8 | 19,8 | 100,0 | 90 |
| Ensemble | 76,8 | 17,3 | 5,9 | 100,0 | 15 345 |

Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée

Indice Synthétique de Fécondité désiré (ISFD) et Indice Synthétique de Fécondité pour les 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Taux de fécondité désiré | Taux de fécondité |
|--|--------------------------|-------------------|
| Résidence | | |
| Cotonou | 3,5 | 4,0 |
| Autres villes | 4,7 | 5,4 |
| Ensemble urbain | 4,5 | 5,2 |
| Rural | 5,2 | 6,1 |
| Département | | |
| Alibori | 4,4 | 6,2 |
| Atacora | 6,1 | 6,7 |
| Atlantique | 4,0 | 4,9 |
| Borgou | 5,9 | 6,2 |
| Collines | 4,4 | 5,4 |
| Couffo | 5,4 | 5,9 |
| Donga | 6,5 | 6,8 |
| Littoral | 3,5 | 4,0 |
| Mono | 4,6 | 5,7 |
| Ouémé | 4,7 | 5,1 |
| Plateau | 4,9 | 5,7 |
| Zou | 4,7 | 5,6 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucun | 5,4 | 6,4 |
| Primaire | 4,7 | 5,4 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,0 | 4,5 |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | 3,3 | 3,6 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 6,0 | 7,0 |
| Second | 5,2 | 6,2 |
| Moyen | 5,3 | 6,1 |
| Quatrième | 4,6 | 5,3 |
| Le plus élevé | 3,6 | 4,2 |
| Ensemble | 4,9 | 5,7 |

Note : Les taux sont basés sur les naissances des femmes de 15-49 ans durant la période 1-36 mois précédant l'enquête. L'ISF est le même que celui présenté au Tableau 5.2.

Résultats clés

- **Utilisation de la contraception :** Le pourcentage de femmes de 15-49 ans en union qui utilisaient une méthode de contraception moderne au moment de l'enquête est de 12 %. Par rapport à l'EDSB-IV 2011-2012, on note une augmentation de ce niveau d'utilisation, la prévalence moderne étant passée de 8 % à 12 %.
- **Méthodes utilisées :** Les méthodes modernes sont les méthodes les plus utilisées par les femmes en union, en particulier les implants et les injectables. Le pourcentage d'utilisatrices d'implants a augmenté entre 2011-2012 et 2017-2018, passant de 1 % à 5 %.
- **Choix informé de la méthode de planification familiale :** Seulement 52 % des femmes qui utilisent la contraception moderne ont reçu les informations qui permettent un choix informé.¹
- **Discontinuité contraceptive :** Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive ayant eu lieu dans les cinq années précédant l'enquête, 33 % ont été discontinués dans les douze mois. Les injectables constituent la méthode qui connaît le taux de discontinuité le plus élevé (57 %).
- **Besoins non satisfaits en matière de planification familiale :** 32 % des femmes de 15-49 ans en union ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale.

Les couples peuvent utiliser des méthodes contraceptives pour limiter ou espacer le nombre d'enfants. Ce chapitre présente entre autres les résultats sur l'utilisation et les sources d'approvisionnement des méthodes contraceptives, le choix informé des méthodes et les taux et les raisons de discontinuité contraceptive. En outre, il présente l'estimation de la demande potentielle en planification familiale ainsi que les résultats concernant le contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale.

L'utilisation de la contraception permet d'éviter les grossesses non désirées ou non planifiées. Elle permet également de prévenir les grossesses à risque et améliore aussi la santé de la mère et de l'enfant. Le Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018 (PNDS) a inscrit comme priorité la promotion de la Planification Familiale (PF) dans le souci de réduire la mortalité maternelle et néo-natale. Le Bénin a également adopté le Plan d'Action National Budgétisé pour la Planification Familiale (PANBPF) pour la

¹ Y compris les femmes qui ont été informées des effets secondaires ou des problèmes liés à l'utilisation, de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires, et celles qui ont été informées par un agent de santé ou un agent en PF d'autres méthodes qui pourraient être utilisées

période 2014-2018. Ce plan a eu pour objectif d'atteindre une prévalence contraceptive de 20 % pour les méthodes modernes chez les femmes de 15-49 ans.

7.1 CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

La connaissance des méthodes contraceptives est relativement élevée au Bénin. En effet, 94 % des femmes et 95 % des hommes de 15-49 ans ont déclaré avoir entendu parler d'une méthode contraceptive (**Tableau 7.1**).

Parmi les méthodes modernes, pour l'ensemble des femmes et des hommes, on constate que le condom masculin (90 % chez les femmes et 93 % chez les hommes), les injectables (86 % chez les femmes et 72 % chez les hommes), les implants (85 % chez les femmes et 69 % chez les hommes) et les pilules (82 % chez les femmes et 74 % chez les hommes) sont les méthodes les plus connues. À l'opposé, c'est la stérilisation masculine qui est la méthode la moins connue (20 % des femmes et 23 % des hommes).

Ainsi, parmi les 11 méthodes contraceptives (modernes et traditionnelles), les femmes de 15-49 ans actuellement en union en connaissent, en moyenne, 8,0 contre 7,5 chez les hommes en union du même groupe d'âges.

Les résultats par âge montrent que, chez les femmes en union, la connaissance d'au moins une méthode contraceptive moderne est plus faible chez les jeunes de 15-19 ans que chez les autres (88 % contre au moins 96 % dans les autres groupes d'âges). On note aussi des écarts de ce niveau de connaissance entre les départements, le pourcentage de femmes en union ayant entendu parler d'au moins une méthode contraceptive moderne variant de 88 % dans le Borgou à pratiquement 100 % dans le Littoral. Chez les hommes en union, c'est dans l'Ouémé que ce niveau de connaissance est le plus faible (76 %) (**Tableau 7.2**).

Prévalence de la contraception

Pourcentage de femmes qui utilisent une méthode contraceptive

Échantillon : Toutes les femmes de 15-49 ans, actuellement en union, et les femmes de 15-49 ans non en union sexuellement actives

Au Bénin, 16 % des femmes de 15-49 ans en union utilisaient au moment de l'enquête une méthode contraceptive, principalement une méthode moderne (12 %). Seulement 3 % utilisaient une méthode traditionnelle (**Tableau 7.3**). La prévalence de la contraception parmi les femmes non en union sexuellement actives est nettement plus élevée (29 % pour toutes les méthodes et 24 % pour les méthodes modernes).

Méthodes modernes

Comprennent la stérilisation masculine et féminine, les injectables, le dispositif intra-utérin (DIU), les pilules contraceptives, les implants, le condom masculin et le condom féminin, la méthode des jours fixes (MJF), la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et la pilule du lendemain

Parmi les méthodes contraceptives modernes, les implants et les injectables sont les méthodes les plus utilisées par les femmes en union (respectivement 5 % et 2 %) (**Tableau 7.4.1** et **Graphique 7.1**).


Tendances : La comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes montre que la prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union a augmenté. Elle est passée de 3 % en 1996 à 7 % en 2001 puis à 6 % en 2006 et à 8 % en 2011-2012 pour atteindre 12 % en 2017-2018. En particulier, on note une augmentation du recours aux méthodes modernes au détriment des méthodes traditionnelles (**Tableau 7.4.2** et **Graphique 7.2**).

Variations par caractéristique

- La prévalence contraceptive moderne augmente avec le nombre d'enfants vivants, de 2 % chez les femmes en union sans enfant à 15 % chez celles ayant 5 enfants ou plus (**Tableau 7.4.1**).


Graphique 7.1 Utilisation contraceptive

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive



Graphique 7.2 Tendances de l'utilisation contraceptive

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui utilisent une méthode de contraception



- L'utilisation de la contraception moderne varie selon les départements. La prévalence contraceptive la plus élevée est enregistrée dans le Littoral (19 %) et la plus faible dans le Couffo (5 %), soit un écart de 14 points de pourcentage (**Tableau 7.4.1** et **Graphique 7.3**).
- Le niveau d'utilisation de la contraception moderne augmente avec le niveau d'instruction, passant pour les méthodes modernes de 11 % chez les femmes en union sans niveau d'instruction à 23 % parmi celles qui ont un niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- L'utilisation actuelle d'une méthode contraceptive moderne varie avec le quintile de bien-être économique, passant de 9 % pour le plus bas niveau à 18 % pour le plus élevé (**Graphique 7.4**).
- La prévalence contraceptive moderne chez les femmes de 15-49 ans non en union et sexuellement actives varie en fonction du milieu de résidence. Elle est de 27 % pour le milieu urbain et de 21 % pour le milieu rural soit un écart de 6 points de pourcentage.


Connaissance de la période féconde

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des questions sur la connaissance de la période féconde dans le cycle menstruel ont été posées aux femmes de 15-49 ans. Les résultats montrent que 29 % savent situer correctement cette période. Parmi les utilisatrices de la méthode du rythme, cette proportion est de 47 % ; pour celle de la Méthode des Jours Fixes (MJF), cette proportion est de 74 % (**Tableau 7.5**).

La proportion de femmes qui savent situer correctement la période féconde est plus faible chez les moins de 20 ans (21 %) et plus élevée chez les femmes de 25-29 ans et 30-34 ans (32 % dans chaque groupe d'âges) (**Tableau 7.6**).


Graphique 7.3 Utilisation d'une méthode moderne contraceptive par département

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union



Graphique 7.4 Utilisation des méthodes modernes par bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union



7.2 SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DES METHODES MODERNES

Source d'approvisionnement des méthodes modernes

Endroit où la méthode moderne actuellement utilisée a été obtenue la dernière fois.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans utilisant actuellement une méthode moderne de contraception

Au Bénin, le secteur public est la plus grande source d'approvisionnement des méthodes contraceptives modernes. Près de deux utilisatrices de méthodes modernes sur trois (62 %) a obtenu récemment sa méthode dans le secteur public dont (47 %) dans les centres de santé du gouvernement. Dans 28 % des cas, les utilisatrices se sont approvisionnées auprès du secteur médical privé, en majorité dans une pharmacie (17 %). Les hôpitaux/cliniques privées interviennent dans 8 % des cas. En outre, 7 % des femmes se sont approvisionnées au niveau d'autres sources comme boutique, ami/parents (exclusivement en condom masculin) (**Tableau 7.7** et **Graphique 7.5**).

Le secteur public est prédominant dans l'approvisionnement en méthodes contraceptives comme les implants (91 %), les injectables (81 %) et le DIU (64 %). Par contre, il pèse moins dans l'approvisionnement en pilules (31 %) et en condoms (8 %). Le secteur médical privé joue un rôle important dans l'approvisionnement en condoms masculins (51 %) mais aussi en pilules (69 %), majoritairement par la pharmacie (64 %) (**Tableau 7.7**).

Graphique 7.5 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes modernes selon la source d'approvisionnement la plus récente



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

7.3 CHOIX INFORMÉ

Choix informé

Un choix informé signifie qu'au moment où la femme a commencé l'épisode actuel d'utilisation de la méthode, elle a été informée sur les effets secondaires de la méthode, sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires et sur d'autres méthodes qu'elle pourrait utiliser.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans qui utilisent actuellement certaines méthodes modernes de contraception et dont le dernier épisode d'utilisation a commencé dans les 5 années avant l'enquête.

Parmi les femmes de 15-49 ans dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé dans les cinq années avant l'enquête, 62 % ont été informées de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de leur méthode. Par ailleurs, 55 % ont été informées de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires. Trois quarts (75 %) ont reçu des informations d'un agent de santé ou d'un agent en planification familiale concernant l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser. Dans l'ensemble, 52 % des femmes ont reçu les trois types d'informations (**Tableau 7.8**).

7.4 DISCONTINUITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES

Taux de discontinuité contraceptive

Pourcentage d'épisodes contraceptifs discontinués au cours des 12 mois


Échantillon : Épisodes d'utilisation contraceptive des 5 années avant l'enquête des femmes actuellement âgées de 15-49 ans (une femme a pu avoir plus d'un épisode)

Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive commencés par les femmes au cours des cinq dernières années, 33 % ont été discontinués dans les 12 mois. Dans 3 % d'épisodes, les femmes ont changé de méthode. Les taux de discontinuité sont élevés pour les injectables (57 %) et les pilules (48 %) (Tableau 7.9 et Graphique 7.6).

Les raisons principales de discontinuation les plus fréquemment avancées concernent le souhait de tomber enceinte (48 %) et les soucis pour la santé et les effets secondaires (13 %) (Tableau 7.10).

Graphique 7.6 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives

Pourcentage d'épisodes contraceptifs discontinués au cours des 12 mois, parmi les femmes de 15-49 ans



7.5 DEMANDE EN PLANIFICATION FAMILIALE

Besoins non satisfaits en matière de planification familiale

Proportion de femmes qui (1) ne sont pas enceintes et ni en aménorrhée post-partum et qui sont considérées comme étant fécondes et qui veulent retarder la venue du prochain enfant de deux années ou plus ou qui ne veulent plus d'enfant mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive, ou (2) dont la grossesse actuelle a été mal planifiée ou est non souhaitée, ou (3) qui sont en aménorrhée post-partum et dont la dernière naissance des deux dernières années était mal planifiée ou non souhaitée.

Échantillon : Toutes les femmes de 15-49 ans, les femmes de 15-49 ans actuellement en union et les femmes de 15-49 ans non en union sexuellement actives

Demande pour la planification familiale :

Besoins non satisfaits pour la planification familiale + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)

Proportion de demande satisfaite :

$$\frac{\text{Utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)}}{\text{Besoins non satisfaits + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)}}$$

Proportion de demande satisfaite par les méthodes modernes :

$$\frac{\text{Utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode moderne)}}{\text{Besoins non satisfaits + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)}}$$

Les résultats de l'EDSB-V montrent que 32 % des femmes actuellement en union ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale dont 23 % pour espacer les naissances et 10 % pour les limiter (**Graphique 7.7**). Pour 16 % des femmes actuellement en union, les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits. Globalement, la demande totale en planification familiale s'élève à 48 % dont 33 % orientés vers l'espacement et 15 % vers la limitation. Cette demande en planification est satisfaite dans 32 % des cas dont 26 % par des méthodes modernes (**Tableau 7.11.1**).


Variations par caractéristique

- La proportion des femmes actuellement en union dont les besoins en PF ne sont pas satisfaits est plus élevée dans le groupe d'âges 20-24 ans (37 %) (**Tableau 7.11.1**).

Tendances : La demande totale en planification parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union est restée stationnaire entre 1996 et 2017-2018. Dans la même période, le pourcentage de besoins non satisfaits a augmenté passant de 28 % en 1996 à 32 % en 2017-2018 et le pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes est passée de 8 % en 1996 à 26 % en 2017-2018 (**Graphique 7.8**).

Graphique 7.7 Demande en matière de planification familiale


Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union selon les besoins en matière de planification familiale



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

Graphique 7.8 Tendances de la demande en matière de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union



- Dans les départements, les proportions de femmes actuellement en union dont les besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits varient d'un minimum de 22 % dans l'Alibori à un maximum de 38 % dans le Couffo et l'Atlantique (**Graphique 7.9**).
- Les résultats selon les quintiles de bien-être économique montrent que c'est dans le quintile le plus bas que la proportion de femmes en union dont les besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits est la plus faible (29 % contre 33-34 % dans les autres quintiles) (**Graphique 7.10**).
- La demande totale en planification familiale des femmes non en union sexuellement actives est supérieure à celles des femmes en union (79 % contre 48 %) (**Tableau 7.11.2**).

7.6 PRISE DE DECISION SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des informations sur la prise de décision concernant l'utilisation de la planification familiale ont été collectées auprès de deux catégories de femmes : les femmes en union qui utilisent la contraception et les femmes en union qui ne l'utilise pas.

Parmi les femmes en union qui utilisent actuellement la contraception, la décision d'utilisation est prise, dans la majorité des cas par la femme (46 %). Dans 43 % des cas, c'est principalement la femme et le mari/partenaire qui a pris la décision et dans 11 % des cas, c'est le mari/partenaire. Au Bénin, la femme est donc pratiquement toujours impliquée dans ce type de décision (89 %).


Parmi les femmes en union qui n'utilisent pas actuellement la contraception, on constate que la décision de ne pas utiliser est prise principalement par la femme (60 %). Dans 20 % des cas, la décision est conjointe et dans 15 % par le mari/partenaire principalement (**Tableau 7.12**).

Utilisation future de la contraception

L'EDSB-V a recueilli des informations auprès des femmes de 15-49 ans actuellement en union non-utilisatrices de la contraception sur leur intention d'utiliser la contraception dans le futur. Parmi ces femmes, un peu plus d'une sur deux (54 %) n'a pas l'intention de utiliser la contraception dans le futur (**Tableau 7.13**).


Graphique 7.9 Besoins non satisfaits par département

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale



Graphique 7.10 Besoins non satisfaits par bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale



Exposition aux messages sur la planification familiale dans les médias

Plus de la moitié des femmes (45 %) et des hommes (47 %) n'ont ni vu, ni entendu des messages sur la planification familiale par le biais de médias, comme la radio, la télévision, les journaux, le téléphone portable, ou d'autres médias comme une affiche, prospectus/brochure, animation culturelle/éducative, lieu de culte ou à l'école (**Tableau 7.14.1**).

C'est par le canal de la radio que les femmes et les hommes ont été le plus fréquemment informés sur la planification familiale (respectivement 43 % et 41 %), suivie par la télévision (respectivement 19 % et 18 %). Pour le Bénin, d'autres médias mentionnés par les femmes et les hommes comme source d'information sur la planification familiale sont : des affiches, des animations culturelle/éducatives et des écoles. La proportion d'hommes et de femmes exposés aux messages sur la planification familiale par le biais des journaux/magazine est faible, respectivement (9 % contre 8 %).

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes âgées de 15-49 ans, si elles pensent qu'il est acceptable de passer des messages sur la planification familiale dans les médias. L'opinion des femmes varie selon le type de média : la plupart des femmes pensent qu'il est acceptable de passer des messages sur la planification familiale à la télévision (86 %), dans les journaux/magazines (84 %), sur la radio (83 %), ou par le téléphone portable (81 %). Par contre, les proportions de femmes qui pensent qu'il est acceptable de passer des messages sur la planification familiale dans un lieu de culte (église ou mosquée) est nettement plus faible (7 %) (**Tableau 7.14.2**).

7.7 CONTACT DES NON UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION AVEC DES PRESTATAIRES DE PLANIFICATION FAMILIALE

Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Les enquêtées ont discuté de planification familiale au cours des 12 mois avant l'enquête avec un agent de terrain ou durant une visite dans un établissement de santé.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement de méthode contraceptive

La majorité de femmes (82 %) non utilisatrices de la contraception n'ont parlé de planification familiale ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé. Seulement 8 % des femmes non utilisatrices de la planification familiale ont reçu la visite d'un agent de terrain et ont parlé de planification familiale et 14 % se sont rendues dans un établissement de santé et ont parlé de planification familiale au cours des 12 derniers mois (**Tableau 7.15**).

Variations par caractéristique

- La proportion de femmes non utilisatrices n'ayant pas discuté de planification familiale dans un établissement sanitaire ou avec un agent de terrain est plus élevée chez les femmes de 15-19 ans (91 % contre 76 % chez les femmes de 25-29 ans et 30-34 ans) (**Tableau 7.15**).
- C'est dans les groupes d'âges 25-29 ans et 30-34 ans, que le pourcentage de femmes qui informées sur la planification familiale est le plus élevé puisque 10 % en ont parlé à un agent de terrain et 20 % dans un établissement de santé.
- Le pourcentage de femmes ayant parlé de la planification avec un agent de terrain varie de moins d'un pour cent dans l'Atacora à 18 % dans le Plateau. En ce qui concerne les femmes qui ont discuté de PF dans un établissement de santé, les pourcentages varient de 8 % dans le Mono et la Donga à 20 % dans l'Alibori.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la planification familiale, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 7.1** **Connaissance des méthodes contraceptives**
- **Tableau 7.2** **Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 7.3** **Utilisation actuelle de la contraception selon âge**
- **Tableau 7.4.1** **Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 7.4.2** **Tendances de l'utilisation actuelle de la contraception**
- **Tableau 7.5** **Connaissance de la période de fertilité**
- **Tableau 7.6** **Connaissance de la période de fertilité par âge**
- **Tableau 7.7** **Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception**
- **Tableau 7.8** **Choix informé de la méthode contraceptive**
- **Tableau 7.9** **Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois**
- **Tableau 7.10** **Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives**
- **Tableau 7.11.1** **Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union**
- **Tableau 7.11.2** **Besoins et demande en matière de planification familiale pour l'ensemble des femmes et pour les femmes non en union sexuellement actives**
- **Tableau 7.12** **Prise de décision concernant la planification familiale**
- **Tableau 7.13** **Utilisation future de la contraception**
- **Tableau 7.14.1** **Exposition aux messages sur la planification familiale**
- **Tableau 7.14.2** **Acceptable de parler de la planification familiale**
- **Tableau 7.15** **Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale**

Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives

Pourcentage de tous les enquêtés de 15-49 ans, pourcentage d'enquêtés de 15-49 ans actuellement en union et pourcentage d'enquêtés de 15-49 ans qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actifs qui ont déjà entendu parler d'une méthode contraceptive, selon la méthode, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Méthode | Femme | | | Homme | | |
|--|---------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|
| | Ensemble des femmes | Femme actuellement en union | Femme non en union sexuellement active ¹ | Ensemble des hommes | Homme actuellement en union | Homme non en union sexuellement actif ¹ |
| N'importe quelle méthode | 94,4 | 96,5 | 98,8 | 94,6 | 96,9 | 98,1 |
| Une méthode moderne | 94,2 | 96,3 | 98,8 | 94,4 | 96,8 | 97,9 |
| Stérilisation féminine | 43,3 | 45,8 | 42,2 | 39,2 | 47,1 | 39,2 |
| Stérilisation masculine | 19,8 | 21,0 | 20,7 | 22,5 | 27,0 | 23,8 |
| DIU | 57,6 | 62,7 | 54,9 | 33,8 | 41,7 | 35,1 |
| Injectables | 85,6 | 90,3 | 90,4 | 71,9 | 82,9 | 73,9 |
| Implants | 84,9 | 90,8 | 90,1 | 68,9 | 80,4 | 71,4 |
| Pilule | 81,5 | 86,4 | 87,4 | 73,5 | 83,0 | 77,4 |
| Condom masculin | 89,7 | 91,6 | 95,9 | 92,9 | 95,6 | 96,3 |
| Condom féminin | 53,4 | 53,4 | 66,6 | 57,4 | 63,7 | 65,4 |
| Pilule du lendemain | 37,7 | 39,8 | 47,2 | 34,9 | 41,6 | 40,9 |
| Méthode des jours fixes | 45,0 | 48,8 | 48,2 | 32,0 | 39,3 | 34,1 |
| MAMA | 38,8 | 45,8 | 28,1 | 15,2 | 19,5 | 15,0 |
| Autre méthode moderne | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| Une méthode traditionnelle | 66,2 | 70,0 | 71,6 | 63,0 | 71,7 | 68,5 |
| Méthode du rythme | 59,8 | 63,0 | 65,5 | 42,8 | 50,1 | 45,3 |
| Retrait | 49,8 | 53,3 | 57,1 | 60,3 | 69,1 | 66,8 |
| Autre méthode traditionnelle | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 4,7 | 3,0 |
| Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15-49 ans | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 | 6,9 |
| Effectif d'enquêtés | 15 928 | 11 168 | 893 | 6 727 | 3 675 | 720 |
| Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15-64 ans | na | na | na | 6,6 | 7,5 | 6,9 |
| Effectif d'enquêtés | na | na | na | 7 595 | 4 457 | 742 |

na = Non applicable

MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

¹ Sexuellement actif signifie que la personne a eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête.

Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive et pourcentage ayant entendu parler d'au moins une méthode contraceptive moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | Homme | | |
|--|---|--|--------------------|---|--|-------------------|
| | A entendu parler d'au moins une méthode | A entendu parler d'au moins une méthode moderne ¹ | Effectif de femmes | A entendu parler d'au moins une méthode | A entendu parler d'au moins une méthode moderne ¹ | Effectif d'hommes |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 88,4 | 87,9 | 618 | * | * | 9 |
| 20-24 | 95,9 | 95,8 | 1 966 | 97,5 | 97,5 | 284 |
| 25-29 | 96,6 | 96,5 | 2 658 | 97,1 | 96,8 | 735 |
| 30-34 | 97,5 | 97,4 | 2 035 | 96,8 | 96,8 | 777 |
| 35-39 | 97,8 | 97,6 | 1 706 | 97,1 | 96,8 | 754 |
| 40-44 | 97,6 | 97,5 | 1 166 | 96,6 | 96,6 | 574 |
| 45-49 | 96,5 | 95,9 | 1 020 | 96,8 | 96,8 | 543 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 99,6 | 99,6 | 551 | 98,5 | 98,4 | 182 |
| Autres villes | 97,0 | 96,8 | 3 881 | 96,0 | 96,0 | 1 326 |
| Ensemble urbain | 97,3 | 97,2 | 4 431 | 96,3 | 96,3 | 1 509 |
| Rural | 95,9 | 95,7 | 6 737 | 97,4 | 97,2 | 2 167 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 97,1 | 97,0 | 1 550 | 99,4 | 99,4 | 494 |
| Atacora | 96,7 | 96,3 | 892 | 99,3 | 99,3 | 300 |
| Atlantique | 98,8 | 98,8 | 1 311 | 98,9 | 98,7 | 446 |
| Borgou | 88,4 | 87,7 | 1 381 | 99,6 | 99,0 | 493 |
| Collines | 97,6 | 97,1 | 738 | 96,7 | 96,7 | 239 |
| Couffo | 98,3 | 98,3 | 743 | 100,0 | 100,0 | 222 |
| Donga | 92,7 | 92,6 | 716 | 98,9 | 98,9 | 246 |
| Littoral | 99,6 | 99,6 | 551 | 98,5 | 98,4 | 182 |
| Mono | 97,8 | 97,6 | 514 | 100,0 | 100,0 | 158 |
| Ouémé | 98,1 | 98,0 | 985 | 75,6 | 75,6 | 351 |
| Plateau | 97,6 | 97,6 | 709 | 100,0 | 100,0 | 219 |
| Zou | 99,0 | 98,9 | 1 080 | 99,4 | 99,4 | 325 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 95,2 | 94,9 | 7 409 | 95,5 | 95,4 | 1 693 |
| Primaire | 98,9 | 98,8 | 1 984 | 97,2 | 97,0 | 926 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 99,1 | 99,0 | 1 294 | 98,5 | 98,5 | 535 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 99,7 | 99,7 | 481 | 99,5 | 99,5 | 521 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 91,6 | 91,3 | 2 165 | 96,1 | 95,7 | 762 |
| Second | 95,3 | 94,9 | 2 220 | 96,7 | 96,7 | 715 |
| Moyen | 97,7 | 97,6 | 2 233 | 97,4 | 97,2 | 680 |
| Quatrième | 98,4 | 98,3 | 2 330 | 97,0 | 97,0 | 718 |
| Le plus élevé | 99,2 | 99,1 | 2 221 | 97,4 | 97,4 | 800 |
| Ensemble 15-49 | 96,5 | 96,3 | 11 168 | 96,9 | 96,8 | 3 675 |
| 50-64 | na | na | na | 96,0 | 95,7 | 782 |
| Ensemble 15-64 | na | na | na | 96,8 | 96,6 | 4 457 |

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

¹ Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, pilule du lendemain, méthode des jours fixes (MJF), méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon âge

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15-49 ans, des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des femmes de 15-49 ans non en union et sexuellement actives par méthode actuellement utilisée et selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Méthode moderne | | | | | Méthode traditionnelle | | | | | Total | Effectif de femmes | | |
|---|---------------------|------|------------|----------|--------|------------------------|------|------------------------------------|----------------------------|--------|-------|--------------------|---------|--------|
| | Une méthode moderne | DIU | Injections | Implants | Pilule | Condom masculin | MJF | Autre méthode moderne ¹ | Une méthode traditionnelle | Rythme | | | Retrait | Autre |
| ENSEMBLE DES FEMMES | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 6,7 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 93,3 | 3 350 |
| 20-24 | 15,4 | 0,6 | 2,1 | 3,9 | 0,9 | 4,3 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 84,6 | 2 923 |
| 25-29 | 16,6 | 1,3 | 3,1 | 4,9 | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 3,3 | 1,7 | 1,4 | 0,2 | 83,4 | 2 986 |
| 30-34 | 19,3 | 2,1 | 2,5 | 7,1 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 3,4 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 80,7 | 2 202 |
| 35-39 | 17,5 | 13,9 | 2,4 | 6,6 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 3,6 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 82,5 | 1 882 |
| 40-44 | 18,2 | 14,5 | 2,7 | 2,3 | 6,2 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 3,7 | 2,0 | 1,1 | 0,7 | 81,8 | 1 320 |
| 45-49 | 10,4 | 8,5 | 1,4 | 4,4 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 89,6 | 1 265 |
| Ensemble | 14,4 | 11,7 | 1,3 | 1,9 | 4,5 | 1,2 | 2,1 | 0,3 | 2,7 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 85,6 | 15 928 |
| FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 6,3 | 0,2 | 1,1 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 93,7 | 618 |
| 20-24 | 12,2 | 0,7 | 2,1 | 3,7 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 2,7 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 87,8 | 1 966 |
| 25-29 | 15,6 | 1,2 | 2,8 | 4,8 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 3,2 | 1,7 | 1,4 | 0,2 | 84,4 | 2 658 |
| 30-34 | 19,4 | 2,2 | 2,6 | 7,0 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 3,4 | 1,5 | 1,8 | 0,1 | 80,6 | 2 035 |
| 35-39 | 18,3 | 14,6 | 2,6 | 2,2 | 6,8 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 3,7 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 81,7 | 1 706 |
| 40-44 | 18,3 | 14,5 | 2,5 | 2,2 | 6,6 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 81,7 | 1 166 |
| 45-49 | 11,6 | 9,3 | 1,6 | 0,8 | 5,1 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 88,4 | 1 020 |
| Ensemble | 15,5 | 12,4 | 1,6 | 2,2 | 5,4 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 3,1 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 84,5 | 11 168 |
| FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES² | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 22,6 | 0,0 | 2,0 | 4,2 | 0,4 | 12,4 | 0,3 | 0,3 | 3,1 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 77,4 | 377 |
| 20-24 | 36,5 | 29,4 | 0,4 | 3,8 | 7,5 | 16,3 | 0,4 | 0,0 | 7,1 | 4,3 | 2,3 | 0,6 | 63,5 | 273 |
| 25+ | 29,5 | 23,4 | 2,0 | 4,5 | 10,2 | 2,6 | 3,2 | 0,9 | 6,0 | 4,1 | 1,9 | 0,0 | 70,5 | 242 |
| Ensemble | 28,8 | 23,6 | 0,7 | 3,2 | 6,8 | 1,1 | 11,1 | 0,5 | 5,1 | 3,4 | 1,6 | 0,2 | 71,2 | 893 |

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

MJF = Méthode des Jours Fixes.

¹ Y compris stérilisation féminine, pilule du lendemain, et méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)

² Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 30 jours précédant l'enquête.

Tableau 7.4.1. Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des femmes de 15-49 ans non en union sexuellement actives par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Méthode moderne | | | | | | | | | | Méthode traditionnelle | | | | N'utilise pas actuellement | Effectif de femmes |
|--|---------------------|------|-------------|----------|--------|-----------------|-----|------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------|-------|------|----------------------------|--------------------|
| | Une méthode moderne | DIU | Injectables | Implants | Pilule | Condom masculin | MJF | Autre méthode moderne ¹ | Une méthode traditionnelle | Rythme | Retrait | Autre | Total | | | |
| FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2,1 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 97,9 | 100,0 | 689 |
| 1-2 | 13,3 | 10,2 | 1,0 | 3,6 | 1,4 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 3,1 | 1,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 86,7 | 100,0 | 3 819 |
| 3-4 | 18,3 | 14,5 | 2,1 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 3,8 | 1,7 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 81,7 | 100,0 | 3 566 |
| 5+ | 18,0 | 15,1 | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 82,0 | 100,0 | 3 094 |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 27,2 | 19,2 | 4,7 | 2,9 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 8,0 | 4,1 | 3,1 | 0,7 | 0,7 | 72,8 | 100,0 | 551 |
| Autres villes | 16,8 | 13,9 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 83,2 | 100,0 | 3 881 |
| Ensemble urbain | 18,1 | 14,5 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 81,9 | 100,0 | 4 431 |
| Rural | 13,8 | 11,0 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 86,2 | 100,0 | 6 737 |
| Département | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 15,7 | 13,5 | 1,3 | 3,3 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 2,2 | 1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 84,3 | 100,0 | 1 550 |
| Atacora | 10,8 | 10,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 89,2 | 100,0 | 892 |
| Atlantique | 21,4 | 13,7 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 7,6 | 3,8 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | 78,6 | 100,0 | 1 311 |
| Borgou | 12,8 | 12,0 | 0,9 | 2,9 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 87,2 | 100,0 | 1 381 |
| Collines | 20,7 | 18,1 | 0,7 | 3,6 | 2,9 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 2,6 | 0,0 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 79,3 | 100,0 | 738 |
| Couffo | 6,2 | 4,5 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 100,0 | 743 |
| Donga | 6,2 | 5,9 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 93,8 | 100,0 | 716 |
| Littoral | 27,2 | 19,2 | 4,7 | 2,9 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 8,0 | 4,1 | 3,1 | 0,7 | 0,7 | 72,8 | 100,0 | 551 |
| Mono | 23,2 | 18,0 | 1,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,4 | 5,2 | 2,8 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 76,8 | 100,0 | 514 |
| Ouémé | 21,1 | 15,2 | 5,6 | 1,1 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 6,0 | 3,3 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 78,9 | 100,0 | 985 |
| Plateau | 6,5 | 5,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 100,0 | 709 |
| Zou | 15,8 | 13,3 | 0,7 | 2,2 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 84,2 | 100,0 | 1 080 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 13,1 | 10,8 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 86,9 | 100,0 | 7 409 |
| Primaire | 18,5 | 14,8 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 3,6 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 81,5 | 100,0 | 1 984 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 19,4 | 14,1 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 5,3 | 3,6 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 80,6 | 100,0 | 1 294 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 29,2 | 23,2 | 3,8 | 2,7 | 4,1 | 4,1 | 2,4 | 0,3 | 5,9 | 3,8 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 70,8 | 100,0 | 481 |
| Quantiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 11,3 | 9,4 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 88,7 | 100,0 | 2 165 |
| Second | 11,9 | 9,9 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,7 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 88,1 | 100,0 | 2 220 |
| Moyen | 14,1 | 11,9 | 1,0 | 2,3 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 2,2 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 85,9 | 100,0 | 2 333 |
| Quatrième | 16,8 | 12,9 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 4,0 | 1,6 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 83,2 | 100,0 | 2 330 |
| Le plus élevé | 23,3 | 17,9 | 4,2 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 5,4 | 3,4 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 76,7 | 100,0 | 2 221 |
| Ensemble | 15,5 | 12,4 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 84,5 | 100,0 | 11 168 |

À suivre...

Tableau 7.4.1—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Méthode moderne | | | | | | | | | | Méthode traditionnelle | | | Effectif de femmes | |
|---|---------------------|---------------------|-----|-------------|----------|--------|-----------------|-----|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|-------|--------------------|------------------------|
| | Une méthode moderne | Une méthode moderne | DIU | Injectables | Implants | Pilule | Condom masculin | MJF | Autre méthode moderne ¹ | Une méthode traditionnelle | Rythme | Retrait | Autre | | N utilise actuellement |
| FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES² | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 38,7 | 29,8 | 1,9 | 6,0 | 0,7 | 2,2 | 17,8 | 1,2 | 0,0 | 8,9 | 6,1 | 2,8 | 0,0 | 61,3 | 84 |
| Autres villes | 33,8 | 26,4 | 0,6 | 2,6 | 8,1 | 1,7 | 12,7 | 0,4 | 0,3 | 7,4 | 4,6 | 2,3 | 0,5 | 66,2 | 336 |
| Ensemble urbain | 34,8 | 27,1 | 0,9 | 3,2 | 6,6 | 1,8 | 13,7 | 0,5 | 0,3 | 7,7 | 4,9 | 2,4 | 0,4 | 65,2 | 420 |
| Rural | 23,4 | 20,5 | 0,5 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 8,8 | 0,5 | 0,0 | 2,9 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 76,6 | 472 |
| Ensemble | 28,8 | 23,6 | 0,7 | 3,2 | 6,8 | 1,1 | 11,1 | 0,5 | 0,1 | 5,1 | 3,4 | 1,6 | 0,2 | 71,2 | 893 |

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

MJF = Méthode des Jours Fixes.

¹ Y compris stérilisation féminine, pilule du lendemain, et méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)

² Femme ayant eu des rapports sexuels dans les 30 jours précédant l'enquête.

Tableau 7.4.2 Tendances de l'utilisation actuelle de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon les résultats de plusieurs enquêtes, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Méthode | EDSB-I 1996 | EDSB-II 2001 | EDSB-III 2006 | EDSB-IV 2011-2012 | EDSB-V 2017-2018 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Une méthode | 16,4 | 18,6 | 17,0 | 12,9 | 15,5 |
| Une méthode moderne | 3,4 | 7,2 | 6,1 | 7,9 | 12,4 |
| DIU | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,6 |
| Injectable | 0,7 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Implants | na | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 5,4 |
| Pilule | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| Condom masculin | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 0,9 |
| Autre méthode moderne | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,8 |
| Une méthode traditionnelle | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 5,0 | 3,1 |
| Rythme | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 2,9 | 1,6 |
| Retrait | 5,2 | 4,3 | 3,6 | 0,8 | 1,3 |
| Autre méthode traditionnelle | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,3 |
| N'utilise pas actuellement | 83,6 | 81,4 | 83,0 | 87,1 | 84,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de femmes | 4 198 | 4 563 | 13 403 | 11 680 | 11 168 |

na = Non applicable

Tableau 7.5 Connaissance de la période de fertilité

Répartition (en %) des utilisatrices de la méthode du rythme, des utilisatrices de la MJF et de l'ensemble des femmes de 15-49 ans par connaissance de la période de fertilité pendant le cycle menstruel, EDSB-V Bénin 2017-2018

| A situé la période fertile : | Utilisatrice de la méthode du rythme | Utilisatrice de la méthode MJF | Ensemble des femmes de 15-49 ans |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Juste avant le début des règles | 3,0 | 0,0 | 3,5 |
| Pendant les règles | 1,3 | 0,0 | 1,4 |
| Juste après la fin des règles | 42,8 | 9,3 | 42,3 |
| Au milieu de deux cycles menstruels | 47,0 | 74,1 | 29,0 |
| Autre | 1,4 | 3,9 | 0,7 |
| Pas de moment spécifique | 0,3 | 11,3 | 6,2 |
| Ne sait pas | 4,2 | 1,4 | 16,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de femmes | 239 | 51 | 15 928 |

Note : Une connaissance correcte de la période de fertilité est définie ainsi : « Au milieu de deux cycles menstruels »
MJF = Méthode des Jours Fixes.

Tableau 7.6 Connaissance de la période de fertilité par âge

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui savent situer correctement la période de fertilité pendant le cycle ovulatoire, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Pourcentage sachant situer correctement la période de fertilité | Effectif de femmes |
|---------------|---|-----------------------|
| 15-19 | 20,7 | 3 350 |
| 20-24 | 30,8 | 2 923 |
| 25-29 | 32,0 | 2 986 |
| 30-34 | 32,0 | 2 202 |
| 35-39 | 31,5 | 1 882 |
| 40-44 | 30,4 | 1 320 |
| 45-49 | 29,8 | 1 265 |
| Ensemble | 29,0 | 15 928 |

Note : Une connaissance correcte de la période de fertilité est définie ainsi : « Au milieu de deux cycles menstruels »

Tableau 7.7 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception

Répartition (en %) des utilisatrices de méthodes modernes de contraception, âgées de 15-49 ans, par source d'approvisionnement la plus récente, selon la méthode, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Source de la méthode | DIU | Injectables | Implants | Pilule | Condom masculin | Méthode des jours fixes | Autre méthode moderne | Ensemble |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Secteur public | 63,8 | 80,8 | 91,1 | 31,3 | 7,7 | 18,6 | (60,1) | 62,4 |
| Hôpital du gouvernement | 15,4 | 16,1 | 19,1 | 4,9 | 2,2 | 6,2 | (43,7) | 13,8 |
| Centre de santé du gouvernement | 45,9 | 62,2 | 69,9 | 25,5 | 3,3 | 10,1 | (16,4) | 46,5 |
| Autre secteur public | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | (0,0) | 2,1 |
| Secteur médical privé | 36,2 | 19,2 | 8,9 | 68,7 | 51,2 | 18,1 | (39,9) | 28,4 |
| Hôpital/clinique privé | 24,3 | 14,9 | 5,7 | 3,3 | 0,4 | 10,7 | (0,0) | 8,1 |
| Pharmacie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,7 | 49,8 | 4,2 | (39,9) | 16,6 |
| Autre secteur médical privé/ONG | 11,8 | 4,2 | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 3,2 | (0,0) | 3,7 |
| Autre secteur non médical | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 25,4 | (0,0) | 6,8 |
| Boutique | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 2,2 | (0,0) | 5,8 |
| Amis/parents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 23,2 | (0,0) | 1,0 |
| Autre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 37,8 | (0,0) | 2,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (100,0) | 100,0 |
| Effectif de femmes | 203 | 303 | 722 | 193 | 336 | 51 | 35 | 1 842 |

Note : L'ensemble inclut d'autres méthodes modernes (stérilisation, condom féminin, pilule du lendemain) mais exclut la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA).
ONG = Organisation Non Gouvernementale

Tableau 7.8 Choix informé de la méthode contraceptive

Parmi les utilisatrices actuelles de certaines méthodes modernes, âgées de 15-49 ans, dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé dans les 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de cette méthode, pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires, pourcentage ayant été informé sur l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser et pourcentage ayant reçu les 3 types d'information, selon la méthode et la source initiale de la méthode, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Méthode/source | Parmi les femmes dont la dernière période d'utilisation d'une méthode moderne a commencé dans les 5 années ayant précédé l'enquête : | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------|
| | Pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de cette méthode | Pourcentage ayant été informé de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires | Pourcentage ayant été informé par un agent de santé ou un agent en planification familiale d'autres méthodes qui pourraient être utilisées | Pourcentage ayant reçu les 3 types d'informations (Indice information méthode) | Effectif de femmes |
| Méthode | | | | | |
| Stérilisation féminine | * | * | * | * | 13 |
| Pilule | 33,9 | 25,3 | 59,8 | 23,4 | 178 |
| DIU | 70,6 | 67,1 | 84,1 | 63,1 | 179 |
| Injectables | 65,7 | 58,4 | 79,8 | 55,3 | 290 |
| Implants | 64,8 | 58,9 | 74,7 | 54,1 | 675 |
| Source initiale de la méthode¹ | | | | | |
| Secteur public | 64,8 | 58,6 | 76,3 | 53,8 | 1 007 |
| Hôpital du gouvernement | 69,5 | 62,7 | 83,4 | 60,9 | 179 |
| Centre de santé du gouvernement | 63,8 | 57,8 | 74,6 | 52,5 | 802 |
| Autre secteur public | (60,2) | (54,2) | (77,5) | (46,5) | 26 |
| Secteur médical privé | 59,6 | 53,7 | 79,5 | 51,8 | 261 |
| Hôpital/clinique privé | 67,4 | 63,5 | 82,7 | 60,7 | 132 |
| Pharmacie | 30,8 | 24,8 | 63,1 | 23,1 | 67 |
| Autre secteur médical privé/ONG | 73,8 | 63,7 | 90,3 | 63,7 | 63 |
| Autre secteur non médical | (20,7) | (10,9) | (40,0) | (10,9) | 43 |
| Boutique | (17,7) | (8,5) | (33,3) | (8,5) | 35 |
| Institution religieuse | * | * | * | * | 2 |
| Amis/parents | * | * | * | * | 5 |
| Autre | (35,6) | (22,9) | (39,7) | (22,9) | 25 |
| Ensemble | 61,8 | 55,4 | 75,1 | 51,5 | 1 335 |

Note : Le tableau n'inclut que les méthodes figurant sur la liste. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

ONG = Organisation Non Gouvernementale

¹ Source au moment où a commencé l'épisode d'utilisation de la méthode actuelle.

Tableau 7.9 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois

Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage d'épisodes discontinués dans les 12 mois, selon la raison de discontinuation et de la méthode, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Méthode | Échec de la méthode | Souhaitait tomber enceinte | Autres raisons liées à la fécondité ¹ | Effets secondaires/ raisons liées à la santé | Souhaitait une méthode plus efficace | Autres raisons liées à la méthode ² | Autres raisons | N'importe quelle raison ³ | A changé pour une autre méthode ⁴ | Nombre d'épisodes d'utilisation ⁵ |
|---------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|--|--|
| DIU | (0,9) | (2,1) | (0,3) | (3,0) | (0,5) | (0,2) | (2,7) | (9,9) | (0,8) | 248 |
| Injectables | 0,1 | 17,6 | 3,4 | 15,7 | 2,8 | 4,8 | 12,1 | 56,5 | 2,6 | 671 |
| Implants | 0,1 | 6,1 | 1,6 | 5,8 | 0,9 | 0,8 | 3,5 | 18,7 | 0,9 | 1 084 |
| Pilule | 2,3 | 15,7 | 3,7 | 10,6 | 3,1 | 4,7 | 8,2 | 48,3 | 3,9 | 561 |
| Condom masculin | 2,0 | 15,2 | 5,3 | 0,0 | 2,1 | 0,8 | 4,7 | 30,2 | 2,4 | 466 |
| Rythme | 3,6 | 14,1 | 2,8 | 0,0 | 3,3 | 1,2 | 2,1 | 27,1 | 1,2 | 542 |
| Retrait | 2,7 | 12,8 | 5,3 | 0,0 | 8,5 | 0,6 | 6,3 | 36,2 | 7,4 | 355 |
| Autre ⁶ | (1,0) | (15,7) | (5,0) | (1,9) | (3,3) | (2,5) | (6,0) | (35,3) | (2,6) | 239 |
| Toutes les méthodes | 1,4 | 12,2 | 3,2 | 5,8 | 2,7 | 2,1 | 5,8 | 33,1 | 2,5 | 4 167 |

Note : Les valeurs sont basées sur des calculs de table de survie en utilisant les informations sur les épisodes d'utilisation qui ont eu lieu 3-62 mois avant l'enquête. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Inclut rapports sexuels peu fréquents /mari absent, difficulté à tomber enceinte /ménopause et dissolution de l'union/séparation

² Inclut difficultés d'accès /trop éloigné, coût trop élevé et utilisation peu pratique

³ Les raisons de la discontinuation sont mutuellement exclusives et leur somme correspond au total figurant dans cette colonne.

⁴ On considère qu'une femme a changé de méthode si elle a utilisé une méthode différente dans le mois qui a suivi la discontinuation ou si elle a donné comme raison de discontinuation qu'elle « souhaitait une méthode plus efficace » et qu'elle a commencé à utiliser une autre méthode dans les deux mois qui ont suivi la discontinuation.

⁵ Tous les épisodes d'utilisation qui ont eu lieu dans les 5 ans ayant précédé l'enquête sont inclus. Les épisodes d'utilisation incluent les épisodes qui ont été discontinués pendant la période d'observation ainsi que les épisodes d'utilisation qui n'ont pas été discontinués durant la période d'observation.

⁶ Y compris la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et retrait, diaphragme, stérilisation féminine, stérilisation masculin, condom féminin, pilule de lendemain, Méthode des Jours Fixes (MJF).

Tableau 7.10. Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives

Répartition (en %) des discontinuations de méthodes contraceptives dans les 5 années ayant précédé l'enquête par raison principale de discontinuation, selon la méthode spécifique, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Raison | DIU | Injectables | Implants | Pilule | Condom masculin | MJF | Autre méthode moderne ¹ | Rythme | Retrait | Autre | Ensemble des méthodes |
|---|-------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
| Est tombée enceinte pendant l'utilisation | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 5,4 | 5,4 | 2,5 | (0,0) | 9,2 | 7,1 | (7,4) | 4,1 |
| Voulait tomber enceinte | 39,7 | 38,6 | 44,7 | 43,9 | 53,6 | 58,3 | (43,8) | 64,7 | 50,2 | (40,1) | 48,0 |
| Mari/partenaire désapprouvait | 1,8 | 5,8 | 4,9 | 2,8 | 6,0 | 0,0 | (5,6) | 1,5 | 6,9 | (4,3) | 4,2 |
| Souhaitait une méthode plus efficace | 4,0 | 5,6 | 5,5 | 7,3 | 7,1 | 3,1 | (7,2) | 7,3 | 13,7 | (13,9) | 7,1 |
| Soucis pour la santé/effets secondaires | 22,9 | 23,3 | 24,3 | 14,8 | 0,2 | 1,9 | (8,9) | 0,0 | 0,0 | (4,2) | 12,7 |
| Manque d'accès/trop loin | 0,0 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | (0,0) | 0,0 | 0,0 | (0,0) | 0,8 |
| Coûte trop cher | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | (0,0) | 0,0 | 0,0 | (0,0) | 0,7 |
| Peu pratique à utiliser | 8,3 | 2,6 | 1,6 | 5,9 | 2,1 | 3,8 | (4,3) | 3,8 | 1,2 | (0,0) | 3,2 |
| Cela dépend de Dieu/fataliste | 6,6 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 0,7 | (0,0) | 0,7 | 0,0 | (0,0) | 1,9 |
| Difficultés pour tomber enceinte/ménopause | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 2,9 | (4,4) | 0,7 | 0,3 | (0,0) | 0,8 |
| Rapports sexuels peu fréquents/mari éloigné | 3,4 | 4,7 | 2,9 | 3,9 | 14,1 | 21,2 | (17,8) | 7,7 | 14,2 | (9,5) | 7,2 |
| Dissolution de l'union/séparation | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | 2,2 | 0,0 | (0,0) | 0,0 | 1,1 | (0,0) | 1,2 |
| Autre | 10,6 | 10,2 | 10,8 | 6,6 | 4,3 | 5,7 | (3,9) | 3,1 | 3,4 | (20,6) | 7,2 |
| Ne sait pas | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | (4,1) | 1,3 | 1,9 | (0,0) | 0,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nombre de discontinuations | 83 | 482 | 467 | 460 | 228 | 71 | (0,0) | 390 | 255 | 29 | 2 514 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

MJF = Méthode des Jours Fixes

¹ Y compris condom féminin, pilule du lendemain, et méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)

Tableau 7.11.1 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Besoins non satisfaits en matière de planification familiale | | Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle) | | Demande totale en planification familiale ¹ | | Efficacité de femmes | Pourcentage de demande satisfaite ² | Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³ |
|--|--|--------------|---|--------------|--|-------|----------------------|--|--|
| | Pour espacer | Pour limiter | Total | Pour espacer | Pour limiter | Total | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-19 | 32,5 | 0,5 | 33,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 39,3 | 16,0 | 13,2 |
| 20-24 | 35,9 | 1,1 | 37,0 | 11,6 | 0,6 | 12,2 | 49,2 | 24,9 | 19,3 |
| 25-29 | 29,5 | 4,1 | 33,6 | 13,5 | 2,1 | 15,6 | 49,3 | 31,7 | 25,2 |
| 30-34 | 22,5 | 10,1 | 32,6 | 13,4 | 5,9 | 19,4 | 52,0 | 37,2 | 30,7 |
| 35-39 | 14,5 | 18,9 | 33,4 | 8,3 | 10,0 | 18,3 | 28,9 | 35,4 | 28,2 |
| 40-44 | 9,3 | 21,4 | 30,7 | 4,4 | 13,8 | 18,3 | 13,7 | 37,4 | 29,6 |
| 45-49 | 3,5 | 15,5 | 19,0 | 1,8 | 9,8 | 11,6 | 30,6 | 37,9 | 30,4 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 21,8 | 13,2 | 35,0 | 17,3 | 9,8 | 27,2 | 39,2 | 43,7 | 30,9 |
| Autres villes | 23,4 | 10,1 | 33,5 | 10,7 | 6,0 | 16,8 | 34,2 | 33,4 | 27,6 |
| Ensemble urbain | 23,2 | 10,4 | 33,7 | 11,6 | 6,5 | 18,1 | 34,8 | 34,9 | 28,1 |
| Rural | 22,4 | 9,0 | 31,4 | 8,9 | 4,9 | 13,8 | 31,3 | 30,6 | 24,3 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 19,2 | 3,2 | 22,4 | 14,2 | 1,5 | 15,7 | 33,3 | 41,2 | 35,5 |
| Atacora | 24,7 | 8,3 | 33,0 | 7,7 | 3,1 | 10,8 | 32,4 | 24,6 | 22,8 |
| Atlantique | 22,8 | 14,8 | 37,5 | 12,1 | 9,2 | 21,4 | 34,9 | 36,3 | 23,4 |
| Borgou | 22,0 | 7,2 | 29,2 | 8,1 | 4,7 | 12,8 | 30,1 | 28,7 | 30,5 |
| Collines | 22,2 | 13,8 | 36,1 | 11,1 | 9,6 | 20,7 | 33,4 | 36,5 | 32,0 |
| Couffo | 29,4 | 8,3 | 37,7 | 4,3 | 1,9 | 6,2 | 33,7 | 14,1 | 10,1 |
| Donga | 28,3 | 4,7 | 33,0 | 4,5 | 1,7 | 6,2 | 32,8 | 15,7 | 15,0 |
| Littoral | 21,8 | 13,2 | 35,0 | 17,3 | 9,8 | 27,2 | 39,2 | 43,7 | 30,9 |
| Mono | 25,0 | 11,0 | 36,1 | 13,2 | 9,9 | 23,2 | 38,3 | 39,1 | 30,4 |
| Ouémé | 20,8 | 12,9 | 33,7 | 12,9 | 8,2 | 21,1 | 33,7 | 38,6 | 27,6 |
| Plateau | 23,9 | 10,4 | 34,3 | 2,8 | 3,7 | 6,5 | 26,7 | 16,0 | 14,0 |
| Zou | 19,6 | 11,6 | 31,2 | 8,9 | 6,9 | 15,8 | 28,5 | 33,6 | 28,3 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucun | 20,7 | 10,4 | 31,1 | 8,2 | 5,0 | 13,1 | 28,9 | 29,7 | 24,3 |
| Primaire | 25,5 | 9,9 | 35,4 | 10,7 | 7,8 | 18,5 | 36,2 | 34,3 | 27,5 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 29,3 | 5,4 | 34,7 | 14,7 | 4,7 | 19,4 | 44,0 | 35,9 | 26,1 |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | 25,0 | 6,1 | 31,0 | 21,5 | 7,6 | 29,2 | 46,5 | 48,5 | 38,6 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 20,7 | 8,1 | 28,8 | 8,1 | 3,2 | 11,3 | 28,8 | 28,2 | 23,4 |
| Second | 23,4 | 9,6 | 32,9 | 7,8 | 4,0 | 11,9 | 31,2 | 26,5 | 22,0 |
| Moyen | 24,0 | 9,7 | 33,7 | 9,4 | 4,7 | 14,1 | 33,4 | 29,5 | 24,9 |
| Quatrième | 23,7 | 9,4 | 33,1 | 10,3 | 6,6 | 16,8 | 34,0 | 33,7 | 25,7 |
| Le plus élevé | 21,8 | 11,1 | 32,9 | 14,2 | 9,1 | 23,3 | 36,0 | 41,4 | 31,9 |
| Ensemble | 22,7 | 9,6 | 32,3 | 10,0 | 5,6 | 15,5 | 32,7 | 32,4 | 25,9 |

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al., 2012.

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

³ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la Méthode des Jours Fixes (MJF), la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

Tableau 7.11.2. Besoins et demande en matière de planification familiale pour l'ensemble des femmes et pour les femmes non en union sexuellement actives

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes de 15-49 ans non en union sexuellement actives, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Besoins non satisfaits en matière de planification familiale | | | | Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle) | | | | Demande totale en planification familiale ¹ | | | | Effectif de femmes | Pourcentage de demande satisfaite ² | Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³ | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | de planification familiale | | Total | | Pour espacer | | Pour limiter | | Total | | Pour espacer | | | | | Pour limiter | |
| | Pour espacer | Pour limiter | Pour espacer | Pour limiter | Pour espacer | Pour limiter | Pour espacer | Pour limiter | Pour espacer | Pour limiter | Pour espacer | Pour limiter | | | | Pour espacer | Pour limiter |
| ENSEMBLE DES FEMMES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 14,6 | 0,3 | 14,9 | 0,1 | 6,7 | 21,2 | 0,4 | 21,5 | 3 350 | 31,0 | 25,8 | | | | | | |
| 20-24 | 28,9 | 0,8 | 29,6 | 0,5 | 15,4 | 43,8 | 1,3 | 45,0 | 2 923 | 34,2 | 27,6 | | | | | | |
| 25-29 | 27,4 | 3,9 | 31,3 | 2,3 | 16,6 | 41,7 | 6,2 | 47,9 | 2 986 | 27,8 | 31,6 | | | | | | |
| 30-34 | 21,5 | 9,7 | 31,1 | 6,1 | 19,3 | 34,7 | 15,7 | 50,5 | 2 202 | 38,3 | 28,6 | | | | | | |
| 35-39 | 13,6 | 17,6 | 31,2 | 9,7 | 17,5 | 21,4 | 27,3 | 48,7 | 1 882 | 35,9 | 31,6 | | | | | | |
| 40-44 | 8,7 | 19,6 | 28,3 | 13,6 | 18,2 | 13,3 | 33,2 | 46,5 | 1 320 | 39,1 | 31,6 | | | | | | |
| 45-49 | 3,1 | 13,2 | 16,3 | 8,6 | 10,4 | 4,9 | 21,8 | 26,7 | 1 265 | 38,9 | 31,6 | | | | | | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colonou | 16,3 | 7,8 | 24,1 | 6,8 | 23,2 | 32,6 | 14,7 | 47,3 | 958 | 49,0 | 36,8 | | | | | | |
| Autres villes | 18,8 | 7,0 | 25,8 | 4,6 | 15,8 | 30,0 | 11,5 | 41,6 | 5 803 | 37,9 | 31,4 | | | | | | |
| Ensemble urbain | 18,5 | 7,1 | 25,6 | 4,9 | 16,8 | 30,4 | 12,0 | 42,4 | 6 761 | 39,7 | 32,2 | | | | | | |
| Rural | 19,5 | 7,0 | 26,4 | 3,9 | 12,6 | 28,2 | 10,9 | 39,1 | 9 167 | 32,3 | 26,1 | | | | | | |
| Département | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 19,4 | 2,8 | 22,2 | 1,4 | 15,2 | 33,2 | 4,1 | 37,4 | 1 878 | 40,7 | 35,7 | | | | | | |
| Atacora | 21,0 | 6,2 | 27,3 | 2,5 | 12,9 | 31,4 | 8,7 | 40,1 | 1 302 | 32,1 | 30,1 | | | | | | |
| Atlantique | 16,6 | 10,1 | 26,7 | 6,9 | 18,5 | 28,2 | 17,0 | 45,2 | 2 037 | 27,2 | 30,1 | | | | | | |
| Borgou | 19,8 | 5,5 | 25,3 | 3,8 | 12,7 | 28,7 | 9,3 | 38,0 | 1 839 | 33,5 | 31,8 | | | | | | |
| Collines | 20,0 | 9,6 | 29,5 | 7,0 | 17,3 | 30,3 | 16,5 | 46,8 | 1 151 | 36,9 | 32,4 | | | | | | |
| Couffo | 22,1 | 5,9 | 28,0 | 4,0 | 17,3 | 26,1 | 7,2 | 33,3 | 1 041 | 16,1 | 12,3 | | | | | | |
| Donga | 25,7 | 3,8 | 29,5 | 1,4 | 5,5 | 29,8 | 5,2 | 35,0 | 881 | 15,7 | 15,1 | | | | | | |
| Littoral | 16,3 | 7,8 | 24,1 | 6,8 | 23,2 | 32,6 | 14,7 | 47,3 | 958 | 49,0 | 36,8 | | | | | | |
| Mono | 18,9 | 7,5 | 26,3 | 7,5 | 22,2 | 33,6 | 15,0 | 48,5 | 759 | 45,8 | 35,8 | | | | | | |
| Ouémé | 16,1 | 8,9 | 25,0 | 5,7 | 17,4 | 27,8 | 14,6 | 42,4 | 1 507 | 41,0 | 28,9 | | | | | | |
| Plateau | 21,0 | 8,2 | 29,2 | 2,7 | 5,6 | 23,9 | 10,9 | 34,8 | 970 | 16,1 | 13,8 | | | | | | |
| Zou | 16,3 | 8,0 | 24,3 | 5,1 | 13,9 | 25,1 | 13,1 | 38,2 | 1 606 | 36,3 | 30,1 | | | | | | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 18,9 | 9,2 | 28,1 | 4,6 | 12,4 | 26,7 | 13,8 | 40,5 | 8 785 | 30,7 | 25,3 | | | | | | |
| Primaire | 20,0 | 6,5 | 26,5 | 5,5 | 14,6 | 29,1 | 12,0 | 41,1 | 3 148 | 35,5 | 29,1 | | | | | | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 19,3 | 2,6 | 21,9 | 2,6 | 15,6 | 32,3 | 5,1 | 37,5 | 2 847 | 41,6 | 31,5 | | | | | | |
| Secondaire 2 nd cycle ou plus | 17,1 | 2,7 | 19,7 | 3,8 | 26,3 | 39,6 | 6,5 | 46,1 | 1 147 | 57,2 | 46,8 | | | | | | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 18,5 | 6,6 | 25,1 | 2,7 | 10,3 | 26,0 | 9,3 | 35,3 | 2 735 | 29,1 | 24,6 | | | | | | |
| Second | 19,8 | 7,4 | 27,2 | 3,3 | 10,9 | 27,5 | 10,7 | 38,1 | 3 030 | 28,7 | 24,2 | | | | | | |
| Moyen | 20,7 | 7,3 | 27,9 | 3,9 | 13,2 | 30,0 | 11,2 | 41,2 | 3 104 | 32,1 | 27,5 | | | | | | |
| Quatrième | 19,6 | 6,8 | 26,4 | 5,0 | 15,8 | 30,4 | 11,8 | 42,2 | 3 405 | 37,4 | 29,2 | | | | | | |
| Le plus élevé | 17,0 | 7,0 | 24,0 | 6,2 | 20,1 | 30,9 | 13,2 | 44,1 | 3 654 | 45,6 | 35,5 | | | | | | |
| Ensemble | 19,1 | 7,0 | 26,1 | 4,3 | 14,4 | 29,1 | 11,4 | 40,5 | 15 928 | 35,6 | 28,8 | | | | | | |

A suivre ...

Tableau 7.11.2—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Besoins non satisfaits en matière de planification familiale | | | | Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle) | | | | Demande totale en planification familiale ¹ | | | | Effectif de femmes | Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³ | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------|
| | Pour espacer | | Pour limiter | | Pour espacer | | Pour limiter | | Pour espacer | | Pour limiter | | | | Total |
| | Total | Pour limiter | Total | Pour limiter | Total | Pour limiter | Total | Pour limiter | Total | Pour limiter | | | | | |
| FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVÉS ⁴ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 64,3 | 1,2 | 65,5 | 22,3 | 0,3 | 22,6 | 86,6 | 1,6 | 88,2 | 377 | 25,7 | 22,1 | | | |
| 20-24 | 41,7 | 0,0 | 41,7 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 78,3 | 0,0 | 78,3 | 273 | 46,7 | 37,6 | | | |
| 25-29 | 28,6 | 3,3 | 31,9 | 34,4 | 2,4 | 36,8 | 63,0 | 5,7 | 68,7 | 101 | 53,5 | 40,0 | | | |
| 30-34 | 26,6 | 8,9 | 35,5 | 25,7 | 10,9 | 36,6 | 52,3 | 19,9 | 72,2 | 49 | 50,8 | 43,3 | | | |
| 35-39 | (24,4) | (19,2) | (43,7) | (7,0) | (8,1) | (15,1) | (31,5) | (27,3) | (58,8) | 36 | (25,7) | (17,9) | | | |
| 40-44 | (18,8) | (22,5) | (41,3) | (1,3) | (19,9) | (21,2) | (20,0) | (42,4) | (62,4) | 32 | (33,9) | (33,9) | | | |
| 45-49 | (16,5) | (34,2) | (50,7) | (0,0) | (16,7) | (16,7) | (16,5) | (50,9) | (67,4) | 24 | (24,8) | (18,8) | | | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 34,4 | 2,6 | 37,0 | 35,4 | 3,3 | 38,7 | 69,9 | 5,9 | 75,7 | 84 | 51,1 | 39,4 | | | |
| Autres villes | 46,2 | 3,3 | 49,6 | 30,8 | 3,1 | 33,8 | 77,0 | 6,4 | 83,4 | 336 | 40,5 | 31,7 | | | |
| Ensemble urbain | 43,9 | 3,2 | 47,1 | 31,7 | 3,1 | 34,8 | 75,6 | 6,3 | 81,9 | 420 | 42,5 | 33,1 | | | |
| Rural | 49,3 | 4,5 | 53,8 | 21,4 | 2,0 | 23,4 | 70,7 | 6,5 | 77,2 | 472 | 30,3 | 26,6 | | | |
| Département | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 55,7 | 1,3 | 57,0 | 30,4 | 0,9 | 31,3 | 86,1 | 2,2 | 88,3 | 119 | 35,5 | 34,3 | | | |
| Atacora | 38,4 | 5,6 | 43,9 | 31,9 | 3,1 | 35,1 | 70,3 | 8,7 | 79,0 | 114 | 44,4 | 44,4 | | | |
| Atlantique | 34,2 | 8,2 | 42,4 | 32,1 | 1,7 | 33,8 | 66,3 | 9,9 | 76,2 | 96 | 44,4 | 26,2 | | | |
| Borgou | 59,6 | 0,0 | 59,6 | 21,6 | 3,7 | 25,3 | 81,2 | 3,7 | 84,9 | 81 | 29,7 | 28,4 | | | |
| Collines | 45,6 | 6,8 | 52,4 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 60,6 | 9,3 | 69,9 | 120 | 25,1 | 21,2 | | | |
| Couffo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | * | * | | | |
| Donga | (67,3) | (0,0) | (67,3) | (12,2) | (0,0) | (12,2) | (79,6) | (0,0) | (79,6) | 30 | (15,4) | (15,4) | | | |
| Littoral | 34,4 | 2,6 | 37,0 | 35,4 | 3,3 | 38,7 | 69,9 | 5,9 | 75,7 | 84 | 51,1 | 39,4 | | | |
| Mono | (39,8) | (0,0) | (39,8) | (57,6) | (0,0) | (57,6) | (97,3) | (0,0) | (97,3) | 31 | (59,2) | (45,4) | | | |
| Ouémé | (50,4) | (1,9) | (52,3) | (24,6) | (4,5) | (29,0) | (75,0) | (6,4) | (81,4) | 61 | (35,7) | (17,8) | | | |
| Plateau | (64,8) | (12,7) | (77,5) | (12,5) | (0,0) | (12,5) | (77,3) | (12,7) | (90,1) | 45 | (13,9) | (10,0) | | | |
| Zou | 43,5 | 2,0 | 45,5 | 23,0 | 4,8 | 27,8 | 66,5 | 6,8 | 73,3 | 95 | 37,9 | 30,6 | | | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 40,3 | 9,8 | 50,1 | 18,8 | 5,5 | 24,4 | 59,1 | 15,3 | 74,5 | 260 | 32,7 | 31,0 | | | |
| Primaire | 47,7 | 2,1 | 49,7 | 18,7 | 2,0 | 20,7 | 66,3 | 4,1 | 70,4 | 210 | 29,4 | 23,7 | | | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 53,8 | 1,3 | 55,1 | 30,1 | 1,2 | 31,3 | 83,9 | 2,5 | 86,4 | 268 | 36,2 | 28,8 | | | |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | 44,0 | 0,9 | 45,0 | 42,5 | 0,2 | 42,7 | 86,5 | 1,2 | 87,7 | 154 | 48,7 | 36,3 | | | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 46,0 | 5,2 | 51,2 | 23,6 | 1,9 | 25,5 | 69,6 | 7,1 | 76,7 | 97 | 33,3 | 31,5 | | | |
| Second | 49,2 | 4,9 | 54,1 | 18,2 | 1,1 | 19,4 | 67,4 | 6,0 | 73,4 | 141 | 26,4 | 24,7 | | | |
| Moyen | 47,3 | 4,0 | 51,3 | 20,4 | 3,6 | 24,1 | 67,7 | 7,7 | 75,4 | 179 | 31,9 | 29,1 | | | |
| Quatrième | 47,6 | 4,3 | 51,9 | 27,7 | 4,2 | 32,0 | 75,4 | 8,5 | 83,9 | 205 | 38,1 | 30,9 | | | |
| Le plus élevé | 44,7 | 2,5 | 47,2 | 34,1 | 1,3 | 35,5 | 78,8 | 3,9 | 82,7 | 271 | 42,9 | 31,1 | | | |
| Ensemble | 46,7 | 3,9 | 50,6 | 26,3 | 2,5 | 28,8 | 73,0 | 6,4 | 79,4 | 893 | 36,2 | 29,8 | | | |

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al., 2012. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

³ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la Méthode des Jours Fixes (MJF), la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

⁴ Femmes qui ont eu des rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête.

Tableau 7.12. Prise de décision concernant la planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans, actuellement en union et utilisatrices actuelles de la planification familiale, répartition (en %) en fonction de la décision d'utiliser la planification familiale ; parmi les femmes actuellement en union qui n'utilisent pas actuellement la planification familiale, répartition (en %) en fonction de la décision de ne pas utiliser la planification familiale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques. EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les femmes actuellement en union qui sont des utilisatrices actuelles de la planification familiale | | | | Parmi les femmes actuellement en union qui ne sont pas des utilisatrices actuelles de la planification familiale | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | Principalement la femme | La femme et le mari/partenaire ensemble | Principalement le mari/partenaire | Autre/ne sait pas/manquant | Principalement la femme | La femme et le mari/partenaire ensemble | Principalement le mari/partenaire | Autre/ne sait pas/manquant | Effectif de femmes | Total | Effectif de femmes | Total |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | (45,3) | (31,5) | (23,3) | (0,0) | 57,8 | 18,3 | 16,1 | 7,8 | 39 | 100,0 | 100,0 | 425 |
| 20-24 | 40,8 | 45,0 | 14,2 | 0,0 | 56,3 | 21,9 | 17,6 | 4,3 | 241 | 100,0 | 100,0 | 1 329 |
| 25-29 | 42,9 | 45,0 | 11,4 | 0,7 | 57,4 | 19,3 | 19,2 | 4,2 | 415 | 100,0 | 100,0 | 1 750 |
| 30-34 | 50,9 | 39,2 | 9,8 | 0,1 | 59,4 | 21,8 | 14,0 | 4,8 | 394 | 100,0 | 100,0 | 1 342 |
| 35-39 | 46,0 | 42,7 | 11,0 | 0,3 | 62,8 | 18,4 | 13,9 | 5,0 | 312 | 100,0 | 100,0 | 1 232 |
| 40-44 | 47,6 | 45,1 | 7,0 | 0,4 | 63,8 | 14,9 | 13,8 | 7,5 | 213 | 100,0 | 100,0 | 888 |
| 45-49 | 53,4 | 38,1 | 8,5 | 0,0 | 62,6 | 19,9 | 8,6 | 9,0 | 118 | 100,0 | 100,0 | 887 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | | | | | |
| 0 | * | * | * | * | 55,3 | 23,3 | 9,9 | 11,5 | 14 | 100,0 | 100,0 | 359 |
| 1-2 | 43,1 | 44,4 | 12,5 | 0,0 | 58,9 | 20,7 | 15,2 | 5,2 | 508 | 100,0 | 100,0 | 2 683 |
| 3-4 | 45,9 | 42,2 | 11,1 | 0,8 | 57,7 | 20,0 | 17,4 | 4,9 | 651 | 100,0 | 100,0 | 2 480 |
| 5+ | 50,1 | 40,5 | 9,3 | 0,0 | 63,5 | 17,0 | 13,7 | 5,7 | 558 | 100,0 | 100,0 | 2 330 |
| Résidence | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 46,6 | 45,6 | 7,6 | 0,2 | 57,2 | 27,2 | 11,9 | 3,8 | 150 | 100,0 | 100,0 | 341 |
| Autres villes | 42,7 | 49,0 | 8,1 | 0,2 | 61,8 | 21,2 | 12,4 | 4,6 | 652 | 100,0 | 100,0 | 2 703 |
| Ensemble urbain | 43,4 | 48,3 | 8,0 | 0,2 | 61,3 | 21,8 | 12,4 | 4,5 | 801 | 100,0 | 100,0 | 3 043 |
| Rural | 48,8 | 37,4 | 13,4 | 0,3 | 58,7 | 18,1 | 17,0 | 6,2 | 931 | 100,0 | 100,0 | 4 809 |
| Département | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 59,1 | 21,1 | 19,8 | 0,0 | 54,7 | 12,6 | 32,3 | 0,4 | 243 | 100,0 | 100,0 | 1 098 |
| Atacora | 44,3 | 46,0 | 8,2 | 1,4 | 65,8 | 8,0 | 14,8 | 11,5 | 96 | 100,0 | 100,0 | 682 |
| Atlantique | 36,5 | 52,8 | 10,1 | 0,6 | 62,9 | 20,8 | 9,5 | 6,8 | 280 | 100,0 | 100,0 | 852 |
| Borgou | 57,1 | 30,3 | 12,2 | 0,4 | 68,4 | 13,4 | 11,0 | 7,2 | 177 | 100,0 | 100,0 | 970 |
| Collines | 31,7 | 52,9 | 15,4 | 0,0 | 52,6 | 25,2 | 20,0 | 2,2 | 153 | 100,0 | 100,0 | 480 |
| Couffo | (22,3) | (65,3) | (12,4) | (0,0) | 37,2 | 38,2 | 14,9 | 9,7 | 46 | 100,0 | 100,0 | 577 |
| Donga | 61,5 | 32,4 | 6,1 | 0,0 | 67,9 | 10,8 | 15,7 | 5,6 | 44 | 100,0 | 100,0 | 557 |
| Littoral | 46,6 | 45,6 | 7,6 | 0,2 | 57,2 | 27,2 | 11,9 | 3,8 | 150 | 100,0 | 100,0 | 341 |
| Mono | 38,1 | 53,0 | 8,9 | 0,0 | 60,6 | 26,4 | 10,4 | 2,6 | 119 | 100,0 | 100,0 | 323 |
| Ouémé | 57,2 | 35,0 | 7,3 | 0,5 | 75,7 | 19,2 | 3,7 | 1,4 | 208 | 100,0 | 100,0 | 672 |
| Plateau | (39,7) | (60,3) | (0,0) | (0,0) | 53,2 | 32,1 | 7,5 | 7,1 | 46 | 100,0 | 100,0 | 547 |
| Zou | 44,2 | 48,0 | 7,8 | 0,0 | 53,9 | 19,7 | 18,7 | 7,7 | 170 | 100,0 | 100,0 | 755 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 48,1 | 39,0 | 12,5 | 0,4 | 59,9 | 17,6 | 16,5 | 6,0 | 974 | 100,0 | 100,0 | 5 444 |
| Primaire | 45,4 | 44,9 | 9,5 | 0,3 | 59,5 | 22,3 | 13,2 | 5,0 | 367 | 100,0 | 100,0 | 1 323 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 44,4 | 47,2 | 8,4 | 0,0 | 61,0 | 23,3 | 11,2 | 4,5 | 251 | 100,0 | 100,0 | 818 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 40,0 | 51,8 | 8,1 | 0,0 | 53,8 | 32,9 | 10,5 | 2,7 | 140 | 100,0 | 100,0 | 268 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 58,1 | 28,8 | 12,4 | 0,7 | 59,4 | 17,1 | 16,6 | 6,9 | 244 | 100,0 | 100,0 | 1 622 |
| Second | 46,9 | 42,0 | 10,4 | 0,6 | 57,7 | 16,6 | 19,7 | 5,9 | 263 | 100,0 | 100,0 | 1 638 |
| Moyen | 48,0 | 38,1 | 13,9 | 0,1 | 59,3 | 19,5 | 15,7 | 5,5 | 315 | 100,0 | 100,0 | 1 587 |
| Quatrième | 46,0 | 42,8 | 10,8 | 0,4 | 61,5 | 39,2 | 14,1 | 4,9 | 392 | 100,0 | 100,0 | 1 590 |
| Le plus élevé | 39,8 | 51,6 | 8,7 | 0,0 | 60,8 | 25,7 | 9,1 | 4,3 | 517 | 100,0 | 100,0 | 1 416 |
| Ensemble | 46,3 | 42,5 | 10,9 | 0,3 | 59,7 | 19,5 | 15,2 | 5,5 | 1 732 | 100,0 | 100,0 | 7 853 |

Note : Dans ce tableau, les femmes qui sont actuellement enceintes sont exclues. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 7.13 Utilisation future de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union qui n'utilisent pas de méthode contraceptive par intention d'utiliser, selon le nombre d'enfants vivants, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Intention d'utiliser dans le futur | Nombre d'enfants vivants ¹ | | | | | Ensemble |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| A l'intention d'utiliser | 29,4 | 38,6 | 36,4 | 38,8 | 33,5 | 35,7 |
| Pas sûre | 12,7 | 13,3 | 11,8 | 9,6 | 8,3 | 10,2 |
| N'a pas l'intention d'utiliser | 57,9 | 48,1 | 51,8 | 51,6 | 58,2 | 54,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de femmes | 359 | 1 614 | 1 712 | 1 617 | 4 134 | 9 436 |

¹ Y compris la grossesse actuelle

Tableau 7.14.1—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Homme | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|-------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | Femme | | | | | Homme | | | | | | | | | | | | | |
| | Radio | Télé- vision | Jour- naux/ maga- zines | Télé- phone port- able | Pros- pectus/ bro- chure | Animation cultur- elle/édu- cative | Lieu de culte (église/ mos- quée) | Aucun de ces médias | Effectif de femmes | Radio | Télé- vision | Jour- naux/ maga- zines | Télé- phone port- able | Affiche | Pros- pectus/ bro- chure | Animation cultur- elle/édu- cative | Lieu de culte (église/ mos- quée) | Aucun de ces médias | Effectif d'hom- mes |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 32,7 | 4,2 | 1,9 | 1,8 | 10,3 | 7,5 | 10,5 | 5,7 | 2 735 | 26,1 | 4,7 | 2,2 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 9,9 | 8,0 | 63,0 | 1 248 |
| Second | 37,2 | 7,0 | 3,7 | 3,4 | 11,6 | 7,9 | 13,6 | 7,7 | 3 030 | 36,9 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 6,7 | 4,0 | 10,1 | 8,5 | 54,7 | 1 315 |
| Moyen | 44,2 | 10,8 | 4,9 | 4,1 | 13,8 | 8,1 | 16,1 | 9,8 | 3 104 | 42,3 | 10,9 | 5,3 | 3,7 | 10,2 | 4,6 | 9,9 | 8,5 | 47,1 | 1 282 |
| Quatrième | 45,8 | 20,5 | 9,3 | 6,8 | 17,2 | 9,9 | 18,5 | 8,4 | 3 405 | 47,9 | 19,7 | 6,7 | 5,1 | 14,2 | 7,8 | 10,3 | 9,1 | 40,8 | 1 317 |
| Le plus élevé | 50,4 | 44,8 | 20,2 | 14,6 | 30,9 | 18,4 | 26,3 | 18,7 | 3 654 | 50,9 | 38,7 | 18,1 | 9,5 | 29,1 | 19,5 | 15,3 | 11,1 | 32,9 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 42,7 | 18,8 | 8,6 | 6,5 | 17,4 | 10,7 | 17,5 | 11,5 | 15 928 | 41,4 | 17,5 | 7,7 | 4,9 | 13,4 | 8,1 | 11,3 | 9,1 | 47,0 | 6 727 |
| 50-64 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 52,1 | 18,6 | 7,9 | 3,6 | 10,0 | 7,1 | 11,4 | 11,3 | 41,3 | 868 |
| Ensemble 15-64 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 42,6 | 17,7 | 7,7 | 4,8 | 13,0 | 8,0 | 11,3 | 9,4 | 46,4 | 7 595 |

na = Non applicable

Tableau 7.14.2 Acceptable de parler de la planification familiale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que c'est acceptable de parler de la planification familiale par méthode d'annonce, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | | | | | | | Effectif de femmes |
|--|-------|------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| | Radio | Télévision | Journaux/magazines | Téléphone portable | Affiche | Prospectus/brochure | Animation culturelle/éducative | Lieu de culte (église/mosquée) | A l'école | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 78,2 | 81,4 | 79,8 | 76,6 | 15,6 | 11,4 | 14,7 | 5,5 | 19,8 | 3 350 |
| 20-24 | 84,1 | 87,4 | 85,1 | 81,9 | 21,3 | 13,2 | 19,3 | 6,5 | 14,7 | 2 923 |
| 25-29 | 86,1 | 88,5 | 86,3 | 83,4 | 18,1 | 11,1 | 18,2 | 7,0 | 8,5 | 2 986 |
| 30-34 | 85,4 | 87,9 | 86,3 | 82,7 | 20,0 | 11,2 | 20,3 | 7,5 | 8,6 | 2 202 |
| 35-39 | 83,8 | 86,6 | 84,8 | 81,3 | 16,9 | 8,7 | 18,1 | 7,5 | 7,5 | 1 882 |
| 40-44 | 84,0 | 86,2 | 84,3 | 80,4 | 13,5 | 7,7 | 16,3 | 7,1 | 6,2 | 1 320 |
| 45-49 | 81,2 | 84,7 | 82,5 | 79,9 | 12,1 | 7,6 | 14,7 | 6,8 | 6,3 | 1 265 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 87,0 | 90,0 | 88,3 | 85,7 | 36,0 | 15,9 | 22,7 | 13,1 | 19,3 | 958 |
| Autres villes | 83,8 | 85,9 | 83,8 | 81,0 | 21,2 | 13,4 | 21,8 | 7,1 | 13,1 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 84,2 | 86,5 | 84,4 | 81,7 | 23,3 | 13,8 | 22,0 | 8,0 | 14,0 | 6 761 |
| Rural | 82,4 | 85,6 | 83,8 | 80,2 | 13,1 | 8,4 | 14,2 | 5,8 | 9,7 | 9 167 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 83,7 | 96,4 | 97,4 | 95,0 | 22,1 | 19,4 | 2,9 | 1,6 | 6,7 | 1 878 |
| Atacora | 84,5 | 86,1 | 84,8 | 82,3 | 6,1 | 2,9 | 3,6 | 1,0 | 6,7 | 1 302 |
| Atlantique | 89,2 | 89,7 | 87,7 | 85,0 | 19,1 | 8,7 | 15,6 | 7,7 | 10,3 | 2 037 |
| Borgou | 83,9 | 85,1 | 82,3 | 74,8 | 25,2 | 18,9 | 31,9 | 6,9 | 16,6 | 1 839 |
| Collines | 84,9 | 85,7 | 82,8 | 79,2 | 17,3 | 11,7 | 13,8 | 13,7 | 16,2 | 1 151 |
| Couffo | 70,3 | 72,7 | 71,5 | 69,9 | 10,2 | 8,4 | 28,5 | 5,2 | 8,1 | 1 041 |
| Donga | 61,2 | 62,8 | 59,6 | 57,2 | 26,9 | 6,1 | 21,2 | 6,8 | 10,8 | 881 |
| Littoral | 87,0 | 90,0 | 88,3 | 85,7 | 36,0 | 15,9 | 22,7 | 13,1 | 19,3 | 958 |
| Mono | 81,2 | 84,3 | 83,6 | 81,0 | 13,6 | 11,2 | 15,5 | 10,6 | 13,9 | 759 |
| Ouémé | 89,5 | 90,3 | 86,5 | 81,0 | 8,9 | 8,2 | 16,9 | 3,6 | 6,5 | 1 507 |
| Plateau | 89,0 | 89,2 | 88,8 | 88,3 | 7,4 | 6,2 | 18,7 | 6,1 | 8,2 | 970 |
| Zou | 81,1 | 84,2 | 80,3 | 78,2 | 14,5 | 5,2 | 23,1 | 9,3 | 17,2 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucun | 82,0 | 85,7 | 83,6 | 79,9 | 11,5 | 6,7 | 13,6 | 4,7 | 5,0 | 8 785 |
| Primaire | 81,8 | 83,5 | 81,3 | 78,4 | 14,4 | 7,0 | 17,6 | 6,8 | 8,0 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 84,7 | 86,9 | 85,1 | 82,5 | 27,1 | 18,5 | 23,6 | 9,9 | 25,8 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 91,5 | 92,9 | 92,4 | 90,3 | 47,3 | 32,0 | 31,8 | 14,1 | 35,7 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 81,1 | 84,5 | 82,8 | 78,6 | 10,3 | 7,5 | 10,5 | 3,5 | 5,7 | 2 735 |
| Second | 80,2 | 84,7 | 82,4 | 78,8 | 11,6 | 7,9 | 13,6 | 4,8 | 7,7 | 3 030 |
| Moyen | 82,0 | 84,6 | 82,9 | 79,9 | 13,8 | 8,1 | 16,1 | 6,3 | 9,8 | 3 104 |
| Quatrième | 84,2 | 86,7 | 84,3 | 81,1 | 17,2 | 9,9 | 18,5 | 8,4 | 13,6 | 3 405 |
| Le plus élevé | 87,0 | 88,9 | 87,2 | 84,7 | 30,9 | 18,4 | 26,3 | 9,5 | 18,7 | 3 654 |
| Ensemble 15-49 | 83,2 | 86,0 | 84,1 | 80,8 | 17,4 | 10,7 | 17,5 | 6,7 | 11,5 | 15 928 |

Tableau 7.15 Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans non utilisatrices de la contraception, pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois, a reçu la visite d'un agent de terrain avec qui elles ont parlé de planification familiale, pourcentage qui s'est rendu dans un établissement de santé et a parlé de planification familiale, pourcentage qui s'est rendu dans un établissement de santé et n'a pas parlé de planification familiale et pourcentage qui n'a pas parlé de planification familiale, que ce soit avec un agent de terrain ou dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristiques sociodémographiques | Pourcentage de femmes ayant reçu la visite d'un agent de terrain avec qui elles ont parlé de planification familiale | Pourcentage de femmes qui se sont rendues dans un établissement de santé au cours des 12 derniers mois et qui : | | Pourcentage de femmes n'ayant pas parlé de planification familiale, ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé | Effectif de femmes |
|--|--|---|--|--|--------------------|
| | | ont parlé de planification familiale | N'ont pas parlé de planification familiale | | |
| Groupe d'âges | | | | | |
| 15-19 | 5,7 | 6,2 | 14,4 | 90,9 | 3 126 |
| 20-24 | 8,1 | 16,8 | 30,0 | 79,9 | 2 473 |
| 25-29 | 10,0 | 19,5 | 31,8 | 76,0 | 2 490 |
| 30-34 | 9,8 | 19,8 | 31,2 | 76,2 | 1 776 |
| 35-39 | 9,0 | 17,6 | 25,6 | 78,2 | 1 554 |
| 40-44 | 9,8 | 11,5 | 23,4 | 83,2 | 1 080 |
| 45-49 | 8,0 | 7,6 | 20,3 | 88,3 | 1 133 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 7,6 | 16,6 | 24,4 | 81,0 | 736 |
| Autres villes | 6,6 | 13,4 | 25,1 | 83,1 | 4 888 |
| Ensemble urbain | 6,7 | 13,8 | 25,0 | 82,8 | 5 624 |
| Rural | 9,5 | 14,4 | 25,1 | 81,4 | 8 009 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 17,2 | 20,2 | 18,3 | 75,7 | 1 592 |
| Atacora | 0,7 | 11,0 | 22,7 | 88,5 | 1 134 |
| Atlantique | 5,3 | 11,5 | 31,9 | 84,7 | 1 661 |
| Borgou | 7,3 | 17,2 | 21,9 | 81,3 | 1 605 |
| Collines | 12,2 | 11,3 | 28,5 | 79,6 | 952 |
| Couffo | 7,0 | 12,0 | 26,5 | 83,0 | 985 |
| Donga | 4,3 | 8,2 | 31,9 | 89,0 | 833 |
| Littoral | 7,6 | 16,6 | 24,4 | 81,0 | 736 |
| Mono | 9,7 | 7,5 | 27,5 | 85,6 | 590 |
| Ouémé | 1,9 | 9,4 | 26,6 | 89,3 | 1 245 |
| Plateau | 18,2 | 19,1 | 21,3 | 71,9 | 915 |
| Zou | 9,0 | 19,1 | 23,1 | 77,2 | 1 383 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 9,4 | 14,9 | 24,8 | 81,2 | 7 694 |
| Primaire | 7,1 | 14,0 | 26,4 | 82,0 | 2 690 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 7,4 | 12,2 | 22,8 | 84,0 | 2 403 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 4,9 | 13,8 | 29,6 | 83,6 | 845 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 7,9 | 12,6 | 19,0 | 84,3 | 2 454 |
| Second | 10,4 | 14,5 | 24,8 | 81,0 | 2 699 |
| Moyen | 8,1 | 13,9 | 26,1 | 81,8 | 2 693 |
| Quatrième | 9,5 | 14,8 | 27,3 | 80,4 | 2 867 |
| Le plus élevé | 5,8 | 14,7 | 27,2 | 82,6 | 2 919 |
| Ensemble | 8,3 | 14,2 | 25,1 | 82,0 | 13 632 |

Résultats clés

- **Couverture en soins prénatals** : Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les cinq années ayant précédé l'enquête, 83 % ont reçu, pour la naissance la plus récente, des soins prénatals dispensés par un prestataire qualifié. En outre, un peu plus de la moitié (52 %) des femmes ont effectué au moins quatre visites prénatales et dans 51 % des cas, la première visite prénatale a eu lieu au premier trimestre de la grossesse.
- **Composants des soins prénatals** : La mesure du poids est l'examen le plus fréquemment effectué pendant les visites prénatales (99 %). Seulement, 49 % des femmes ont effectué une échographique pendant les visites prénatales.
- **Protection contre le tétanos néonatal** : Pour 71 % des femmes de 15-49 ans, la dernière naissance a été protégée contre le tétanos néonatal.
- **Lieu et assistance à l'accouchement** : Parmi les naissances vivantes des cinq années avant l'enquête, plus de quatre sur cinq (84 %) ont eu lieu dans un établissement de santé et 15 % à la maison. En outre, 78 % des naissances se sont déroulées avec l'assistance de personnel qualifié.
- **Soins postnatals de la mère** : Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des deux années avant l'enquête, un peu plus de six sur dix (62 %) ont reçu des soins postnatals administrés par du personnel qualifié dans les deux jours qui ont suivi la naissance. Par contre, 35 % n'ont reçu aucun soin postnatal au cours des deux jours après l'accouchement.
- **Soins postnatals du nouveau-né** : Parmi les naissances ayant eu lieu au cours des deux années avant l'enquête, 64 % ont bénéficié de soins postnatals dans les deux premiers jours. Un peu moins du tiers (29 %) n'a reçu aucun examen postnatal.

La Santé de la reproduction est un domaine prioritaire pour notre État qui garantit l'accès à des services de qualité. Les soins de santé durant la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement sont importants pour la survie et le bien-être de la mère et de l'enfant. Ils constituent de ce fait des services prioritaires dans la lutte pour la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales.

Le Gouvernement du Bénin met tout en œuvre par des interventions-clés et efficaces afin d'améliorer la santé maternelle et celle du nouveau-né par le biais de sa Direction de la Santé et de la Mère (DSME), l'Agence Nationale de gratuité de la Césarienne (ANGC) et autres structures qui ont pour mission de veiller

à l'amélioration de la santé de la Mère et de l'Enfant. En témoignent les programmes de gratuité de la césarienne, les interventions des Soins Obstétricaux et Néonataux d'urgences (SONU), de la Planification Familiale (PF), des Audits de décès maternels et néonataux, la Prise en charge Intégrée des Maladies de l'Enfance (PCIME).

Ce chapitre présente certains indicateurs actuels de santé maternelle et néonatale. En outre, la comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes permet de retracer les tendances de ces indicateurs et, par conséquent, d'évaluer aussi l'impact des politiques et programmes mis en œuvre.

8.1 COUVERTURE ET CONTENU DES SOINS PRENATALS

8.1.1 Prestataires qualifiés

Soins prénatals par un prestataire qualifié

Soins reçus durant la grossesse dispensés par des prestataires qualifiés, comme les médecins, les infirmières/sages-femmes.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Au Bénin, 83 % des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années avant l'enquête ont reçu des soins prénatals, dispensés par du personnel qualifié. Dans 79 % des cas, ce sont les infirmières/sages-femmes qui ont fourni ces soins prénatals et dans une moindre mesure (4 %), ce sont les médecins. Toutefois, on constate que du personnel non qualifié, comme les aides-soignantes (5 %), continue d'offrir des soins prénatals. En outre, 11 % des femmes n'ont reçu aucun soin prénatal (**Tableau 8.1**).

Tendances : La comparaison des résultats avec les enquêtes précédentes ne fait pas apparaître d'augmentation de la couverture en soins prénatals : en effet, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié est passé de 87 % en 2001 à 83 % en 2017-2018. En outre, le pourcentage de femmes ayant effectué, au moins, quatre visites prénatales diminue depuis 2001, passant de 62 % en 2001 à 52 % en 2017-2018. Par contre, dans la même période, le pourcentage de femmes qui ont effectué leur première visite à moins de 4 mois de grossesse a augmenté, passant de 37 % à 51 % (**Graphique 8.1**).

Graphique 8.1 Tendances des couvertures en soins prénatals

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années précédant l'enquête (pour la naissance la plus récente)



Variations par caractéristique

- La couverture en soins prénatals varie selon certaines caractéristiques sociodémographiques comme la résidence, le rang de naissance de l'enfant, le niveau d'instruction et le niveau de vie du ménage. Par rapport au rang de naissance, on constate que le pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals par du personnel qualifié diminue avec le rang de naissance de l'enfant, variant de 86 % pour les naissances de rang 1 à 80 % pour celles de rangs six et plus.

- La couverture en soins prénatals est meilleure en milieu urbain que rural (90 % contre 79 %). C'est à Cotonou que le pourcentage de femmes ayant eu des soins prénatals est le plus élevé (95 %). Par comparaison, en milieu rural, 14 % des femmes n'ont eu aucun suivi prénatal.
- Les résultats par département montrent que le pourcentage de femmes qui ont reçu des soins prénatals varie de 97 % dans le Zou à 57 % dans l'Alibori, qui enregistre la couverture la plus faible.
- Le suivi prénatal varie en fonction du niveau d'instruction des femmes : de 78 % parmi les femmes sans niveau d'instruction, le pourcentage ayant reçu des soins prénatals passe à 92 % parmi celles ayant le niveau primaire et à 94 % parmi celles ayant le niveau secondaire 1^{er} cycle.
- La couverture en soins prénatals augmente du quintile de bien-être le plus bas au plus élevé, variant de 64 % à 96 %.

8.1.2 Stade de la grossesse et nombre de visites prénatales

L'OMS recommande à chaque femme enceinte de faire au moins quatre visites prénatales et d'effectuer la première dans le premier trimestre de la grossesse. Au Bénin, la proportion de femmes enceintes qui ont eu au moins quatre visites prénatales est de 52 %. Cette proportion varie selon le milieu de résidence. Elle est plus élevée en milieu urbain (59 %) qu'en milieu rural (48 %). De même, en milieu rural, le pourcentage de femmes qui n'ont effectué aucun suivi prénatal est plus de deux fois plus élevé qu'en milieu urbain (14 % contre 6 %).

En outre, seulement une femme sur deux (51%) a effectué sa première visite prénatale au cours du premier trimestre de la grossesse. En milieu urbain, ce pourcentage s'établit à 57 % contre 46 % en milieu rural. Dans 10 % des cas, les femmes effectuent tardivement, c'est-à-dire à 6-7 mois de grossesse, leur première visite. Ce pourcentage varie de 9 % en milieu urbain à 11 % en milieu rural (**Tableau 8.2**).

8.2 COMPOSANTES DES VISITES PRENATALES

La prise de certains médicaments et des examens médicaux sont indispensables pour un bon suivi des femmes pendant la grossesse. Au cours de l'EDSB-V de 2017-2018, on a demandé aux femmes si, pendant leur grossesse, elles avaient pris certains médicaments et effectué certains examens.


Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, le pourcentage ayant pris du fer sous forme de comprimés ou de sirop est de 85 %.

Dans 65 % des cas, les femmes ont pris des médicaments contre les parasites intestinaux.

Par ailleurs, plus de 9 femmes sur 10 ont effectué les examens suivants au cours des consultations prénatales: la mesure du poids (99 %), la palpation à l'abdomen et la mesure de la tension artérielle (98 % pour chacun), la mesure de la taille (97 %), le prélèvement d'urine (94 %) et le prélèvement de sang (89). Seulement 1 femme sur 2 a reçu un conseil nutritionnel (53 %) et a effectué une échographie (49 %) (**Tableau 8.3 et Graphique 8.2**).

Graphique 8.2 Composants des soins prénatals

Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente, pourcentage ayant effectué certains examens



Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage de femmes ayant reçu des suppléments de fer n'a pratiquement pas varié (84 % contre 85 %). Par contre, on note une amélioration en ce qui concerne la réalisation des autres examens médicaux : par exemple, le pourcentage de femmes ayant effectué un prélèvement urinaire est passé de 83 % en 2001 à 92 % en 2006 et à 94 % en 2017-2018 ; de même, le pourcentage de femmes ayant eu un prélèvement sanguin est passé, dans la période, de 29 % à 40 % et à 89 %.

Variations par caractéristique

- La proportion de femmes ayant pris du fer au cours de la grossesse varie de 90 % en milieu urbain à 81 % en milieu rural (**Tableau 8.3**).
- L'administration de fer aux femmes pendant la grossesse est généralisée au Bénin. Avec un pourcentage de 63 %, c'est le département du Borgou qui enregistre la couverture en fer la plus faible ; à l'opposé, c'est dans le département de l'Atlantique que ce pourcentage est le plus élevé (98 %).
- Le pourcentage de femmes ayant pris des médicaments contre les parasites intestinaux varie selon le milieu de résidence, de 73 % en milieu urbain à 59 % en milieu rural.
- La prise des médicaments contre les parasites intestinaux varie aussi en fonction du niveau d'instruction et du quintile de bien-être, passant de 58 % parmi les femmes sans niveau d'instruction à 85 % parmi les femmes qui ont le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et de 41 % dans le quintile le plus bas à 88 % dans le plus élevé.

8.3 PROTECTION CONTRE LE TÉTANOS NEONATAL

Protection contre le tétanos néonatal

Le nombre d'injections antitétaniques nécessaires pour éviter que le nouveau-né contracte le tétanos dépend des vaccinations reçues par la mère. Une naissance est protégée contre le tétanos néonatal si la mère a reçu l'une des combinaisons suivantes :

- Deux injections de vaccin antitétanique au cours de la grossesse ou
- Deux injections ou plus, la troisième ayant été effectuée dans les 3 années avant la naissance ou
- Trois injections ou plus, la dernière ayant été effectuée dans les 5 années avant la naissance ou
- Quatre injections ou plus, la dernière ayant été effectuée dans les 10 années avant la naissance ou
- Cinq injections ou plus à n'importe quel moment avant la naissance.

Échantillon : Dernières naissances vivantes des femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Le tétanos néonatal est une cause majeure de décès prématuré chez les enfants dans de nombreux pays en développement. Il est souvent la conséquence d'un manque d'asepsie durant l'accouchement. La protection contre le tétanos néonatal est de 71 % pour les naissances les plus récentes des cinq années ayant précédé l'enquête de 2017-2018.

Une femme sur deux (51 %) a reçu deux injections antitétaniques durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente (**Tableau 8.4**).

Tendances : Entre 2006 et 2011-2012, la couverture antitétanique s'est améliorée, le pourcentage de femmes dont la dernière naissance vivante est protégée contre le tétanos néonatal a augmenté, passant de 60 % à 70 %. Cette tendance à l'amélioration ne s'est pas poursuivie puisque la couverture se situe toujours autour de 70 % (71 % en 2017-2018).

Variations par caractéristique

- La couverture vaccinale varie avec l'âge des femmes à la naissance : de 61 % parmi celles qui avaient moins de 20 ans à la naissance de l'enfant, elle atteint 72 % dans les groupes d'âges 20-34 ans et 35-49 ans.
- La couverture antitétanique néonatale est nettement plus faible dans les départements de l'Atacora (53 %) et de Alibori (56 %) que dans le département du Mono (90 %) où elle enregistre son niveau le plus élevé.
- La couverture contre le tétanos néonatal augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 67 % parmi celles sans aucun niveau d'instruction à 83 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- On note aussi des variations en fonction du bien-être économique. Dans le quintile le plus bas, pour 52 % des femmes, la dernière naissance était protégée contre le tétanos néonatal contre 83 % dans le quintile le plus élevé.

8.4 SERVICES D'ACCOUCHEMENT

8.4.1 Accouchement en établissement de santé

Accouchements en établissement de santé

Accouchements qui se déroulent dans un établissement de santé.

Échantillon : Toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête


L'amélioration de la prestation des services de santé maternelle est importante pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Cependant, l'accès aux établissements de santé dans les zones rurales est plus difficile que dans les zones urbaines en raison de la distance, de l'inaccessibilité et du manque d'installations appropriées. Globalement, pour 15 % des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années précédant l'enquête, les mères ont accouché à la maison. A l'opposé, 84 % des naissances ont eu lieu dans un établissement de santé, en majorité dans les établissements du secteur public (70 % contre 14 % dans le secteur privé) (**Tableau 8.5**).

Bien qu'au Bénin, des efforts aient été faits pour promouvoir l'accouchement dans un établissement de santé, l'accouchement à domicile demeure encore assez fréquent dans certains départements tels que le Borgou (38 %), l'Atacora (27 %), l'Alibori (27 %), la Donga (20 %) et le Couffo (13 %).

Tendances : La comparaison des résultats avec ceux de l'EDSB-II de 2001 montre que la proportion de naissances qui ont eu lieu dans un établissement de santé a augmenté, de 76 % à 84 %, et les accouchements à la maison sont devenus moins fréquents passant de 23 % en 2001 à 15 % en 2017-2018 (**Graphique 8.3**). Cette diminution a concerné les deux milieux de résidence puisque, en milieu urbain, le pourcentage de naissances qui ont eu lieu à la maison est passé de 15 % en 2001 à 9 % en 2017-2018 et, en milieu rural, de 26 % à 18 % dans la même période.

Graphique 8.3 Lieu d'accouchement : tendances

Pourcentage de naissances vivantes des 5 années avant l'enquête




Variations par caractéristique

- La proportion de naissances qui ont eu lieu dans un établissement de santé diminue avec le rang de naissance, de 90 % pour le rang 1 à 76 % pour les rangs 6 ou plus. Parmi les naissances qui n'ont bénéficié d'aucune visite prénatale, seulement 26 % ont eu lieu dans un établissement de santé contre 96 % quand la mère a effectué au moins quatre visites prénatales.
- La proportion de naissances ayant eu lieu à la maison est plus élevée en milieu rural (18 %) qu'en milieu urbain (9 %).
- Dans les départements du Littoral et de l'Ouémé, la quasi-totalité des naissances s'est déroulée dans un établissement de santé (99 % dans les deux cas). Par contre, dans le département du Borgou, cette proportion est nettement plus faible (61 %) (**Graphique 8.4**).
- Le pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé varie selon le niveau d'instruction de la mère, de 78 % chez les femmes sans niveau d'instruction à 99 % chez celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- Le pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé varie aussi selon le quintile de bien-être économique, passant de 61 % dans le quintile le plus bas à 99 % dans le plus élevé (**Graphique 8.5**).


Graphique 8.4 Naissances dans un établissement de santé par département

Pourcentage de naissances vivantes des 5 années avant l'enquête qui se sont déroulées dans un établissement de santé



Graphique 8.5 Naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé par bien-être économique du ménage

Pourcentage de naissances vivantes des 5 années avant l'enquête qui se sont déroulées dans un établissement de santé



8.4.2 Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié

Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié

Naissances dont l'accouchement s'est déroulé avec l'assistance de médecins et d'infirmières/sages-femmes.

Échantillon : Toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête


Au Bénin, 78 % des naissances ont été assistées par un prestataire qualifié et formé. Dans la majorité des cas (72 %), ce sont les infirmières/sages-femmes qui ont assisté les femmes lors de l'accouchement (suivies des médecins (6 %) et des aides-soignantes et des accoucheuses traditionnelles (3 % pour chacun) (Tableau 8.6 et Graphique 8.6).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de naissances des cinq dernières années dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié et formé varie entre le milieu rural et le milieu urbain. En milieu urbain, 85 % ont été assistées par un prestataire qualifié contre 74 % en milieu rural.
- Les résultats selon les départements mettent en évidence des disparités importantes. En effet, dans les départements de l'Ouémé (98 %) et l'Atlantique (94 %), les pourcentages de femmes ayant bénéficié d'une assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié sont relativement élevés, tandis que dans les départements de l'Alibori (48 %) et du Borgou (60 %), les pourcentages sont plus bas.
- Considérant le niveau d'instruction des femmes, les résultats montrent que plus le niveau d'instruction augmente, plus la femme a tendance à accoucher avec l'assistance de personnel qualifié. Les proportions de naissances assistées par du personnel qualifié chez les femmes sans niveau d'instruction est de 72 % contre 93 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d ou plus.
- La proportion de naissances dont l'accouchement s'est déroulé avec l'assistance de personnel qualifié augmente, du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 55 % à 95 % (Graphique 8.7).


Graphique 8.6 Assistance à l'accouchement

Répartition (en %) des naissances des 5 années avant l'enquête



Graphique 8.7 Assistance à l'accouchement par du personnel qualifié par bien-être économique du ménage

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années avant l'enquête dont l'accouchement a été assisté par du personnel qualifié



8.4.3 Accouchement par césarienne

Les accouchements par césarienne peuvent réduire la mortalité maternelle et néonatale et éviter des complications telles que la fistule obstétricale. Au Bénin, seulement 5 % des naissances des cinq dernières années ont eu lieu par césarienne : 2 % ont été décidées avant le début du travail et 3 % après le début du travail (Tableau 8.7).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage de naissances par césarienne a peu changé, variant de 4 % à 5 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant eu une césarienne tend à augmenter avec l'âge à la naissance, variant de 4 % parmi celles de moins de 20 ans à 6 % parmi celles de 35-49 ans.
- Le pourcentage des naissances accouchées par césarienne tend à diminuer avec l'augmentation du rang de naissance, passant de 8 % parmi les naissances de rang 1 à 3 % parmi celles de rangs 6 ou plus.
- Le pourcentage de naissances qui ont eu lieu par césarienne ne varie pas parmi les naissances qui se déroulent dans des établissements privés (7 %) que dans le public (6 %).
- Le pourcentage de naissances par césarienne est plus élevé en milieu urbain (8 %) qu'en milieu rural (3 %).
- Avec un pourcentage de 15 %, c'est dans le département du Littoral que ce type d'accouchement est le plus fréquent. À l'opposé, avec 2 %, c'est dans le département de l'Alibori que le pourcentage de femmes accouchées par césarienne est le plus faible.
- Le pourcentage de naissances par césarienne augmente, de manière importante, du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 2 % à 12 %.

8.4.4 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance

Le **Tableau 8.8** présente les pourcentages de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années avant l'enquête qui ont accouché dans un établissement de santé par durée de séjour dans l'établissement selon le type d'accouchement. On constate que la durée du séjour dans l'établissement de santé après l'accouchement est nettement plus longue quand l'accouchement a eu lieu par césarienne que par voie normale : 90 % des femmes accouchées par césarienne sont restées au moins trois jours dans l'établissement de santé contre 23 % pour celles ayant accouché par voie normale.

8.5 SOINS POSTNATALS

8.5.1 Examen postnatal de la mère

Une proportion importante de décès maternels et de décès de nouveau-nés qui se produisent dans la période néonatale ont lieu dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Il est donc fortement recommandé que les femmes effectuent une visite postnatale dans les deux jours qui suivent l'accouchement. Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes qui avaient accouché au cours des deux années ayant précédé l'enquête si, après leur dernier accouchement, elles avaient effectué un examen postnatal et combien de temps après l'accouchement cet examen avait eu lieu. Ainsi dans l'ensemble, 66 % des femmes ont reçu des soins postnatals au cours des deux jours après la naissance. Par contre, 27 % n'ont jamais reçu de soins postnatals (**Tableau 8.9**).

Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals au cours des deux jours après la naissance a augmenté, passant de 51 % à 66 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les deux jours après la naissance de l'enfant varie de manière importante entre les départements. En effet, si dans le Zou (91 %), le Littoral (81 %) ou le Plateau (79 %), la couverture en soins postnatals immédiatement après la naissance est

plutôt élevée, il en va différemment de l'Atacora (30 %), et du Borgou (42 %) où le suivi postnatal des femmes n'est pas une pratique généralisée.

- La couverture en soins postnatals dans les délais recommandés (2 jours après l'accouchement) augmente en fonction du niveau d'instruction de la mère, passant de 60 % pour les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction à 80 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus
- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les délais recommandés augmente avec le niveau de bien-être économique, passant de 45 % dans le quintile le plus bas à 80 % dans le plus quintile le plus élevé (**Tableau 8.9**).

Type de prestataire

Les compétences du prestataire déterminent ses capacités à diagnostiquer des problèmes et à recommander un traitement ou une référence appropriée. Au Bénin, 62 % de femmes ont eu un examen postnatal dispensé par un prestataire de santé qualifié, à savoir un médecin, une infirmière ou une sage-femme. Par contre, dans 4 % des cas en 2017-2018, c'est une matrone, une aide-soignante ou une accoucheuse traditionnelle qui a dispensé les soins postnatals à la mère (**Tableau 8.10**).

8.5.2 Examen postnatal du nouveau-né

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, on a demandé à toutes les femmes, qui avaient eu une naissance vivante au cours des deux dernières années, si quelqu'un avait examiné leur nouveau-né, combien de temps après l'accouchement cet examen avait eu lieu et enfin quel type de prestataire avait effectué l'examen.


Dans l'ensemble, près des deux tiers des dernières naissances des deux dernières années (64 %) ont bénéficié des soins postnatals dans les premières 48 heures (**Tableau 8.11**).

Variations par caractéristique

- L'examen postnatal du nouveau-né dans les premiers deux jours est plus fréquent quand la naissance a eu lieu dans un établissement de santé qu'ailleurs (74 % contre 10 %) (**Graphique 8.8**).
- En milieu urbain, 68 % des nouveau-nés ont eu un examen postnatal dans les deux jours qui ont suivi leur naissance contre 62 % en milieu rural.
- La couverture en soins postnatals du nouveau-né augmente du quintile de bien-être le plus bas (45 %) au quintile de bien-être le plus élevé (78 %).

Graphique 8.8 Soins postnatals selon le lieu de l'accouchement

Pourcentage des dernières naissances des 2 années avant l'enquête pour lesquelles les femmes et les nouveau-nés ont reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance



Type de prestataire

En ce qui concerne le type de prestataire, on constate que 60 % des nouveau-nés ont reçu des soins postnatals dans les premières 48 heures dispensés par un prestataire de santé qualifié (médecin/infirmier/sage-femme). Dans seulement 4 % des cas, ce sont les matrones, Aide-soignantes et accoucheuses traditionnelles qui ont donné ces soins (**Tableau 8.12**).

Contenu des examens postnatals

L'enquête a également recueilli des données sur les composantes des soins postnatals. Plus précisément, on a cherché à savoir si certains actes avaient été effectués dans les deux jours suivant la naissance et si des conseils avaient été dispensés à la mère, en particulier ceux concernant les signes de danger chez le nouveau-né.

Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête ont montré que pour seulement 58 % des dernières naissances vivantes ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, au moins deux actes/conseils ont été dispensés dans les premières 48 heures (**Tableau 8.13**).

Les examens qui ont été les plus fréquemment effectués sont la pesée (67 %), la prise de la température (48 %), l'examen du cordon et le counseling sur l'allaitement (46 % dans chaque cas).

8.6 PROBLEMES D'ACCES AUX SOINS DE SANTE

Problèmes d'accès aux soins de santé

On a demandé aux femmes si l'un des éléments suivants constituait un problème important quand elles recherchaient un conseil médical ou un traitement quand elles étaient malades :

- Obtenir la permission d'aller chez un médecin.
- Avoir l'argent pour des conseils ou un traitement.
- Distance à l'établissement de santé.
- Ne pas vouloir aller seule.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

De nombreux facteurs peuvent empêcher les femmes d'obtenir un conseil médical ou un traitement pour elles-mêmes lorsqu'elles sont malades. La connaissance de ces facteurs est particulièrement importante pour comprendre et traiter les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans la recherche de soins, y compris pendant la grossesse et l'accouchement.

Trois femmes sur cinq (60 %) ont déclaré avoir eu au moins un problème d'accès aux soins de santé. Parmi ces problèmes, obtenir de l'argent pour se faire soigner (53 %) est le principal problème déclaré par les femmes, suivi de la distance jusqu'à l'établissement de santé (31 %). En outre, le fait d'obtenir la permission d'aller se faire soigner a été citée par 22 % des femmes et la fait de ne pas vouloir s'y rendre seule par 20 % des femmes (**Tableau 8.14**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant déclaré au moins un problème d'accès aux soins de santé augmente avec le nombre d'enfants vivants, passant de 58 % quand les femmes ont 1-2 enfant à 67 % quand elles en ont cinq ou plus.
- La proportion de femmes ayant cité au moins un problème d'accès aux soins de santé diminue avec le niveau d'instruction, passant de 64 % parmi celles sans niveau d'instruction à 45 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- Dans le quintile de bien-être le plus bas, sept femmes sur dix (70 %) ont déclaré au moins un problème d'accès aux soins de santé contre 47 % dans le quintile de bien-être le plus élevé.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la santé maternelle, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 8.1** Soins prénatals
- **Tableau 8.2** Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite
- **Tableau 8.3** Composants des visites prénatales
- **Tableau 8.4** Vaccination antitétanique
- **Tableau 8.5** Lieu de l'accouchement
- **Tableau 8.6** Assistance au cours de l'accouchement
- **Tableau 8.7** Césarienne
- **Tableau 8.8** Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance
- **Tableau 8.9** Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère
- **Tableau 8.10** Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère
- **Tableau 8.11** Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né
- **Tableau 8.12** Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né
- **Tableau 8.13** Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés
- **Tableau 8.14** Problèmes d'accès aux soins de santé

Tableau 8.1 Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé vu durant la grossesse de la naissance la plus récente, et pourcentage ayant reçu, pour la naissance la plus récente, des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Prestataire de soins prénatals | | | | | | | Pas de soins prénatals | Total | Pourcentage ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié ¹ | Effectif de femmes |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|---------|-------|------------------------|-------|---|--------------------|
| | Médecin | Infirmière/sage-femme | Aide-soignante | Agent de santé communautaire | Accoucheuse traditionnelle | Matrone | Autre | | | | |
| Âge à la naissance | | | | | | | | | | | |
| <20 | 3,1 | 77,6 | 6,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 12,2 | 100,0 | 80,7 | 1 087 |
| 20-34 | 4,3 | 79,4 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 10,5 | 100,0 | 83,7 | 6 426 |
| 35-49 | 4,4 | 78,8 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 11,5 | 100,0 | 83,2 | 1 517 |
| Rang de naissance | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5,1 | 81,0 | 5,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 7,7 | 100,0 | 86,1 | 1 806 |
| 2-3 | 4,8 | 79,4 | 4,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 10,1 | 100,0 | 84,3 | 3 125 |
| 4-5 | 3,7 | 78,8 | 5,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 11,4 | 100,0 | 82,6 | 2 265 |
| 6+ | 2,5 | 77,0 | 5,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 14,8 | 100,0 | 79,5 | 1 835 |
| Résidence | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 18,1 | 77,1 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,4 | 100,0 | 95,2 | 408 |
| Autres villes | 5,0 | 83,8 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 7,1 | 100,0 | 88,8 | 3 115 |
| Ensemble urbain | 6,5 | 83,0 | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 6,4 | 100,0 | 89,5 | 3 523 |
| Rural | 2,7 | 76,6 | 6,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 13,8 | 100,0 | 79,3 | 5 508 |
| Département | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 0,2 | 56,7 | 21,2 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 21,5 | 100,0 | 56,8 | 1 226 |
| Atacora | 0,6 | 75,1 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 18,3 | 100,0 | 75,8 | 800 |
| Atlantique | 11,9 | 81,3 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 100,0 | 93,2 | 1 043 |
| Borgou | 2,7 | 65,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 31,2 | 100,0 | 67,7 | 1 164 |
| Collines | 1,4 | 94,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 100,0 | 96,3 | 604 |
| Couffo | 1,7 | 89,9 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 5,1 | 100,0 | 91,6 | 583 |
| Donga | 1,6 | 84,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 11,7 | 100,0 | 86,0 | 599 |
| Littoral | 18,1 | 77,1 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,4 | 100,0 | 95,2 | 408 |
| Mono | 3,6 | 79,4 | 12,6 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 100,0 | 83,0 | 393 |
| Ouémé | 3,5 | 92,8 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 100,0 | 96,3 | 798 |
| Plateau | 5,1 | 87,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 6,7 | 100,0 | 92,4 | 550 |
| Zou | 4,7 | 92,0 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 100,0 | 96,7 | 863 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 2,6 | 75,6 | 6,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 15,1 | 100,0 | 78,2 | 5 807 |
| Primaire | 4,7 | 86,8 | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 4,4 | 100,0 | 91,5 | 1 650 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 6,5 | 87,1 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 2,8 | 100,0 | 93,7 | 1 150 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 17,0 | 75,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,0 | 100,0 | 92,1 | 423 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 0,9 | 62,7 | 6,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 28,5 | 100,0 | 63,6 | 1 827 |
| Second | 1,8 | 78,2 | 6,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 12,4 | 100,0 | 80,0 | 1 827 |
| Moyen | 3,0 | 82,5 | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 8,1 | 100,0 | 85,5 | 1 837 |
| Quatrième | 4,0 | 88,4 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 100,0 | 92,4 | 1 857 |
| Le plus élevé | 11,6 | 83,9 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 100,0 | 95,5 | 1 683 |
| Ensemble | 4,2 | 79,1 | 5,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 10,9 | 100,0 | 83,2 | 9 031 |

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul celui possédant les qualifications les plus élevées a été pris en compte dans ce tableau.

¹ Sont considérés, dans le pays, comme des prestataires de soins prénatals qualifiés : médecins, infirmières/sages-femmes

Tableau 8.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par nombre de visites prénatales pour la naissance vivante la plus récente et en fonction du stade de la grossesse au moment de la première visite prénatale ; parmi les femmes qui ont eu une visite prénatale, nombre médian de mois de grossesse à la première visite, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse | Résidence | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------------|-------|----------|
| | Cotonou | Autre villes | Ensemble urbain | Rural | Ensemble |
| Nombre de consultations prénatales | | | | | |
| Aucune | 1,4 | 7,1 | 6,4 | 13,8 | 10,9 |
| 1 | 1,5 | 6,2 | 5,6 | 7,0 | 6,5 |
| 2-3 | 11,2 | 27,7 | 25,8 | 29,4 | 28,0 |
| 4+ | 81,9 | 55,9 | 58,9 | 47,7 | 52,1 |
| Ne sait pas/manquant | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 2,1 | 2,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nombre de mois de grossesse à la première visite prénatale | | | | | |
| Pas de soins prénatals | 1,4 | 7,1 | 6,4 | 13,8 | 10,9 |
| <4 | 73,9 | 54,8 | 57,0 | 46,4 | 50,6 |
| 4-5 | 19,5 | 26,9 | 26,0 | 26,5 | 26,3 |
| 6-7 | 3,5 | 9,2 | 8,5 | 10,5 | 9,8 |
| 8+ | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,6 |
| Ne sait pas/manquant | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif de femmes | 408 | 3 115 | 3 523 | 5 508 | 9 031 |
| Nombre médian de mois de grossesse à la première visite prénatale (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals) | | | | | |
| | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
| Effectif de femmes ayant effectué des visites prénatales | 402 | 2 895 | 3 297 | 4 749 | 8 046 |

Tableau 8.3 Composants des visites prénatales

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, et pourcentages ayant pris des médicaments contre les parasites intestinaux au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente ; parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu dans les 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant effectué certains examens prénatals, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années, pourcentage ayant pris durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente : | | Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour leur naissance vivante la plus récente des 5 dernières années, pourcentage ayant effectué certains examens : | | | | | | | | | | Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente | |
|--|---|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------|---|--|
| | Du fer sous forme de comprimés ou de sirop | Des médicaments contre les parasites intestinaux | Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années | Mesure de la tension artérielle | Prélèvement d'urine | Prélèvement sanguin | Mesure du poids | Mesure de la taille | Palpé à l'abdomen | Échographie | Conseil nutritionnel | | | |
| Âge à la naissance | | | | | | | | | | | | | | |
| <20 | 82,3 | 56,6 | 1 087 | 97,1 | 90,4 | 86,8 | 98,3 | 96,6 | 96,7 | 43,0 | 52,6 | 954 | | |
| 20-34 | 84,9 | 65,8 | 6 426 | 98,0 | 94,0 | 89,7 | 98,8 | 96,9 | 97,8 | 50,7 | 53,8 | 5 749 | | |
| 35-49 | 85,2 | 65,3 | 1 517 | 98,5 | 94,2 | 87,6 | 98,9 | 97,7 | 98,4 | 48,1 | 51,8 | 1 343 | | |
| Rang de naissance | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 87,9 | 66,3 | 1 806 | 97,9 | 92,9 | 89,5 | 98,9 | 97,2 | 97,7 | 54,3 | 56,1 | 1 667 | | |
| 2-3 | 85,9 | 65,9 | 3 125 | 97,9 | 94,0 | 90,6 | 98,9 | 96,9 | 97,6 | 51,1 | 54,3 | 2 808 | | |
| 4-5 | 83,9 | 67,0 | 2 265 | 98,7 | 93,8 | 88,8 | 98,7 | 97,1 | 98,1 | 51,5 | 54,8 | 2 007 | | |
| 6+ | 80,1 | 57,5 | 1 835 | 97,4 | 93,3 | 86,1 | 98,4 | 96,7 | 97,6 | 38,3 | 46,8 | 1 564 | | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 97,1 | 90,6 | 408 | 99,4 | 97,0 | 94,8 | 99,7 | 96,7 | 99,1 | 94,4 | 67,5 | 402 | | |
| Autres villes | 89,5 | 70,2 | 3 115 | 98,6 | 94,6 | 90,4 | 99,0 | 98,1 | 98,0 | 60,1 | 57,1 | 2 895 | | |
| Ensemble urbain | 90,3 | 72,6 | 3 523 | 98,7 | 94,9 | 90,9 | 99,1 | 97,9 | 98,1 | 64,2 | 58,4 | 3 297 | | |
| Rural | 81,0 | 59,4 | 5 508 | 97,5 | 92,7 | 87,7 | 98,5 | 96,3 | 97,5 | 39,0 | 49,8 | 4 749 | | |
| Département | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 71,0 | 50,4 | 1 226 | 96,9 | 95,0 | 95,7 | 98,0 | 97,1 | 96,1 | 34,4 | 65,7 | 963 | | |
| Atacora | 75,1 | 33,8 | 800 | 93,9 | 92,4 | 84,4 | 98,3 | 97,0 | 96,0 | 21,8 | 28,2 | 654 | | |
| Atlantique | 97,5 | 89,2 | 1 043 | 98,5 | 95,1 | 89,2 | 98,9 | 96,8 | 98,6 | 67,1 | 63,2 | 1 030 | | |
| Borgou | 63,0 | 33,8 | 1 164 | 98,8 | 93,8 | 92,0 | 99,4 | 99,0 | 97,5 | 29,6 | 55,0 | 801 | | |
| Collines | 92,1 | 64,4 | 604 | 98,7 | 89,3 | 85,2 | 99,2 | 99,1 | 98,6 | 46,6 | 36,4 | 587 | | |
| Couffo | 85,9 | 57,9 | 583 | 97,1 | 88,9 | 84,4 | 97,4 | 94,1 | 95,3 | 42,1 | 61,8 | 553 | | |
| Donga | 88,3 | 65,3 | 599 | 97,9 | 96,6 | 97,2 | 99,8 | 99,4 | 98,8 | 41,4 | 56,8 | 529 | | |
| Littoral | 97,1 | 90,6 | 408 | 99,4 | 97,0 | 94,8 | 99,7 | 96,7 | 99,1 | 94,4 | 67,5 | 402 | | |
| Mono | 90,6 | 73,2 | 393 | 98,2 | 92,7 | 80,7 | 97,5 | 95,4 | 98,2 | 54,1 | 60,7 | 380 | | |
| Ouémé | 96,3 | 94,0 | 798 | 99,6 | 95,2 | 86,9 | 99,5 | 99,0 | 98,5 | 41,2 | 78,5 | 785 | | |
| Plateau | 89,9 | 76,1 | 550 | 97,8 | 88,6 | 84,4 | 98,0 | 95,6 | 95,5 | 42,3 | 53,2 | 513 | | |
| Zou | 94,8 | 78,2 | 863 | 99,1 | 95,5 | 88,6 | 99,2 | 93,8 | 98,9 | 62,1 | 50,4 | 847 | | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 79,6 | 57,5 | 5 807 | 97,6 | 92,9 | 88,1 | 98,5 | 96,6 | 97,3 | 40,5 | 49,9 | 4 931 | | |
| Primaire | 91,6 | 73,5 | 1 650 | 98,9 | 94,4 | 89,6 | 99,1 | 97,5 | 98,1 | 56,1 | 57,0 | 1 578 | | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 94,8 | 80,2 | 1 150 | 97,9 | 94,7 | 90,8 | 99,2 | 98,2 | 99,1 | 64,8 | 60,4 | 1 118 | | |
| Secondaire 2 nd cycle ou plus | 98,2 | 84,9 | 423 | 99,4 | 95,2 | 92,7 | 99,5 | 96,6 | 98,8 | 87,7 | 60,6 | 419 | | |

À suivre...

Tableau 8.3—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années, pourcentage ayant pris durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente : | | Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour leur naissance vivante la plus récente des 5 dernières années, pourcentage ayant effectué certains examens : | | | | | | | | | | Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente | |
|--|---|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------|---|--|
| | Du fer sous forme de comprimés ou de sirop | Des médicaments contre les parasites intestinaux | Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années | Mesure de la tension artérielle | Prélèvement d'urine | Prélèvement sanguin | Mesure du poids | Mesure de la taille | Palpé à l'abdomen | Échographie | Conseil nutritionnel | | | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 64,1 | 40,9 | 1 827 | 96,7 | 92,0 | 88,2 | 98,6 | 96,5 | 95,8 | 25,2 | 43,6 | 1 306 | | |
| Second | 81,9 | 57,1 | 1 827 | 97,1 | 91,3 | 85,8 | 98,0 | 95,2 | 97,7 | 34,2 | 49,1 | 1 600 | | |
| Moyen | 87,9 | 64,4 | 1 837 | 97,8 | 92,9 | 89,0 | 98,3 | 97,0 | 97,2 | 40,4 | 50,7 | 1 688 | | |
| Quatrième | 92,7 | 74,4 | 1 857 | 98,6 | 94,7 | 88,7 | 99,1 | 97,7 | 98,6 | 56,9 | 56,9 | 1 790 | | |
| Le plus élevé | 97,3 | 87,7 | 1 683 | 99,4 | 96,6 | 93,2 | 99,7 | 98,3 | 99,0 | 83,9 | 63,8 | 1 661 | | |
| Ensemble | 84,6 | 64,6 | 9 031 | 98,0 | 93,6 | 89,0 | 98,8 | 97,0 | 97,7 | 49,4 | 53,3 | 8 046 | | |

Tableau 8.4 Vaccination antitétanique

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu deux injections antitétaniques ou plus au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente | Pourcentage dont la naissance vivante la plus récente est protégée contre le tétanos néonatal ¹ | Effectif de mères |
|--|--|--|-------------------|
| Âge à la naissance | | | |
| <20 | 54,5 | 60,8 | 1 087 |
| 20-34 | 51,7 | 72,0 | 6 426 |
| 35-49 | 45,1 | 72,1 | 1 517 |
| Rang de naissance | | | |
| 1 | 64,2 | 67,2 | 1 806 |
| 2-3 | 51,7 | 73,1 | 3 125 |
| 4-5 | 48,4 | 73,1 | 2 265 |
| 6+ | 39,9 | 66,9 | 1 835 |
| Résidence | | | |
| Cotonou | 60,4 | 80,1 | 408 |
| Autres villes | 54,6 | 76,6 | 3 115 |
| Ensemble urbain | 55,2 | 77,0 | 3 523 |
| Rural | 48,2 | 66,6 | 5 508 |
| Département | | | |
| Alibori | 44,8 | 56,4 | 1 226 |
| Atacora | 37,1 | 53,4 | 800 |
| Atlantique | 59,0 | 79,6 | 1 043 |
| Borgou | 34,6 | 54,9 | 1 164 |
| Collines | 45,0 | 72,2 | 604 |
| Couffo | 63,6 | 79,6 | 583 |
| Donga | 54,9 | 74,1 | 599 |
| Littoral | 60,4 | 80,1 | 408 |
| Mono | 77,1 | 89,6 | 393 |
| Ouémé | 55,1 | 79,3 | 798 |
| Plateau | 53,2 | 73,5 | 550 |
| Zou | 56,2 | 85,4 | 863 |
| Niveau d'instruction | | | |
| Aucun | 47,0 | 66,7 | 5 807 |
| Primaire | 54,4 | 75,3 | 1 650 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 60,7 | 79,5 | 1 150 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 65,7 | 83,2 | 423 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 38,0 | 52,4 | 1 827 |
| Second | 48,9 | 68,3 | 1 827 |
| Moyen | 50,8 | 71,8 | 1 837 |
| Quatrième | 56,3 | 78,8 | 1 857 |
| Le plus élevé | 61,5 | 82,9 | 1 683 |
| Ensemble | 51,0 | 70,7 | 9 031 |

¹ Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 3 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 5 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 10 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, cinq injections avant la dernière naissance vivante.

Tableau 8.5 Lieu de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par lieu de l'accouchement et pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Établissement de santé | | | | Total | Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé | Effectif de naissances |
|--|------------------------|---------------|--------|-------|-------|--|------------------------|
| | Secteur public | Secteur privé | Maison | Autre | | | |
| Âge de la mère à la naissance | | | | | | | |
| <20 | 73,7 | 10,8 | 13,4 | 2,0 | 100,0 | 84,5 | 1 747 |
| 20-34 | 69,6 | 14,7 | 14,1 | 1,6 | 100,0 | 84,2 | 10 007 |
| 35-49 | 68,8 | 12,5 | 17,2 | 1,4 | 100,0 | 81,4 | 1 890 |
| Rang de naissance | | | | | | | |
| 1 | 73,8 | 15,8 | 9,2 | 1,2 | 100,0 | 89,6 | 3 005 |
| 2-3 | 69,6 | 15,6 | 13,2 | 1,6 | 100,0 | 85,3 | 4 930 |
| 4-5 | 69,6 | 13,1 | 15,9 | 1,4 | 100,0 | 82,7 | 3 206 |
| 6+ | 66,6 | 9,3 | 21,3 | 2,7 | 100,0 | 75,9 | 2 502 |
| Visites prénatales¹ | | | | | | | |
| Aucune | 22,4 | 3,8 | 67,3 | 6,5 | 100,0 | 26,2 | 985 |
| 1-3 | 76,3 | 11,1 | 11,4 | 1,2 | 100,0 | 87,4 | 3 112 |
| 4+ | 77,3 | 18,4 | 3,5 | 0,8 | 100,0 | 95,7 | 4 702 |
| Ne sait pas/manquant | 75,5 | 20,8 | 2,9 | 0,8 | 100,0 | 96,3 | 232 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 54,7 | 44,5 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 99,2 | 579 |
| Autres villes | 70,1 | 18,9 | 10,2 | 0,8 | 100,0 | 89,0 | 4 677 |
| Ensemble urbain | 68,4 | 21,7 | 9,1 | 0,8 | 100,0 | 90,1 | 5 256 |
| Rural | 71,0 | 9,0 | 17,8 | 2,2 | 100,0 | 80,0 | 8 387 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | 66,3 | 0,7 | 26,5 | 6,6 | 100,0 | 67,0 | 1 831 |
| Atacora | 67,4 | 2,6 | 27,1 | 3,0 | 100,0 | 69,9 | 1 216 |
| Atlantique | 65,3 | 32,4 | 1,7 | 0,5 | 100,0 | 97,7 | 1 568 |
| Borgou | 54,4 | 6,6 | 37,9 | 1,2 | 100,0 | 61,0 | 1 784 |
| Collines | 85,2 | 9,2 | 5,0 | 0,6 | 100,0 | 94,3 | 869 |
| Couffo | 73,3 | 12,8 | 13,1 | 0,7 | 100,0 | 86,2 | 902 |
| Donga | 77,3 | 2,6 | 19,5 | 0,6 | 100,0 | 79,8 | 926 |
| Littoral | 54,7 | 44,5 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 99,2 | 579 |
| Mono | 90,8 | 5,3 | 3,6 | 0,3 | 100,0 | 96,1 | 613 |
| Ouémé | 69,5 | 29,2 | 1,0 | 0,2 | 100,0 | 98,7 | 1 197 |
| Plateau | 75,3 | 16,7 | 6,3 | 1,6 | 100,0 | 92,1 | 860 |
| Zou | 81,0 | 17,1 | 1,6 | 0,2 | 100,0 | 98,1 | 1 299 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucun | 67,8 | 10,1 | 19,9 | 2,2 | 100,0 | 77,9 | 8 964 |
| Primaire | 74,9 | 18,6 | 5,9 | 0,6 | 100,0 | 93,4 | 2 486 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 77,0 | 20,1 | 2,5 | 0,3 | 100,0 | 97,2 | 1 619 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 62,8 | 35,9 | 0,4 | 0,9 | 100,0 | 98,7 | 574 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 57,0 | 4,2 | 36,0 | 2,7 | 100,0 | 61,3 | 2 922 |
| Second | 71,5 | 8,1 | 17,6 | 2,9 | 100,0 | 79,5 | 2 811 |
| Moyen | 77,0 | 10,5 | 11,1 | 1,4 | 100,0 | 87,5 | 2 749 |
| Quatrième | 78,2 | 17,2 | 3,9 | 0,8 | 100,0 | 95,3 | 2 738 |
| Le plus élevé | 66,7 | 32,4 | 0,6 | 0,3 | 100,0 | 99,1 | 2 423 |
| Ensemble | 70,0 | 13,9 | 14,5 | 1,7 | 100,0 | 83,9 | 13 643 |

¹ Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Tableau 8.6 Assistance au cours de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de personnel ayant assisté l'accouchement, pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par un prestataire de santé qualifié, et pourcentage qui ont eu le contact "peau-à-peau" immédiatement après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Personnel ayant fourni l'assistance durant l'accouchement | | | | | | | Total | Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié ¹ | Pourcentage de naissances placées en contact « peau-à-peau » immédiatement après la naissance | Effectif de naissances |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------------------|---------|---------------|----------|-------|--|---|------------------------|
| | Médecin | Infirmière/sage-femme | Aide-soignante | Accoucheuse traditionnelle | Matrone | Parents/autre | Personne | | | | |
| Âge de la mère à la naissance | | | | | | | | | | | |
| <20 | 5,3 | 72,2 | 3,6 | 4,2 | 0,8 | 6,2 | 7,7 | 100,0 | 77,5 | 72,7 | 1 747 |
| 20-34 | 6,2 | 72,4 | 2,6 | 3,0 | 0,5 | 7,0 | 8,3 | 100,0 | 78,6 | 75,5 | 10 007 |
| 35-49 | 5,8 | 70,1 | 2,6 | 3,0 | 0,9 | 8,3 | 9,4 | 100,0 | 75,8 | 74,5 | 1 890 |
| Rang de naissance | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8,1 | 74,6 | 2,9 | 2,7 | 0,7 | 6,2 | 4,8 | 100,0 | 82,7 | 75,5 | 3 005 |
| 2-3 | 6,1 | 73,6 | 2,5 | 2,8 | 0,5 | 6,5 | 8,1 | 100,0 | 79,6 | 76,5 | 4 930 |
| 4-5 | 5,2 | 72,3 | 2,7 | 3,3 | 0,6 | 6,7 | 9,2 | 100,0 | 77,5 | 75,6 | 3 206 |
| 6+ | 4,5 | 65,6 | 3,1 | 4,2 | 1,0 | 9,7 | 11,9 | 100,0 | 70,1 | 70,8 | 2 502 |
| Visites prénatales | | | | | | | | | | | |
| Aucune | 0,7 | 23,2 | 1,2 | 17,6 | 1,3 | 25,8 | 30,2 | 100,0 | 24,0 | 35,7 | 985 |
| 1-3 | 3,4 | 78,2 | 3,1 | 1,8 | 0,6 | 6,3 | 6,5 | 100,0 | 81,7 | 76,9 | 3 112 |
| 4+ | 9,9 | 79,1 | 2,6 | 0,7 | 0,5 | 3,1 | 4,2 | 100,0 | 89,0 | 82,1 | 4 702 |
| Ne sait pas/manquant | 9,8 | 80,4 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 4,2 | 1,1 | 100,0 | 90,2 | 81,0 | 232 |
| Lieu de l'accouchement | | | | | | | | | | | |
| Établissement de santé | 7,1 | 85,0 | 3,1 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 100,0 | 92,1 | 85,4 | 11 445 |
| Établissement public | 5,6 | 85,9 | 3,4 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 2,8 | 100,0 | 91,5 | 85,1 | 9 550 |
| Établissement privé | 14,9 | 80,4 | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | 100,0 | 95,3 | 86,8 | 1 895 |
| Ailleurs | 0,4 | 4,4 | 0,6 | 19,1 | 2,0 | 34,3 | 39,2 | 100,0 | 4,8 | 21,3 | 2 199 |
| Résidence | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 16,9 | 76,3 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 5,3 | 0,4 | 100,0 | 93,2 | 83,8 | 579 |
| Autres villes | 7,9 | 76,1 | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 6,0 | 5,3 | 100,0 | 84,0 | 78,5 | 4 677 |
| Ensemble urbain | 8,9 | 76,1 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 5,9 | 4,8 | 100,0 | 85,0 | 79,1 | 5 256 |
| Rural | 4,2 | 69,5 | 2,8 | 4,4 | 0,7 | 7,8 | 10,6 | 100,0 | 73,7 | 72,5 | 8 387 |
| Département | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 0,3 | 47,5 | 3,9 | 7,1 | 0,7 | 3,3 | 37,4 | 100,0 | 47,7 | 53,4 | 1 831 |
| Atacora | 1,9 | 62,8 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 21,0 | 4,3 | 100,0 | 64,8 | 60,4 | 1 216 |
| Atlantique | 14,7 | 79,4 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 100,0 | 94,0 | 90,4 | 1 568 |
| Borgou | 3,0 | 56,9 | 2,1 | 10,0 | 1,2 | 11,3 | 15,5 | 100,0 | 59,9 | 62,7 | 1 784 |
| Collines | 4,3 | 89,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 3,2 | 0,9 | 100,0 | 93,5 | 89,0 | 869 |
| Couffo | 3,0 | 77,0 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 8,7 | 5,7 | 100,0 | 80,0 | 74,9 | 902 |
| Donga | 2,7 | 75,8 | 1,1 | 2,6 | 0,8 | 13,2 | 3,8 | 100,0 | 78,5 | 70,1 | 926 |
| Littoral | 16,9 | 76,3 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 5,3 | 0,4 | 100,0 | 93,2 | 83,8 | 579 |
| Mono | 7,8 | 76,7 | 11,1 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 1,4 | 100,0 | 84,5 | 76,8 | 613 |
| Ouémé | 9,7 | 88,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 97,8 | 86,4 | 1 197 |
| Plateau | 5,7 | 86,5 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 5,2 | 0,7 | 100,0 | 92,2 | 83,7 | 860 |
| Zou | 8,4 | 81,2 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 8,0 | 0,3 | 100,0 | 89,6 | 90,8 | 1 299 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 4,2 | 67,5 | 2,7 | 4,5 | 0,7 | 8,4 | 11,8 | 100,0 | 71,7 | 70,9 | 8 964 |
| Primaire | 7,3 | 81,1 | 3,0 | 0,9 | 0,6 | 5,2 | 1,8 | 100,0 | 88,4 | 82,2 | 2 486 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 9,5 | 82,5 | 2,5 | 0,3 | 0,4 | 3,2 | 1,7 | 100,0 | 92,0 | 85,3 | 1 619 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 18,7 | 74,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 1,0 | 100,0 | 92,6 | 80,1 | 574 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 2,0 | 53,1 | 3,2 | 9,0 | 1,4 | 12,9 | 18,3 | 100,0 | 55,2 | 59,1 | 2 922 |
| Second | 3,3 | 70,0 | 3,5 | 3,8 | 0,6 | 8,3 | 10,6 | 100,0 | 73,3 | 71,2 | 2 811 |
| Moyen | 4,4 | 75,7 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | 7,3 | 7,1 | 100,0 | 80,1 | 78,5 | 2 749 |
| Quatrième | 7,4 | 82,9 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 3,3 | 100,0 | 90,3 | 83,7 | 2 738 |
| Le plus élevé | 14,4 | 80,7 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 0,9 | 100,0 | 95,1 | 84,9 | 2 423 |
| Ensemble | 6,0 | 72,0 | 2,7 | 3,2 | 0,6 | 7,1 | 8,3 | 100,0 | 78,1 | 75,0 | 13 643 |

Note : Si l'enquêtée déclare que plus d'une personne a assisté l'accouchement, seule celle possédant les qualifications les plus élevées est prise en compte dans ce tableau.

¹ Le personnel qualifié formé comprend les médecins, les infirmières/sages-femmes.

² Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Tableau 8.7 Césarienne

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête accouchées par césarienne, pourcentage accouché par césarienne qui était planifiée avant le début des douleurs de l'accouchement et pourcentage accouché par césarienne décidée après le début des douleurs de l'accouchement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage accouché par césarienne | Moment auquel a été prise la décision de réaliser une césarienne | | Effectif de naissances |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| | | Prévu avant le début des douleurs | Décidée après le début des douleurs | |
| Âge de la mère à la naissance | | | | |
| <20 | 4,4 | 0,8 | 3,6 | 1 747 |
| 20-34 | 5,0 | 2,2 | 2,8 | 10 007 |
| 35-49 | 6,1 | 2,7 | 3,4 | 1 890 |
| Rang de naissance | | | | |
| 1 | 7,7 | 2,7 | 5,0 | 3 005 |
| 2-3 | 4,7 | 2,3 | 2,4 | 4 930 |
| 4-5 | 4,6 | 2,2 | 2,4 | 3 206 |
| 6+ | 3,4 | 1,1 | 2,4 | 2 502 |
| Visites prénatales¹ | | | | |
| Aucune | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 985 |
| 1-3 | 3,2 | 1,1 | 2,1 | 3 112 |
| 4+ | 8,4 | 3,6 | 4,8 | 4 702 |
| Ne sait pas/manquant | 10,4 | 3,3 | 7,2 | 232 |
| Lieu d'accouchement² | | | | |
| Établissement de santé | 6,1 | 2,5 | 3,5 | 11 445 |
| Établissement public | 5,9 | 2,2 | 3,7 | 9 550 |
| Établissement privé | 7,2 | 4,3 | 2,9 | 1 895 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 14,6 | 7,6 | 7,0 | 579 |
| Autres villes | 7,0 | 3,3 | 3,7 | 4 677 |
| Ensemble urbain | 7,8 | 3,8 | 4,1 | 5 256 |
| Rural | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 8 387 |
| Département | | | | |
| Alibori | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 1 831 |
| Atacora | 2,7 | 0,8 | 1,9 | 1 216 |
| Atlantique | 8,9 | 4,3 | 4,6 | 1 568 |
| Borgou | 2,6 | 1,0 | 1,6 | 1 784 |
| Collines | 4,0 | 1,2 | 2,7 | 869 |
| Couffo | 4,8 | 1,4 | 3,4 | 902 |
| Donga | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 926 |
| Littoral | 14,6 | 7,6 | 7,0 | 579 |
| Mono | 7,3 | 4,8 | 2,5 | 613 |
| Ouémé | 7,5 | 2,7 | 4,8 | 1 197 |
| Plateau | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 860 |
| Zou | 7,4 | 2,8 | 4,6 | 1 299 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucun | 3,3 | 1,2 | 2,2 | 8 964 |
| Primaire | 6,3 | 2,2 | 4,1 | 2 486 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 8,0 | 3,9 | 4,1 | 1 619 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 19,2 | 11,5 | 7,7 | 574 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 2 922 |
| Second | 2,9 | 1,0 | 1,9 | 2 811 |
| Moyen | 3,3 | 1,4 | 1,9 | 2 749 |
| Quatrième | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 2 738 |
| Le plus élevé | 12,3 | 5,6 | 6,7 | 2 423 |
| Ensemble | 5,1 | 2,1 | 3,0 | 13 643 |

Note : La question sur la césarienne n'est posée qu'aux femmes qui ont accouché dans un établissement de santé. Dans ce tableau, on suppose que les femmes qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé n'ont pas accouché par césarienne.

¹ Concerne seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Tableau 8.8 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance

Parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 années ayant précédé l'enquête dont l'accouchement de la naissance vivante la plus récente s'est déroulé dans un établissement de santé, répartition (en %) par durée de séjour dans l'établissement de santé suivant leur naissance vivante la plus récente, selon le type d'accouchement, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Type d'accouchement | <6 heures | 6-11 heures | 12-23 heures | 1-2 jours | 3 jours ou + | Manquant | Total | Effectif de femmes |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------|--------------------|
| Accouchement par voie basse | 10,2 | 7,3 | 4,5 | 54,3 | 23,1 | 0,6 | 100,0 | 7 169 |
| Césarienne | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 5,8 | 89,6 | 1,2 | 100,0 | 529 |

Tableau 8.9 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) de la durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère pour la naissance vivante la plus récente et pourcentage de femmes ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu un examen postnatal au cours des 2 jours ayant suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère ¹ | | | | | Ne sait pas/manquant | Pas d'examen post-natals ² | Total | Pourcentage de femmes ayant reçu un examen postnatal dans les deux jours après la naissance ¹ | Effectif de femmes |
|--|---|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------|---------------------------------------|-------|--|--------------------|
| | Moins de 4 heures | 4-23 heures | 1-2 jours | 3-6 jours | 7-41 jours | | | | | |
| Âge à la naissance | | | | | | | | | | |
| <20 | 49,7 | 8,3 | 7,9 | 0,8 | 0,5 | 8,2 | 24,6 | 100,0 | 65,9 | 724 |
| 20-34 | 50,5 | 8,0 | 7,0 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 27,1 | 100,0 | 65,5 | 4 017 |
| 35-49 | 50,7 | 8,4 | 6,6 | 0,5 | 0,4 | 5,3 | 28,3 | 100,0 | 65,6 | 760 |
| Rang de naissance | | | | | | | | | | |
| 1 | 52,8 | 9,7 | 7,8 | 1,4 | 0,7 | 6,5 | 21,1 | 100,0 | 70,3 | 1 228 |
| 2-3 | 52,4 | 7,5 | 6,7 | 0,5 | 0,4 | 6,8 | 25,7 | 100,0 | 66,6 | 1 971 |
| 4-5 | 51,1 | 8,7 | 7,0 | 0,7 | 0,1 | 5,7 | 26,7 | 100,0 | 66,8 | 1 304 |
| 6+ | 42,8 | 6,2 | 6,8 | 0,5 | 0,8 | 6,1 | 36,8 | 100,0 | 55,8 | 999 |
| Lieu d'accouchement | | | | | | | | | | |
| Établissement de santé | 57,7 | 8,9 | 7,7 | 0,5 | 0,3 | 7,1 | 17,8 | 100,0 | 74,3 | 4 680 |
| Ailleurs | 9,3 | 3,1 | 3,3 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 78,6 | 100,0 | 15,7 | 822 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 65,7 | 10,1 | 4,9 | 1,9 | 1,4 | 5,7 | 10,4 | 100,0 | 80,7 | 242 |
| Autres villes | 53,8 | 8,9 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 6,3 | 24,4 | 100,0 | 68,4 | 1 863 |
| Ensemble urbain | 55,2 | 9,0 | 5,6 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 22,8 | 100,0 | 69,8 | 2 105 |
| Rural | 47,5 | 7,5 | 7,9 | 0,7 | 0,5 | 6,4 | 29,5 | 100,0 | 62,9 | 3 397 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 45,7 | 5,8 | 12,8 | 0,6 | 0,5 | 4,9 | 29,7 | 100,0 | 64,3 | 766 |
| Atacora | 14,9 | 7,1 | 7,9 | 0,3 | 1,0 | 2,5 | 66,2 | 100,0 | 29,9 | 499 |
| Atlantique | 55,2 | 9,3 | 2,2 | 0,2 | 0,7 | 8,8 | 23,6 | 100,0 | 66,7 | 595 |
| Borgou | 37,2 | 2,7 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 10,9 | 46,2 | 100,0 | 41,8 | 730 |
| Collines | 55,7 | 9,5 | 12,9 | 1,3 | 0,8 | 6,2 | 13,6 | 100,0 | 78,1 | 353 |
| Couffo | 59,9 | 3,4 | 4,6 | 0,3 | 0,2 | 6,3 | 25,4 | 100,0 | 67,8 | 375 |
| Donga | 43,6 | 15,8 | 11,0 | 1,5 | 0,2 | 11,0 | 17,0 | 100,0 | 70,4 | 391 |
| Littoral | 65,7 | 10,1 | 4,9 | 1,9 | 1,4 | 5,7 | 10,4 | 100,0 | 80,7 | 242 |
| Mono | 48,2 | 8,2 | 18,7 | 0,4 | 0,0 | 2,2 | 22,3 | 100,0 | 75,1 | 225 |
| Ouémé | 52,1 | 16,9 | 7,0 | 1,8 | 0,0 | 3,6 | 18,6 | 100,0 | 76,0 | 479 |
| Plateau | 60,6 | 12,0 | 6,1 | 0,7 | 0,4 | 6,1 | 14,1 | 100,0 | 78,7 | 340 |
| Zou | 86,2 | 3,2 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 4,3 | 4,5 | 100,0 | 91,0 | 508 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucun | 45,8 | 7,3 | 7,1 | 0,6 | 0,4 | 6,6 | 32,1 | 100,0 | 60,2 | 3 458 |
| Primaire | 57,2 | 9,3 | 6,3 | 0,9 | 0,3 | 6,0 | 20,0 | 100,0 | 72,8 | 1 036 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 58,0 | 9,4 | 7,5 | 1,0 | 0,5 | 6,5 | 17,0 | 100,0 | 74,9 | 731 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 63,1 | 9,6 | 6,8 | 1,1 | 1,3 | 4,5 | 13,6 | 100,0 | 79,5 | 277 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 32,7 | 5,0 | 7,3 | 0,6 | 0,7 | 5,7 | 48,0 | 100,0 | 44,9 | 1 153 |
| Second | 49,7 | 8,3 | 7,4 | 0,5 | 0,4 | 5,7 | 28,0 | 100,0 | 65,4 | 1 139 |
| Moyen | 50,8 | 8,4 | 8,7 | 0,5 | 0,4 | 6,8 | 24,5 | 100,0 | 67,8 | 1 134 |
| Quatrième | 58,1 | 8,3 | 6,1 | 1,2 | 0,3 | 7,4 | 18,6 | 100,0 | 72,5 | 1 097 |
| Le plus élevé | 63,3 | 10,8 | 5,4 | 1,0 | 0,5 | 6,1 | 12,9 | 100,0 | 79,5 | 979 |
| Ensemble | 50,5 | 8,1 | 7,0 | 0,7 | 0,5 | 6,3 | 26,9 | 100,0 | 65,5 | 5 502 |

¹ Sont incluses les femmes qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une infirmière, une sage-femme, un agent de santé communautaire ou une accoucheuse traditionnelle.

² Y compris les femmes qui ont eu un examen postnatal après 41 jours.

Tableau 8.10 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal de la mère au cours des 2 jours ayant suivi la dernière naissance vivante, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal à la mère | | | | | Pas d'examen postnatal au cours des 2 jours après la naissance | Total | Effectif de femmes |
|--|---|----------------|------------------------------|----------------------------|---------|--|-------|--------------------|
| | Médecin/ infirmière/ sage-femme | Aide-soignante | Agent de santé communautaire | Accoucheuse traditionnelle | Matrone | | | |
| Âge à la naissance | | | | | | | | |
| <20 | 60,8 | 3,4 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 34,1 | 100,0 | 724 |
| 20-34 | 61,6 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 34,5 | 100,0 | 4 017 |
| 35-49 | 61,6 | 2,8 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 34,4 | 100,0 | 760 |
| Rang de naissance | | | | | | | | |
| 1 | 66,3 | 3,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 29,7 | 100,0 | 1 228 |
| 2-3 | 62,0 | 3,6 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 33,4 | 100,0 | 1 971 |
| 4-5 | 63,2 | 2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 33,2 | 100,0 | 1 304 |
| 6+ | 52,2 | 2,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 44,2 | 100,0 | 999 |
| Lieu d'accouchement | | | | | | | | |
| Établissement de santé | 70,4 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 25,7 | 100,0 | 4 680 |
| Ailleurs | 11,0 | 0,5 | 0,1 | 3,3 | 0,8 | 84,3 | 100,0 | 822 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 75,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 19,3 | 100,0 | 242 |
| Autres villes | 64,5 | 3,3 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 31,6 | 100,0 | 1 863 |
| Ensemble urbain | 65,7 | 3,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 30,2 | 100,0 | 2 105 |
| Rural | 58,8 | 2,8 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 37,1 | 100,0 | 3 397 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 58,2 | 5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 35,7 | 100,0 | 766 |
| Atacora | 27,8 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 70,1 | 100,0 | 499 |
| Atlantique | 62,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 33,3 | 100,0 | 595 |
| Borgou | 37,9 | 2,1 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | 58,2 | 100,0 | 730 |
| Collines | 74,6 | 3,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 21,9 | 100,0 | 353 |
| Couffo | 62,8 | 2,0 | 0,2 | 1,3 | 1,4 | 32,2 | 100,0 | 375 |
| Donga | 69,3 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 29,6 | 100,0 | 391 |
| Littoral | 75,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 19,3 | 100,0 | 242 |
| Mono | 62,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 24,9 | 100,0 | 225 |
| Ouémé | 72,9 | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 24,0 | 100,0 | 479 |
| Plateau | 75,8 | 2,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 21,3 | 100,0 | 340 |
| Zou | 88,9 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 9,0 | 100,0 | 508 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 56,4 | 2,6 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 39,8 | 100,0 | 3 458 |
| Primaire | 67,7 | 3,9 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 27,2 | 100,0 | 1 036 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 70,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 25,1 | 100,0 | 731 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 77,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 100,0 | 277 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 40,6 | 2,3 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 55,1 | 100,0 | 1 153 |
| Second | 60,9 | 3,1 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 34,6 | 100,0 | 1 139 |
| Moyen | 63,5 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 32,2 | 100,0 | 1 134 |
| Quatrième | 69,0 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 27,5 | 100,0 | 1 097 |
| Le plus élevé | 76,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 20,5 | 100,0 | 979 |
| Ensemble | 61,5 | 3,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 34,5 | 100,0 | 5 502 |

Tableau 8.11 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né

Répartition (en %) des naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par durée écoulée entre le premier examen postnatal et l'accouchement et pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les 2 premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal du nouveau-né ¹ | | | | | | Ne sait pas/ manquant | Pas d'examen postnatals ² | Total | Pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les 2 premiers jours après la naissance ¹ | Effectif de naissances |
|--|--|------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------------------|--------------------------------------|-------|--|------------------------|
| | Moins d'1 heure | 1-3 heures | 4-23 heures | 1-2 jours | 3-6 jours | | | | | | |
| Âge de la mère à la naissance | | | | | | | | | | | |
| <20 | 21,4 | 26,4 | 8,2 | 8,5 | 1,6 | 8,3 | 25,6 | 100,0 | 64,5 | 724 | |
| 20-34 | 22,7 | 26,5 | 7,4 | 7,6 | 0,9 | 5,7 | 29,2 | 100,0 | 64,2 | 4 017 | |
| 35-49 | 20,2 | 27,0 | 7,6 | 8,4 | 1,2 | 5,0 | 30,5 | 100,0 | 63,2 | 760 | |
| Rang de naissance | | | | | | | | | | | |
| 1 | 24,4 | 26,6 | 9,1 | 8,4 | 1,5 | 7,0 | 22,9 | 100,0 | 68,6 | 1 228 | |
| 2-3 | 21,9 | 28,4 | 7,6 | 7,5 | 1,0 | 5,6 | 28,0 | 100,0 | 65,4 | 1 971 | |
| 4-5 | 23,2 | 26,8 | 7,7 | 7,3 | 0,7 | 5,4 | 28,9 | 100,0 | 65,0 | 1 304 | |
| 6+ | 18,8 | 22,5 | 5,3 | 8,5 | 1,1 | 5,9 | 38,0 | 100,0 | 55,0 | 999 | |
| Lieu d'accouchement | | | | | | | | | | | |
| Établissement de santé | 25,8 | 30,6 | 8,6 | 8,8 | 0,7 | 6,8 | 18,8 | 100,0 | 73,7 | 4 680 | |
| Ailleurs | 1,8 | 3,8 | 1,4 | 2,6 | 2,8 | 1,0 | 86,5 | 100,0 | 9,7 | 822 | |
| Résidence | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 35,2 | 30,4 | 7,9 | 7,6 | 1,0 | 4,4 | 13,6 | 100,0 | 81,0 | 242 | |
| Autres villes | 22,3 | 29,1 | 8,0 | 7,1 | 1,1 | 6,5 | 25,9 | 100,0 | 66,4 | 1 863 | |
| Ensemble urbain | 23,8 | 29,2 | 8,0 | 7,1 | 1,1 | 6,3 | 24,5 | 100,0 | 68,1 | 2 105 | |
| Rural | 21,2 | 24,9 | 7,3 | 8,3 | 1,0 | 5,7 | 31,7 | 100,0 | 61,6 | 3 397 | |
| Département | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 27,6 | 16,6 | 5,5 | 15,6 | 0,6 | 4,3 | 29,8 | 100,0 | 65,3 | 766 | |
| Atacora | 0,7 | 13,4 | 7,5 | 11,5 | 3,0 | 3,0 | 60,8 | 100,0 | 33,1 | 499 | |
| Atlantique | 37,8 | 16,4 | 9,7 | 2,5 | 0,4 | 9,5 | 23,7 | 100,0 | 66,4 | 595 | |
| Borgou | 13,2 | 20,1 | 1,7 | 2,2 | 0,8 | 10,5 | 51,6 | 100,0 | 37,1 | 730 | |
| Collines | 22,3 | 28,2 | 10,9 | 11,5 | 0,4 | 5,9 | 20,7 | 100,0 | 73,0 | 353 | |
| Couffo | 22,2 | 34,3 | 1,9 | 4,0 | 1,5 | 2,8 | 33,3 | 100,0 | 62,4 | 375 | |
| Donga | 8,9 | 36,7 | 13,2 | 11,0 | 1,3 | 10,2 | 18,7 | 100,0 | 69,8 | 391 | |
| Littoral | 35,2 | 30,4 | 7,9 | 7,6 | 1,0 | 4,4 | 13,6 | 100,0 | 81,0 | 242 | |
| Mono | 12,7 | 36,0 | 8,3 | 13,2 | 1,6 | 2,3 | 25,8 | 100,0 | 70,2 | 225 | |
| Ouémé | 22,1 | 31,0 | 15,7 | 6,9 | 0,9 | 5,7 | 17,7 | 100,0 | 75,7 | 479 | |
| Plateau | 15,7 | 44,7 | 11,4 | 6,8 | 1,8 | 4,6 | 15,0 | 100,0 | 78,7 | 340 | |
| Zou | 42,3 | 38,7 | 3,2 | 4,1 | 0,2 | 3,0 | 8,5 | 100,0 | 88,3 | 508 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 20,2 | 24,1 | 6,9 | 8,3 | 1,2 | 5,6 | 33,8 | 100,0 | 59,4 | 3 458 | |
| Primaire | 23,9 | 30,6 | 8,4 | 7,0 | 0,9 | 7,1 | 22,2 | 100,0 | 69,9 | 1 036 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 25,5 | 31,4 | 9,5 | 7,7 | 1,1 | 6,5 | 18,2 | 100,0 | 74,2 | 731 | |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 31,7 | 29,4 | 7,3 | 6,2 | 0,0 | 4,5 | 21,0 | 100,0 | 74,5 | 277 | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 14,4 | 16,8 | 5,0 | 8,7 | 1,2 | 5,2 | 48,7 | 100,0 | 44,9 | 1 153 | |
| Second | 22,5 | 26,1 | 8,0 | 7,3 | 1,0 | 4,4 | 30,7 | 100,0 | 64,0 | 1 139 | |
| Moyen | 20,8 | 28,4 | 8,3 | 9,5 | 1,2 | 6,5 | 25,3 | 100,0 | 67,0 | 1 134 | |
| Quatrième | 23,2 | 31,3 | 7,7 | 6,9 | 0,8 | 7,8 | 22,3 | 100,0 | 69,0 | 1 097 | |
| Le plus élevé | 31,4 | 31,2 | 8,9 | 6,5 | 1,0 | 5,8 | 15,2 | 100,0 | 78,0 | 979 | |
| Ensemble | 22,2 | 26,6 | 7,5 | 7,8 | 1,0 | 5,9 | 28,9 | 100,0 | 64,1 | 5 502 | |

¹ Sont inclus les nouveau-nés qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une infirmière, une sage-femme, un agent de santé communautaire ou une accoucheuse traditionnelle.

² Y compris les nouveau-nés qui ont eu un examen après la première semaine.

Tableau 8.12 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né

Répartition (en %) des naissances vivantes les récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né dans les 2 jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né | | | | Pas d'examen postnatal au cours des 2 jours après la naissance | Total | Effectif de naissances |
|--|---|----------------|----------------------------|---------|--|-------|------------------------|
| | Médecin/ infirmière/ sage-femme | Aide-soignante | Accoucheuse traditionnelle | Matrone | | | |
| Âge de la mère à la naissance | | | | | | | |
| <20 | 59,4 | 4,1 | 0,5 | 0,5 | 35,5 | 100,0 | 724 |
| 20-34 | 60,6 | 3,0 | 0,4 | 0,3 | 35,8 | 100,0 | 4 017 |
| 35-49 | 60,4 | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 36,8 | 100,0 | 760 |
| Rang de naissance | | | | | | | |
| 1 | 64,6 | 3,5 | 0,1 | 0,4 | 31,4 | 100,0 | 1 228 |
| 2-3 | 61,4 | 3,2 | 0,5 | 0,2 | 34,6 | 100,0 | 1 971 |
| 4-5 | 61,8 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | 35,0 | 100,0 | 1 304 |
| 6+ | 51,5 | 2,6 | 0,5 | 0,4 | 45,0 | 100,0 | 999 |
| Lieu d'accouchement | | | | | | | |
| Établissement de santé | 69,9 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 26,3 | 100,0 | 4 680 |
| Ailleurs | 6,3 | 0,4 | 2,4 | 0,6 | 90,3 | 100,0 | 822 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 75,2 | 5,3 | 0,0 | 0,5 | 19,0 | 100,0 | 242 |
| Autres villes | 62,9 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 33,6 | 100,0 | 1 863 |
| Ensemble urbain | 64,3 | 3,5 | 0,1 | 0,2 | 31,9 | 100,0 | 2 105 |
| Rural | 57,9 | 2,7 | 0,5 | 0,4 | 38,4 | 100,0 | 3 397 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | 57,1 | 6,4 | 1,5 | 0,2 | 34,7 | 100,0 | 766 |
| Atacora | 31,4 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 66,9 | 100,0 | 499 |
| Atlantique | 63,2 | 2,5 | 0,0 | 0,7 | 33,6 | 100,0 | 595 |
| Borgou | 32,9 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | 62,9 | 100,0 | 730 |
| Collines | 70,7 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 27,0 | 100,0 | 353 |
| Couffo | 59,9 | 1,3 | 0,0 | 1,1 | 37,6 | 100,0 | 375 |
| Donga | 68,7 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 30,2 | 100,0 | 391 |
| Littoral | 75,2 | 5,3 | 0,0 | 0,5 | 19,0 | 100,0 | 242 |
| Mono | 59,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 100,0 | 225 |
| Ouémé | 73,9 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 24,3 | 100,0 | 479 |
| Plateau | 77,0 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 21,3 | 100,0 | 340 |
| Zou | 86,4 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 11,7 | 100,0 | 508 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucun | 55,8 | 2,8 | 0,6 | 0,3 | 40,6 | 100,0 | 3 458 |
| Primaire | 65,8 | 3,3 | 0,1 | 0,7 | 30,1 | 100,0 | 1 036 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 70,3 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 25,8 | 100,0 | 731 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 71,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 100,0 | 277 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 40,8 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 55,1 | 100,0 | 1 153 |
| Second | 59,9 | 3,2 | 0,6 | 0,4 | 36,0 | 100,0 | 1 139 |
| Moyen | 63,0 | 3,3 | 0,2 | 0,5 | 33,0 | 100,0 | 1 134 |
| Quatrième | 65,3 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 31,0 | 100,0 | 1 097 |
| Le plus élevé | 75,5 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 22,0 | 100,0 | 979 |
| Ensemble | 60,4 | 3,0 | 0,4 | 0,3 | 35,9 | 100,0 | 5 502 |

Tableau 8.13 Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés

Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains actes/conseils au cours des 2 premiers jours après la naissance et pourcentage pour lesquelles au moins deux actes /conseils ont été effectués dans les 2 premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains actes/conseils au cours des 2 premiers jours après la naissance : | | | | | | Pourcentage pour lesquelles on a effectué au moins deux actes/ conseils au cours des 2 premiers jours après la naissance | Effectif de naissances |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------|
| | Examen du cordon | Prise de la température | Counseling sur les signes de danger | Counseling sur l'allaitement | Observation de l'allaitement | Pesé ¹ | | |
| Âge de la mère à la naissance | | | | | | | | |
| <20 | 44,9 | 46,1 | 38,7 | 46,5 | 40,4 | 67,6 | 58,6 | 724 |
| 20-34 | 46,6 | 48,7 | 39,0 | 46,5 | 40,7 | 66,3 | 59,0 | 4 017 |
| 35-49 | 42,4 | 46,1 | 36,4 | 41,8 | 33,5 | 66,8 | 52,4 | 760 |
| Rang de naissance | | | | | | | | |
| 1 | 48,0 | 51,6 | 43,6 | 52,3 | 46,1 | 72,4 | 63,7 | 1 228 |
| 2-3 | 47,5 | 48,5 | 39,3 | 46,8 | 40,9 | 67,9 | 59,3 | 1 971 |
| 4-5 | 46,5 | 48,4 | 38,1 | 45,4 | 38,4 | 64,0 | 57,1 | 1 304 |
| 6+ | 38,8 | 42,0 | 31,9 | 36,9 | 31,0 | 60,1 | 49,7 | 999 |
| Lieu d'accouchement | | | | | | | | |
| Établissement de santé | 49,7 | 53,0 | 42,3 | 50,7 | 43,7 | 76,7 | 64,0 | 4 680 |
| Ailleurs | 23,3 | 19,6 | 17,5 | 18,5 | 16,4 | 8,6 | 23,8 | 822 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 65,3 | 71,7 | 56,2 | 66,3 | 58,2 | 90,9 | 77,3 | 242 |
| Autres villes | 46,2 | 51,0 | 41,4 | 49,5 | 44,5 | 71,6 | 61,0 | 1 863 |
| Ensemble urbain | 48,4 | 53,4 | 43,1 | 51,4 | 46,1 | 73,8 | 62,9 | 2 105 |
| Rural | 44,2 | 44,7 | 35,8 | 42,4 | 35,7 | 62,1 | 55,0 | 3 397 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 43,6 | 34,8 | 35,9 | 36,7 | 29,8 | 46,4 | 44,5 | 766 |
| Atacora | 18,8 | 32,8 | 17,8 | 19,5 | 12,3 | 55,7 | 36,9 | 499 |
| Atlantique | 52,8 | 57,2 | 43,2 | 59,1 | 55,1 | 84,3 | 70,7 | 595 |
| Borgou | 35,4 | 37,0 | 35,4 | 32,2 | 27,9 | 45,4 | 40,7 | 730 |
| Collines | 47,0 | 51,2 | 44,3 | 48,7 | 41,4 | 84,0 | 58,8 | 353 |
| Couffo | 45,6 | 33,8 | 27,4 | 40,4 | 30,0 | 54,7 | 53,0 | 375 |
| Donga | 48,6 | 57,8 | 50,2 | 50,9 | 40,7 | 70,8 | 63,3 | 391 |
| Littoral | 65,3 | 71,7 | 56,2 | 66,3 | 58,2 | 90,9 | 77,3 | 242 |
| Mono | 46,8 | 47,9 | 40,9 | 48,1 | 44,2 | 76,4 | 57,5 | 225 |
| Ouémé | 52,0 | 52,9 | 28,0 | 45,3 | 41,4 | 81,8 | 72,6 | 479 |
| Plateau | 58,4 | 59,0 | 50,1 | 67,9 | 55,9 | 56,0 | 74,7 | 340 |
| Zou | 55,4 | 65,5 | 51,0 | 62,9 | 61,9 | 87,3 | 74,4 | 508 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | |
| Aucun | 42,0 | 43,8 | 34,7 | 40,2 | 35,0 | 58,2 | 52,7 | 3 458 |
| Primaire | 52,2 | 55,1 | 44,1 | 54,3 | 45,2 | 75,4 | 67,0 | 1 036 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 52,6 | 54,4 | 46,6 | 56,2 | 49,6 | 83,4 | 66,9 | 731 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 50,7 | 57,1 | 45,8 | 57,9 | 51,2 | 93,8 | 67,9 | 277 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 32,7 | 33,7 | 24,7 | 28,3 | 22,2 | 42,4 | 41,0 | 1 153 |
| Second | 41,9 | 44,0 | 35,8 | 41,7 | 34,4 | 62,6 | 53,7 | 1 139 |
| Moyen | 48,4 | 49,6 | 42,1 | 48,9 | 42,0 | 69,0 | 60,9 | 1 134 |
| Quatrième | 52,2 | 54,2 | 43,4 | 53,6 | 49,4 | 75,1 | 65,6 | 1 097 |
| Le plus élevé | 55,5 | 60,7 | 48,9 | 59,3 | 52,7 | 87,2 | 71,3 | 979 |
| Ensemble | 45,8 | 48,0 | 38,6 | 45,9 | 39,7 | 66,6 | 58,0 | 5 502 |

¹ Concerne les nouveau-nés qui ont été pesés « à la naissance ». Il se peut que certains nouveau-nés pesés au cours des 2 jours après la naissance aient été exclus.

Tableau 8.14 Problèmes d'accès aux soins de santé

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'elles avaient des problèmes importants d'accès aux soins de santé quand elles étaient malades, par type de problèmes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Problèmes d'accès aux soins de santé | | | | | Effectif de femmes |
|--|--|--|---|------------------------------|---|--------------------|
| | Obtenir la permission d'aller se faire soigner | Obtenir l'argent pour se faire soigner | Distance jusqu'à l'établissement de santé | Ne veut pas s'y rendre seule | Au moins un problème d'accès aux soins de santé | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 25,2 | 50,4 | 30,1 | 25,7 | 58,6 | 3 350 |
| 20-34 | 22,2 | 53,0 | 31,5 | 18,6 | 60,1 | 8 111 |
| 35-49 | 19,7 | 55,8 | 31,3 | 17,5 | 62,1 | 4 467 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | |
| 0 | 22,7 | 48,8 | 28,4 | 23,5 | 57,0 | 4 244 |
| 1-2 | 21,1 | 51,2 | 29,5 | 18,0 | 57,8 | 4 464 |
| 3-4 | 22,1 | 54,6 | 31,1 | 17,6 | 61,7 | 3 863 |
| 5+ | 22,8 | 60,0 | 36,8 | 19,8 | 66,6 | 3 357 |
| État matrimonial | | | | | | |
| Célibataire | 22,3 | 50,4 | 27,5 | 24,2 | 58,1 | 3 889 |
| En union | 22,6 | 53,1 | 32,4 | 18,2 | 60,3 | 11 168 |
| En rupture d'union | 15,3 | 68,0 | 31,4 | 20,0 | 71,6 | 871 |
| Emploi dans les 12 derniers mois | | | | | | |
| Ne travaillait pas | 20,7 | 44,8 | 28,6 | 19,7 | 52,3 | 3 525 |
| Travaillait et était payée en argent | 22,2 | 56,6 | 31,5 | 18,3 | 63,7 | 9 676 |
| Travaillait et n'était pas payée en argent | 23,8 | 52,4 | 33,0 | 25,0 | 59,0 | 2 727 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 10,6 | 39,0 | 12,8 | 12,7 | 47,3 | 958 |
| Autres villes | 21,1 | 51,0 | 27,1 | 17,9 | 57,5 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 19,6 | 49,3 | 25,1 | 17,2 | 56,1 | 6 761 |
| Rural | 24,0 | 56,2 | 35,6 | 21,6 | 63,5 | 9 167 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 43,8 | 38,7 | 36,8 | 22,9 | 47,6 | 1 878 |
| Atacora | 22,6 | 59,4 | 45,5 | 38,9 | 71,9 | 1 302 |
| Atlantique | 10,9 | 57,7 | 27,6 | 19,2 | 66,5 | 2 037 |
| Borgou | 36,4 | 58,7 | 48,1 | 22,0 | 63,2 | 1 839 |
| Collines | 3,6 | 50,9 | 13,2 | 6,5 | 54,3 | 1 151 |
| Couffo | 11,2 | 48,7 | 24,3 | 8,5 | 53,1 | 1 041 |
| Donga | 12,5 | 39,0 | 31,4 | 13,4 | 49,7 | 881 |
| Littoral | 10,6 | 39,0 | 12,8 | 12,7 | 47,3 | 958 |
| Mono | 35,9 | 68,7 | 35,2 | 23,1 | 73,8 | 759 |
| Ouémé | 26,1 | 61,7 | 25,9 | 14,4 | 64,0 | 1 507 |
| Plateau | 29,0 | 71,0 | 48,2 | 30,3 | 76,1 | 970 |
| Zou | 12,5 | 48,5 | 18,8 | 20,3 | 58,4 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 26,2 | 56,8 | 37,0 | 20,9 | 63,9 | 8 785 |
| Primaire | 18,2 | 56,1 | 27,8 | 19,2 | 61,7 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 18,4 | 46,4 | 22,8 | 18,9 | 54,2 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 10,5 | 35,4 | 16,7 | 14,6 | 44,8 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 33,1 | 61,4 | 51,5 | 28,8 | 70,1 | 2 735 |
| Second | 25,4 | 59,1 | 35,9 | 20,7 | 65,1 | 3 030 |
| Moyen | 22,0 | 55,6 | 32,6 | 19,7 | 63,5 | 3 104 |
| Quatrième | 19,8 | 53,9 | 25,7 | 18,1 | 59,4 | 3 405 |
| Le plus élevé | 13,5 | 39,6 | 15,9 | 13,8 | 47,4 | 3 654 |
| Ensemble | 22,1 | 53,3 | 31,1 | 19,8 | 60,4 | 15 928 |

Résultats clés

- **Vaccination** : Plus d'un enfant de 12-23 mois sur 2 (57 %) ont reçu tous les vaccins de base.
- **Symptômes d'IRA** : Au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, 3 % des enfants de moins de 5 ans ont présenté des symptômes d'IRA. Pour 46 % de ces enfants, des conseils ou un traitement ont été recherchés.
- **Fièvre** : Au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, 19 % des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre. Des conseils ou traitement ont été recherchés pour 53 % de ces enfants.
- **Diarrhée** : Au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, 10 % des enfants de moins de 5 ans ont eu la diarrhée. Des conseils ou traitement ont été recherchés pour 43 % de ces enfants. Dans 37 % des cas, les enfants ayant eu la diarrhée ont reçu une TRO mais dans 31 % des cas, les enfants n'ont reçu aucun traitement.
- **Évacuation des selles des enfants** : Les résultats montrent que dans 35 % des cas, on s'est débarrassé de manière hygiénique des dernières selles des enfants les plus jeunes de moins de 2 ans qui vivaient avec leur mère.

Les données sur la santé et la survie des enfants peuvent aider les décideurs et les responsables de programmes à évaluer l'efficacité des stratégies actuelles, à élaborer des interventions appropriées pour prévenir les décès causés par les maladies infantiles et améliorer la santé des enfants au Bénin.

Ce chapitre présente les résultats concernant le poids à la naissance et la couverture vaccinale des jeunes enfants. Les données sur la prévalence et les traitements des trois maladies infantiles les plus courantes comme les symptômes d'infections respiratoires aiguës (IRA), la fièvre et la diarrhée y sont aussi analysées. En outre, étant donné l'importance des pratiques hygiéniques appropriées dans la prévention et la réduction des maladies diarrhéiques, le chapitre présente également les résultats sur l'évacuation des selles des enfants.

9.1 POIDS A LA NAISSANCE

Faible poids à la naissance

Pourcentage de naissances dont le poids déclaré à la naissance est inférieur 2,5 kg sans tenir compte de l'âge gestationnel.

Échantillon : Naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête pour lesquelles on dispose d'un poids à la naissance, soit basée sur un enregistrement écrit, soit basé sur la déclaration de la mère.

D'après les carnets ou les déclarations de la mère, le poids à la naissance des enfants n'est connu que dans 60 % des cas, soit six enfants sur dix. Pour les naissances dont on connaît le poids, 12 % sont de faible poids à la naissance (**Tableau 9.1**).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants pour lesquels on dispose d'un poids à la naissance a peu varié, passant de 59 % à 60 %. Il en est de même du pourcentage de naissances dont le poids est inférieur à 2,5kg qui est passé de 13 % à 12 % dans la même période.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de naissances de faible poids diminue avec l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, de 18 % lorsque la mère a moins de 20 ans à 11 % lorsqu'elle a plus de 20 ans.
- Le pourcentage de naissances de faible poids est plus élevé quand la mère fume des cigarettes que quand elle n'en fume pas (18 %, contre 12 %).
- Les résultats selon le département montrent que c'est le Mono qui présente le plus faible pourcentage d'enfants pesant moins de 2,5 kg à la naissance (7 %), et les départements de l'Atacora le niveau le plus élevé (18 %) suivi par l'Alibori (17 %).

9.2 VACCINATION DES ENFANTS

Couverture de tous les vaccins de base

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu des vaccins spécifiques à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère). On considère qu'un enfant a reçu tous les vaccins de base, s'il a reçu au moins :


- Une dose du vaccin BCG qui protège contre la tuberculose
- Trois doses de vaccin DTC qui protège contre la diphtérie, le tétanos la coqueluche
- Trois doses de vaccin contre la polio
- Une dose de vaccin contre la rougeole

Échantillon : Enfants vivants de 12-23 mois

Au Bénin, 57 % des enfants de 12-23 mois ont reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête et 51 % ont reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âge (**Tableau 9.2**); Par contre, 11 % des enfants de 12-23 mois n'ont reçu aucun vaccin à n'importe quel moment avant l'enquête (**Graphique 9.1**).

Graphique 9.1 Vaccinations infantiles

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête




Tendances : Comparativement à l'EDSB-IV, la couverture vaccinale de base chez les enfants de 12-23 mois a augmenté de près de 10 points de pourcentage, passant de 48 % en 2011-2012 à 57 % en 2017-2018 (**Graphique 9.2**).

Variations par caractéristique

- Quel que soit le vaccin et la dose, on constate que le pourcentage d'enfants vaccinés diminue avec le rang de naissance (**Tableau 9.3**).
- La couverture vaccinale de base est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (60 % contre 54 %) (**Graphique 9.3**).
- La proportion d'enfants ayant reçu tous les vaccins appropriés est plus élevée dans le groupe d'âges 12-23 mois (51 %) que dans le groupe d'âge 24-35 mois (47 %).


Graphique 9.2 Tendances de la couverture vaccinale

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête



Graphique 9.3 Couverture vaccinale par résidence

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête



- On observe des écarts entre les départements : la proportion d'enfants ayant reçu tous les vaccins de base varie de 29 % dans le Plateau à 71 % dans l'Ouémé, l'Atacora et le Mono (**Graphique 9.4**).
- La couverture vaccinale de base des enfants de 12-23 mois varie avec le niveau d'instruction de la mère : quand la mère n'a aucun niveau d'instruction, 15 % des enfants n'ont reçu aucun vaccin contre 5 % quand la mère a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.

9.2.1 Possession et disponibilité d'un carnet de vaccination

Le carnet de vaccination est un document important pour s'assurer que l'enfant a bien reçu tous les vaccins recommandés. Au Bénin, 90 % des enfants de 12-23 mois et 87 % des enfants de 24-35 mois ont déjà eu un carnet de vaccination. Par contre, les pourcentages avec un carnet de vaccination qui a été vu sont respectivement de 72 % et de 64 % (**Tableau 9.4**).

9.3 SYMPTOMES D'INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS

Les infections respiratoires aiguës, et particulièrement la pneumonie, constituent l'une des premières causes de mortalité des enfants dans les pays en développement. Pour évaluer la prévalence de ces infections chez les enfants, on a demandé aux enquêtées si leurs enfants avaient souffert de la toux pendant les deux semaines ayant précédé l'interview.

Dans le cas d'une réponse positive, on a demandé si cette toux avait été accompagnée d'une respiration courte et rapide, et si ces difficultés respiratoires étaient dues à un problème de bronches (symptômes caractéristiques d'IRA). Pour les enfants qui avaient présenté des symptômes d'IRA au cours de cette période, on a demandé s'ils avaient été conduits en consultation ou si des conseils ou un traitement avaient été recherchés.

Traitement des infections respiratoires aiguës (IRA)

Enfants avec des symptômes d'IRA pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement. Les symptômes d'IRA comprennent une respiration courte et rapide associée à des problèmes dans la poitrine, et/ou de difficultés respiratoires associées à des problèmes dans la poitrine.


Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview.

Parmi les enfants de moins de 5 ans, 3 % ont présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines qui ont précédé l'interview (**Tableau 9.5**).

Pour 46 % des enfants de moins de 5 ans, des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès d'un prestataire de santé. Cependant, dans seulement 16 % des cas, les conseils ou le traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant l'apparition des symptômes. Des conseils ou un traitement ont été recherchés

Graphique 9.4 Couverture vaccinale par département

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête



pour un peu moins de la moitié (46 %) des enfants ayant présenté des symptômes d'IRA dans le secteur public de santé (Tableau 9.6).

9.4 FIEVRE

Traitement de la fièvre

Enfants avec de la fièvre pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview

Pour estimer la prévalence de la fièvre, on a demandé aux mères si leurs enfants de moins de 5 ans avaient eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview. Au Bénin, 19 % des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview (Tableau 9.7).

9.5 MALADIES DIARRHEIQUES

9.5.1 Prévalence de la diarrhée


Au Bénin, 10 % des enfants de moins de 5 ans ont eu, au moins, un épisode de diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview. Pour 43 % de ces enfants, des conseils ou un traitement ont été recherchés (Tableau 9.8).

Variations par caractéristique

- C'est dans les groupes d'âges 6-11 mois et 12-23 mois que la prévalence de la diarrhée demeure la plus élevée (soit respectivement 18 % et 16 %) (Graphique 9.5).
- La prévalence de la diarrhée ne varie pas entre le milieu rural (11 %) et le milieu urbain (10 %).
- Les résultats selon le département montrent que la prévalence de la diarrhée est plus importante dans l'Atacora (20 %), la Donga (14 %) et le Plateau (14 %) que dans le Zou (5 %) et le Borgou (7 %) (Tableau 9.8).

Graphique 9.5 Prévalence de la diarrhée par âge

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'enquête



9.5.2 Traitement de la diarrhée

Thérapie de réhydratation par voie orale


Enfants avec diarrhée à qui on a augmenté les quantités de liquides ou à qui on a donné des liquides préparés à partir de sachets spéciaux de sels de réhydratation orale (SRO) ou des liquides préparés à partir de solution maison recommandée (SMR) par le gouvernement.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête.

Le **Tableau 9.9** présente les proportions d'enfants de moins de 5 ans à qui on a donné divers traitements contre la diarrhée. Dans 37 % des cas, on a administré aux enfants malades une TRO, (soit des SRO, des SMR, ou une augmentation des liquides). En outre, seulement 17 % des enfants ayant eu la diarrhée ont reçu du zinc, et 11 % ont reçu une association de SRO et de zinc (**Graphique 9.6**).

Graphique 9.6 Traitement de la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'interview



9.5.3 Pratiques alimentaires

Pratiques alimentaires appropriées

Enfants avec diarrhée à qui on a donné plus de liquides que d'habitude et la même quantité de nourriture ou plus que d'habitude.


Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête

Au cours des épisodes diarrhéiques, il est recommandé de donner plus de liquides et d'aliments à l'enfant. Cependant, au Bénin les résultats montrent que seulement 16 % des enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ont reçu plus de liquides que ce qu'ils ont l'habitude de prendre. Parmi ces enfants ayant souffert de diarrhée, environ un sur deux a reçu moins de liquides qu'à l'accoutumée : 35 % en ont reçu un peu moins mais 15 % en ont reçu beaucoup moins. En outre, dans 6 % des cas, les enfants n'ont pas reçu de liquides (**Tableau 9.10**).

Concernant la prise d'aliments, on constate qu'un peu plus de deux enfants ayant eu la diarrhée sur cinq (42 %) ont été nourris conformément aux recommandations. Ces enfants ont reçu, soit la même quantité de nourriture (33 %), soit davantage (9 %). Par contre, pour près de la moitié des enfants, l'alimentation a été réduite (49 %) : dans 37 % des cas, les enfants en ont reçu un peu moins que la quantité habituelle mais dans 12 % des cas, ils en ont reçu beaucoup moins (**Graphique 9.7**).

Graphique 9.7 Pratiques alimentaires pendant la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'enquête



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

Le **Tableau 9.9** présente des informations plus détaillées sur les pratiques alimentaires des enfants pendant la diarrhée.

9.5.4 Sources des conseils ou traitement

Le **Tableau 9.11** présente les pourcentages d'enfants qui ont eu la diarrhée pendant la période de référence selon la source du traitement. Les données sont présentées pour 3 catégories d'enfants : ceux ayant eu la diarrhée, ceux pour lesquels on a recherché un traitement ou des conseils et ceux ayant eu la diarrhée et qui ont été traités avec des SRO.

Quelle que soit la catégorie d'enfants, les résultats montrent que c'est au secteur public, notamment dans les centres de santé du gouvernement (38 %) que se sont principalement adressées les enquêtées pour obtenir des conseils ou un traitement pour soigner les enfants ayant eu la diarrhée.


9.5.5 Connaissance des sachets de SRO

Au Bénin, près de sept femmes de 15-49 ans sur dix (70 %) ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés (**Tableau 9.12**). Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (77 % contre 66 %). Le niveau de connaissance concernant les sachets SRO préconditionnés varie avec le niveau d'instruction des femmes. En effet, il passe de 65 % parmi celles qui n'ont aucun niveau d'instruction à 94 % parmi celle qui ont un niveau secondaire 2^d cycle ou plus supérieur.

9.6 TRAITEMENT DES MALADIES INFANTILES

Les résultats de l'EDSB-V 2017-2018 montrent que c'est la fièvre qui a le plus affecté les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview (19 % contre 3 % pour les IRA et 10 % pour la diarrhée). C'est pour les enfants qui ont eu de la fièvre que l'on a le plus fréquemment recherché des conseils ou un traitement (53 % contre respectivement 46 % et 43 %) (**Graphique 9.8**).

Graphique 9.8 Prévalence et traitement des maladies infantiles



9.7 ÉVACUATION DES SELLES DES ENFANTS

Évacuation appropriée des selles des enfants

Les selles de l'enfant le plus jeune ont été jetées ou rincées dans les toilettes ou les latrines, ou enterrées, ou l'enfant a utilisé les toilettes ou les latrines.

Échantillon : le plus jeune enfant de moins de 2 ans vivant avec sa mère

Le respect des règles d'hygiène lors de l'évacuation des selles des enfants évite la propagation de certaines maladies comme le choléra, l'amibiase etc. Au Bénin, le pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique est de 35 % (**Tableau 9.13**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants dont les mères se sont débarrassées des selles de manière hygiénique est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (48 % contre 27 %).

- Les départements du Littoral (69 %) et du Zou (55 %) enregistrent les proportions les plus élevées d'enfants dont les mères se sont débarrassées des selles de manière hygiénique. Par contre, avec seulement 7 %, c'est dans l'Atacora que l'on observe la proportion la plus faible.
- La proportion d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique est plus élevée dans le quintile de bien-être économique le plus élevé (75 %) que dans le quintile de bien être le plus bas (13 %).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le faible poids à la naissance, les vaccinations, les maladies infantiles et l'évacuation des selles des enfants, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 9.1** Taille et poids de l'enfant à la naissance
- **Tableau 9.2** Vaccinations par source d'information
- **Tableau 9.3** Vaccinations par caractéristique sociodémographique
- **Tableau 9.4** Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 9.5** Prévalence et traitement des symptômes d'IRA
- **Tableau 9.6** Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA
- **Tableau 9.7** Prévalence et traitement de la fièvre
- **Tableau 9.8** Prévalence et traitement de la diarrhée
- **Tableau 9.9** Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée
- **Tableau 9.10** Pratiques alimentaires durant la diarrhée
- **Tableau 9.11** Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée
- **Tableau 9.12** Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés
- **Tableau 9.13** Évacuation des selles des enfants

Tableau 9.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête selon l'estimation, par la mère, de la grosseur de l'enfant à la naissance, pourcentage des naissances vivantes des 5 années ayant précédé l'enquête pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré et parmi les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête dont on connaît le poids à la naissance, pourcentage qui pèse moins de 2,5 kg, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Répartition (en %) des naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance | | | | Total | Pourcentage de naissances pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré ¹ | Effectif de naissances | Parmi les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré ¹ | |
|--|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------|--|------------------------|--|------------------------|
| | Très petit | Plus petit que la moyenne | Moyen ou plus gros que la moyenne | Ne sait pas/manquant | | | | Pourcentage pesant moins de 2,5 kg | Effectif de naissances |
| Âge de la mère à la naissance | | | | | | | | | |
| <20 | 5,1 | 13,1 | 79,5 | 2,3 | 100,0 | 57,7 | 1 747 | 18,1 | 1 007 |
| 20-34 | 3,4 | 10,8 | 84,0 | 1,7 | 100,0 | 60,9 | 10 007 | 10,7 | 6 094 |
| 35-49 | 3,3 | 9,4 | 85,2 | 2,1 | 100,0 | 60,0 | 1 890 | 10,8 | 1 134 |
| Rang de naissance | | | | | | | | | |
| 1 | 3,8 | 12,5 | 82,1 | 1,7 | 100,0 | 64,7 | 3 005 | 15,6 | 1 944 |
| 2-3 | 3,3 | 10,3 | 84,6 | 1,8 | 100,0 | 62,0 | 4 930 | 11,3 | 3 056 |
| 4-5 | 3,6 | 10,1 | 84,5 | 1,8 | 100,0 | 59,7 | 3 206 | 8,8 | 1 914 |
| 6+ | 4,1 | 11,2 | 82,3 | 2,4 | 100,0 | 52,8 | 2 502 | 10,4 | 1 321 |
| Statut tabagique de la mère | | | | | | | | | |
| Fume cigarettes/tabac | 1,7 | 20,4 | 74,1 | 3,8 | 100,0 | 47,0 | 227 | 17,5 | 107 |
| Ne fume pas | 3,7 | 10,7 | 83,8 | 1,8 | 100,0 | 60,6 | 13 416 | 11,5 | 8 129 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 4,6 | 9,9 | 84,6 | 0,8 | 100,0 | 85,4 | 579 | 10,7 | 495 |
| Autres villes | 3,5 | 11,5 | 83,1 | 1,9 | 100,0 | 65,8 | 4 677 | 11,1 | 3 078 |
| Ensemble urbain | 3,6 | 11,3 | 83,3 | 1,8 | 100,0 | 68,0 | 5 256 | 11,0 | 3 573 |
| Rural | 3,6 | 10,6 | 83,8 | 1,9 | 100,0 | 55,6 | 8 387 | 12,0 | 4 662 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 5,6 | 5,2 | 86,2 | 3,0 | 100,0 | 36,4 | 1 831 | 17,1 | 666 |
| Atacora | 6,8 | 9,0 | 81,5 | 2,8 | 100,0 | 46,7 | 1 216 | 18,1 | 568 |
| Atlantique | 3,6 | 16,7 | 78,0 | 1,6 | 100,0 | 75,8 | 1 568 | 11,3 | 1 189 |
| Borgou | 2,1 | 18,2 | 76,5 | 3,2 | 100,0 | 38,6 | 1 784 | 12,7 | 689 |
| Collines | 1,3 | 6,2 | 92,1 | 0,4 | 100,0 | 83,6 | 869 | 10,9 | 726 |
| Couffo | 5,7 | 7,7 | 85,0 | 1,6 | 100,0 | 49,4 | 902 | 8,0 | 445 |
| Donga | 1,3 | 4,3 | 93,3 | 1,1 | 100,0 | 63,0 | 926 | 12,6 | 584 |
| Littoral | 4,6 | 9,9 | 84,6 | 0,8 | 100,0 | 85,4 | 579 | 10,7 | 495 |
| Mono | 3,8 | 18,2 | 75,1 | 2,9 | 100,0 | 71,1 | 613 | 7,4 | 436 |
| Ouémé | 4,1 | 15,1 | 79,1 | 1,7 | 100,0 | 71,6 | 1 197 | 9,1 | 857 |
| Plateau | 2,7 | 10,5 | 86,0 | 0,9 | 100,0 | 54,5 | 860 | 11,6 | 468 |
| Zou | 1,4 | 7,1 | 90,9 | 0,6 | 100,0 | 85,7 | 1 299 | 10,0 | 1 112 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | |
| Aucun | 4,0 | 10,4 | 83,4 | 2,2 | 100,0 | 52,4 | 8 964 | 12,0 | 4 699 |
| Primaire | 2,5 | 11,9 | 84,1 | 1,5 | 100,0 | 70,6 | 2 486 | 10,1 | 1 755 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 3,5 | 11,9 | 83,9 | 0,8 | 100,0 | 78,0 | 1 619 | 12,3 | 1 262 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 2,6 | 12,4 | 84,1 | 0,9 | 100,0 | 90,4 | 574 | 11,5 | 519 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 4,0 | 12,1 | 81,3 | 2,6 | 100,0 | 37,3 | 2 922 | 12,0 | 1 090 |
| Second | 4,8 | 9,9 | 82,9 | 2,4 | 100,0 | 54,9 | 2 811 | 13,4 | 1 544 |
| Moyen | 3,5 | 9,8 | 84,8 | 1,9 | 100,0 | 62,8 | 2 749 | 11,2 | 1 727 |
| Quatrième | 3,0 | 11,6 | 83,8 | 1,6 | 100,0 | 68,9 | 2 738 | 11,7 | 1 887 |
| Le plus élevé | 2,6 | 11,1 | 85,6 | 0,6 | 100,0 | 82,0 | 2 423 | 10,3 | 1 987 |
| Ensemble | 3,6 | 10,9 | 83,6 | 1,9 | 100,0 | 60,4 | 13 643 | 11,6 | 8 235 |

¹ Basé soit sur un enregistrement écrit, soit sur la déclaration de la mère.

Tableau 9.2 Vaccinations par source d'information

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et d'enfants de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête, par source d'information (carnet de vaccination ou déclaration de la mère) et pourcentage qui ont reçu certains vaccins à l'âge approprié, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Vaccin | Enfants de 12-23 mois | | | | Enfants de 24-35 mois | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------|--|
| | Carnet de vaccination ¹ | Déclaration de la mère | Les deux sources | Vacciné à l'âge approprié ^{2,3} | Carnet de vaccination ¹ | Déclaration de la mère | Les deux sources | Vacciné à l'âge approprié ^{2,3} |
| BCG | 69,2 | 19,0 | 88,2 | 88,1 | 62,1 | 23,4 | 85,5 | 84,6 |
| DTC-HepB-Hib | | | | | | | | |
| 1 | 66,3 | 18,0 | 84,2 | 84,0 | 59,9 | 22,5 | 82,4 | 81,1 |
| 2 | 63,7 | 14,6 | 78,3 | 77,9 | 57,3 | 18,6 | 75,9 | 74,7 |
| 3 | 60,5 | 12,5 | 73,0 | 72,2 | 54,4 | 16,7 | 71,2 | 69,6 |
| Polio | | | | | | | | |
| 0 (dose naissance) | 68,6 | 17,8 | 86,5 | 86,3 | 61,6 | 21,1 | 82,7 | 81,9 |
| 1 | 66,5 | 15,7 | 82,2 | 81,9 | 60,3 | 20,1 | 80,4 | 79,1 |
| 2 | 63,8 | 13,3 | 77,1 | 76,7 | 57,3 | 17,4 | 74,7 | 73,7 |
| 3 | 60,4 | 5,1 | 65,5 | 64,8 | 54,3 | 7,3 | 61,6 | 60,0 |
| Pneumocoque | | | | | | | | |
| 1 | 63,6 | 17,6 | 81,2 | 80,9 | 57,1 | 21,8 | 78,9 | 77,6 |
| 2 | 61,3 | 14,6 | 75,9 | 75,4 | 54,5 | 18,2 | 72,7 | 71,7 |
| 3 | 58,3 | 12,5 | 70,8 | 69,9 | 51,9 | 16,3 | 68,1 | 66,2 |
| Vaccin anti-rougeoleux | 53,4 | 14,6 | 67,9 | 64,5 | 47,9 | 18,9 | 66,8 | 61,0 |
| Fièvre jaune | 50,3 | 13,9 | 64,2 | 61,0 | 45,1 | 17,8 | 62,9 | 57,3 |
| Tous les vaccins de base⁴ | 52,3 | 4,3 | 56,6 | 53,7 | 47,1 | 6,0 | 53,1 | 48,3 |
| Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges⁵ | 47,6 | 3,7 | 51,3 | 48,8 | 42,3 | 5,0 | 47,3 | 42,5 |
| Aucun vaccin | 2,1 | 8,8 | 10,9 | na | 1,6 | 11,3 | 12,9 | na |
| Effectif d'enfants | 1 797 | 718 | 2 515 | 2 515 | 1 517 | 849 | 2 365 | 2 365 |

na = Non applicable

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphtérie-tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = Haemophilus influenzae type b

¹ Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

² Reçu avant l'âge de 12 mois

³ Pour les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On considère que les proportions de vaccins données au cours de la première et de la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccins.

⁴ BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 3 doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donnée à la naissance) et 1 dose de vaccin anti-rougeoleux.

⁵ BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 4 doses du vaccin oral contre la polio, 3 doses du vaccin contre le pneumocoque, 1 dose de vaccin anti-rougeoleux et 1 dose de vaccin contre la fièvre jaune.

Tableau 9.3. Vaccinations par caractéristique sociodémographique

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère) pourcentage ayant reçu tous les vaccins de base et pourcentage ayant reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ED5B-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Enfants de 12-23 mois | | | | | | | | | | Enfants de 24-35 mois | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|--------------------|------|--------------------|------|------|------|------|-----------------------|------|------------------------|------|--|------|--|--------------------|--------------|--------------------|
| | DTC-HepB-Hib | | | | | Polio ¹ | | | | | Pneumocoque | | Vaccin anti-rougeoleux | | Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ³ | | Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ⁴ | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 0 (dose manquante) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Aucun vaccin | Effectif d'enfants | Aucun vaccin | Effectif d'enfants |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 89,0 | 84,9 | 78,7 | 73,5 | 87,1 | 82,5 | 77,1 | 66,4 | 82,3 | 76,3 | 71,5 | 70,1 | 70,1 | 58,8 | 65,7 | 53,1 | 10,0 | 1 280 | 47,3 | 1 156 |
| Féminin | 87,4 | 83,6 | 78,0 | 72,5 | 85,8 | 81,9 | 77,2 | 64,7 | 80,1 | 75,4 | 70,1 | 70,1 | 65,7 | 54,4 | 62,7 | 49,5 | 11,8 | 1 234 | 47,3 | 1 209 |
| Rang de naissance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 93,1 | 88,9 | 82,9 | 77,1 | 90,6 | 87,4 | 81,3 | 68,5 | 84,0 | 78,8 | 73,7 | 71,1 | 71,1 | 58,7 | 66,9 | 52,5 | 6,6 | 579 | 48,6 | 501 |
| 2-3 | 88,0 | 84,5 | 78,2 | 74,5 | 86,5 | 81,6 | 76,7 | 66,3 | 82,3 | 76,5 | 72,7 | 68,7 | 68,7 | 57,7 | 64,7 | 52,5 | 10,7 | 903 | 48,7 | 890 |
| 4-5 | 86,7 | 82,1 | 76,7 | 71,5 | 85,0 | 80,6 | 75,9 | 65,1 | 80,3 | 74,9 | 70,7 | 67,3 | 67,3 | 55,6 | 64,0 | 50,9 | 12,1 | 605 | 48,5 | 562 |
| 6+ | 84,1 | 80,5 | 74,7 | 66,6 | 82,8 | 78,6 | 74,1 | 60,6 | 76,5 | 71,9 | 63,1 | 62,8 | 62,8 | 53,0 | 60,0 | 47,8 | 15,3 | 427 | 41,0 | 413 |
| Carnet de vaccination⁵ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vu | 96,8 | 92,7 | 89,2 | 84,7 | 96,1 | 93,0 | 89,3 | 84,6 | 89,0 | 85,7 | 81,5 | 74,7 | 74,7 | 73,2 | 70,4 | 66,7 | 2,9 | 1 797 | 66,0 | 1 517 |
| Non vu/pas de carnet | 66,6 | 63,0 | 51,2 | 43,9 | 62,4 | 55,1 | 46,6 | 17,9 | 61,8 | 51,1 | 43,9 | 51,0 | 51,0 | 15,0 | 48,8 | 12,9 | 30,8 | 718 | 13,9 | 849 |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 97,1 | 92,5 | 91,5 | 87,0 | 96,0 | 95,1 | 91,4 | 76,3 | 92,6 | 91,9 | 85,9 | 78,1 | 78,1 | 66,7 | 71,2 | 56,8 | 2,4 | 127 | 56,8 | 103 |
| Autres villes | 91,7 | 87,3 | 82,3 | 76,4 | 90,2 | 85,5 | 81,1 | 68,8 | 84,1 | 79,9 | 74,5 | 70,6 | 70,6 | 59,4 | 67,0 | 54,5 | 8,1 | 817 | 52,5 | 874 |
| Ensemble urbain | 92,4 | 88,0 | 83,5 | 77,8 | 91,0 | 86,8 | 82,5 | 69,8 | 85,3 | 81,5 | 76,1 | 71,6 | 71,6 | 60,4 | 67,6 | 54,8 | 7,4 | 944 | 53,0 | 976 |
| Rural | 85,7 | 82,0 | 75,2 | 70,2 | 83,7 | 79,4 | 73,9 | 63,0 | 78,8 | 72,5 | 67,6 | 65,7 | 65,7 | 54,3 | 62,2 | 49,2 | 13,0 | 1 571 | 43,4 | 1 389 |
| Département | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 83,1 | 77,8 | 70,4 | 65,9 | 82,0 | 73,4 | 69,9 | 57,8 | 64,9 | 58,9 | 55,2 | 58,4 | 58,4 | 47,2 | 52,3 | 36,9 | 16,2 | 320 | 30,4 | 286 |
| Atacora | 83,4 | 81,8 | 79,7 | 78,4 | 81,3 | 81,7 | 79,8 | 78,4 | 81,8 | 79,7 | 78,4 | 71,9 | 71,9 | 70,5 | 70,5 | 67,6 | 15,7 | 227 | 59,4 | 206 |
| Atlantique | 95,7 | 92,0 | 84,9 | 79,3 | 95,4 | 90,1 | 83,4 | 68,4 | 92,0 | 84,6 | 79,5 | 73,7 | 73,7 | 59,9 | 72,5 | 58,9 | 4,3 | 308 | 58,4 | 272 |
| Borgou | 73,0 | 69,4 | 59,9 | 54,0 | 71,8 | 64,6 | 59,9 | 50,1 | 67,5 | 59,0 | 53,5 | 54,2 | 54,2 | 40,7 | 48,2 | 35,6 | 22,8 | 346 | 30,5 | 314 |
| Collines | 98,1 | 93,7 | 88,7 | 86,9 | 88,7 | 90,9 | 88,0 | 79,6 | 94,2 | 88,9 | 87,6 | 81,4 | 81,4 | 68,2 | 78,3 | 59,4 | 1,9 | 156 | 57,6 | 149 |
| Couffo | 85,7 | 76,9 | 68,6 | 59,2 | 80,7 | 76,6 | 66,9 | 50,7 | 69,9 | 63,2 | 54,1 | 56,4 | 56,4 | 40,1 | 50,5 | 31,4 | 13,8 | 171 | 22,4 | 146 |
| Donga | 89,6 | 87,3 | 83,7 | 77,5 | 88,4 | 87,3 | 80,7 | 70,3 | 87,1 | 83,7 | 77,5 | 70,8 | 70,8 | 61,9 | 68,3 | 59,4 | 10,4 | 160 | 52,1 | 156 |
| Littoral | 97,1 | 92,5 | 91,5 | 87,0 | 96,0 | 95,1 | 91,4 | 76,3 | 92,6 | 91,9 | 85,9 | 78,1 | 78,1 | 66,7 | 71,2 | 56,8 | 2,4 | 127 | 56,8 | 103 |
| Mono | 97,0 | 95,2 | 91,4 | 87,9 | 97,0 | 91,4 | 89,3 | 74,2 | 95,2 | 92,3 | 88,9 | 86,5 | 86,5 | 70,6 | 84,0 | 66,0 | 3,0 | 97 | 55,6 | 123 |
| Ouémé | 96,6 | 95,0 | 90,8 | 83,4 | 96,0 | 93,9 | 90,0 | 75,6 | 94,2 | 90,6 | 82,7 | 80,7 | 80,7 | 71,0 | 80,9 | 70,3 | 3,4 | 221 | 65,0 | 213 |
| Plateau | 81,3 | 70,0 | 60,6 | 49,6 | 81,0 | 67,2 | 52,6 | 45,0 | 60,4 | 51,7 | 42,7 | 37,0 | 37,0 | 29,0 | 34,8 | 24,7 | 18,0 | 145 | 30,5 | 150 |
| Zou | 94,4 | 93,6 | 89,7 | 86,2 | 94,5 | 92,3 | 89,5 | 74,8 | 93,2 | 89,3 | 85,4 | 81,1 | 81,1 | 68,0 | 75,5 | 61,6 | 4,6 | 235 | 58,5 | 248 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 84,3 | 79,4 | 73,1 | 66,9 | 82,5 | 77,5 | 71,9 | 60,9 | 76,1 | 70,6 | 64,6 | 62,1 | 62,1 | 51,9 | 58,5 | 47,0 | 14,5 | 1 604 | 43,6 | 1 519 |
| Primaire | 93,5 | 90,9 | 85,2 | 82,1 | 92,2 | 88,7 | 84,7 | 72,7 | 88,9 | 83,6 | 80,3 | 74,8 | 74,8 | 63,2 | 71,4 | 57,3 | 5,9 | 473 | 50,1 | 445 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 97,4 | 95,6 | 91,2 | 85,0 | 94,9 | 93,1 | 88,5 | 73,5 | 91,6 | 87,1 | 82,2 | 80,9 | 80,9 | 65,1 | 75,8 | 58,3 | 2,3 | 312 | 57,7 | 308 |
| Secondaire 2 nd cycle ou plus | 94,5 | 93,0 | 87,8 | 87,2 | 93,9 | 90,5 | 87,4 | 78,5 | 91,3 | 86,0 | 85,5 | 84,3 | 84,3 | 70,7 | 81,7 | 66,4 | 4,9 | 126 | 61,1 | 92 |

À suivre...

Tableau 9.3—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Enfants de 12-23 mois | | | | | | | | | | | | Enfants de 24-35 mois | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|----------------------------|------|------|-------------|------|------|------------------------------------|---|-----------------|---|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------|
| | DTC-HepB-Hib | | | Polio ¹ | | | Pneumocoque | | | Vaccin anti- rouge- oleux | Tous les vaccins de base ² | Fièvre jaune | Tous les vaccins appro- priés pour le groupe d'âges ³ | Aucun vaccin d'enfants | Effectif d'enfants | Tous les vaccins appro- priés pour le groupe d'âges ⁴ | Effectif d'enfants | |
| | 1 | 2 | 3 | 0 (dose nais- sance) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 72,4 | 67,6 | 55,4 | 70,3 | 64,6 | 58,9 | 49,9 | 64,1 | 56,6 | 52,8 | 52,9 | 42,6 | 48,4 | 37,3 | 25,0 | 51,2 | 33,7 | 508 |
| Second | 86,0 | 81,8 | 68,9 | 84,4 | 80,6 | 75,0 | 63,1 | 77,8 | 71,9 | 65,2 | 61,9 | 52,9 | 57,6 | 45,4 | 13,1 | 480 | 43,9 | 435 |
| Moyen | 92,1 | 88,2 | 77,7 | 89,6 | 86,9 | 81,2 | 71,2 | 85,5 | 80,9 | 76,2 | 73,2 | 61,8 | 70,0 | 57,0 | 7,5 | 568 | 48,8 | 479 |
| Quatrième | 94,3 | 91,2 | 84,5 | 92,5 | 87,3 | 82,2 | 69,9 | 87,7 | 82,0 | 76,4 | 72,2 | 60,5 | 68,7 | 55,4 | 5,5 | 498 | 51,7 | 510 |
| Le plus élevé | 96,8 | 93,1 | 85,8 | 96,3 | 92,1 | 89,3 | 73,9 | 91,7 | 88,8 | 84,1 | 79,9 | 65,7 | 77,0 | 61,8 | 2,7 | 456 | 59,9 | 433 |
| Ensemble | 88,2 | 84,2 | 73,0 | 86,5 | 82,2 | 77,1 | 65,5 | 81,2 | 75,9 | 70,8 | 67,9 | 56,6 | 64,2 | 51,3 | 10,9 | 2 515 | 47,3 | 2 365 |

Note : On considère que les enfants ont reçu le vaccin si le carnet de vaccination ou si la mère a déclaré que l'enfant l'avait reçu. Pour les enfants dont les informations sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On suppose que les proportions de vaccinations données pendant la première et la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccinations.

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphtérie-tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = Haemophilus influenzae type b

¹ Polio 0 est le vaccin contre la polio donnée à la naissance.

² BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 3 doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donné à la naissance) et 1 dose de vaccin anti-rougeoleux.

³ BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 4 doses du vaccin oral contre la polio, 3 doses du vaccin contre le pneumocoque, 1 dose de vaccin anti-rougeoleux et 1 dose de vaccin contre la fièvre jaune.

⁴ BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 4 doses du vaccin oral contre la polio, 3 doses du vaccin contre le pneumocoque, 1 dose de vaccin anti-rougeoleux et 1 dose de vaccin contre la fièvre jaune.

⁵ Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

Tableau 9.4 Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et d'enfants de 24-35 mois qui ont déjà eu un carnet de vaccination et pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Enfants de 12-23 mois | | | Enfants de 24-35 mois | | |
|--|---|---|--------------------|---|---|--------------------|
| | Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination ¹ | Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu ¹ | Effectif d'enfants | Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination ¹ | Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu ¹ | Effectif d'enfants |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 90,2 | 71,2 | 1 280 | 87,2 | 63,1 | 1 156 |
| Féminin | 89,3 | 71,7 | 1 234 | 87,5 | 65,1 | 1 209 |
| Rang de naissance | | | | | | |
| 1 | 92,2 | 72,8 | 579 | 91,0 | 67,3 | 501 |
| 2-3 | 90,0 | 71,2 | 903 | 87,1 | 65,6 | 890 |
| 4-5 | 88,5 | 70,0 | 605 | 89,6 | 64,5 | 562 |
| 6+ | 88,0 | 72,3 | 427 | 80,3 | 56,6 | 413 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 99,2 | 75,9 | 127 | 97,8 | 66,9 | 103 |
| Autres villes | 93,5 | 73,4 | 817 | 92,0 | 66,3 | 874 |
| Ensemble urbain | 94,3 | 73,7 | 944 | 92,6 | 66,3 | 976 |
| Rural | 87,1 | 70,1 | 1 571 | 83,6 | 62,6 | 1 389 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 85,0 | 70,6 | 320 | 72,0 | 55,6 | 286 |
| Atacora | 88,1 | 73,4 | 227 | 83,7 | 54,6 | 206 |
| Atlantique | 96,7 | 72,0 | 308 | 99,2 | 69,6 | 272 |
| Borgou | 74,0 | 58,6 | 346 | 68,4 | 48,2 | 314 |
| Collines | 96,6 | 78,6 | 156 | 91,9 | 70,1 | 149 |
| Couffo | 94,3 | 66,0 | 171 | 89,0 | 51,4 | 146 |
| Donga | 90,0 | 68,7 | 160 | 90,6 | 64,5 | 156 |
| Littoral | 99,2 | 75,9 | 127 | 97,8 | 66,9 | 103 |
| Mono | 97,3 | 74,8 | 97 | 98,4 | 74,9 | 123 |
| Ouémé | 97,5 | 82,4 | 221 | 98,8 | 77,6 | 213 |
| Plateau | 86,6 | 66,3 | 145 | 85,4 | 67,3 | 150 |
| Zou | 90,7 | 79,2 | 235 | 94,6 | 79,8 | 248 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucun | 86,3 | 69,1 | 1 604 | 82,7 | 61,0 | 1 519 |
| Primaire | 95,4 | 76,0 | 473 | 94,0 | 68,9 | 445 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 97,0 | 77,1 | 312 | 97,1 | 70,1 | 308 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 95,0 | 70,5 | 126 | 99,0 | 72,8 | 92 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 76,7 | 59,7 | 512 | 68,1 | 49,0 | 508 |
| Second | 88,3 | 71,6 | 480 | 88,0 | 64,9 | 435 |
| Moyen | 93,9 | 76,0 | 568 | 90,9 | 68,1 | 479 |
| Quatrième | 93,1 | 75,6 | 498 | 93,8 | 69,8 | 510 |
| Le plus élevé | 97,3 | 74,4 | 456 | 97,7 | 70,0 | 433 |
| Ensemble | 89,8 | 71,5 | 2 515 | 87,3 | 64,1 | 2 365 |

¹ Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

Tableau 9.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les enfants de moins de 5 ans : | | Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA : | | |
|---|---|--------------------|---|--|--------------------|
| | Pourcentage avec des symptômes d'IRA ¹ | Effectif d'enfants | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ² | Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour suivant | Effectif d'enfants |
| Âge en mois | | | | | |
| <6 | 3,6 | 1 423 | 46,5 | 12,6 | 51 |
| 6-11 | 4,2 | 1 517 | 44,6 | 17,3 | 64 |
| 12-23 | 3,3 | 2 515 | 41,9 | 15,5 | 83 |
| 24-35 | 2,7 | 2 365 | 48,3 | 16,6 | 63 |
| 36-47 | 2,2 | 2 450 | 53,4 | 24,5 | 54 |
| 48-59 | 2,0 | 2 416 | (43,7) | (8,6) | 47 |
| Sexe | | | | | |
| Masculin | 3,0 | 6 415 | 45,8 | 13,8 | 194 |
| Féminin | 2,7 | 6 271 | 46,5 | 18,6 | 167 |
| Statut tabagique actuel de la mère | | | | | |
| Fume cigarettes/tabac | 7,1 | 208 | * | * | 15 |
| Ne fume pas | 2,8 | 12 478 | 46,8 | 16,5 | 346 |
| Combustible pour cuisiner | | | | | |
| Électricité ou gaz | 1,9 | 371 | * | * | 7 |
| Kérosène | * | 6 | * | * | 1 |
| Charbon/lignite | 0,0 | 124 | * | * | 0 |
| Charbon de bois | 2,4 | 2 926 | 53,8 | 26,5 | 71 |
| Bois/paille ³ | 3,1 | 9 243 | 43,9 | 13,1 | 282 |
| Excrément d'animaux | * | 2 | * | * | 0 |
| Autre combustible | * | 10 | * | * | 1 |
| Pas de repas préparé dans le ménage | * | 4 | * | * | 0 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 1,5 | 558 | * | * | 8 |
| Autres villes | 2,4 | 4 382 | 60,8 | 23,3 | 105 |
| Ensemble urbain | 2,3 | 4 940 | 59,7 | 24,2 | 113 |
| Rural | 3,2 | 7 746 | 39,8 | 12,3 | 248 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 5,3 | 1 718 | 14,1 | 6,9 | 92 |
| Aïacora | 1,5 | 1 127 | * | * | 17 |
| Atlantique | 3,9 | 1 448 | (41,6) | (9,3) | 57 |
| Borgou | 0,8 | 1 678 | * | * | 14 |
| Collines | 1,8 | 814 | * | * | 15 |
| Couffo | 4,5 | 844 | (80,0) | (35,9) | 38 |
| Donga | 0,3 | 831 | * | * | 2 |
| Littoral | 1,5 | 558 | * | * | 8 |
| Mono | 6,8 | 565 | (48,7) | (13,8) | 39 |
| Ouémé | 1,1 | 1 131 | * | * | 13 |
| Plateau | 5,0 | 766 | (58,5) | (7,2) | 38 |
| Zou | 2,4 | 1 206 | (73,9) | (26,6) | 30 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | |
| Aucun | 3,1 | 8 301 | 42,0 | 15,7 | 253 |
| Primaire | 2,5 | 2 310 | 50,3 | 15,8 | 58 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,6 | 1 523 | (56,4) | (22,5) | 39 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,9 | 552 | * | * | 10 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 3,2 | 2 713 | 30,2 | 6,5 | 86 |
| Second | 3,8 | 2 554 | 49,2 | 18,8 | 96 |
| Moyen | 3,0 | 2 559 | 41,9 | 14,6 | 77 |
| Quatrième | 2,8 | 2 549 | 53,7 | 18,9 | 72 |
| Le plus élevé | 1,3 | 2 311 | (73,8) | (31,0) | 31 |
| Ensemble | 2,8 | 12 686 | 46,1 | 16,0 | 361 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

² Sont inclus les conseils ou traitements fournis par le secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeurs de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

³ Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles.

Tableau 9.6 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Source | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chaque source : | |
|-----------------------------------|--|--|
| | Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA ¹ | Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹ |
| Secteur public | 21,5 | 46,2 |
| Hôpital du gouvernement | 3,6 | 7,7 |
| Centre de santé du gouvernement | 16,8 | 36,0 |
| Clinique mobile | 0,6 | 1,3 |
| Agent de terrain/ASC | 0,6 | 1,2 |
| Secteur privé | 13,6 | 29,2 |
| Hôpital privé/clinique | 4,9 | 10,4 |
| Pharmacie | 6,1 | 13,1 |
| Médecin privé | 1,0 | 2,1 |
| Clinique mobile | 0,5 | 1,0 |
| Agent de terrain/ASC | 0,9 | 1,9 |
| Autres secteurs privés | 0,3 | 0,6 |
| Autre secteur privé | 10,5 | 22,6 |
| Boutique | 6,5 | 14,0 |
| Praticien traditionnel | 1,0 | 2,1 |
| Marché | 1,8 | 3,8 |
| Vendeur de médicaments itinérants | 1,2 | 2,6 |
| Autre | 1,7 | 3,6 |
| Effectif d'enfants | 361 | 168 |

ASC = Agent de santé communautaire

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associé à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées des problèmes de congestion dans la poitrine.

Tableau 9.7 Prévalence et traitement de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés et pourcentage ayant reçu des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les enfants de moins de 5 ans : | | Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre : | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| | Pourcentage ayant eu de la fièvre | Effectif d'enfants | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹ | Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour suivant | Pourcentage qui ont pris des antibiotiques | Effectif d'enfants ayant eu de la fièvre |
| Âge en mois | | | | | | |
| <6 | 16,9 | 1 423 | 49,3 | 22,9 | 17,1 | 240 |
| 6-11 | 24,7 | 1 517 | 56,4 | 31,2 | 18,4 | 374 |
| 12-23 | 24,9 | 2 515 | 51,2 | 28,2 | 15,3 | 626 |
| 24-35 | 18,9 | 2 365 | 53,3 | 26,0 | 14,6 | 448 |
| 36-47 | 17,9 | 2 450 | 58,6 | 32,7 | 12,7 | 439 |
| 48-59 | 14,0 | 2 416 | 48,3 | 22,8 | 14,2 | 339 |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 20,0 | 6 415 | 52,0 | 27,1 | 15,4 | 1 282 |
| Féminin | 18,9 | 6 271 | 54,4 | 28,5 | 15,0 | 1 184 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 19,1 | 558 | 65,8 | 47,3 | 20,8 | 107 |
| Autres villes | 17,1 | 4 382 | 57,8 | 33,6 | 18,1 | 748 |
| Ensemble urbain | 17,3 | 4 940 | 58,8 | 35,3 | 18,5 | 855 |
| Rural | 20,8 | 7 746 | 50,1 | 23,8 | 13,5 | 1 611 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 22,5 | 1 718 | 16,5 | 10,7 | 4,6 | 387 |
| Atacora | 16,2 | 1 127 | 45,2 | 20,5 | 11,3 | 182 |
| Atlantique | 27,4 | 1 448 | 61,0 | 33,1 | 15,3 | 397 |
| Borgou | 12,8 | 1 678 | 47,6 | 23,5 | 10,6 | 214 |
| Collines | 16,6 | 814 | 80,1 | 43,1 | 16,5 | 135 |
| Couffo | 16,7 | 844 | 63,9 | 20,1 | 21,5 | 141 |
| Donga | 16,3 | 831 | 85,8 | 55,3 | 14,8 | 136 |
| Littoral | 19,1 | 558 | 65,8 | 47,3 | 20,8 | 107 |
| Mono | 20,9 | 565 | 45,6 | 19,5 | 11,4 | 118 |
| Ouémé | 18,9 | 1 131 | 59,7 | 39,8 | 18,7 | 213 |
| Plateau | 30,8 | 766 | 46,9 | 16,5 | 21,2 | 236 |
| Zou | 16,6 | 1 206 | 71,4 | 33,2 | 27,2 | 200 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucun | 19,5 | 8 301 | 49,0 | 25,0 | 13,8 | 1 619 |
| Primaire | 20,8 | 2 310 | 57,7 | 29,7 | 17,0 | 480 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 18,2 | 1 523 | 62,8 | 33,6 | 18,8 | 278 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 16,2 | 552 | 72,9 | 50,3 | 19,6 | 90 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 17,9 | 2 713 | 38,6 | 17,3 | 11,2 | 485 |
| Second | 21,1 | 2 554 | 49,2 | 24,2 | 10,9 | 538 |
| Moyen | 20,7 | 2 559 | 48,0 | 22,8 | 13,0 | 529 |
| Quatrième | 20,6 | 2 549 | 64,2 | 32,5 | 19,9 | 526 |
| Le plus élevé | 16,8 | 2 311 | 68,6 | 46,3 | 22,7 | 389 |
| Ensemble | 19,4 | 12 686 | 53,1 | 27,8 | 15,2 | 2 466 |

¹ Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur médical public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

Tableau 9.8 Prévalence et traitement de la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage ayant eu la diarrhée | Effectif d'enfants | Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée : | |
|--|----------------------------------|--------------------|---|---|
| | | | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹ | Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée |
| Âge en mois | | | | |
| <6 | 9,8 | 1 423 | 34,2 | 139 |
| 6-11 | 18,4 | 1 517 | 42,8 | 279 |
| 12-23 | 16,4 | 2 515 | 47,6 | 412 |
| 24-35 | 10,6 | 2 365 | 40,8 | 250 |
| 36-47 | 5,7 | 2 450 | 43,8 | 139 |
| 48-59 | 4,2 | 2 416 | 37,0 | 100 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 10,2 | 6 415 | 42,1 | 654 |
| Féminin | 10,6 | 6 271 | 43,3 | 665 |
| Source de l'eau de boisson² | | | | |
| Source améliorée | 9,6 | 8 487 | 46,4 | 811 |
| Non améliorée | 12,1 | 4 186 | 36,8 | 508 |
| Autre/manquant | * | 12 | * | 0 |
| Type d'installation sanitaire³ | | | | |
| Toilettes améliorées | 5,3 | 1 342 | 46,9 | 71 |
| Toilettes non améliorée | 11,0 | 11 344 | 42,5 | 1 249 |
| Toilettes partagée ⁴ | 8,1 | 2 235 | 49,8 | 182 |
| Toilettes non améliorée | 10,4 | 1 623 | 41,1 | 169 |
| Défécation en plein air | 12,0 | 7 486 | 41,2 | 898 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 8,6 | 558 | 41,9 | 48 |
| Autres villes | 9,6 | 4 382 | 48,0 | 421 |
| Ensemble urbain | 9,5 | 4 940 | 47,4 | 469 |
| Rural | 11,0 | 7 746 | 40,1 | 850 |
| Département | | | | |
| Alibori | 12,3 | 1 718 | 17,3 | 212 |
| Atacora | 20,2 | 1 127 | 44,3 | 227 |
| Atlantique | 9,2 | 1 448 | 35,5 | 133 |
| Borgou | 6,7 | 1 678 | 56,6 | 113 |
| Collines | 8,9 | 814 | 62,1 | 72 |
| Couffo | 9,3 | 844 | 34,5 | 78 |
| Donga | 14,1 | 831 | 68,0 | 117 |
| Littoral | 8,6 | 558 | 41,9 | 48 |
| Mono | 11,9 | 565 | 22,2 | 67 |
| Ouémé | 7,7 | 1 131 | 60,2 | 87 |
| Plateau | 14,1 | 766 | 41,4 | 108 |
| Zou | 4,8 | 1 206 | 55,5 | 58 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucun | 10,4 | 8 301 | 39,8 | 860 |
| Primaire | 11,7 | 2 310 | 47,9 | 270 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 9,7 | 1 523 | 50,3 | 147 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 7,6 | 552 | (43,6) | 42 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 11,6 | 2 713 | 39,0 | 316 |
| Second | 12,0 | 2 554 | 44,5 | 307 |
| Moyen | 11,4 | 2 559 | 37,5 | 291 |
| Quatrième | 9,5 | 2 549 | 42,6 | 243 |
| Le plus élevé | 7,0 | 2 311 | 55,9 | 163 |
| Ensemble | 10,4 | 12 686 | 42,7 | 1 320 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

² Se référer au Tableau 2.1 pour la définition des catégories

³ Se référer au Tableau 2.3 pour la définition des catégories

⁴ Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par 2 ménages ou plus.

Tableau 9.9 Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés, une solution maison (SMR), soit une SRO ou une SMR, du zinc, une SRO et du zinc, une SRO ou l'augmentation des quantités de liquides, une thérapie de réhydratation par voie orale (TRO), la poursuite de réhydratation et une TRO, d'autres traitements et pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants avec diarrhée à qui on a donné : | | | | | | | | | | | Manquant | Pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement | Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------|--------------------------|-------------------------|----------|---|---|---------------------|--|--|
| | Une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés | Solution Maison Recommandée (SMR) | Soit SRO ou SMR | Zinc | SRO et zinc | SRO ou augmentation des liquides | TRO (SRO, SMR, ou augmentation des liquides) | Poursuite de l'alimentation et TRO ¹ | Antibiotiques | Médicaments antimotilité | Solution intra-veineuse | | | | Remède maison/autre | | |
| Âge en mois | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <6 | 19,3 | 7,1 | 22,0 | 13,8 | 8,4 | 26,8 | 29,5 | 16,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 52,4 | 139 | | |
| 6-11 | 26,2 | 8,4 | 28,5 | 21,9 | 14,8 | 38,1 | 40,4 | 27,2 | 7,0 | 0,0 | 0,3 | 38,7 | 0,0 | 25,7 | 279 | | |
| 12-23 | 23,9 | 9,6 | 26,6 | 15,2 | 10,7 | 36,1 | 37,9 | 29,4 | 5,8 | 0,6 | 0,2 | 42,5 | 0,4 | 28,7 | 412 | | |
| 24-35 | 18,4 | 8,6 | 19,8 | 16,1 | 8,3 | 29,9 | 30,7 | 26,6 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 25,0 | 250 | | |
| 36-47 | 17,6 | 12,5 | 23,6 | 19,6 | 8,7 | 35,8 | 40,0 | 32,1 | 8,3 | 2,3 | 0,0 | 39,5 | 0,8 | 22,9 | 139 | | |
| 48-59 | 23,3 | 11,6 | 26,2 | 13,6 | 8,7 | 38,1 | 41,0 | 38,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 35,4 | 100 | | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 22,7 | 10,3 | 25,8 | 16,8 | 10,5 | 34,7 | 37,0 | 29,5 | 5,7 | 0,8 | 0,0 | 39,3 | 0,3 | 30,4 | 654 | | |
| Féminin | 21,6 | 8,5 | 24,0 | 17,2 | 10,5 | 34,3 | 36,3 | 26,5 | 7,5 | 0,3 | 0,3 | 35,8 | 0,1 | 32,3 | 665 | | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 21,4 | 3,7 | 21,4 | 28,5 | 14,3 | 38,6 | 38,6 | 26,4 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 29,3 | 48 | | |
| Autres villes | 27,6 | 10,0 | 29,8 | 15,6 | 11,1 | 38,2 | 39,9 | 29,3 | 6,8 | 0,4 | 0,2 | 42,1 | 0,2 | 27,7 | 421 | | |
| Ensemble urbain | 27,0 | 9,4 | 29,0 | 16,9 | 11,5 | 38,2 | 39,8 | 29,0 | 7,1 | 0,4 | 0,2 | 40,8 | 0,2 | 27,8 | 469 | | |
| Rural | 19,5 | 9,4 | 22,6 | 17,0 | 10,0 | 32,4 | 34,9 | 27,5 | 6,4 | 0,6 | 0,1 | 35,7 | 0,2 | 33,3 | 850 | | |
| Département | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 18,6 | 11,9 | 20,5 | 15,9 | 12,3 | 37,6 | 39,4 | 32,5 | 7,3 | 1,9 | 0,4 | 10,7 | 0,3 | 49,1 | 212 | | |
| Atacora | 18,2 | 8,0 | 21,0 | 15,2 | 12,4 | 20,6 | 23,4 | 15,5 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 0,5 | 32,7 | 227 | | |
| Atlantique | 20,1 | 8,9 | 24,3 | 7,3 | 5,3 | 33,0 | 36,3 | 30,0 | 4,2 | 0,0 | 0,7 | 47,2 | 0,0 | 26,4 | 133 | | |
| Borgou | 26,3 | 5,1 | 28,2 | 23,6 | 12,9 | 33,9 | 35,9 | 25,8 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 28,3 | 113 | | |
| Collines | 33,3 | 20,5 | 38,6 | 20,7 | 16,3 | 44,1 | 47,6 | 45,4 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 24,0 | 72 | | |
| Couffo | 17,0 | 9,3 | 19,0 | 24,4 | 7,8 | 38,3 | 39,1 | 33,4 | 8,8 | 2,8 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 37,4 | 78 | | |
| Donga | 28,4 | 7,9 | 29,3 | 16,5 | 14,7 | 45,1 | 46,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 0,0 | 24,3 | 117 | | |
| Littoral | 21,4 | 3,7 | 21,4 | 28,5 | 14,3 | 38,6 | 38,6 | 26,4 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 29,3 | 48 | | |
| Mono | 25,8 | 7,5 | 28,4 | 8,8 | 7,1 | 43,2 | 44,9 | 39,5 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 33,7 | 67 | | |
| Ouémé | 10,7 | 3,9 | 10,7 | 11,8 | 2,0 | 25,3 | 25,3 | 17,5 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 67,9 | 0,0 | 20,0 | 87 | | |
| Plateau | 21,9 | 8,6 | 26,4 | 18,0 | 6,1 | 29,1 | 32,8 | 21,1 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 28,3 | 108 | | |
| Zou | 41,7 | 21,1 | 50,6 | 29,3 | 13,4 | 53,7 | 58,3 | 43,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 14,8 | 58 | | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 19,6 | 8,6 | 21,9 | 15,0 | 9,2 | 31,8 | 33,8 | 26,2 | 6,2 | 0,7 | 0,2 | 38,0 | 0,2 | 33,4 | 860 | | |
| Primaire | 25,8 | 8,6 | 29,8 | 17,2 | 9,8 | 37,9 | 40,6 | 31,4 | 7,1 | 0,5 | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 28,7 | 270 | | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 28,9 | 12,7 | 32,0 | 23,5 | 15,4 | 41,3 | 44,1 | 30,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,7 | 23,1 | 147 | | |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | (27,9) | (17,3) | (29,8) | (33,3) | (25,0) | (44,0) | (44,0) | (34,0) | (5,3) | (0,0) | (0,0) | (31,1) | (0,0) | (35,3) | 42 | | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 20,5 | 10,9 | 23,4 | 14,9 | 9,7 | 29,8 | 31,7 | 24,8 | 6,4 | 0,8 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 34,7 | 316 | | |
| Second | 20,3 | 10,1 | 23,3 | 16,8 | 11,4 | 33,4 | 36,0 | 27,5 | 8,4 | 0,9 | 0,6 | 37,8 | 0,4 | 30,2 | 307 | | |
| Moyen | 19,3 | 7,7 | 22,0 | 15,0 | 9,2 | 32,9 | 35,3 | 25,4 | 6,3 | 0,3 | 0,0 | 35,6 | 0,2 | 35,3 | 291 | | |
| Quatrième | 23,1 | 9,0 | 25,0 | 19,3 | 10,4 | 35,6 | 37,3 | 28,6 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 0,4 | 29,5 | 243 | | |
| Le plus élevé | 32,6 | 8,8 | 35,8 | 21,3 | 12,9 | 46,6 | 48,8 | 38,9 | 8,1 | 0,6 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 22,6 | 163 | | |
| Ensemble | 22,2 | 9,4 | 24,9 | 17,0 | 10,5 | 34,5 | 36,7 | 28,0 | 6,6 | 0,5 | 0,1 | 37,5 | 0,2 | 31,3 | 1 320 | | |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

SRO = Sels de réhydratation par voie orale

¹ Par poursuite de l'alimentation, on entend ici les enfants à qui on a donné davantage de nourriture que d'habitude, la même quantité ou un peu moins que d'habitude pendant les épisodes diarrhéiques.

Tableau 9.10 Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition (en%) des enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Quantité de liquides donnée | | | | | Quantité d'aliments donnée | | | | | Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|---------------------|--------------|---|----------------|--------|---------------------|-----------------------|-------|
| | Davantage d'habitude | Même que d'habitude | Un peu moins | Beaucoup moins | Aucune | Ne sait pas/ manquant | Total | Davantage d'habitude | Même que d'habitude | Un peu moins | | Beaucoup moins | Aucune | Ne mange pas encore | Ne sait pas/ manquant | Total |
| Âge en mois | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <6 | 10,8 | 30,3 | 35,1 | 10,3 | 12,0 | 1,5 | 100,0 | 10,9 | 35,5 | 15,8 | 9,9 | 1,7 | 26,3 | 0,0 | 100,0 | 139 |
| 6-11 | 17,0 | 22,0 | 36,7 | 18,2 | 5,8 | 0,3 | 100,0 | 10,5 | 24,6 | 35,1 | 18,6 | 3,4 | 7,8 | 0,0 | 100,0 | 279 |
| 12-23 | 17,1 | 27,3 | 34,9 | 15,8 | 4,0 | 0,9 | 100,0 | 8,9 | 30,8 | 42,9 | 11,2 | 5,1 | 0,6 | 0,5 | 100,0 | 412 |
| 24-35 | 13,2 | 30,7 | 36,9 | 13,4 | 4,6 | 1,2 | 100,0 | 4,8 | 40,7 | 38,0 | 12,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 250 |
| 36-47 | 22,3 | 27,4 | 29,5 | 12,5 | 6,9 | 1,3 | 100,0 | 10,2 | 33,0 | 43,6 | 9,6 | 2,1 | 1,0 | 0,6 | 100,0 | 139 |
| 48-59 | 17,8 | 36,3 | 28,7 | 11,4 | 5,0 | 0,9 | 100,0 | 8,0 | 46,4 | 36,3 | 8,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 15,2 | 29,0 | 35,2 | 14,7 | 5,2 | 0,6 | 100,0 | 9,6 | 34,4 | 36,5 | 12,4 | 3,2 | 3,7 | 0,2 | 100,0 | 654 |
| Féminin | 17,3 | 26,7 | 34,1 | 14,5 | 6,2 | 1,3 | 100,0 | 7,9 | 32,2 | 37,6 | 12,3 | 4,1 | 5,7 | 0,2 | 100,0 | 665 |
| Allaitement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allaité | 15,9 | 25,5 | 36,7 | 15,9 | 5,6 | 0,4 | 100,0 | 10,1 | 29,7 | 34,2 | 13,9 | 3,9 | 8,1 | 0,2 | 100,0 | 731 |
| N'allaité pas | 16,7 | 30,7 | 32,1 | 13,0 | 5,9 | 1,7 | 100,0 | 7,1 | 37,8 | 40,6 | 10,5 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 100,0 | 589 |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 26,2 | 30,2 | 22,4 | 16,8 | 2,1 | 2,3 | 100,0 | 3,7 | 44,7 | 33,4 | 11,9 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 48 |
| Autres villes | 16,1 | 28,8 | 36,5 | 12,0 | 5,7 | 0,9 | 100,0 | 5,2 | 31,1 | 41,0 | 10,5 | 4,6 | 7,6 | 0,0 | 100,0 | 421 |
| Ensemble urbain | 17,1 | 28,9 | 35,1 | 12,5 | 5,3 | 1,0 | 100,0 | 5,1 | 32,5 | 40,2 | 10,6 | 4,8 | 6,9 | 0,0 | 100,0 | 469 |
| Rural | 15,8 | 27,2 | 34,4 | 15,8 | 5,9 | 0,9 | 100,0 | 10,7 | 33,7 | 35,3 | 13,3 | 3,0 | 3,5 | 0,4 | 100,0 | 850 |
| Département | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 21,4 | 29,1 | 22,4 | 19,9 | 6,8 | 0,3 | 100,0 | 31,6 | 30,5 | 22,2 | 11,9 | 1,7 | 1,8 | 0,3 | 100,0 | 212 |
| Atacora | 3,0 | 31,3 | 40,5 | 13,4 | 10,8 | 1,0 | 100,0 | 0,9 | 38,0 | 33,1 | 13,8 | 4,4 | 9,6 | 0,3 | 100,0 | 227 |
| Atlantique | 17,3 | 31,1 | 36,8 | 12,8 | 1,3 | 0,8 | 100,0 | 3,6 | 40,3 | 42,4 | 12,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 133 |
| Borgou | 11,7 | 13,8 | 45,9 | 24,8 | 3,0 | 0,9 | 100,0 | 9,8 | 21,6 | 48,4 | 12,3 | 4,2 | 2,9 | 0,9 | 100,0 | 113 |
| Collines | 13,4 | 19,4 | 50,7 | 12,7 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 5,6 | 34,0 | 54,6 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | 72 |
| Couffo | 24,9 | 25,6 | 35,6 | 5,0 | 2,3 | 6,6 | 100,0 | 5,8 | 30,1 | 46,6 | 5,8 | 10,3 | 1,3 | 0,0 | 100,0 | 78 |
| Donga | 24,3 | 29,9 | 33,8 | 8,7 | 2,6 | 0,6 | 100,0 | 6,5 | 28,3 | 36,3 | 18,3 | 4,5 | 6,1 | 0,0 | 100,0 | 117 |
| Littoral | 26,2 | 30,2 | 22,4 | 16,8 | 2,1 | 2,3 | 100,0 | 3,7 | 44,7 | 33,4 | 11,9 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 48 |
| Mono | 21,0 | 24,1 | 41,8 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 8,0 | 27,7 | 51,2 | 10,5 | 1,7 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 67 |
| Ouémé | 19,6 | 37,9 | 35,2 | 6,5 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 0,8 | 42,1 | 42,0 | 10,9 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 100,0 | 87 |
| Plateau | 8,9 | 27,4 | 29,9 | 16,2 | 17,2 | 0,5 | 100,0 | 3,3 | 28,8 | 27,8 | 14,4 | 7,2 | 18,0 | 0,5 | 100,0 | 108 |
| Zou | 27,0 | 27,3 | 19,0 | 20,5 | 6,2 | 0,0 | 100,0 | 4,5 | 37,3 | 35,0 | 16,5 | 3,7 | 3,0 | 0,0 | 100,0 | 58 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 15,4 | 29,2 | 34,1 | 14,3 | 6,5 | 0,6 | 100,0 | 11,3 | 33,7 | 34,8 | 11,9 | 3,3 | 4,7 | 0,3 | 100,0 | 860 |
| Primaire | 18,2 | 23,9 | 37,7 | 13,6 | 5,3 | 1,3 | 100,0 | 2,3 | 30,6 | 44,2 | 13,3 | 3,6 | 5,6 | 0,3 | 100,0 | 270 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 16,1 | 27,0 | 32,0 | 19,1 | 3,4 | 2,4 | 100,0 | 5,9 | 35,5 | 34,6 | 15,2 | 5,1 | 3,6 | 0,0 | 100,0 | 147 |
| Secondaire 2 nd cycle ou plus | (22,7) | (28,0) | (34,0) | (12,2) | (1,6) | (1,5) | (100,0) | (6,2) | (34,6) | (43,8) | (5,7) | (6,1) | (3,6) | (0,0) | (100,0) | 42 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 12,4 | 25,7 | 34,9 | 18,7 | 7,4 | 0,9 | 100,0 | 7,8 | 31,9 | 37,9 | 13,4 | 4,6 | 4,3 | 0,0 | 100,0 | 316 |
| Second | 16,4 | 24,0 | 37,9 | 14,3 | 6,2 | 1,2 | 100,0 | 9,0 | 33,0 | 37,6 | 13,9 | 2,1 | 3,6 | 0,7 | 100,0 | 307 |
| Moyen | 16,6 | 28,4 | 32,4 | 15,0 | 6,5 | 1,1 | 100,0 | 11,6 | 33,0 | 32,4 | 14,1 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 100,0 | 291 |
| Quatrième | 15,4 | 31,7 | 36,6 | 10,9 | 4,6 | 0,8 | 100,0 | 9,1 | 32,4 | 38,7 | 9,4 | 2,7 | 7,6 | 0,0 | 100,0 | 243 |
| Le plus élevé | 24,1 | 32,6 | 28,8 | 11,9 | 1,9 | 0,7 | 100,0 | 4,2 | 38,2 | 39,9 | 8,8 | 4,1 | 4,8 | 0,0 | 100,0 | 163 |
| Ensemble | 16,3 | 27,8 | 34,6 | 14,6 | 5,7 | 1,0 | 100,0 | 8,7 | 33,3 | 37,0 | 12,4 | 3,6 | 4,7 | 0,2 | 100,0 | 1 320 |

Note : Il est recommandé, pendant les épisodes diarrhéiques, de donner davantage de liquides à l'enfant et de ne pas réduire les rations alimentaires. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 9.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu des SRO, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Source | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chaque source : | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| | Parmi les enfants ayant eu la diarrhée | Parmi les enfants ayant eu la diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement | Parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu SRO ¹ |
| Secteur public | 19,7 | 44,2 | 45,4 |
| Hôpital du gouvernement | 2,5 | 5,6 | 5,5 |
| Centre de santé du gouvernement | 14,9 | 33,5 | 37,5 |
| Clinique PF | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Agent de terrain | 0,6 | 1,4 | 1,0 |
| Agent de santé Strat AV | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Agent de santé/relai communautaire | 1,4 | 3,2 | 1,3 |
| Autre secteur public | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Secteur privé | 9,9 | 22,3 | 18,5 |
| Hôpital privé/clinique | 3,1 | 7,0 | 7,2 |
| Pharmacie | 6,2 | 13,8 | 12,1 |
| Médecin privé | 0,3 | 0,8 | 0,0 |
| Hôpital confessionnel | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| ABPF | 0,2 | 0,5 | 0,0 |
| Agent de santé - ONG | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| Autre secteur privé | 12,3 | 27,7 | 7,8 |
| Boutique | 5,1 | 11,5 | 3,0 |
| Praticien traditionnel | 2,1 | 4,7 | 1,9 |
| Marché | 2,7 | 6,0 | 1,4 |
| Vendeur de médicaments itinérants | 2,9 | 6,4 | 2,0 |
| Autre | 3,2 | 7,3 | 0,4 |
| Effectif d'enfants | 1 320 | 588 | 292 |

ABPF= Agence Béninoise pour la Promotion de la Famille

ASC = Agent de santé communautaire

ONG = Organisation non-gouvernemental

PF = Planification familiale

SRO = Sels de réhydratation par voie orale

STRAT AV = Stratégie Avancée

¹ Liquides de sachets SRO ou de sachets SRO préconditionnés

Tableau 9.12 Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de femmes qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés | Effectif des femmes |
|--|--|---------------------|
| Groupe d'âges | | |
| 15-19 | 49,4 | 506 |
| 20-24 | 64,9 | 1 931 |
| 25-34 | 72,7 | 4 404 |
| 35-49 | 74,5 | 2 190 |
| Résidence | | |
| Cotonou | 88,3 | 408 |
| Autres villes | 76,0 | 3 115 |
| Ensemble urbain | 77,4 | 3 523 |
| Rural | 65,6 | 5 508 |
| Département | | |
| Alibori | 70,9 | 1 226 |
| Atacora | 58,0 | 800 |
| Atlantique | 76,6 | 1 043 |
| Borgou | 55,1 | 1 164 |
| Collines | 81,5 | 604 |
| Couffo | 59,3 | 583 |
| Donga | 73,6 | 599 |
| Littoral | 88,3 | 408 |
| Mono | 65,7 | 393 |
| Ouémé | 65,7 | 798 |
| Plateau | 66,6 | 550 |
| Zou | 90,2 | 863 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucun | 65,0 | 5 807 |
| Primaire | 74,2 | 1 650 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 82,1 | 1 150 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 94,0 | 423 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 52,1 | 1 827 |
| Second | 64,0 | 1 827 |
| Moyen | 70,2 | 1 837 |
| Quatrième | 79,0 | 1 857 |
| Le plus élevé | 86,8 | 1 683 |
| Ensemble | 70,2 | 9 031 |

SRO = Sels de réhydratation par voie orale.

Tableau 9.13 Évacuation des selles des enfants

Répartition (en %) des enfants les plus jeunes de moins de 2 ans vivant avec leur mère par moyen d'évacuation des dernières matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Moyen d'évacuation des matières fécales : | | | | | | | Total | Pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée ¹ | Effectif d'enfants |
|---|--|--|-----------|--|--------------------|------------------------|-------|-------|---|--------------------|
| | L'enfant a utilisé les toilettes ou latrines | Jetées/ rincées dans toilettes ou latrines | Enterrées | Jetées/ rincées dans égouts ou caniveaux | Jetées aux ordures | Laissées à l'air libre | Autre | | | |
| Âge en mois | | | | | | | | | | |
| 0-1 | 0,2 | 29,6 | 1,8 | 4,9 | 57,4 | 1,4 | 4,8 | 100,0 | 31,5 | 498 |
| 2-3 | 0,3 | 32,3 | 3,0 | 4,0 | 54,6 | 3,4 | 2,4 | 100,0 | 35,5 | 468 |
| 4-5 | 0,6 | 32,8 | 2,4 | 2,0 | 57,0 | 4,0 | 1,1 | 100,0 | 35,9 | 420 |
| 6-8 | 0,6 | 32,4 | 3,5 | 2,2 | 57,6 | 2,5 | 1,3 | 100,0 | 36,5 | 804 |
| 9-11 | 0,3 | 30,0 | 3,0 | 1,8 | 60,6 | 3,6 | 0,7 | 100,0 | 33,3 | 682 |
| 12-17 | 0,8 | 30,0 | 3,8 | 1,1 | 60,0 | 3,3 | 1,0 | 100,0 | 34,6 | 1 177 |
| 18-23 | 1,1 | 30,1 | 4,5 | 0,6 | 58,8 | 3,8 | 1,2 | 100,0 | 35,6 | 1 221 |
| 6-23 | 0,8 | 30,5 | 3,8 | 1,3 | 59,2 | 3,3 | 1,1 | 100,0 | 35,1 | 3 884 |
| Installation sanitaire² | | | | | | | | | | |
| Toilettes améliorées | 0,8 | 71,2 | 0,4 | 2,6 | 24,1 | 0,6 | 0,3 | 100,0 | 72,4 | 536 |
| Toilettes non améliorées | 0,6 | 26,2 | 3,8 | 1,9 | 62,3 | 3,5 | 1,7 | 100,0 | 30,6 | 4 735 |
| Toilettes partagées ³ | 1,3 | 63,8 | 0,8 | 2,5 | 30,3 | 0,4 | 0,9 | 100,0 | 65,9 | 911 |
| Toilettes non améliorées | 0,7 | 53,5 | 2,8 | 2,0 | 35,6 | 1,5 | 3,9 | 100,0 | 57,0 | 694 |
| Défécation en plein air | 0,4 | 9,2 | 4,8 | 1,6 | 77,6 | 4,9 | 1,4 | 100,0 | 14,5 | 3 130 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 2,0 | 66,6 | 0,6 | 3,4 | 25,4 | 0,6 | 1,5 | 100,0 | 69,2 | 236 |
| Autres villes | 0,9 | 41,7 | 2,5 | 2,6 | 48,0 | 3,2 | 1,1 | 100,0 | 45,2 | 1 789 |
| Ensemble urbain | 1,0 | 44,6 | 2,3 | 2,7 | 45,3 | 2,9 | 1,2 | 100,0 | 48,0 | 2 024 |
| Rural | 0,4 | 22,1 | 4,1 | 1,5 | 66,6 | 3,4 | 1,8 | 100,0 | 26,7 | 3 246 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 1,0 | 30,8 | 9,5 | 1,0 | 50,0 | 4,4 | 3,3 | 100,0 | 41,3 | 744 |
| Atacora | 0,0 | 6,5 | 0,3 | 0,6 | 90,4 | 1,9 | 0,2 | 100,0 | 6,8 | 475 |
| Atlantique | 1,2 | 41,0 | 8,3 | 0,9 | 43,7 | 0,9 | 4,0 | 100,0 | 50,5 | 569 |
| Borgou | 0,6 | 12,2 | 1,3 | 5,6 | 64,7 | 14,9 | 0,6 | 100,0 | 14,1 | 707 |
| Collines | 0,0 | 22,8 | 0,2 | 2,2 | 73,2 | 0,2 | 1,5 | 100,0 | 23,0 | 337 |
| Couffo | 0,0 | 27,3 | 2,1 | 1,2 | 67,7 | 0,5 | 1,2 | 100,0 | 29,4 | 358 |
| Donga | 0,7 | 18,6 | 0,2 | 1,5 | 76,0 | 1,5 | 1,4 | 100,0 | 19,5 | 369 |
| Littoral | 2,0 | 66,6 | 0,6 | 3,4 | 25,4 | 0,6 | 1,5 | 100,0 | 69,2 | 236 |
| Mono | 1,4 | 33,9 | 5,4 | 0,9 | 55,9 | 1,7 | 0,9 | 100,0 | 40,7 | 220 |
| Ouémé | 0,5 | 48,8 | 2,8 | 2,4 | 44,8 | 0,3 | 0,4 | 100,0 | 52,1 | 457 |
| Plateau | 0,3 | 26,8 | 3,2 | 0,0 | 68,0 | 0,4 | 1,3 | 100,0 | 30,3 | 308 |
| Zou | 0,5 | 53,3 | 1,5 | 1,6 | 42,0 | 0,4 | 0,7 | 100,0 | 55,3 | 491 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | |
| Aucun | 0,7 | 22,7 | 3,9 | 1,4 | 65,4 | 4,2 | 1,6 | 100,0 | 27,4 | 3 309 |
| Primaire | 0,6 | 36,8 | 3,1 | 2,6 | 53,4 | 1,7 | 1,8 | 100,0 | 40,4 | 987 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,3 | 45,9 | 2,2 | 2,8 | 46,1 | 1,6 | 1,1 | 100,0 | 48,4 | 705 |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | 0,6 | 67,7 | 1,5 | 3,0 | 24,2 | 0,9 | 2,0 | 100,0 | 69,9 | 269 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 0,3 | 8,5 | 4,4 | 2,1 | 75,9 | 7,2 | 1,6 | 100,0 | 13,2 | 1 105 |
| Second | 0,4 | 14,8 | 5,5 | 1,1 | 72,3 | 3,5 | 2,4 | 100,0 | 20,7 | 1 080 |
| Moyen | 0,4 | 22,7 | 3,5 | 1,4 | 68,1 | 2,6 | 1,3 | 100,0 | 26,6 | 1 095 |
| Quatrième | 1,0 | 41,1 | 2,4 | 1,9 | 50,5 | 1,5 | 1,6 | 100,0 | 44,5 | 1 049 |
| Le plus élevé | 1,2 | 73,2 | 1,1 | 3,1 | 19,8 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 75,4 | 942 |
| Ensemble | 0,6 | 30,8 | 3,4 | 1,9 | 58,5 | 3,2 | 1,6 | 100,0 | 34,8 | 5 271 |

¹ On considère que les matières fécales des enfants sont évacuées de manière appropriée si l'enfant utilise les toilettes ou les latrines, si les matières fécales sont jetées ou rincées dans des toilettes ou des latrines ou si elles sont enterrées.

² Se référer au Tableau 2.3 pour la définition des catégories.

³ Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par 2 ménages ou plus.

Résultats clés

- **Possession de MII :** 92 % des ménages possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide et, en moyenne, un ménage possède 2,5 MII.
- **Source d'obtention de moustiquaire :** Environ 9 moustiquaires sur 10 (89 %) ont été obtenues par les ménages lors d'une campagne de distribution de masse.
- **Accès au MII :** 77 % de la population des ménages ont accès à une MII. Ce pourcentage varie considérablement selon le département.
- **Utilisation de MII :** 71 % de la population des ménages avaient dormi sous une MII la nuit avant l'interview. Chez les enfants de moins de 5 ans, ce taux est d'environ 76 % et chez les femmes enceintes de 15-49 ans il est de 79 %.
- **Utilisation de TPIg :** 33 % des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête ont déclaré avoir reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale et seulement 13 % ont déclaré en avoir reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale.
- **Prise en charge du paludisme chez les enfants :** Des conseils ou un traitement ont été recherchés pour 53 % des enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines avant l'interview. Pour 18 % des enfants qui ont eu de la fièvre, on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé.
- **Prévalence du paludisme chez l'enfant :** La quasi-totalité des enfants de 6-59 mois (98 %) ont été testés pour le paludisme. Pour 36 % d'entre eux, le test du diagnostic rapide s'est révélé positif et pour 39 %, le test de gouttes épaisses au microscope était positif.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2017, près de la moitié de la population mondiale était exposée au risque de paludisme. Ce fléau constitue un frein au développement des communautés et des pays les plus touchés par la maladie.

Le Bénin, à l'instar de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, enregistre le paludisme comme la première cause de mortalité et de morbidité. En 2017, selon l'annuaire des statistiques sanitaires du Ministère de la santé du Bénin, le paludisme constituait la première cause de consultation (44 %) et d'hospitalisation (31 %).

La mission assignée au Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) est d'assurer l'accès universel à la prévention et au traitement correct du paludisme pour réduire les taux de mortalité et de morbidité dus à cette maladie. De ce fait, plusieurs plans stratégiques basés sur la politique de lutte contre le

paludisme ont été élaborés. Le dernier plan vise à atteindre la couverture universelle des interventions de prévention et de prise en charge du paludisme pour la période 2017-2021.

De façon générale, le programme poursuit les trois objectifs suivants : i) Réduire le taux d'incidence du paludisme d'au moins 25 % par rapport à 2015¹ ; ii) Réduire le taux de mortalité liée au paludisme d'au moins 25 % par rapport à 2015² et iii) Renforcer les capacités de gestion du programme à tous les niveaux. Ces objectifs ont été déclinés en trois axes d'intervention : prévention du paludisme, diagnostic et prise en charge et renforcement du programme.

10.1 POSSESSION DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNÉES D'INSECTICIDE

Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide

Ménages qui ont, au moins, une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII). Une MII est définie comme suit : (1) une moustiquaire imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action ou MIILDA) ou (2) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide au cours des 12 derniers mois.

Échantillon : Ménages

Couverture universelle en MII dans les ménages

Pourcentage de ménages avec au moins une MII pour deux personnes au maximum.

Échantillon : Ménages

Ce chapitre présente les données utiles pour évaluer l'efficacité des stratégies de contrôle du paludisme qui ont été mises en place, stratégies qui comprennent la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide (pulvérisation des murs internes des logements), la disponibilité et l'utilisation de moustiquaires, l'utilisation prophylactique et thérapeutique d'antipaludiques, le test de diagnostic des enfants avec de la fièvre ainsi que la prévalence de l'anémie et du paludisme parmi les enfants de moins de 5 ans.

Les données collectées pendant l'EDSB-V portent, d'une part, sur la distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action et de moustiquaires préimprégnées d'insecticide et, d'autre part, sur l'ensemble des moustiquaires traitées ou non traitées sur le terrain. Elles permettent de mesurer le pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire, le nombre moyen de moustiquaires par ménage et le pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire pour deux personnes au maximum qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage.

La mise à l'échelle nationale de MIILDA se fait grâce à des campagnes nationales de distribution gratuite de MIILDA aux ménages à trois ans d'intervalle. Entre deux campagnes, il y a aussi une distribution de routine de MIILDA lors des consultations prénatales et pendant les séances de vaccination des enfants de moins d'un an. Des écoles primaires bénéficient aussi de la distribution de MIILDA dans des classes bien ciblées. Des distributions au niveau de points de cession communautaire existent également pour le reste de la population.


¹ Incidence en 2015 : 15,2 %

² Taux de létalité lié au paludisme en 2015 : 0,90 pour mille

Dans l'ensemble, plus de neuf ménages sur dix (92 %) disposent d'une MII. En moyenne, un ménage dispose d'au moins 2,5 MII et environ près de deux ménages sur trois (61 %) a au moins une MII pour deux personnes au maximum qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview (**Tableau 10.1** et **Graphique 10.1**).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, on note une tendance à la hausse de la possession d'une MII par les ménages, le pourcentage étant passé de 25 % à 80 % en 2011-2012 et à 92 % en 2017-2018 (**Graphique 10.2**).


Graphique 10.1 Possession de MII par le ménage



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

Graphique 10.2 Possession de MII dans les ménages : Tendances

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)



Variations par caractéristique

- La possession d'une MII varie suivant le département. En effet, le pourcentage de ménages possédant une MII est relativement plus faible dans le département de l'Ouémé (78 %) que dans les autres départements tels que le Zou (97 %), les Collines (96 %), l'Atlantique, le Couffo et la Donga (95 % dans les trois cas) (**Graphique 10.3** et **Tableau 10.1**). Il en est de même pour le pourcentage de ménages disposant d'au moins une MII pour deux personnes au maximum ayant dormi passé la nuit dernière dans les ménages. Il passe de 44 % dans l'Alibori à 73 % dans le Mono.
- Le pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour deux personnes au maximum qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage augmente avec le niveau de bien-être économique du ménage. Il passe de 52 % dans les ménages du quintile de bien-être le plus bas à 66 % dans ceux du plus élevé (**Graphique 10.4**).


Pulvérisation intradomiciliaire d'Insecticide

La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) est une technique de lutte antivectorielle qui consiste à pulvériser une suspension d'insecticide sur les murs intérieurs des logements en utilisant des insecticides à effet rémanent agréés par l'OMS.

Au cours de l'enquête, on a demandé si quelqu'un était venu pour pulvériser d'insecticide les murs intérieurs du logement. Au niveau national, on constate que la PID est une stratégie qui n'est pas utilisée de manière généralisée et importante, seulement, 9 % des ménages en ayant bénéficié au cours des 12 derniers mois (**Tableau 10.2**). Cependant, dans certains départements tels que la Donga, l'Atacora, et l'Alibori, on note que les pourcentages de ménages qui ont bénéficié d'une PID sont nettement plus élevés qu'ailleurs (respectivement 62 %, 36 %, et 31 %). Dans les autres départements, cette proportion est très faible, variant entre moins de 1 % à 3 %. On note également que cette stratégie de prévention est un peu plus utilisée en milieu rural qu'en milieu urbain (10 % contre 7 %).


Graphique 10.3 Possession de MII par département

Pourcentage de ménages possédant au moins une MII



Graphique 10.4 Possession de MII par bien-être économique du ménage

Pourcentage de ménages possédant au moins une MII




Dans 92 % des cas, les ménages possèdent au moins une MII et/ou ont bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois. Encore une fois, c'est dans les départements de la Donga et du Zou que cette proportion est la plus élevée (respectivement 98 % et 97 %) (**Graphique 10.5**).

Source des moustiquaires

- Environ 9 moustiquaires sur 10 (89 %) ont été obtenues au cours d'une campagne de distribution de masse de moustiquaires. Seulement 3 % ont été obtenues lors des visites prénatales (**Tableau 10.3** et **Graphique 10.6**).


Graphique 10.5 Prévention du paludisme

Pourcentage de ménages avec au moins une MII et/ou ayant bénéficié d'une PID selon le département



Graphique 10.6 Source d'approvisionnement des moustiquaires

Répartition (en %) des moustiquaires dans les ménages interviewés



10.2 ACCÈS AUX MII ET UTILISATION DES MII DANS LES MÉNAGES

Accès à une MII

Pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.

Échantillon : Population de fait des ménages.

Utilisation des MII

Pourcentage de la population qui a dormi sous une MII la nuit avant l'interview.

Échantillon : Population de fait des ménages.


Pour atteindre la couverture universelle, l'OMS recommande une moustiquaire pour deux personnes par ménage. Ainsi, l'accès aux MII est mesuré par le pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum. Une comparaison de cet indicateur avec ceux liés à l'utilisation peut aider les programmes à identifier les obstacles empêchant l'utilisation correcte des MII, à orienter ou réorienter les stratégies et à mettre en place les actions appropriées.

Il ressort des résultats de l'enquête que 77 % de la population des ménages ont accès à une MII (**Tableaux 10.4 et 10.5**) alors que 71 % de la population des ménages ont dormi sous une MII la nuit précédant l'interview (**Tableau 10.6**). L'écart entre l'accès et l'utilisation est donc d'environ 6 points de pourcentage, ce qui montre que bien que des efforts aient été fournis en matière de sensibilisation, il est nécessaire de poursuivre ces efforts pour une utilisation totale des MII par les ménages qui en ont. Par ailleurs, dans les ménages qui possèdent au moins une MII, 77 % de la population ont dormi sous MII et 73 % des MII existantes ont été utilisées la nuit précédant l'interview (**Tableaux 10.6 et 10.7**).

Tendances : On note une tendance à l'amélioration en termes d'accessibilité et d'utilisation des MII. En effet, le pourcentage de population ayant accès à une MII est passé de 15 % en 2006 à 64 % en 2011-2012 et à 77 % en 2017-2018. Dans la même période, le pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview est passé de 15 % à 63 % et à 71 % (**Graphique 10.7**).

Graphique 10.7 Accès et utilisation des MII : Tendances


Pourcentage de la population des ménages ayant accès aux MII et pourcentage de la population ayant dormi sous une MII la nuit avant l'enquête



Variations par caractéristique

- La population des ménages ayant accès aux MII et ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview est relativement plus élevée à Cotonou³ que dans les autres localités et en milieu rural. En effet, le pourcentage d'accès aux MII est de 83 % à Cotonou contre 77 % dans les autres villes et en milieu rural ; de même, le taux d'utilisation varie de 81 % à Cotonou à 71 % dans les autres villes et 70 % en milieu rural (**Graphique 10.8**).
- L'accessibilité des populations aux MII varie d'un département à l'autre. En effet, dans l'Alibori (64 %), le Borgou (69 %) et l'Ouémé (68 %), le pourcentage ayant accès à une MII varie entre 64 % et 69 % contre au moins 80 % dans les autres départements (**Tableau 10.5**).

Graphique 10.8 Accès et utilisation des MII



10.3 UTILISATION DES MII PAR LES ENFANTS ET LES FEMMES ENCEINTES


Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans constituent des cibles prioritaires des interventions en matière de santé en général et de lutte contre le paludisme en particulier du fait de leur état de vulnérabilité en zone endémique comme le Bénin. Ainsi, plusieurs programmes sont mis en œuvre pour prévenir dans ces populations la survenue du paludisme et réduire ainsi les risques de morbidité et de mortalité. Au nombre de ces actions, on peut citer la promotion de l'utilisation universelle de la moustiquaire imprégnée d'insecticide.

Dans l'ensemble, plus de 3 enfants de moins de 5 ans sur 4 (76 %) ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'interview. Ce pourcentage est de 82 % chez les ménages possédant au moins une MII (**Tableau 10.8**).

Quatre femmes enceintes de 15-49 ans sur cinq (79 %) ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. Dans les ménages possédant au moins une MII, ce pourcentage atteint 85 % (**Tableau 10.9** et **Graphique 10.9**).

Tendances : On observe depuis 2006 une tendance à l'augmentation du taux d'utilisation des MII, que ce soit par les enfants de moins de 5 ans ou par les femmes enceintes de 15-49 ans. Cependant, on note qu'entre 2006 et 2011-2012, la tendance à l'augmentation a été plus importante et qu'elle s'est ensuite ralentie, le taux d'utilisation par les enfants étant passé de respectivement 20 % à 70 % et à 76 %. Dans la même période, le taux d'utilisation par les femmes enceintes a varié de 20 % à 75 % et à 79 %.

Graphique 10.9 Utilisation des MII



³ Cotonou se rapporte au département du Littoral dont il est l'unique commune

Variations par caractéristique

- Le niveau d'utilisation des MII chez les enfants de moins de 5 ans ainsi que chez les femmes enceintes reste nettement supérieur à Cotonou que dans les autres villes et en milieu rural. En effet, le taux d'utilisation des MII chez les enfants de moins de cinq ans est de 86 % à Cotonou contre 74 % en milieu rural (**Tableau 10.8**). Chez les femmes enceintes de 15-49 ans, il est respectivement de 82 % contre 79 % (**Tableau 10.9**).
- L'utilisation de MII chez les enfants de moins de cinq ans ainsi que chez les femmes enceintes varie selon le département. Les proportions d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview sont les plus faibles dans le département de l'Alibori (respectivement 69 % pour les deux cas) et les plus élevées dans le Mono (respectivement 87 % et 91 %) (**Tableau 10.8**).
- L'utilisation des MII chez les femmes enceintes de 15-49 ans augmente avec le niveau d'instruction. Elle passe de 77 % chez les femmes sans aucun niveau d'instruction à 85 % chez celles ayant un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus (**Tableau 10.9**).
- Le niveau d'utilisation des MII chez les enfants de moins de 5 ans augmente avec le quintile de bien-être économique du ménage passant de 69 % dans le plus bas à 83 % dans le plus élevé (**Tableau 10.8**).

10.4 PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE

Traitement Préventif Intermittent pendant la grossesse (TPIg)

Pourcentage de femmes qui ont pris au moins trois doses de SP/Fansidar au cours de leur dernière grossesse dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête.

L'infection palustre durant la grossesse est un problème majeur de santé publique au Bénin, comportant des risques importants pour la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né. Le traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIg) est un protocole thérapeutique complet d'antipaludiques administrés aux femmes enceintes au cours des visites prénatales de routine pour prévenir le paludisme. Le TPIg permet de prévenir les épisodes de paludisme chez la femme enceinte, l'anémie maternelle et fœtale, la parasitémie placentaire, le faible poids à la naissance et la mortalité néonatale.

L'Organisation Mondiale de la Santé recommande une approche à 3 volets pour réduire les conséquences négatives sur la santé, associées au paludisme pendant la grossesse (PPG) : diagnostic et traitement rapide de l'infection confirmée, utilisation de moustiquaire imprégnée d'insecticide et TPIg (OMS 2004).

La sulfadoxine-pyriméthamine (SP), appelée aussi Fansidar, est le médicament recommandé à titre préventif pour le TPIg au Bénin. Depuis plus de 10 ans, le Ministère de la Santé a mis en place le TPIg, consistant en l'administration d'au moins deux doses de SP/Fansidar durant les visites prénatales de routine aux second et troisième trimestres de grossesse (TPIg2+) pour protéger la femme enceinte et le futur enfant du paludisme. En 2016, le programme national de lutte contre le paludisme a adopté la recommandation de l'OMS 2012, consistant à administrer 1 dose de SP/Fansidar lors de chaque visite prénatale après le premier trimestre, en respectant un intervalle d'au moins 1 mois entre les doses (OMS 2012a ; OMS 2012b). L'indicateur utilisé pour mesurer la couverture de cette intervention est le pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar pour prévenir le paludisme au cours de leur grossesse la plus récente (TPIg3+).

Dans l'ensemble, 33 % des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête ont déclaré avoir reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale. Seulement 13 % ont déclaré en avoir reçu trois doses dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale (**Tableau 10.10** et **Graphique 10.10**).


Tendances : Le pourcentage de femmes qui ont suivi un TPIg3⁺ ou qui ont pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale a augmenté entre 2006 et 2017-2018 passant de moins de 1 % à 13 % (**Graphique 10.10**).

Variations par caractéristique

- Les proportions de femmes ayant pris trois doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale sont plus élevées en milieu urbain (16 %), dans le département du Mono (26 %) et les plus faibles en milieu rural (12 %), dans les départements de l'Alibori et du Borgou (7 % et 8 % respectivement) (**Tableau 10.10**).
- La prise de 3 doses ou plus de SP/Fansidar dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale augmente avec le niveau d'instruction de la femme. En effet, le pourcentage de femmes ayant pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar passe de 10 % chez celles qui n'ont aucun niveau d'instruction à 26 % chez celles qui ont un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus.
- Le pourcentage de femmes ayant pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale augmente avec le niveau de bien-être du ménage, passant de 6 % chez les femmes des ménages du quintile le plus bas à 23 % chez celles du quintile le plus élevé, soit un pourcentage environ 4 fois plus élevé.

Graphique 10.10 Tendances de l'utilisation du TPIg par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête qui ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP/Fansidar dont, au moins, une dose au cours d'une visite prénatale



10.5 PRISE EN CHARGE DU PALUDISME CHEZ LES ENFANTS

Recherche de soins pour les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans les 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un prestataire de santé, d'un établissement de santé ou d'une pharmacie.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans les deux semaines avant l'interview.

Diagnostic du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé. C'est une mesure indirecte du test de diagnostic du paludisme.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview.

Combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) pour les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, qui ont pris des antipaludiques, pourcentage ayant pris une combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA).

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview.

Au Bénin, l'initiative de la gratuité du traitement du paludisme chez la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans a été lancée en octobre 2011 avec la mise en place de la Combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) au niveau communautaire et dans l'ensemble des 34 zones sanitaires. Avant cette date, toute fièvre était traitée comme un accès palustre avec des antipaludiques de tout genre. Mais en réponse aux cas de résistances accrue de l'agent pathogène du paludisme aux antipaludiques traditionnels, le traitement ne peut plus être mis en œuvre que chez les sujets ayant subi un test de diagnostic biologique du paludisme et dont le résultat s'est révélé positif.


Dans l'ensemble, 19 % des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview. Pour seulement un peu plus d'un enfant malade sur deux (53 %), on a recherché des conseils ou un traitement et, pour 28 %, on a recherché des conseils ou un traitement le jour même ou le jour après. En outre, pour environ un enfant sur cinq (18 %), on a effectué un prélèvement du sang au doigt ou au talon pour être testé (**Tableau 10.11**).

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et qui ont eu recours à un antipaludique, 37 % ont utilisé de la CTA, 20 % ont utilisé de la quinine en comprimés, 17 % de la quinine injectable et 19 % ont de la chloroquine dont, notons-le, l'utilisation a été proscrite depuis plus d'une décennie déjà au Bénin (**Tableau 10.13**).

Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement a légèrement diminué, passant de 58 % à 53 %. Par contre, concernant la prise de CTA, on constate la tendance inverse, le pourcentage d'enfants avec de la fièvre et traités avec une CTA étant passé de 1 % en 2006 à 32 % en 2011-2012 et à 37 % en 2017-2018 (**Graphique 10.11**). Concernant le pourcentage d'enfants avec de la fièvre et à qui on a prélevé du sang pour être testé, on ne constate pas de changement dans la période (17 % contre 18 %).

Graphique 10.11 Tendances de l'utilisation des CTA par les enfants ayant eu de la fièvre

Parmi les enfants ayant eu récemment de la fièvre et qui ont pris un antipaludique, pourcentage ayant reçu une CTA



Variations par caractéristique

- C'est surtout dans le secteur public (41 %), essentiellement les centres de santé du gouvernement (31 %), et le secteur privé (34 %), en majorité dans les hôpitaux et cliniques privés (12 %) et les pharmacies (18 %), que l'on recherche les conseils ou les traitements pour les enfants ayant de la fièvre (**Tableau 10.12**).
- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement augmente avec le niveau d'instruction de la mère. Plus la mère est instruite, plus elle a tendance à rechercher des conseils ou un

traitement pour son enfant souffrant de la fièvre. Le pourcentage passe de 49 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 73 % parmi ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Tableau 10.11**).

- Cette tendance est également observée pour le quintile de bien-être du ménage. Le pourcentage d'enfants ayant eu de la fièvre pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement varie de 39 % dans le quintile le plus bas à 69 % dans le plus élevé (**Tableau 10.11**).
- Le recours à l'utilisation de la quinine en comprimé pour le traitement du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans augmente du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 11 % à 28 % (**Tableau 10.13**).

10.6 PRÉVALENCE DU FAIBLE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE CHEZ LES ENFANTS

Prévalence du faible niveau d'hémoglobine chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 grammes par décilitre (g/dl) de sang. Le seuil de 8,0 g/dl est souvent utilisé pour classer l'anémie liée au paludisme. C'est un seuil différent de celui utilisé pour définir l'anémie sévère dans le chapitre nutrition (7,0 g/dl).

Échantillon : Enfants de 6-59 mois

L'anémie, un état pathologique caractérisé par une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang, provoque une diminution de la quantité d'oxygène dans les tissus et les organes du corps et réduit leur capacité de fonctionnement. L'anémie est associée à des troubles du développement moteur et cognitif chez l'enfant. Les causes principales de l'anémie chez les enfants sont le paludisme et une carence en fer, folates, vitamine B12, ou d'autres nutriments. D'autres problèmes comme des infections causées par des vers intestinaux, les hémoglobinopathies et la drépanocytose peuvent aussi être responsables de l'anémie. Bien que l'anémie ne soit pas spécifique au paludisme, les tendances de la prévalence de l'anémie peuvent refléter la morbidité causée par le paludisme. Elles varient en fonction des changements de la couverture des interventions dans le domaine du paludisme (Korenromp 2004). Les interventions dans le domaine du paludisme ont été associées à une réduction de 60 % du risque d'anémie en utilisant un seuil de 8,0 g/dl (RBM 2003). Globalement, le taux de couverture des tests d'hémoglobine est élevé puisqu'un échantillon de sang a été prélevé pour 98 % des enfants éligibles (**Tableau 10.14**).

Dans l'ensemble, au Bénin environ 9 % des enfants de 6 à 59 mois ont un taux d'hémoglobine inférieur à 8,0 g/dl (**Tableau 10.15**).

Tendances : Au Bénin, entre 2011-2012 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois ayant un taux d'hémoglobine inférieur à 8,0 g/dl a légèrement augmenté, passant de 7 % à 9 %.


Variations par caractéristique

- La prévalence de l'hémoglobine inférieure à 8,0 g/dl chez les enfants de 6 à 59 mois varie au Bénin selon l'âge de l'enfant. Comprise entre 11 % et 12 % parmi ceux de 6-23 mois, elle tend à diminuer par la suite pour concerner 5 % des enfants de 48-59 mois.
- Les départements les plus touchés par la prévalence du niveau d'hémoglobine inférieure à 8 g/dl chez les enfants de 6 à 59 mois sont l'Atacora (18 %), le Borgou (12 %) et l'Alibori (11 %). Les moins touchés sont le Littoral (2 %) et les Collines (4 %).

- La prévalence de l'hémoglobine inférieure à 8,0 g/dl varie avec le niveau d'instruction de la mère, de 11 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 1 % parmi ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Graphique 10.12**).
- Le pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant un niveau d'hémoglobine inférieure à 8,0 g/dl diminue avec le niveau de bien-être économique du ménage. Plus le ménage est riche moins les enfants ont un niveau d'hémoglobine inférieure à 8,0 g/dl. En effet, la prévalence passe de 14 % dans le quintile le plus bas à 3 % dans le plus élevé.

Graphique 10.12 Prévalence de faible niveau d'hémoglobine chez les enfants par niveau d'instruction de la mère

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0g/dl



10.7 PREVALENCE DU PALUDISME CHEZ LES ENFANTS

Prévalence du paludisme chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois classés comme étant infectés par le paludisme selon les résultats de la microscopie

Échantillon : Enfants de 6-59 mois

Au Bénin, les enfants reconnus comme étant les plus vulnérables au paludisme sont les moins de 5 ans. De ce fait, les enfants de cette tranche d'âge bénéficient depuis plusieurs années déjà d'une attention particulière des autorités gouvernementales et sanitaires. Parmi les mesures de traitement mises en œuvre, on note un meilleur accès aux tests de diagnostic biologique du paludisme auxquels il faut recourir avant la prise en charge de l'état fébrile de l'enfant.

La quasi-totalité des enfants de 6-59 mois (98 % pour le TDR et 93 % pour la microscopie) ont été testés pour le paludisme (**Tableau 10.14**). Pour 36 % d'entre eux, le test du diagnostic rapide s'est révélé positif et pour 39 %, le test de gouttes épaisses au microscope est positif (**Tableau 10.16**).

Variations par caractéristique


- La prévalence du paludisme selon les résultats de la microscopie augmente avec l'âge de l'enfant. D'un minimum de 27 % à 6-8 mois, elle augmente pour se situer à 35 % à 18-23 mois et à 45 % dans le groupe d'âges 36-47 mois.
- La prévalence du paludisme varie entre les départements. Il faut préciser ici que les kits de tests qui se sont révélés défectueux au début de l'enquête et qui ont été changés expliquent, très certainement, les écarts entre les résultats des TDR et de la microscopie dans les départements du Littoral et de l'Atlantique.

La prévalence du paludisme basée sur la microscopie varie de manière importante en fonction du milieu de résidence et du département : elle est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (43 % contre 32 %), dans les autres villes qu'à Cotonou (34 % contre 17 %) et dans les départements, elle varie d'un minimum de 17 % dans le Littoral à 51 % dans le Couffo (**Tableau 10.16** et **Graphique 10.13**).

- La prévalence du paludisme selon les résultats au microscope varie en fonction du niveau d'instruction de la mère. Moins la mère est instruite, plus la prévalence est élevée. Elle varie de 44 % chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 20 % chez ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- La prévalence du paludisme selon les résultats au microscope varie également en fonction du niveau de bien-être économique du ménage. Elle a tendance à diminuer avec l'amélioration du niveau de bien-être économique, passant de 55 % dans le quintile le plus bas à 23 % dans le plus élevé (**Graphique 10.14**).


Graphique 10.13 Prévalence du paludisme chez les enfants par département

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat au test de parasitémie palustre est positif selon l'examen microscopique



Graphique 10.14 Prévalence du paludisme chez les enfants par bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du test de parasitémie palustre est positif selon l'examen microscopique



LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le paludisme, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 10.1 Possession de moustiquaires par les ménages**
- **Tableau 10.2 Pulvérisation intradomestique d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques**
- **Tableau 10.3 Source d'obtention des moustiquaires**
- **Tableau 10.4 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)**
- **Tableau 10.5 Accès à une MII**
- **Tableau 10.6 Utilisation des moustiquaires par les ménages**
- **Tableau 10.7 Utilisation des MII existantes**
- **Tableau 10.8 Utilisation des moustiquaires par les enfants**
- **Tableau 10.9 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes**
- **Tableau 10.10 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse**
- **Tableau 10.11 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre**
- **Tableau 10.12 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre**
- **Tableau 10.13 Type d'antipaludiques utilisés**
- **Tableau 10.14 Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants**
- **Tableau 10.15 Niveau d'hémoglobine < 8,0 g/dl chez les enfants**
- **Tableau 10.16 Prévalence du paludisme chez les enfants**

Tableau 10.1 Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire (traitée ou non traitée) et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII); nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage; et pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire et une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire | | Nombre moyen de moustiquaires par ménage | | Effectif de ménages | Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage | | Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit avant l'interview dans le ménage |
|--|--|---|---|--|------------------------|--|---|--|
| | Une mousti- quaire quelconque | Une mousti- quaire imprégnée d'insecticide (MII) ¹ | Une mousti- quaire quelconque | Une mousti- quaire imprégnée d'insecti- cide (MII) ¹ | | Une mousti- quaire quelconque | Une mousti- quaire imprégnée d'insecticide (MII) ¹ | |
| | | | | | | | | |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 94,6 | 91,7 | 2,6 | 2,5 | 852 | 71,8 | 67,4 | 851 |
| Autres villes | 92,1 | 90,0 | 2,5 | 2,4 | 5 252 | 61,9 | 59,7 | 5 237 |
| Ensemble urbain | 92,5 | 90,2 | 2,5 | 2,4 | 6 104 | 63,3 | 60,8 | 6 088 |
| Rural | 93,0 | 92,4 | 2,7 | 2,6 | 8 052 | 61,5 | 60,3 | 8 026 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 87,7 | 87,1 | 2,8 | 2,7 | 1 192 | 44,6 | 44,0 | 1 183 |
| Atacora | 94,2 | 94,0 | 3,4 | 3,4 | 923 | 59,4 | 59,1 | 922 |
| Atlantique | 95,6 | 94,6 | 2,7 | 2,6 | 1 969 | 74,3 | 71,2 | 1 962 |
| Borgou | 88,3 | 88,0 | 2,5 | 2,5 | 1 498 | 47,3 | 47,0 | 1 491 |
| Collines | 96,9 | 96,3 | 2,9 | 2,8 | 981 | 69,3 | 68,4 | 976 |
| Couffo | 95,6 | 95,4 | 2,4 | 2,4 | 1 108 | 64,7 | 64,3 | 1 108 |
| Donga | 95,1 | 94,9 | 3,3 | 3,3 | 740 | 66,3 | 65,7 | 740 |
| Littoral | 94,6 | 91,7 | 2,6 | 2,5 | 852 | 71,8 | 67,4 | 851 |
| Mono | 94,0 | 93,6 | 2,4 | 2,3 | 879 | 73,9 | 72,9 | 874 |
| Ouémé | 84,2 | 78,0 | 2,0 | 1,8 | 1 633 | 55,1 | 49,6 | 1 627 |
| Plateau | 94,7 | 94,2 | 2,4 | 2,4 | 984 | 62,2 | 61,8 | 983 |
| Zou | 97,4 | 97,0 | 2,5 | 2,4 | 1 399 | 64,3 | 63,4 | 1 397 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 89,3 | 88,9 | 2,5 | 2,5 | 2 501 | 52,7 | 52,2 | 2 494 |
| Second | 93,7 | 93,5 | 2,6 | 2,6 | 2 675 | 58,7 | 57,9 | 2 668 |
| Moyen | 93,5 | 92,8 | 2,6 | 2,6 | 2 798 | 62,5 | 61,6 | 2 787 |
| Quatrième | 93,6 | 92,1 | 2,6 | 2,5 | 2 951 | 64,6 | 62,7 | 2 942 |
| Le plus élevé | 93,3 | 90,1 | 2,6 | 2,5 | 3 231 | 70,3 | 66,2 | 3 223 |
| Ensemble | 92,8 | 91,5 | 2,6 | 2,5 | 14 156 | 62,2 | 60,5 | 14 114 |

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'Action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012

Tableau 10.2 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques

Pourcentage de ménages ayant reçu la visite de quelqu'un qui a pulvérisé d'insecticide les murs intérieurs du logement contre les moustiques (PID) au cours des 12 derniers mois ; pourcentage de ménages avec au moins, une MII et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de ménages ayant bénéficié d'une PID ¹ au cours des 12 derniers mois | Pourcentage de ménages avec au moins une MII ² et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois | Effectif de ménages |
|--|---|---|---------------------|
| Résidence | | | |
| Cotonou | 2,9 | 91,9 | 852 |
| Autres villes | 7,9 | 90,3 | 5 252 |
| Ensemble urbain | 7,2 | 90,5 | 6 104 |
| Rural | 9,7 | 93,1 | 8 052 |
| Département | | | |
| Alibori | 31,0 | 90,4 | 1 192 |
| Atacora | 36,2 | 94,7 | 923 |
| Atlantique | 0,7 | 94,7 | 1 969 |
| Borgou | 0,2 | 88,0 | 1 498 |
| Collines | 0,4 | 96,3 | 981 |
| Couffo | 0,2 | 95,4 | 1 108 |
| Donga | 61,5 | 97,9 | 740 |
| Littoral | 2,9 | 91,9 | 852 |
| Mono | 0,2 | 93,6 | 879 |
| Ouémé | 0,1 | 78,0 | 1 633 |
| Plateau | 0,5 | 94,2 | 984 |
| Zou | 0,6 | 97,0 | 1 399 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 9,8 | 89,6 | 2 501 |
| Second | 9,8 | 94,2 | 2 675 |
| Moyen | 11,7 | 93,4 | 2 798 |
| Quatrième | 7,9 | 92,4 | 2 951 |
| Le plus élevé | 4,8 | 90,4 | 3 231 |
| Ensemble | 8,7 | 92,0 | 14 156 |

¹ La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) est limitée à la pulvérisation faite par une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.

² Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012

Tableau 10.3 Source d'obtention des moustiquaires

Répartition (en %) des moustiquaires par source d'obtention, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Campagne de distribution | Visite prénatale | Visite pour vaccination | Établissement de santé du gouvernement | Pharmacie | Boutique/marché | Autre | Ne sait pas/Manquant | Total | Effectif de moustiquaires |
|--|--------------------------|------------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|
| Type de moustiquaire | | | | | | | | | | |
| MII ¹ | 91,2 | 3,2 | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 35 944 |
| Autre ² | 0,0 | 12,9 | 2,9 | 0,4 | 12,3 | 43,5 | 12,8 | 15,2 | 100,0 | 802 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 75,4 | 3,6 | 2,1 | 0,3 | 7,4 | 8,5 | 2,0 | 0,8 | 100,0 | 2 215 |
| Autres villes | 87,0 | 3,5 | 1,7 | 0,1 | 2,1 | 3,7 | 0,9 | 1,0 | 100,0 | 13 078 |
| Ensemble urbain | 85,3 | 3,5 | 1,8 | 0,1 | 2,9 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 15 293 |
| Rural | 92,0 | 3,4 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 21 453 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 97,8 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 3 289 |
| Atacora | 95,8 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 3 113 |
| Atlantique | 81,3 | 5,2 | 2,3 | 0,1 | 2,7 | 7,0 | 1,0 | 0,4 | 100,0 | 5 318 |
| Borgou | 93,2 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 100,0 | 3 713 |
| Collines | 90,1 | 4,1 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 2,9 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 2 817 |
| Couffo | 91,9 | 3,9 | 1,7 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 100,0 | 2 644 |
| Donga | 95,8 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 2 471 |
| Littoral | 75,4 | 3,6 | 2,1 | 0,3 | 7,4 | 8,5 | 2,0 | 0,8 | 100,0 | 2 215 |
| Mono | 92,1 | 2,8 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 2 094 |
| Ouémé | 79,7 | 5,8 | 1,8 | 0,0 | 2,9 | 4,2 | 1,7 | 3,9 | 100,0 | 3 256 |
| Plateau | 92,6 | 2,9 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 2 349 |
| Zou | 89,6 | 3,7 | 2,4 | 0,1 | 0,4 | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 3 468 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 94,9 | 2,5 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 6 301 |
| Second | 94,2 | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 7 003 |
| Moyen | 92,0 | 4,0 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 7 344 |
| Quatrième | 88,5 | 4,0 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 3,7 | 0,6 | 0,7 | 100,0 | 7 655 |
| Le plus élevé | 79,2 | 3,6 | 2,2 | 0,2 | 5,4 | 6,5 | 1,5 | 1,3 | 100,0 | 8 442 |
| Ensemble | 89,2 | 3,4 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 36 746 |

¹ Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

² N'importe quelle moustiquaire qui n'est pas une MII.

Tableau 10.4 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par nombre de MII que possède le ménage et pourcentage ayant accès à une MII selon le nombre de personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Nombre d'MII ¹ | Nombre de personnes qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview | | | | | | | | Ensemble |
|--|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8+ | |
| 0 | 16,6 | 10,8 | 8,3 | 7,0 | 6,5 | 5,4 | 6,3 | 9,2 | 7,9 |
| 1 | 54,3 | 32,9 | 22,9 | 12,2 | 7,0 | 4,2 | 3,6 | 2,1 | 8,2 |
| 2 | 22,5 | 40,7 | 44,8 | 46,7 | 40,0 | 31,3 | 21,6 | 9,2 | 26,3 |
| 3 | 3,7 | 10,2 | 16,0 | 20,8 | 27,0 | 31,7 | 31,2 | 18,2 | 22,2 |
| 4 | 1,9 | 4,0 | 5,6 | 10,2 | 12,7 | 17,2 | 21,3 | 19,7 | 15,5 |
| 5 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 4,4 | 6,1 | 8,1 | 12,9 | 7,4 |
| 6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 5,6 | 9,9 | 5,0 |
| 7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 2,4 | 18,8 | 7,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif | 1 387 | 2 871 | 5 822 | 8 283 | 10 024 | 9 513 | 8 270 | 26 928 | 73 098 |
| Pourcentage ayant accès à une MII ^{1,2} | 83,4 | 89,2 | 84,1 | 86,9 | 81,4 | 81,3 | 77,5 | 68,0 | 77,2 |

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012

² Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.

Tableau 10.5 Accès à une MII

Pourcentage de la population de fait des ménages ayant accès à une MII dans le ménage, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de la population de fait ayant accès à une MII ¹ | Effectif de personnes |
|--|---|-----------------------|
| Résidence | | |
| Cotonou | 83,3 | 3 687 |
| Autres villes | 77,1 | 25 689 |
| Ensemble urbain | 77,9 | 29 376 |
| Rural | 76,7 | 43 722 |
| Département | | |
| Alibori | 64,4 | 9 013 |
| Atacora | 81,7 | 6 371 |
| Atlantique | 85,1 | 8 655 |
| Borgou | 68,5 | 9 195 |
| Collines | 83,0 | 4 758 |
| Couffo | 80,4 | 5 071 |
| Donga | 82,7 | 4 840 |
| Littoral | 83,3 | 3 687 |
| Mono | 85,7 | 3 468 |
| Ouémé | 68,4 | 6 744 |
| Plateau | 79,8 | 4 521 |
| Zou | 80,6 | 6 776 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 70,6 | 14 549 |
| Second | 76,7 | 14 617 |
| Moyen | 78,3 | 14 582 |
| Quatrième | 79,3 | 14 676 |
| Le plus élevé | 80,9 | 14 674 |
| Ensemble | 77,2 | 73 098 |

¹ Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum. Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MI) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

Tableau 10.6 Utilisation des moustiquaires par les ménages

Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit avant l'interview, a dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi la population de fait des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Population des ménages | | | Population de fait des ménages avec, au moins, une MII ¹ | |
|--|---|--|----------|---|----------|
| | Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit dernière | Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière | Effectif | Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière | Effectif |
| Age | | | | | |
| <5 | 77,7 | 76,3 | 13 551 | 82,2 | 12 582 |
| 5-14 | 69,2 | 68,1 | 21 752 | 73,6 | 20 119 |
| 15-34 | 70,9 | 69,3 | 21 401 | 75,9 | 19 549 |
| 35-49 | 76,4 | 74,7 | 8 726 | 80,7 | 8 076 |
| 50+ | 73,1 | 71,5 | 7 668 | 78,5 | 6 994 |
| Sexe | | | | | |
| Masculin | 70,3 | 68,9 | 35 306 | 75,2 | 32 378 |
| Féminin | 74,6 | 73,1 | 37 793 | 79,1 | 34 942 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 84,4 | 80,7 | 3 687 | 85,5 | 3 477 |
| Autres villes | 73,2 | 71,4 | 25 689 | 77,9 | 23 518 |
| Ensemble urbain | 74,6 | 72,5 | 29 376 | 78,9 | 26 995 |
| Rural | 71,2 | 70,2 | 43 722 | 76,1 | 40 325 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 64,1 | 63,7 | 9 013 | 75,9 | 7 566 |
| Atacora | 67,8 | 67,6 | 6 371 | 71,1 | 6 062 |
| Atlantique | 81,5 | 78,7 | 8 655 | 81,8 | 8 330 |
| Borgou | 68,0 | 67,7 | 9 195 | 77,3 | 8 058 |
| Collines | 69,0 | 68,1 | 4 758 | 70,0 | 4 626 |
| Couffo | 71,1 | 70,8 | 5 071 | 73,9 | 4 858 |
| Donga | 64,0 | 63,3 | 4 840 | 66,0 | 4 637 |
| Littoral | 84,4 | 80,7 | 3 687 | 85,5 | 3 477 |
| Mono | 84,6 | 83,3 | 3 468 | 88,4 | 3 266 |
| Ouémé | 69,5 | 64,4 | 6 744 | 78,6 | 5 529 |
| Plateau | 75,0 | 74,5 | 4 521 | 78,1 | 4 317 |
| Zou | 81,2 | 80,0 | 6 776 | 82,3 | 6 594 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 65,6 | 65,3 | 14 549 | 74,4 | 12 774 |
| Second | 72,0 | 71,3 | 14 617 | 76,4 | 13 659 |
| Moyen | 72,2 | 71,4 | 14 582 | 76,3 | 13 637 |
| Quatrième | 74,3 | 72,5 | 14 676 | 77,5 | 13 735 |
| Le plus élevé | 78,4 | 75,0 | 14 674 | 81,4 | 13 517 |
| Ensemble | 72,5 | 71,1 | 73 098 | 77,2 | 67 321 |

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012

Tableau 10.7 Utilisation des MII existantes

Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) qui ont été utilisées par une personne la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique | Pourcentage de MII existantes ¹ utilisées la nuit dernière | Effectif de MII ¹ |
|--|---|------------------------------|
| Résidence | | |
| Cotonou | 74,6 | 2 095 |
| Autres villes | 74,4 | 12 692 |
| Ensemble urbain | 74,4 | 14 787 |
| Rural | 72,7 | 21 157 |
| Département | | |
| Alibori | 90,6 | 3 268 |
| Atacora | 70,4 | 3 106 |
| Atlantique | 67,9 | 5 136 |
| Borgou | 86,1 | 3 685 |
| Collines | 59,7 | 2 784 |
| Couffo | 67,8 | 2 631 |
| Donga | 63,9 | 2 447 |
| Littoral | 74,6 | 2 095 |
| Mono | 75,0 | 2 054 |
| Ouémé | 72,2 | 2 983 |
| Plateau | 72,2 | 2 330 |
| Zou | 76,5 | 3 425 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 73,1 | 6 270 |
| Second | 74,5 | 6 937 |
| Moyen | 72,6 | 7 247 |
| Quatrième | 72,7 | 7 481 |
| Le plus élevé | 74,0 | 8 009 |
| Ensemble | 73,4 | 35 944 |

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MI) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

Tableau 10.8 Utilisation des moustiquaires par les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi les enfants de moins de 5 ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages | | | Enfants de moins de 5 ans dans les ménages ayant au moins une MII ¹ | | Enfants de 6-59 mois dans les ménages ayant au moins une MII ¹ | |
|--|---|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit dernière | Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière | Effectif d'enfants | Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire MII ¹ la nuit dernière | Effectif d'enfants | Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière | Effectif d'enfants |
| Âge en mois | | | | | | | |
| <12 | 79,3 | 77,6 | 3 000 | 83,7 | 2 784 | 84,6 | 1 458 |
| 12-23 | 79,7 | 78,5 | 2 615 | 84,6 | 2 425 | 84,6 | 2 425 |
| 24-35 | 77,5 | 76,0 | 2 531 | 81,1 | 2 373 | 81,1 | 2 373 |
| 36-47 | 76,5 | 75,2 | 2 722 | 81,2 | 2 521 | 81,2 | 2 521 |
| 48-59 | 75,3 | 74,2 | 2 683 | 80,3 | 2 479 | 80,3 | 2 479 |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 77,8 | 76,3 | 6 853 | 82,3 | 6 352 | 82,3 | 5 703 |
| Féminin | 77,6 | 76,3 | 6 698 | 82,1 | 6 230 | 82,0 | 5 553 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 89,4 | 86,4 | 585 | 89,5 | 564 | 89,7 | 517 |
| Autres villes | 80,5 | 78,8 | 4 635 | 84,7 | 4 312 | 84,9 | 3 859 |
| Ensemble urbain | 81,5 | 79,7 | 5 220 | 85,3 | 4 876 | 85,5 | 4 376 |
| Rural | 75,3 | 74,2 | 8 331 | 80,2 | 7 706 | 80,0 | 6 881 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | 69,5 | 69,1 | 1 779 | 81,5 | 1 508 | 81,9 | 1 327 |
| Atacora | 72,4 | 72,2 | 1 205 | 75,8 | 1 149 | 75,5 | 1 026 |
| Atlantique | 88,6 | 85,7 | 1 500 | 88,7 | 1 450 | 89,1 | 1 308 |
| Borgou | 70,6 | 70,3 | 1 831 | 79,5 | 1 618 | 78,8 | 1 471 |
| Collines | 71,3 | 70,4 | 859 | 72,3 | 836 | 71,9 | 742 |
| Couffo | 78,8 | 78,5 | 960 | 81,5 | 926 | 81,0 | 820 |
| Donga | 71,7 | 70,1 | 911 | 72,6 | 880 | 73,1 | 772 |
| Littoral | 89,4 | 86,4 | 585 | 89,5 | 564 | 89,7 | 517 |
| Mono | 89,3 | 87,4 | 611 | 91,3 | 586 | 91,2 | 521 |
| Ouémé | 78,0 | 73,4 | 1 215 | 86,3 | 1 033 | 86,0 | 937 |
| Plateau | 80,5 | 79,7 | 799 | 83,5 | 762 | 83,7 | 684 |
| Zou | 86,1 | 85,2 | 1 296 | 86,9 | 1 271 | 86,8 | 1 133 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 69,1 | 68,8 | 2 898 | 77,9 | 2 559 | 77,5 | 2 282 |
| Second | 76,3 | 75,4 | 2 792 | 80,5 | 2 618 | 80,2 | 2 339 |
| Moyen | 77,9 | 77,2 | 2 750 | 81,8 | 2 593 | 81,7 | 2 317 |
| Quatrième | 80,9 | 78,9 | 2 685 | 83,5 | 2 538 | 83,7 | 2 282 |
| Le plus élevé | 85,8 | 82,5 | 2 426 | 88,0 | 2 275 | 88,3 | 2 036 |
| Ensemble | 77,7 | 76,3 | 13 551 | 82,2 | 12 582 | 82,2 | 11 257 |

Note: Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

Tableau 10.9 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans enceintes qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi les femmes de 15-49 ans enceintes des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les femmes enceintes de 15-49 ans dans tous les ménages | | | Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans les ménages ayant au moins une MII ¹ | |
|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit dernière | Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière | Effectif de femmes enceintes | Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière | Effectif de femmes enceintes |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 84,9 | 81,7 | 63 | 84,5 | 61 |
| Autres villes | 81,8 | 80,3 | 566 | 85,4 | 533 |
| Ensemble urbain | 82,1 | 80,5 | 630 | 85,3 | 594 |
| Rural | 79,4 | 78,6 | 1 080 | 84,6 | 1 003 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 69,1 | 69,1 | 211 | 83,7 | 175 |
| Atacora | 79,1 | 79,1 | 138 | 83,8 | 131 |
| Atlantique | 86,5 | 83,0 | 195 | 88,3 | 184 |
| Borgou | 81,3 | 81,3 | 247 | 88,9 | 226 |
| Collines | 76,4 | 74,7 | 133 | 77,0 | 129 |
| Couffo | 80,7 | 80,7 | 122 | 82,3 | 119 |
| Donga | 75,1 | 74,6 | 121 | 78,4 | 115 |
| Littoral | 84,9 | 81,7 | 63 | 84,5 | 61 |
| Mono | 91,4 | 91,4 | 73 | 95,5 | 70 |
| Ouémé | 86,3 | 81,7 | 109 | 87,1 | 102 |
| Plateau | 77,5 | 76,3 | 123 | 80,4 | 117 |
| Zou | 85,9 | 85,1 | 172 | 86,9 | 168 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 77,4 | 76,7 | 959 | 84,8 | 867 |
| Primaire | 83,2 | 81,5 | 379 | 83,7 | 369 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 84,9 | 83,2 | 286 | 86,2 | 276 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 86,4 | 85,1 | 86 | 85,5 | 85 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 76,4 | 76,4 | 317 | 86,2 | 281 |
| Second | 78,4 | 78,3 | 340 | 83,3 | 320 |
| Moyen | 79,9 | 78,9 | 372 | 85,1 | 345 |
| Quatrième | 81,4 | 80,1 | 374 | 84,0 | 357 |
| Le plus élevé | 86,2 | 82,6 | 307 | 85,8 | 296 |
| Ensemble | 80,4 | 79,3 | 1 709 | 84,8 | 1 597 |

Note : le tableau est basé sur les femmes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

Tableau 10.10 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance vivante, ont reçu une dose ou plus de SP/Fansidar, ont reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar, et qui ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar, selon certains caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique | Pourcentage ayant reçu 1 dose ou plus de SP/Fansidar | Pourcentage ayant reçu 1 dose ou plus de SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale | Pourcentage ayant reçu 2 doses ou plus de SP/Fansidar qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale | Pourcentage ayant reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale | Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 années ayant précédé l'enquête |
|--|--|--|--|---|---|
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 57,9 | 56,3 | 43,9 | 22,8 | 242 |
| Autres villes | 52,7 | 52,2 | 36,8 | 14,6 | 1 863 |
| Ensemble urbain | 53,3 | 52,7 | 37,6 | 15,5 | 2 105 |
| Rural | 46,5 | 46,0 | 30,9 | 12,0 | 3 397 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 39,0 | 38,2 | 26,5 | 7,4 | 766 |
| Atacora | 43,7 | 43,2 | 30,3 | 10,1 | 499 |
| Atlantique | 54,5 | 54,2 | 37,2 | 13,6 | 595 |
| Borgou | 40,2 | 39,8 | 21,7 | 7,6 | 730 |
| Collines | 44,0 | 43,3 | 31,5 | 14,6 | 353 |
| Couffo | 45,6 | 45,6 | 30,0 | 14,0 | 375 |
| Donga | 62,3 | 61,8 | 46,1 | 15,6 | 391 |
| Littoral | 57,9 | 56,3 | 43,9 | 22,8 | 242 |
| Mono | 74,1 | 74,1 | 55,6 | 25,6 | 225 |
| Ouémé | 47,4 | 45,8 | 33,5 | 14,1 | 479 |
| Plateau | 30,7 | 30,0 | 21,9 | 13,0 | 340 |
| Zou | 70,8 | 70,7 | 46,3 | 19,8 | 508 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 44,9 | 44,3 | 29,1 | 9,9 | 3 458 |
| Primaire | 54,6 | 54,2 | 38,9 | 15,6 | 1 036 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 58,6 | 58,0 | 41,7 | 21,8 | 731 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 55,8 | 55,0 | 45,3 | 25,6 | 277 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 34,3 | 33,6 | 20,9 | 5,6 | 1 153 |
| Second | 46,2 | 46,0 | 29,5 | 8,9 | 1 139 |
| Moyen | 51,5 | 51,1 | 34,5 | 14,4 | 1 134 |
| Quatrième | 55,4 | 54,8 | 38,1 | 16,8 | 1 097 |
| Le plus élevé | 60,0 | 58,9 | 46,2 | 22,6 | 979 |
| Ensemble | 49,1 | 48,5 | 33,4 | 13,3 | 5 502 |

Tableau 10.11 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre et pourcentage pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Enfants de moins de 5 ans | | Enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre | | | Enfants moins de 5 ans qui ont reçu des médicaments antipaludiques | | |
|--|---|--------------------|---|---|--|--|--|--------------------|
| | Pourcentage d'enfants avec de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'enquête | Effectif d'enfants | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹ | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant ¹ | Pourcentage pour lesquels on a effectué de sang au doigt ou au talon pour être testé | Effectif d'enfants | Pourcentage ayant été prise en charge gratuitement | Effectif d'enfants |
| Âge en mois | | | | | | | | |
| <12 | 20,9 | 2 941 | 53,6 | 28,0 | 14,9 | 614 | 1,3 | 69 |
| 12-23 | 24,9 | 2 515 | 51,2 | 28,2 | 17,7 | 626 | 3,3 | 108 |
| 24-35 | 18,9 | 2 365 | 53,3 | 26,0 | 19,9 | 448 | 2,0 | 89 |
| 36-47 | 17,9 | 2 450 | 58,6 | 32,7 | 18,8 | 439 | 4,0 | 95 |
| 48-59 | 14,0 | 2 416 | 48,3 | 22,8 | 18,6 | 339 | 3,2 | 70 |
| Sexe | | | | | | | | |
| Masculin | 20,0 | 6 415 | 52,0 | 27,1 | 17,3 | 1 282 | 3,9 | 232 |
| Féminin | 18,9 | 6 271 | 54,4 | 28,5 | 18,2 | 1 184 | 1,7 | 198 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 19,1 | 558 | 65,8 | 47,3 | 14,0 | 107 | (2,6) | 23 |
| Autres villes | 17,1 | 4 382 | 57,8 | 33,6 | 20,0 | 748 | 0,6 | 141 |
| Ensemble urbain | 17,3 | 4 940 | 58,8 | 35,3 | 19,2 | 855 | 0,9 | 163 |
| Rural | 20,8 | 7 746 | 50,1 | 23,8 | 16,9 | 1 611 | 4,1 | 268 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 22,5 | 1 718 | 16,5 | 10,7 | 9,8 | 387 | (0,0) | 46 |
| Atacora | 16,2 | 1 127 | 45,2 | 20,5 | 21,2 | 182 | (0,0) | 26 |
| Atlantique | 27,4 | 1 448 | 61,0 | 33,1 | 11,8 | 397 | 2,5 | 67 |
| Borgou | 12,8 | 1 678 | 47,6 | 23,5 | 23,2 | 214 | (23,1) | 34 |
| Collines | 16,6 | 814 | 80,1 | 43,1 | 20,2 | 135 | 1,9 | 47 |
| Couffo | 16,7 | 844 | 63,9 | 20,1 | 18,4 | 141 | * | 16 |
| Donga | 16,3 | 831 | 85,8 | 55,3 | 45,6 | 136 | (1,8) | 35 |
| Littoral | 19,1 | 558 | 65,8 | 47,3 | 14,0 | 107 | (2,6) | 23 |
| Mono | 20,9 | 565 | 45,6 | 19,5 | 18,3 | 118 | * | 13 |
| Ouémé | 18,9 | 1 131 | 59,7 | 39,8 | 11,2 | 213 | (0,0) | 40 |
| Plateau | 30,8 | 766 | 46,9 | 16,5 | 14,7 | 236 | (1,9) | 41 |
| Zou | 16,6 | 1 206 | 71,4 | 33,2 | 27,0 | 200 | (0,0) | 44 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 19,5 | 8 301 | 49,0 | 25,0 | 16,8 | 1 619 | 3,8 | 274 |
| Primaire | 20,8 | 2 310 | 57,7 | 29,7 | 18,9 | 480 | 1,7 | 90 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 18,2 | 1 523 | 62,8 | 33,6 | 19,4 | 278 | (1,1) | 50 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 16,2 | 552 | 72,9 | 50,3 | 23,0 | 90 | * | 16 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 17,9 | 2 713 | 38,6 | 17,3 | 16,0 | 485 | 5,6 | 68 |
| Second | 21,1 | 2 554 | 49,2 | 24,2 | 17,5 | 538 | 6,8 | 85 |
| Moyen | 20,7 | 2 559 | 48,0 | 22,8 | 15,1 | 529 | 1,7 | 95 |
| Quatrième | 20,6 | 2 549 | 64,2 | 32,5 | 18,4 | 526 | 1,3 | 96 |
| Le plus élevé | 16,8 | 2 311 | 68,6 | 46,3 | 22,9 | 389 | 0,0 | 87 |
| Ensemble | 19,4 | 12 686 | 53,1 | 27,8 | 17,7 | 2 466 | 2,9 | 431 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Sont inclus les conseils ou les traitements des sources suivantes : le secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur ambulant de médicaments. Sont exclus les conseils ou traitements d'un praticien traditionnel.

Tableau 10.12 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Source | Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chacune des sources : | |
|-----------------------------------|--|--|
| | Parmi les enfants avec de la fièvre | Parmi les enfants avec de la fièvre pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés |
| Secteur public | 22,0 | 40,8 |
| Hôpital gouvernemental | 3,6 | 6,6 |
| Centre de santé du gouvernement | 16,9 | 31,3 |
| Poste de santé du gouvernement | 0,4 | 0,7 |
| Clinique mobile | 0,2 | 0,4 |
| Agent de terrain/ASC | 1,1 | 2,0 |
| Autre | 0,1 | 0,1 |
| Secteur privé | 18,5 | 34,3 |
| Hôpital privé/clinique | 6,5 | 12,0 |
| Pharmacie | 9,4 | 17,5 |
| Médecin privé | 0,7 | 1,3 |
| Clinique mobile | 0,4 | 0,7 |
| Agent de terrain/ASC | 1,3 | 2,5 |
| Autre secteurs privés | 0,2 | 0,4 |
| Autre secteur privé | 12,1 | 22,4 |
| Boutique | 6,5 | 12,0 |
| Praticien traditionnel | 0,9 | 1,7 |
| Marché | 1,9 | 3,6 |
| Vendeur de médicaments itinérants | 2,8 | 5,3 |
| Autre | 2,2 | 4,1 |
| Effectif d'enfants | 2 466 | 1 329 |

ASC = Agent de Santé Communautaire

Tableau 10.13 Type d'antipaludiques utilisés

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview qui ont pris n'importe quel antipaludique, pourcentage ayant pris des antipaludiques spécifiques, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants ayant pris : | | | | | | | | | Effectif d'enfants avec de la fièvre ayant pris n'importe quel antipaludique |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | N'importe quelle CTA | SP/Fansidar | Chloroquine | Amodiaquine | Quinine comprimés | Quinine injection | Arte-sunate rectal | Arte-sunate injection | Autre anti-paludique | |
| Âge en mois | | | | | | | | | | |
| <6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 |
| 6-11 | 34,7 | 2,4 | 20,3 | 0,0 | 18,5 | 15,9 | 0,0 | 9,7 | 10,7 | 55 |
| 12-23 | 38,3 | 3,1 | 17,1 | 1,8 | 15,7 | 19,4 | 0,0 | 2,3 | 8,8 | 108 |
| 24-35 | 42,2 | 3,2 | 15,4 | 0,0 | 24,6 | 19,2 | 0,0 | 3,6 | 9,0 | 89 |
| 36-47 | 32,7 | 1,3 | 20,2 | 0,0 | 24,9 | 10,8 | 2,5 | 2,6 | 12,3 | 95 |
| 48-59 | 42,3 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 15,8 | 13,3 | 3,0 | 4,7 | 10,0 | 70 |
| Sexe | | | | | | | | | | |
| Masculin | 41,3 | 1,6 | 19,0 | 0,6 | 17,9 | 18,5 | 1,5 | 3,8 | 9,0 | 232 |
| Féminin | 32,0 | 2,6 | 18,5 | 0,3 | 22,1 | 14,3 | 1,2 | 4,4 | 10,7 | 198 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | (34,7) | (0,0) | (15,5) | (0,0) | (35,6) | (16,3) | (0,0) | (5,2) | (3,6) | 23 |
| Autres villes | 28,3 | 1,8 | 17,4 | 0,4 | 25,6 | 18,0 | 1,5 | 6,1 | 12,0 | 141 |
| Ensemble urbain | 29,2 | 1,5 | 17,2 | 0,4 | 27,0 | 17,8 | 1,3 | 6,0 | 10,9 | 163 |
| Rural | 41,8 | 2,4 | 19,7 | 0,5 | 15,5 | 15,9 | 1,4 | 3,0 | 9,1 | 268 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | (68,0) | (0,0) | (3,4) | (0,0) | (9,9) | (11,4) | (7,7) | (0,0) | (2,2) | 46 |
| Atacora | (33,6) | (0,0) | (26,0) | (0,0) | (18,4) | (31,4) | (5,6) | (6,6) | (0,0) | 26 |
| Atlantique | 25,3 | 2,8 | 22,1 | 0,0 | 24,2 | 15,0 | 0,0 | 1,7 | 15,8 | 67 |
| Borgou | (56,7) | (0,0) | (6,4) | (3,8) | (12,9) | (9,9) | (0,0) | (2,8) | (10,2) | 34 |
| Collines | 33,7 | 1,6 | 29,1 | 0,0 | 12,3 | 19,4 | 0,0 | 7,6 | 5,7 | 47 |
| Couffo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 |
| Donga | (49,7) | (3,6) | (12,5) | (0,0) | (20,4) | (15,0) | (0,0) | (0,0) | (2,9) | 35 |
| Littoral | (34,7) | (0,0) | (15,5) | (0,0) | (35,6) | (16,3) | (0,0) | (5,2) | (3,6) | 23 |
| Mono | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 |
| Ouémé | (23,2) | (7,2) | (23,1) | (0,0) | (26,2) | (6,2) | (0,0) | (3,0) | (11,1) | 40 |
| Plateau | (12,0) | (0,0) | (33,9) | (0,0) | (31,4) | (14,1) | (0,0) | (6,3) | (12,7) | 41 |
| Zou | (47,2) | (0,0) | (12,9) | (1,4) | (18,9) | (26,7) | (2,2) | (9,9) | (13,0) | 44 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | |
| Aucun | 37,4 | 0,9 | 22,1 | 0,5 | 18,5 | 15,5 | 2,2 | 4,1 | 9,9 | 274 |
| Primaire | 33,5 | 2,9 | 12,2 | 0,0 | 21,3 | 20,1 | 0,0 | 4,1 | 13,1 | 90 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | (37,0) | (4,6) | (15,8) | (1,2) | (25,5) | (20,3) | (0,0) | (5,3) | (3,1) | 50 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 47,4 | 0,0 | 21,3 | 1,9 | 10,6 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 68 |
| Second | 42,8 | 1,5 | 18,9 | 0,0 | 16,2 | 17,7 | 1,1 | 1,9 | 13,9 | 85 |
| Moyen | 34,9 | 5,0 | 25,3 | 0,0 | 17,5 | 11,9 | 0,0 | 3,9 | 9,6 | 95 |
| Quatrième | 38,4 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 25,0 | 20,6 | 3,0 | 6,4 | 5,9 | 96 |
| Le plus élevé | 24,0 | 3,3 | 15,3 | 0,7 | 27,6 | 14,5 | 2,4 | 7,1 | 11,7 | 87 |
| Ensemble | 37,0 | 2,1 | 18,8 | 0,4 | 19,9 | 16,6 | 1,4 | 4,1 | 9,8 | 431 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
CTA = Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine.

Tableau 10.14 Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants

Pourcentage d'enfants éligibles de 6-59 mois pour lesquels on a effectué un test d'hémoglobine et de paludisme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage testé pour : | | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Anémie | Paludisme par TDR | Paludisme avec gouttes épaisses | Effectif d'enfants |
| Âge en mois | | | | |
| 6-8 | 97,3 | 97,0 | 92,7 | 439 |
| 9-11 | 97,4 | 97,4 | 94,0 | 381 |
| 12-17 | 98,5 | 98,1 | 93,4 | 669 |
| 18-23 | 97,4 | 97,1 | 93,6 | 698 |
| 24-35 | 98,2 | 98,2 | 93,6 | 1 343 |
| 36-47 | 98,1 | 97,8 | 93,7 | 1 405 |
| 48-59 | 97,1 | 96,8 | 92,0 | 1 413 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 98,3 | 98,0 | 93,5 | 3 191 |
| Féminin | 97,3 | 97,1 | 92,9 | 3 157 |
| Interview de la mère | | | | |
| Interviewée | 98,2 | 97,9 | 93,5 | 5 699 |
| Non interviewée mais vivant dans le ménage | 78,0 | 78,7 | 74,0 | 127 |
| Non interviewée mais ne vivant pas dans le ménage ¹ | 97,7 | 97,7 | 94,1 | 522 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 92,7 | 92,5 | 88,4 | 467 |
| Autres villes | 97,8 | 97,5 | 93,4 | 2 070 |
| Ensemble urbain | 96,8 | 96,6 | 92,5 | 2 537 |
| Rural | 98,4 | 98,2 | 93,6 | 3 811 |
| Département | | | | |
| Alibori | 99,2 | 98,9 | 92,4 | 715 |
| Atacora | 99,7 | 99,7 | 95,3 | 598 |
| Atlantique | 96,6 | 96,6 | 90,6 | 585 |
| Borgou | 98,9 | 98,6 | 95,0 | 812 |
| Collines | 98,7 | 98,1 | 94,1 | 478 |
| Couffo | 98,0 | 98,0 | 93,3 | 450 |
| Donga | 98,5 | 98,5 | 93,9 | 459 |
| Littoral | 92,7 | 92,5 | 88,4 | 467 |
| Mono | 97,0 | 96,7 | 90,1 | 335 |
| Ouémé | 97,3 | 97,3 | 94,6 | 485 |
| Plateau | 97,9 | 97,9 | 94,7 | 338 |
| Zou | 97,1 | 96,2 | 94,1 | 626 |
| Niveau d'instruction de la mère² | | | | |
| Aucun | 98,4 | 98,2 | 93,6 | 3 851 |
| Primaire | 98,0 | 97,7 | 93,9 | 1 230 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 96,8 | 96,6 | 93,0 | 986 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 91,8 | 91,8 | 85,8 | 281 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 98,8 | 98,6 | 93,5 | 1 316 |
| Second | 98,4 | 98,1 | 92,9 | 1 256 |
| Moyen | 98,6 | 98,3 | 94,1 | 1 297 |
| Quatrième | 98,4 | 98,2 | 94,7 | 1 273 |
| Le plus élevé | 94,5 | 94,4 | 90,5 | 1 206 |
| Ensemble | 97,8 | 97,5 | 93,2 | 6 348 |

TDR = Test de Diagnostic Rapide (SD Bioline Malaria Ag Pf Pan).

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 10.15 Niveau d'hémoglobine < 8,0 g/dl chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 g/dl, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Hémoglobine < 8,0 g/dl | Effectif d'enfants |
|--|------------------------|--------------------|
| Âge en mois | | |
| 6-8 | 11,5 | 431 |
| 9-11 | 11,0 | 363 |
| 12-17 | 12,2 | 658 |
| 18-23 | 11,0 | 685 |
| 24-35 | 8,4 | 1 309 |
| 36-47 | 7,9 | 1 356 |
| 48-59 | 5,2 | 1 369 |
| Sexe | | |
| Masculin | 9,1 | 3 136 |
| Féminin | 8,2 | 3 035 |
| Interview de la mère | | |
| Interviewée | 8,6 | 5 571 |
| Non interviewée mais vivant dans le ménage | 11,7 | 95 |
| Non interviewée mais ne vivant pas dans le ménage ¹ | 8,3 | 506 |
| Résidence | | |
| Cotonou | 1,7 | 275 |
| Autres villes | 7,2 | 2 050 |
| Ensemble urbain | 6,5 | 2 325 |
| Rural | 9,9 | 3 846 |
| Département | | |
| Alibori | 11,2 | 787 |
| Atacora | 18,1 | 555 |
| Atlantique | 5,6 | 675 |
| Borgou | 11,8 | 818 |
| Collines | 3,7 | 385 |
| Couffo | 8,8 | 445 |
| Donga | 7,8 | 403 |
| Littoral | 1,7 | 275 |
| Mono | 6,6 | 293 |
| Ouémé | 6,2 | 552 |
| Plateau | 6,6 | 338 |
| Zou | 6,9 | 645 |
| Niveau d'instruction de la mère² | | |
| Aucun | 10,5 | 3 765 |
| Primaire | 7,3 | 1 190 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,8 | 975 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,2 | 240 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 14,1 | 1 216 |
| Second | 10,1 | 1 249 |
| Moyen | 10,2 | 1 313 |
| Quatrième | 5,4 | 1 289 |
| Le plus élevé | 2,8 | 1 103 |
| Ensemble | 8,6 | 6 171 |

Note : Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage. Les niveaux d'hémoglobine sont ajustés en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC (CDC, 1998). L'hémoglobine est mesurée en grammes par décilitre (g/dl).

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 10.16 Prévalence du paludisme

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont les résultats du test de diagnostic rapide (TDR) et du test de gouttes épaisses (parasitémie palustre) sont classés positifs, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Prévalence du paludisme selon le TDR | | Prévalence du paludisme selon le test de gouttes épaisses | |
|--|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | TDR positif | Effectif d'enfants | Paludisme avec gouttes épaisses | Effectif d'enfants |
| Âge en mois | | | | |
| 6-8 | 20,6 | 431 | 27,3 | 412 |
| 9-11 | 23,0 | 363 | 30,6 | 349 |
| 12-17 | 27,5 | 655 | 32,4 | 626 |
| 18-23 | 32,4 | 682 | 34,6 | 657 |
| 24-35 | 38,0 | 1 309 | 39,5 | 1 252 |
| 36-47 | 41,9 | 1 351 | 45,4 | 1 290 |
| 48-59 | 44,3 | 1 365 | 43,9 | 1 293 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 36,4 | 3 127 | 39,7 | 2 980 |
| Féminin | 36,4 | 3 028 | 38,4 | 2 899 |
| Interview de la mère | | | | |
| Interviewée | 35,4 | 5 554 | 38,2 | 5 301 |
| Non interviewée mais vivant dans le ménage | 35,1 | 95 | 41,0 | 90 |
| Non interviewée mais ne vivant pas dans le ménage ¹ | 47,6 | 506 | 48,1 | 488 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 4,2 | 274 | 16,7 | 263 |
| Autres villes | 27,4 | 2 045 | 34,3 | 1 958 |
| Ensemble urbain | 24,7 | 2 319 | 32,2 | 2 220 |
| Rural | 43,5 | 3 837 | 43,3 | 3 659 |
| Département | | | | |
| Alibori | 36,0 | 785 | 37,0 | 737 |
| Atacora | 53,9 | 555 | 49,7 | 534 |
| Atlantique | 23,7 | 675 | 34,2 | 625 |
| Borgou | 51,3 | 817 | 44,9 | 785 |
| Collines | 41,6 | 383 | 42,3 | 366 |
| Couffo | 54,3 | 445 | 51,3 | 425 |
| Donga | 40,2 | 403 | 46,9 | 383 |
| Littoral | 4,2 | 274 | 16,7 | 263 |
| Mono | 25,9 | 292 | 38,0 | 274 |
| Ouémé | 14,5 | 552 | 26,2 | 533 |
| Plateau | 33,9 | 338 | 37,2 | 330 |
| Zou | 36,8 | 638 | 36,9 | 625 |
| Niveau d'instruction de la mère² | | | | |
| Aucun | 43,2 | 3 755 | 43,7 | 3 578 |
| Primaire | 30,6 | 1 186 | 35,9 | 1 136 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 23,4 | 973 | 29,7 | 940 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 11,0 | 240 | 20,3 | 226 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 58,2 | 1 213 | 54,6 | 1 160 |
| Second | 44,1 | 1 245 | 43,2 | 1 181 |
| Moyen | 41,5 | 1 309 | 40,9 | 1 246 |
| Quatrième | 26,0 | 1 287 | 32,5 | 1 235 |
| Le plus élevé | 9,9 | 1 101 | 23,2 | 1 058 |
| Ensemble | 36,4 | 6 155 | 39,1 | 5 879 |

TDR = Test de diagnostic rapide du paludisme (SD Bioline Malaria Ag Pf Pan)

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Résultats clés

- **État nutritionnel des enfants :** Environ un tiers des enfants de moins de 5 ans (32 %) souffrent d'un retard de croissance, 5 % sont émaciés, 17 % présentent une insuffisance pondérale et 2 % un surpoids.
- **Allaitement maternel :** Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 dernières années, la quasi-totalité ont été allaités (97 %). En outre, un enfant sur deux (54 %) a été allaité dans l'heure qui a suivi sa naissance. Seulement 42 % des enfants de zéro à six mois sont exclusivement allaités.
- **Apport alimentaire minimum acceptable :** Parmi les enfants de 6-23 mois non allaités, seulement 15 % ont un apport alimentaire minimum acceptable tel que défini par l'OMS.
- **Anémie des enfants et des femmes :** Environ sept enfants de 6-59 mois sur dix (72 %) et 58 % des femmes de 15-49 ans sont anémiés.
- **Disponibilité du sel iodé dans les ménages :** Parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé, neuf sur dix (90 %) disposaient de sel iodé.
- **État nutritionnel des femmes :** Parmi les femmes de 15-49 ans, 11 % ont un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 18,5 et présentent donc un état de déficience énergétique chronique. À l'opposé, 26 % présentent une surcharge pondérale ou sont obèses.

Ce chapitre porte sur l'état nutritionnel des enfants et des femmes. Il présente l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et les pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant, y compris l'allaitement et l'alimentation avec de la nourriture solide/semi solide. Ce chapitre porte aussi sur la diversité alimentaire et sur la fréquence des repas. En outre, les résultats sur les micronutriments, en particulier la supplémentation et l'enrichissement en certains micronutriments y sont également présentés. Enfin, ce chapitre aborde certains aspects pertinents de l'état nutritionnel des femmes de 15-49 ans.

Le Bénin s'est engagé dans une réforme de politique qui replace la nutrition au cœur du développement avec l'appui de la Banque Mondiale et de l'UNICEF. La volonté politique s'est manifestée par la mise en place du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN), avec un bras opérationnel, le Secrétariat Permanent. Le CAN a pour missions de (1) de définir la Politique Nationale en matière d'Alimentation et de Nutrition ; (2) d'assurer l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du Plan d'Action National pour l'Alimentation et la Nutrition, (3) d'assurer la coordination des actions liées à l'alimentation et à la nutrition.

Au niveau national, la coordination des différentes parties prenantes de la nutrition est assurée par le CAN ; au niveau départemental, cette fonction est assurée dans le Cadre Départemental de Concertation (CDC) de la Nutrition et au niveau communal, dans le Cadre Communal de Concertation (CCC). Enfin, au niveau

communautaire, cette coordination s'effectue à travers le Comité de Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle (CSAN). Ces différents espaces permettent d'afficher une visibilité des intervenants et des interventions en cours sur le territoire national, offrent les bases d'une coordination avec efficacité et efficience de la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement de l'Alimentation et de la Nutrition (PSDAN). Les interventions sont menées à travers des paquets de services qui comprennent : le Suivi et Promotion de la Croissance (SPC) des enfants de 0 à 23 mois ; les conseils nutritionnels aux mères et pères par la communication pour le changement social et de comportement (CCSC) ; le dépistage actif de la malnutrition aiguë, la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée au niveau communautaire et la référence des cas sévères au niveau des formations sanitaires. En conséquence, l'installation dans les ménages et écoles de dispositifs pour le lavage des mains et la promotion de toutes autres mesures d'hygiène domestique préservant la santé et fournissant un appui aux ménages d'enfants de 0 à 59 mois pour la production et la transformation d'aliments leur permettant l'accès à des rations alimentaires diversifiées et visites à domicile. Toutefois, l'intégration des activités d'éveil et de stimulation dans ces paquets pour le bon développement de la petite enfance constitue encore un défi.

Les instruments de coordination et de redevabilité pour l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, les femmes en âge de procréer et la communauté sont mis en place dans les 77 communes que compte le Bénin : les Cadres Communs de Résultats (CCR) et les tableaux de bord Communaux.

Les données anthropométriques et les biomarqueurs collectées au cours de l'EDSB-V 2017-2018 permettent d'évaluer l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer. Cette évaluation permet d'apprécier l'évolution du retard de croissance dont la prévalence demeure, depuis une décennie, au-dessus de 30 %.

11.1 ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS

Les données anthropométriques collectées au cours de l'EDSB-V 2017-2018 permettent de mesurer et d'évaluer l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants en utilisant les indices anthropométriques. Cette évaluation permet d'identifier les sous-groupes de la population infantile qui présentent un retard de croissance avec comme conséquence une perturbation du développement mental, une malnutrition aiguë avec un risque de décès important et une insuffisance pondérale qui est le résultat d'une malnutrition aiguë et d'un retard de croissance.

11.1.1 Mesure de l'état nutritionnel des jeunes enfants

L'EDSB-V 2017-2018 a collecté les données concernant l'état nutritionnel en demandant des informations sur l'âge des enfants et ensuite en mesurant le poids et la taille des enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages de l'échantillon. Le poids a été mesuré avec une balance électronique à double pesée (type SECA). La taille a été mesurée à l'aide d'une toise graduée (ShorrBoards®). Les enfants de moins de 2 ans ont été mesurés en position couchée sur la toise, tandis que ceux âgés de plus de 2 ans ont été mesurés debout. L'âge des enfants a été recueilli à partir d'un document administratif ou calculé sur la base du calendrier des événements spéciaux.

Les données sur la taille/longueur des enfants, leur poids et l'âge ont été utilisés pour calculer 3 indices : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge. Chacun de ces indices fournit des informations différentes sur la croissance et la composition du corps pour évaluer l'état nutritionnel. Comme indiqué dans l'encadré ci-dessous, le retard de croissance ou une taille trop petite par rapport à l'âge est un signe de malnutrition chronique, conséquence d'une alimentation inadéquate pendant une longue période. Le retard de croissance peut aussi être influencé par des maladies récurrentes et chroniques. L'émaciation ou un faible poids-pour-taille est une mesure de la malnutrition aiguë et la conséquence d'une alimentation inadéquate pendant la période qui se situe juste avant l'enquête. L'émaciation peut résulter de prises alimentaires inadéquates ou d'un épisode récent de maladie qui a eu pour conséquence une perte de poids. L'opposé de l'émaciation est le surpoids (un poids trop important par rapport à la taille), une mesure de la surnutrition. Le poids-pour-âge est un indice combiné du poids-pour-taille et de la taille-pour-âge. Par conséquent, il englobe la sous-nutrition aiguë (émaciation) et chronique (retard de croissance) et il constitue un indice de la malnutrition globale.

Retard de croissance (évalué au moyen de la taille-pour-âge)

La taille-pour-âge est une mesure du retard de croissance linéaire et des effets cumulés de déficit de la croissance. Les enfants dont le Z-score pour la taille pour âge se situe en dessous de moins 2 écarts type (-2ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme trop petits par rapport à leur âge (retard de croissance) ou atteints de sous-nutrition chronique. Les enfants en dessous de moins 3 écart type (-3ET) sont considérés comme atteints de retard de croissance sévère.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Émaciation (évalué au moyen du poids-pour-taille)

L'indice poids-pour-taille mesure la masse du corps en relation avec la taille ou longueur et décrit l'état nutritionnel actuel. Les enfants dont le Z-score pour le poids-pour-taille se situe en dessous de moins 2 écarts-type (-2ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme maigres (émaciés) ou atteints de sous-nutrition aiguë. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-taille se situe en dessous de moins 3 écarts type (-3ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme sévèrement émaciés.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Insuffisance pondérale (évalué au moyen du poids-pour-âge)

Le poids-pour-âge est un indice combiné de la taille-pour-âge et du poids-pour-taille. Il prend en compte, à la fois, la sous-nutrition aiguë et chronique. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-âge se situe en dessous de moins 2 écarts type (-2ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-âge se situe en dessous de moins 3 écarts type (-3ET) de la médiane sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale sévère.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Enfants présentant un surpoids

Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-taille est supérieur à 2 écarts type (+2ET) au-dessus de la médiane de la population de référence sont considérés en surpoids.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Les moyennes des Z-scores pour la taille-pour-âge, le poids-pour taille et le poids-pour-âge sont aussi calculées comme une statistique résumée représentant l'état nutritionnel des enfants dans une population. Ces scores moyens décrivent l'état nutritionnel de toute la population des enfants sans l'utilisation d'un seuil. Un Z-score moyen de moins de 0 (c'est-à-dire, une valeur moyenne négative pour le retard de croissance, l'émaciation ou l'insuffisance pondérale) suggère un décalage vers le bas de l'état nutritionnel de toute la population de l'échantillon par rapport à la population de référence. Plus les scores moyens sont éloignés de 0, plus la prévalence de la malnutrition est élevée.

11.1.2 Collecte des données

Au total, 12 832 enfants de moins de 5 ans étaient éligibles pour la prise des mesures anthropométriques (taille et poids). Des données valides pour chacun des trois indices anthropométriques ont été collectées pour environ 97 % des enfants éligibles.


11.1.3 Niveaux de la malnutrition des enfants

Au Bénin, 32 % des enfants de moins de 5 ans sont atteints d'un retard de croissance ou de malnutrition chronique (ils sont trop petits pour leur âge) et 11 % en sont atteints sous la forme sévère, 5 % sont émaciés ou souffrent de malnutrition aiguë (ils sont trop maigres par rapport à leur taille), 1 % présente une émaciation sévère et 2 % un surpoids (Tableau 11.1).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018 la prévalence du retard de croissance a baissé, passant de 43 % à 32 %. La prévalence de l'émaciation suit la même tendance, passant de 8 % à 5 %. Par contre, l'insuffisance pondérale est demeurée pratiquement au même niveau (18 % en 2006 contre 17 % en 2017-2018). Dans la même période, le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant un surpoids est passé de 9 % à 2 %.

Graphique 11.1 Tendances de l'état nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition



Variations par caractéristique

- La prévalence de retard de croissance augmente avec l'âge, variant de 17 % parmi les enfants du groupe d'âge 6-8 mois à 41 % parmi ceux de 24-35 mois.
- L'état nutritionnel des enfants est affecté par celui de la mère : quand la mère est maigre, 39 % des enfants présentent un retard de croissance, 13 % sont émaciés et 30 % présentent un retard de croissance. Par comparaison, quand l'état nutritionnel de la mère est normal, ces pourcentages sont respectivement de 34 %, 5 % et 18 %.
- Les résultats selon le milieu de résidence montrent que le niveau du retard de croissance est plus élevé en milieu rural (35 %) qu'en milieu urbain (28 %).

- En ce qui concerne le niveau de la prévalence entre les départements, le pourcentage le plus élevé des enfants atteints de retard de croissance est observé dans le département du Couffo (38 %) et le plus faible dans le Littoral (19 %) (**Graphique 11.2**).
- La prévalence du retard de croissance et de l'insuffisance pondérale diminue quand le niveau d'instruction de la mère augmente, passant, pour le retard de croissance de 35 % quand la mère n'a aucun niveau d'instruction à 14 % quand elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, pour l'insuffisance pondérale de respectivement 18 % à 9 %.
- La prévalence du retard de croissance diminue lorsque le niveau de bien-être économique augmente, passant de 41 % parmi les enfants des ménages classés dans le quintile le plus bas à 19 % parmi ceux des ménages classés dans le quintile le plus élevé (**Graphique 11.3**).

11.2 ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Les pratiques alimentaires appropriées du nourrisson et du jeune enfant (PANJE) comprennent l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, l'allaitement prolongé jusqu'à l'âge de 2 ans, l'introduction d'aliments solides et semi-solides à l'âge de 6 mois et l'augmentation graduelle des quantités de nourriture et de la fréquence des repas à mesure que l'enfant grandit. Il est aussi important que l'enfant reçoive une alimentation variée, c'est-à-dire qu'il mange des aliments de différents groupes alimentaires pour satisfaire ses besoins croissants en micronutriments et macronutriments (OMS 2008).


11.2.1 Allaitement

Initiation de l'allaitement

L'initiation précoce de l'allaitement est importante pour la mère et pour l'enfant. Le premier lait contient le colostrum, qui est très riche d'un point de vue nutritionnel et qui contient les anticorps qui protègent le nouveau-né des maladies. L'initiation précoce de l'allaitement renforce aussi le lien affectif entre la mère et son nouveau-né, ce qui facilite la production régulière de lait. Il est donc recommandé que l'enfant soit immédiatement mis au sein dès qu'il naît ou dans l'heure qui suit la naissance ; par contre, la pratique consistant à donner à l'enfant des aliments avant de l'allaiter (c'est-à-dire donner au nouveau-né autre chose que le lait maternel avant qu'il ne soit régulièrement allaité) doit être découragé.


Graphique 11.2 Retard de croissance chez les enfants par département

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance



Graphique 11.3 Retard de croissance chez les enfants par bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance



Allaitement précoce

Initiation de l'allaitement dans l'heure qui suit la naissance

Échantillon : Enfant dernier-né dont la naissance a eu lieu 2 ans avant l'enquête.

Au Bénin, 97 % des enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête ont été allaités, 54 % ont été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et 42 % des enfants de 0-5 mois ont été exclusivement allaités (**Tableaux 11.2 et 11.3**).


Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance a augmenté, passant de 48 % à 54 % (**Graphique 11.4**).

Variations par caractéristiques

- Le pourcentage d'enfants allaités dans l'heure qui a suivi la naissance diminue avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 57 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 47 % parmi ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.

Graphique 11.4 Tendances de l'allaitement initial

Pourcentage d'enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête ayant commencé l'allaitement dans l'heure ayant suivi la naissance




11.2.2 Allaitement exclusif

Le lait maternel contient tous les nutriments nécessaires à l'enfant pendant les 6 premiers mois et il constitue une source de nutrition non contaminée. Il est recommandé que les enfants soient exclusivement allaités pendant les 6 premiers mois, c'est-à-dire qu'ils ne doivent recevoir rien d'autre que le lait maternel. Donner des aliments de complément avant l'âge de 6 mois n'est pas nécessaire et cette pratique n'est pas encouragée parce que les risques de contamination et de maladies diarrhéiques qui peuvent en résulter sont élevés. En outre, l'introduction précoce d'aliments de complément réduit aussi la production de lait, celle-ci étant stimulée par la fréquence et l'intensité de la succion.

Les résultats concernant les pratiques d'allaitement des enfants selon l'âge sont présentés au **Tableau 11.3** et au **Graphique 11.5**. Dans l'ensemble, 42 % des enfants de moins de 6 mois sont exclusivement allaités au sein. Cependant, contrairement aux recommandations en la matière, on constate que 28 % des enfants de moins de 6 mois reçoivent, en plus du lait maternel, de l'eau seulement et 12 % des aliments de complément. En outre, 15 % des enfants de 0-23 mois sont nourris au biberon (**Tableau 11.4**).

Graphique 11.5 Pratiques d'allaitement par âge


Pourcentage d'enfants de moins de 2 ans



Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de 6 mois exclusivement allaités a augmenté passant de 38 % à 42 %, soit pratiquement le même niveau qu'en 2006 (**Graphique 11.6**).

Graphique 11.6 Tendances de l'allaitement exclusif

Pourcentage d'enfants derniers nés de moins de 6 mois exclusivement allaités



11.2.3 Durée médiane de l'allaitement

Au plan national, la durée médiane de l'allaitement maternel est de 20,4 mois pour les enfants nés au cours des 3 derniers mois. La durée médiane de l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire le moment auquel la moitié des enfants ont arrêté d'être allaités exclusivement, s'établit à 2,1 mois et la durée médiane de l'allaitement prédominant est de 6,4 mois (**Tableau 11.5**).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, on ne constate pas de modification importante de la durée médiane de l'allaitement maternel et de celle de l'allaitement exclusif, les médianes étant passées respectivement de 21,4 à 20,4 mois et de 1,8 à 2,1 mois. Par contre, dans la même période, on observe une augmentation importante de la durée médiane de l'allaitement prédominant, celle-ci étant passée de 4,1 à 6,4 mois.

Variations par caractéristiques

- La durée médiane de l'allaitement exclusif est plus longue en milieu rural qu'en milieu urbain (2,4 mois contre 1,3 mois).
- La durée médiane de l'allaitement maternel diminue du quintile de bien-être économique le plus bas (21,6 mois) au quintile le plus élevée (17,9 mois) (**Tableau 11.5**).

11.2.4 Aliments de complément

Après l'âge de 6 mois, le lait maternel n'est plus suffisant pour couvrir les besoins nutritionnels des enfants. Des aliments de complément doivent donc être ajoutés dans l'alimentation de l'enfant. L'alimentation de complément fait référence à la période de transition de l'allaitement exclusif à une alimentation diversifiée familiale. C'est la période la plus critique pour les enfants car, durant cette transition, les enfants sont très exposés à la sous-alimentation. Les aliments de complément doivent être introduits en temps opportun, c'est-à-dire dès l'âge de 6 mois tout en conservant l'allaitement maternel.

Une alimentation de complément appropriée doit être variée pour satisfaire tous les besoins en nutriments de l'enfant. Les fruits et les légumes riches en vitamine A doivent être consommés quotidiennement. Manger des fruits et des légumes, en plus de ceux qui sont riches en vitamine A, est tout aussi important. Des études ont montré qu'une alimentation de complément qui ne comprendrait que des plantes est insuffisante pour couvrir les besoins en certains micronutriments. Par conséquent, il est recommandé que la viande, les volailles, le poisson ou les œufs fassent partie de l'alimentation quotidienne, aussi souvent que possible (OMS 1998).

Le **Tableau 11.6** présente les résultats concernant les divers types d'aliments et de liquides reçus par les enfants de moins de 2 ans vivant avec leur mère le jour ou la nuit ayant précédé l'interview. En outre, ces résultats sont présentés selon l'âge pour les enfants allaités et ceux qui ne le sont pas. Globalement, les aliments les plus fréquemment donnés aux enfants de 0-23 mois sont les préparations solides ou semi-solides (58 % chez les enfants allaités et 89 % chez les enfants non allaités), les autres liquides composés de jus,

boisson à base de jus, bouillon clair, autres liquides non lactés (44 % chez les enfants allaités et 61 % chez les enfants non allaités) et les aliments riches en viande, poissons, volailles (31 % chez les enfants allaités et 60 % chez les enfants non allaités).

Variations par caractéristiques

- La consommation des différents types d'aliments est plus élevée chez les enfants de 6-23 mois non allaités que chez les enfants allaités du même groupe d'âges.
- Un tiers des enfants de 6 à 23 mois allaités (29 %) ont consommé une préparation à base de fruits et légumes riches en vitamine A, le jour ou la nuit ayant précédé l'interview contre quatre sur dix (41 %) chez les enfants non allaités.
- La consommation des aliments préparés à base de viande, poisson et volaille est beaucoup plus faible chez les enfants de 6-23 mois allaités (31 %) que chez ceux qui ne sont pas allaités (60 %).

11.2.5 Minimum alimentaire acceptable

Les nouveau-nés et les jeunes enfants doivent recevoir un apport alimentaire minimum acceptable pour leur garantir une croissance et un développement optimal. Si l'alimentation des enfants n'est pas diversifiée et s'ils ne sont pas nourris à une certaine fréquence, ils sont vulnérables à la malnutrition, en particulier au retard de croissance et aux carences en micronutriments et ils sont exposés à des risques de morbidité et de mortalité plus élevés. La recommandation de l'OMS concernant le minimum alimentaire acceptable, qui est une combinaison de diversité alimentaire minimale et de fréquence minimale des repas, est différent selon que l'enfant est allaité ou non. La définition de cet indicateur combiné du minimum alimentaire acceptable pour les enfants de 6-23 mois figure dans l'encadré ci-dessous.

La diversité alimentaire est un indicateur indirect de la densité adéquate en micronutriments des aliments. La diversité alimentaire minimale signifie que l'enfant est nourri avec des aliments appartenant à, au moins, quatre groupes alimentaires distincts. Le seuil de quatre groupes est associé à un meilleur régime alimentaire, que ce soit pour les enfants allaités ou pour ceux qui ne le sont pas. La consommation d'aliments appartenant à, au moins, quatre groupes signifie que l'enfant a une plus grande probabilité de manger au moins un aliment d'origine animale et au moins un fruit ou légume, en plus d'un aliment de base (céréales, racines ou tubercules (OMS 2008). Les quatre groupes d'aliments doivent provenir d'une liste de sept groupes d'aliments : céréales, racines et tubercules ; légumineuses et noix ; produits laitiers (lait, yaourt, fromage) ; produits carnés (viande, volaille, abats et poisson) ; œufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ; autres fruits et légumes.

La fréquence minimale des repas est un indicateur indirect de la consommation énergétique de l'enfant. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, l'indicateur est basé sur la quantité d'énergie dont l'enfant a besoin et, si l'enfant est allaité, la quantité d'énergie nécessaire qui n'est pas satisfaite par le lait maternel. On considère que les enfants allaités reçoivent un nombre minimum de repas s'ils reçoivent des aliments solides, semi-solides, ou mous au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et, au moins, trois fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois reçoivent un nombre minimum de repas s'ils reçoivent des aliments solides, semi-solides, ou mous, au moins, quatre fois par jour.

Minimum alimentaire acceptable

Proportion d'enfants de 6–23 mois qui ont reçu l'apport alimentaire minimum acceptable. Cet indicateur est un indicateur combiné, calculé à partir des groupes suivants :

Enfants allaités de 6-23 mois qui ont reçu, au moins, la diversification alimentaire minimum, le nombre minimum de repas le jour précédent

Enfants allaités de 6-23 mois

et


Enfants non allaités de 6-23 mois ayant reçu, au moins, deux fois du lait et, au moins, la diversité alimentaire minimum (en dehors des aliments lactés) et le nombre minimum de repas le jour précédent

Enfants non allaités de 6-23 mois

Échantillon : Enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère

Au plan national, 15 % des enfants de 6-23 mois sont nourris conformément aux trois pratiques optimales de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui incluent l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et la fréquence des repas (Tableau 11.7 et Graphique 11.7). Parmi les enfants de 6-23 mois allaités, environ un sur quatre reçoit une alimentation variée (26 %), et 45 % ont été nourris un nombre minimum de fois de manière appropriée pour leur âge. Parmi les enfants non allaités, on constate que seulement 9 % reçoivent un apport alimentaire minimum acceptable.

Graphique 11.7 Indicateurs ANJE sur l'apport alimentaire minimal acceptable



Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable augmente avec l'âge, variant de 11 % parmi ceux de 6-8 mois à 17 % parmi ceux de 18-23 mois.
- Les résultats selon le département montrent que le pourcentage d'enfants de 6-23 mois nourris selon les recommandations varie d'un minimum de 5 % dans l'Ouémé à un maximum de 29 % dans l'Alibori.
- Le pourcentage d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable est plus élevé parmi ceux dont la mère a un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus que chez les autres (20 % contre 15 % et 11 %).

11.3 PRÉVALENCE DE L'ANÉMIE PARMIS LES ENFANTS

Anémie parmi les enfants

| Anémie | Niveau d'hémoglobine en grammes/décilitre* |
|----------------|--|
| Anémie | < 11,0 |
| Anémie légère | 10,0 - 10,9 |
| Anémie modérée | 7,0 - 9,9 |
| Anémie sévère | < 7,0 |
| Pas d'anémie | 11,0 ou plus |

*Les niveaux d'hémoglobine sont ajustés en fonction de l'altitude dans les zones situées au-dessus de 1 000 mètres.

Échantillon : Enfants de 6-59 mois


L'anémie est un état pathologique caractérisé par un des niveaux d'hémoglobine trop faibles dans le sang. Le fer est un composant important de l'hémoglobine et on considère que la carence en fer est globalement responsable de la moitié des anémies. L'anémie peut aussi être causée par le paludisme, l'ankylostome et d'autres helminthes, des carences nutritionnelles, des infections chroniques et des maladies génétiques. L'anémie est un problème de santé grave chez les enfants car elle peut affecter le développement cognitif, stopper la croissance et augmenter la morbidité due aux maladies infectieuses.

Au plan national, 72 % des enfants de 6-59 mois sont atteints de l'anémie dont 3 % sous sa forme sévère et 41 % sous forme modérée (Tableau 11.8).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, la prévalence de l'anémie a légèrement baissé, passant de 78 % à 72 %. En particulier, le pourcentage d'enfants de 6-59 mois atteints d'anémie modérée est passé de 46 % à 41 % et le niveau de l'anémie sévère est passé de 8 % à 3 %. Seule la prévalence de l'anémie légère a un peu augmenté, passant de 25 % à 28 % (Graphique 11.8).

Graphique 11.8 Tendances de l'anémie chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois




Variations par caractéristique

- La prévalence de l'anémie chez les enfants varie selon l'âge, de 87 % parmi les enfants de 6- 8 mois à 60 % chez ceux 48-59 mois. Le pic de prévalence est atteint dans le groupe d'âges 9-11 mois (89 %) (Tableau 11.8).
- Selon le milieu de résidence, on constate que la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6-59 mois est plus élevée en milieu rural (75 %) qu'en milieu urbain (66 %).

- Les résultats selon le département montrent que l'Atacora enregistre le pourcentage le plus élevé (85 %) d'enfants de 6-59 mois anémiés. À l'opposé, le Zou présente le niveau le plus bas (59 %) (**Graphique 11.9**).
- L'anémie chez les enfants varie en fonction du niveau d'instruction de la mère : 58 % des enfants de 6-59 mois dont la mère a un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus présentent un état d'anémie contre 74 % parmi ceux dont la mère n'a aucun niveau d'instruction.
- Le pourcentage d'enfants de 6-23 mois anémiés est plus élevé dans les ménages du quintile le plus bas (79 %) que dans ceux du plus élevé (58 %).

Graphique 11.9 Anémie chez les enfants par département

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois atteints d'anémie



11.4 PRÉSENCE DE SEL IODÉ DANS LES MÉNAGES

L'iode est un micronutriment essentiel, le sel iodé permet d'éviter l'apparition de goitre et d'autres maladies thyroïdiennes parmi les enfants et les adultes. En accord avec les régulations sur l'alimentation et les médicaments, le sel consommé par les ménages doit être enrichi avec de l'iode (au moins 15 parties par million) (ppm).

Au Bénin, parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé, 90 % disposent de sel iodé (**Tableau 11.9**).

Tendances : De 2006 à 2017-2018, le pourcentage de ménages disposant de sel iodé a connu une hausse, passant de 85 % à 90 %.

Variations par caractéristique

- La disponibilité de sel iodé est légèrement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (91 % contre 88 %).
- Le pourcentage de ménages disposant du sel iodé varie de 78 % dans le département du Mono à 99 % dans l'Atacora.
- Les résultats selon les quintiles de bien-être économique montrent que les ménages du quintile le plus bas disposent davantage de sel iodé que ceux du quintile le plus élevé (91 % contre 87 %).

11.5 CONSOMMATION DE MICRONUTRIMENTS ET SUPPLÉMENTATION PARMIS LES ENFANTS

La carence en micronutriments est un des facteurs de risques importants de la morbidité et de la mortalité infantile. Les micronutriments sont disponibles dans la nourriture et peuvent aussi être fournis directement par la supplémentation. Allaiter les enfants les fait bénéficier des suppléments donnés à la mère.

Les informations collectées sur la consommation d'aliments parmi les plus jeunes enfants de moins de 6-23 mois sont utiles pour savoir dans quelle mesure les enfants consomment des aliments de groupes riches en

deux micronutriments clés - vitamine A et fer- dans leur alimentation quotidienne. La carence en fer est l'une des causes principales de l'anémie qui a des conséquences graves, que ce soit sur l'état de santé des femmes comme sur celui des enfants. La vitamine A est un micronutriment essentiel pour le système immunitaire et elle joue un rôle important sur le maintien du tissu épithélial. Une carence sévère en vitamine A peut causer des lésions oculaires et elle est l'une des causes les plus importantes de cécité pendant l'enfance. La carence en vitamine A a augmenté la gravité des infections comme la rougeole et les maladies diarrhéiques et ralentit la guérison des maladies. La carence en vitamine A est plus répandue dans les environnements secs où les fruits et légumes ne sont pas facilement disponibles.

Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère, 58 % ont consommé des aliments riches en vitamine A dans les dernières 24 heures et 52 % ont consommé des aliments riches en fer ; parmi les enfants de 6-59 mois, 24 % ont reçu des suppléments de fer au cours des sept jours précédant l'enquête, 52 % ont reçu des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois et 38 % ont été traités avec des vermifuges dans cette période (**Tableau 11.10**).

Tendances : Dans la période 2011-2012 à 2017-2018, on constate que la consommation d'aliments riches en fer et en vitamine A par les enfants de 6-23 mois a augmenté, passant respectivement de 39 % à 52 % et de 54 % à 58 %. On note également une augmentation du pourcentage d'enfants de 6-23 mois ayant reçu des suppléments de vitamine A au cours des 6 mois précédant l'enquête, passant de 49 % à 52 %. Par contre, on observe une diminution des pourcentages d'enfants de 6-59 mois qui ont reçu des suppléments de fer au cours des 7 derniers jours et de ceux qui ont reçu des vermifuges au cours des 6 derniers mois. En effet ces pourcentages sont passés respectivement de 31 % à 24 % et de 50 % à 38 %.

Variations selon certaines caractéristiques

- Le pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités ayant consommé des aliments riches en vitamine A est plus élevé que celui des enfants allaités (76 % contre 54 %). Il en est de même pour les aliments riches en fer (69 % contre 48 %).
- Le pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant reçu des suppléments de vitamine A dans les six derniers mois est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (57 % contre 49 %).
- Il ressort des résultats que c'est dans le département de la Donga que le pourcentage d'enfants de 6-59 mois qui ont reçu des suppléments de Vitamine A au cours des six derniers mois est le plus élevé (75 %) tandis qu'à l'opposé, c'est dans l'Alibori que l'on observe le plus faible (35 %) (**Tableau 11.10**).

11.6 ÉTAT NUTRITIONNEL DES FEMMES

11.6.1 État nutritionnel des femmes

L'état nutritionnel des femmes en âge de procréer est l'un des facteurs déterminants du bon déroulement des grossesses, de leur issue ainsi que de la mortalité maternelle. En outre, il influe sur la morbidité et la mortalité des jeunes enfants. L'évaluation de l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer est particulièrement utile dans l'identification des grossesses à risque. Du point de vue anatomique, la taille des mères étant associée à la largeur de leur bassin, les femmes de petite taille sont plus susceptibles d'avoir des complications pendant la grossesse et l'accouchement et d'accoucher des enfants de faible poids. La taille généralement admise en dessous de laquelle une femme peut être considérée à risque est comprise entre 140 et 150 centimètres.

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, en vue d'évaluer l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer, on a relevé les données anthropométriques (la taille et le poids) des femmes de 15-49 ans. Ces mesures du poids et de la taille ont permis de déterminer l'indice de masse corporelle (IMC) ou indice de Quételet. L'IMC est calculé en divisant le poids (en kilogrammes) par le carré de la taille en mètre. Il est exprimé en kilogramme par mètre carré (kg/m²). Le déficit énergétique chronique chez la femme en âge de procréer est indiqué par

les valeurs de l'IMC inférieures à la valeur seuil (18,5), tandis que le surpoids est indiqué pour les valeurs supérieures ou égales au seuil (25,0). Il importe de préciser que les femmes enceintes et celles ayant eu une naissance dans les deux mois précédant l'enquête sont exclues du calcul de l'indice.

Indice de masse corporelle (IMC)

L'IMC est calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètre (kg/m²).

| État | IMC |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Trop maigre par rapport à la taille | Moins de 18,5 |
| Normal | Entre 18,5 et 24,9 |
| Surpoids | Entre 25,0 et 29,9 |
| Obèse | Supérieur ou égal à 30,0 |

Échantillon : Femmes de 15-49 ans qui ne sont pas enceintes et qui n'ont pas eu de naissances dans les 2 mois ayant précédé l'enquête.

Au Bénin, l'IMC moyen est estimé à 23. Une femme sur dix (11 %) souffre de maigreur dont 3 % sous sa forme sévère. A l'opposé, 26 % présentent une surcharge pondérale dont 9 % sont obèses (**Tableau 11.11**).

Tendances : De 2006 à 2017-2018, le pourcentage de femmes de 15-49 ans présentant un état de maigreur (IMC inférieur à 18,5) a légèrement augmenté, de 9 % à 11 %. Entre ces deux dates, le pourcentage de femmes en surpoids ou obèse (IMC supérieur ou égale à 25) a aussi augmenté, mais de manière plus importante, passant de 19 % à 26 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans présentant un état de maigreur est plus élevé chez les jeunes femmes de 15-19 ans (21 %) que chez les plus âgées (8 % à 30-39 ans et 7 % à 40-49 ans). Le pourcentage de femmes de 15-49 ans présentant un surpoids ou un état d'obésité augmente avec l'âge, variant de 7 % à 15-19 ans à 42 % à 40-49 ans (**Tableau 11.11**).
- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans maigres est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (12 % contre 9 %). A l'opposé, le surpoids ou l'obésité sont plus fréquents en milieu urbain qu'en milieu rural (35 % contre 19 %).
- Le pourcentage de femmes présentant un état de maigreur varie entre départements : il est plus de deux fois plus élevé dans le Plateau (16 %) et l'Atacora (15 %) que dans le Littoral et la Donga (6 % dans les 2 cas). Par contre, dans le Littoral, près d'une femme de 15-49 ans sur deux (48 %) accuse une surcharge pondérale ou est obèse. Avec 12 % c'est dans l'Atacora que ce pourcentage est le plus faible.
- Du quintile le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes maigres diminue de manière importante, passant de 16 % à 7 %. A l'opposé, le pourcentage de femmes présentant un surpoids ou obèses suit la tendance inverse, passant de 12 % dans le quintile le plus bas à 43 % dans le plus élevé.

11.7 PRÉVALENCE DE L'ANÉMIE CHEZ LES FEMMES

Niveaux d'hémoglobine en dessous desquels une femme est considérée comme étant anémiée.

| Enquêtés | Niveau d'hémoglobine en grammes/décilitre* |
|------------------------------|--|
| Femme non enceinte 15-49 ans | Moins de 12,0 |
| Femme enceinte 15-49 ans | Moins de 11,0 |


*Les niveaux d'hémoglobine sont ajustés en fonction du statut tabagique et de l'altitude dans les zones au-dessus de 1 000 mètres

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, les niveaux d'hémoglobine ont été mesurés pour les femmes de 15-49 ans. Les résultats du **Tableau 11.12** montrent que 58 % des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie : 26 % sous sa forme légère, 30 % sous sa forme modérée et 2 % sous sa forme sévère.

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, la prévalence de l'anémie chez les femmes de 15 à 49 ans a légèrement diminué, passant de 61 % à 58 %. C'est surtout sous la forme modérée que la prévalence a baissé, celle-ci étant passée de 34 % à 30 %. Dans la même période, la prévalence de l'anémie légère et sévère n'a pas changé (**Graphique 11.10**).

Graphique 11.10 Tendances de l'anémie chez les femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans



Variations par caractéristiques

- La prévalence de l'anémie est plus élevée chez les femmes enceintes que chez les autres, en particulier sous la forme modérée (44 % contre 28 % parmi celles qui allaitent et 29 % parmi celles qui n'allaitent pas et qui ne sont pas enceintes).
- La prévalence de l'anémie varie entre départements, d'un minimum de 40 % dans les Collines à un maximum de 71 % dans le Plateau.
- Du quintile le plus bas au plus élevé, la prévalence de l'anémie a tendance à diminuer, passant de 63 % à 55 % (**Tableau 11.12**).

11.8 CONSOMMATION DE MICRONUTRIMENTS PARMIS LES MÈRES

À la question de savoir si les femmes ayant une naissance au cours des cinq dernières années ont pris du fer ou des vermifuges au cours de la grossesse de leur dernier enfant, 47 % des femmes ont déclaré avoir pris du fer pendant plus de quatre-vingt-dix-jours (90 jours) et 65 % des vermifuges (**Tableau 11.13**).

Variations selon certaines caractéristiques

- La supplémentation en fer suivant les recommandations (plus de 90 jours) au cours de la grossesse est plus fréquente en milieu urbain qu'en milieu rural (53 % contre 43 %). La prise de vermifuges durant la grossesse est aussi plus courante en milieu urbain que rural (73 % contre 59 %).

- La prise de fer pendant 90 jours au cours de la grossesse varie selon les départements, de 72 % dans l'Atlantique à 28 % dans le Couffo. Le recours aux vermifuges varie de 94 % dans l'Ouémé et 91 % dans le Littoral à 34 % dans les départements de l'Atacora et du Borgou.
- Le pourcentage de femmes ayant pris du fer pendant 90 jours au cours de la grossesse augmente avec le niveau d'instruction, passant de 43 % parmi celles sans aucun niveau d'instruction à 65 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- Le pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges pendant la grossesse augmente avec le quintile de bien-être économique, passant de 41 % dans le quintile le plus bas à 88 % dans le quintile le plus élevé. De même, le pourcentage de femmes ayant pris du fer pendant 90 jours au cours de la grossesse passe de 31 % dans le quintile le plus bas à 62 % dans le quintile le plus élevé.

En outre le **Tableau 11.13** montre un pourcentage élevé (91 %) de femmes qui vivent dans un ménage disposant de sel iodé pour la cuisine.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la nutrition des enfants et des adultes, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 11.1** État nutritionnel des enfants
- **Tableau 11.2** Allaitement initial
- **Tableau 11.3** Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant
- **Tableau 11.4** Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement
- **Tableau 11.5** Durée médiane de l'allaitement
- **Tableau 11.6** Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview
- **Tableau 11.7** Apport alimentaire minimum acceptable
- **Tableau 11.8** Prévalence de l'anémie chez les enfants
- **Tableau 11.9** Présence de sel iodé dans le ménage
- **Tableau 11.10** Consommation de micronutriments par les enfants
- **Tableau 11.11** État nutritionnel des femmes
- **Tableau 11.12** Prévalence de l'anémie chez les femmes
- **Tableau 11.13** Consommation de micronutriments par les mères

Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Taille-pour-Âge ¹ | | | | Poids-pour-Taille | | | | Poids-pour-Âge | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| | Pourcentage en dessous de -3 ET | Pourcentage en dessous de -2 ET ² | Score centré réduit moyen (ET) | Effectif d'enfants | Pourcentage en dessous de -3 ET | Pourcentage en dessous de -2 ET ² | Score centré réduit moyen (ET) | Effectif d'enfants | Pourcentage en dessous de -3 ET | Pourcentage en dessous de -2 ET ² | Score centré réduit moyen (ET) | Effectif d'enfants |
| | | | | | | | | | | | | |
| Âge en mois | | | | | | | | | | | | |
| <6 | 5,6 | 16,8 | -0,8 | 1 392 | 2,0 | 6,7 | 6,3 | 1 386 | 4,8 | 13,4 | 1,3 | 1 401 |
| 6-8 | 3,5 | 16,9 | -0,9 | 827 | 1,6 | 8,9 | 2,6 | 827 | 3,6 | 16,3 | 0,6 | 831 |
| 9-11 | 7,3 | 25,5 | -1,2 | 686 | 2,5 | 10,3 | 1,0 | 700 | 5,3 | 20,5 | 0,4 | 691 |
| 12-17 | 8,0 | 27,1 | -1,3 | 1 249 | 1,8 | 8,0 | 1,7 | 1 258 | 4,1 | 17,7 | 0,5 | 1 254 |
| 18-23 | 14,0 | 40,1 | -1,7 | 1 267 | 1,7 | 6,4 | 0,6 | 1 310 | 6,0 | 19,6 | 0,2 | 1 271 |
| 24-35 | 15,2 | 41,1 | -1,7 | 2 394 | 0,4 | 3,2 | 2,1 | 2 482 | 3,8 | 17,5 | 0,6 | 2 404 |
| 36-47 | 12,6 | 36,9 | -1,7 | 2 504 | 0,4 | 2,4 | 1,3 | 2 669 | 2,9 | 15,2 | 0,1 | 2 516 |
| 48-59 | 11,3 | 32,9 | -1,5 | 2 458 | 0,6 | 3,5 | 0,7 | 2 627 | 3,7 | 17,0 | 0,1 | 2 465 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 12,4 | 35,1 | -1,5 | 6 465 | 1,3 | 5,6 | 1,8 | 6 719 | 4,8 | 17,8 | 0,4 | 6 494 |
| Féminin | 9,4 | 29,1 | -1,4 | 6 312 | 0,8 | 4,3 | 1,9 | 6 541 | 3,2 | 15,8 | 0,4 | 6 338 |
| Intervalle intergénérisique en mois³ | | | | | | | | | | | | |
| Première naissance ⁴ | 10,4 | 31,8 | -1,5 | 2 537 | 1,1 | 5,1 | 2,2 | 2 576 | 3,9 | 17,1 | 0,3 | 2 546 |
| <24 | 14,6 | 35,6 | -1,6 | 1 331 | 1,1 | 5,9 | 2,0 | 1 460 | 5,4 | 20,3 | 0,5 | 1 336 |
| 24-47 | 10,7 | 32,9 | -1,5 | 5 885 | 1,2 | 5,1 | 1,9 | 6 039 | 4,1 | 16,9 | 0,4 | 5 913 |
| 48+ | 6,9 | 24,3 | -1,2 | 1 929 | 0,7 | 4,1 | 1,8 | 1 961 | 2,5 | 12,7 | 0,4 | 1 935 |
| Grosseur à la naissance⁵ | | | | | | | | | | | | |
| Très petit | 21,8 | 50,0 | -2,0 | 388 | 3,1 | 10,8 | 1,8 | 402 | 13,8 | 36,5 | 0,0 | 392 |
| Petit | 14,6 | 41,4 | -1,8 | 1 268 | 1,5 | 6,8 | 1,6 | 1 320 | 8,1 | 27,9 | 0,3 | 1 271 |
| Moyen ou plus gros que la moyenne | 9,4 | 29,4 | -1,4 | 9 879 | 1,0 | 4,6 | 2,0 | 10 149 | 3,0 | 14,3 | 0,4 | 9 917 |
| Manquant | 13,4 | 39,5 | -1,5 | 144 | 0,0 | 5,3 | 2,6 | 163 | 5,6 | 21,1 | 0,0 | 147 |
| Interview de la mère | | | | | | | | | | | | |
| Interviewée | 10,5 | 31,5 | -1,4 | 11 683 | 1,1 | 5,0 | 2,0 | 12 037 | 3,9 | 16,6 | 0,4 | 11 730 |
| Mère non interviewée mais vivant dans le ménage | 8,6 | 28,3 | -1,3 | 203 | 1,4 | 5,5 | 1,3 | 239 | 2,5 | 10,4 | 1,1 | 207 |
| Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ⁶ | 17,0 | 41,4 | -1,7 | 891 | 0,6 | 4,1 | 0,8 | 984 | 5,7 | 21,1 | 0,3 | 895 |
| État nutritionnel de la mère⁶ | | | | | | | | | | | | |
| Maigre (IMC <18,5) | 12,7 | 38,6 | -1,7 | 429 | 2,8 | 13,0 | 1,2 | 445 | 8,3 | 30,1 | 0,0 | 430 |
| Normal (IMC 18,5-24,9) | 11,8 | 33,5 | -1,5 | 3 339 | 0,8 | 4,9 | 1,5 | 3 443 | 3,9 | 18,2 | 0,3 | 3 342 |
| En surpoids/obèse (IMC ≥25,0) | 6,5 | 22,9 | -1,2 | 1 238 | 0,6 | 3,2 | 2,3 | 1 259 | 2,4 | 10,4 | 0,6 | 1 240 |

À suivre...

Tableau 11.1—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Taille-pour-Âge ¹ | | | | Poids-pour-Taille | | | | Poids-pour-Âge | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | Pourcentage en dessous de -3 ET | Score centré (ET) | Effectif d'enfants | Effectif d'enfants | Pourcentage en dessous de -3 ET | Score centré (ET) | Effectif d'enfants | Effectif d'enfants | Pourcentage en dessous de -3 ET | Score centré (ET) | Effectif d'enfants | Effectif d'enfants |
| | en dessous de -2 ET ² | en dessous de -2 ET ² | au-dessus de +2 ET ² | au-dessus de +2 ET ² | en dessous de -2 ET ² | au-dessus de +2 ET ² | en dessous de -2 ET ² | au-dessus de +2 ET ² | en dessous de -2 ET ² | au-dessus de +2 ET ² | en dessous de -2 ET ² | au-dessus de +2 ET ² |
| Résidence | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 5,3 | -1,0 | 554 | 558 | 1,2 | -0,4 | 558 | 558 | 2,3 | -0,9 | 558 | 558 |
| Autres villes | 8,5 | -1,3 | 4 436 | 4 537 | 1,1 | -0,3 | 4 436 | 4 537 | 3,3 | -1,0 | 4 436 | 4 455 |
| Ensemble urbain | 8,2 | -1,3 | 4 990 | 5 095 | 1,1 | -0,3 | 4 990 | 5 095 | 3,2 | -1,0 | 4 990 | 5 011 |
| Rural | 12,6 | -1,5 | 7 787 | 8 165 | 1,0 | -0,2 | 7 787 | 8 165 | 4,6 | -1,1 | 7 787 | 7 821 |
| Département | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 14,5 | -1,5 | 1 661 | 1 728 | 1,7 | -0,3 | 1 661 | 1 728 | 5,7 | -1,1 | 1 661 | 1 674 |
| Atacora | 13,7 | -1,6 | 1 149 | 1 194 | 1,0 | -0,4 | 1 149 | 1 194 | 5,2 | -1,2 | 1 149 | 1 154 |
| Atlantique | 10,0 | -1,4 | 1 426 | 1 473 | 0,8 | -0,3 | 1 426 | 1 473 | 3,2 | -1,0 | 1 426 | 1 427 |
| Borgou | 12,0 | -1,5 | 1 618 | 1 811 | 1,5 | -0,3 | 1 618 | 1 811 | 4,1 | -1,1 | 1 618 | 1 621 |
| Collines | 5,6 | -1,2 | 835 | 849 | 0,9 | -0,1 | 835 | 849 | 1,9 | -0,8 | 835 | 837 |
| Couffo | 13,0 | -1,6 | 893 | 935 | 0,8 | -0,1 | 893 | 935 | 3,4 | -1,0 | 893 | 901 |
| Donga | 9,5 | -1,3 | 871 | 889 | 1,9 | -0,2 | 871 | 889 | 3,8 | -0,8 | 871 | 875 |
| Littoral | 5,3 | -1,0 | 554 | 558 | 1,2 | -0,4 | 554 | 558 | 2,3 | -0,9 | 554 | 556 |
| Mono | 10,0 | -1,4 | 583 | 592 | 0,4 | -0,4 | 583 | 592 | 5,3 | -1,1 | 583 | 589 |
| Ouémé | 9,0 | -1,4 | 1 155 | 1 184 | 0,6 | -0,4 | 1 155 | 1 184 | 4,1 | -1,1 | 1 155 | 1 161 |
| Plateau | 11,6 | -1,6 | 782 | 792 | 0,7 | -0,4 | 782 | 792 | 4,3 | -1,1 | 782 | 783 |
| Zou | 10,3 | -1,5 | 1 249 | 1 255 | 0,4 | -0,2 | 1 249 | 1 255 | 3,5 | -1,0 | 1 249 | 1 256 |
| Niveau d'instruction de la mère⁷ | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 12,2 | -1,5 | 7 742 | 8 100 | 1,2 | -0,3 | 7 742 | 8 100 | 4,5 | -1,1 | 7 742 | 7 778 |
| Primaire | 9,1 | -1,4 | 2 184 | 2 205 | 0,6 | -0,3 | 2 184 | 2 205 | 3,3 | -1,0 | 2 184 | 2 192 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 5,9 | -1,2 | 1 437 | 1 447 | 1,2 | -0,3 | 1 437 | 1 447 | 2,7 | -0,9 | 1 437 | 1 443 |
| Secondaire 2 ^u cycle ou plus | 2,8 | -0,8 | 523 | 523 | 1,2 | -0,2 | 523 | 523 | 1,3 | -0,7 | 523 | 523 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 15,1 | -1,7 | 2 600 | 2 833 | 1,2 | -0,3 | 2 600 | 2 833 | 5,7 | -1,2 | 2 600 | 2 619 |
| Second | 14,1 | -1,6 | 2 623 | 2 734 | 1,0 | -0,2 | 2 623 | 2 734 | 4,8 | -1,1 | 2 623 | 2 634 |
| Moyen | 11,1 | -1,5 | 2 629 | 2 701 | 1,2 | -0,2 | 2 629 | 2 701 | 4,0 | -1,0 | 2 629 | 2 633 |
| Quatrième | 9,1 | -1,4 | 2 602 | 2 645 | 1,0 | -0,2 | 2 602 | 2 645 | 3,5 | -1,0 | 2 602 | 2 614 |
| Le plus élevé | 4,2 | -1,0 | 2 323 | 2 347 | 1,0 | -0,3 | 2 323 | 2 347 | 2,0 | -0,8 | 2 323 | 2 333 |
| Ensemble | 10,9 | -1,4 | 12 777 | 13 260 | 1,1 | -0,3 | 12 777 | 13 260 | 4,0 | -1,0 | 12 777 | 12 832 |

Note : Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

¹ Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée alors que tous les autres enfants sont mesurés en position debout.

² Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

³ Non compris les enfants dont la mère n'a pas été interviewée.

⁴ Les premières naissances multiples-jumeaux, triplés- etc. sont comptées comme première naissance parce qu'elles n'ont pas d'intervalle avec la naissance précédente.

⁵ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

⁶ Non compris les enfants dont la mère n'a pas été pesée et mesurée, les enfants dont la mère n'a pas été interviewée et les enfants dont la mère est enceinte ou a donné naissance à un enfant dans les deux mois précédents. L'état nutritionnel de la mère, basé sur l'IMC (Indice de Masse Corporelle), est présenté au tableau 11.11.

⁷ Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 11.2 Allaitement initial

Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été allaités, pourcentage qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage qui ont commencé à être allaités le jour qui a suivi leur naissance et parmi les derniers nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités, pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête : | | | | Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête et qui ont été allaités : | |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|
| | Pourcentage ayant été allaité | Pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance | Pourcentage ayant commencé à être allaité le jour qui a suivi la naissance ¹ | Effectif d'enfants derniers-nés | Pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités ² | Effectif d'enfants derniers-nés ayant été allaités |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 96,0 | 53,7 | 83,6 | 2 773 | 17,9 | 2 663 |
| Féminin | 97,1 | 54,4 | 86,3 | 2 729 | 18,1 | 2 650 |
| Assistance à l'accouchement | | | | | | |
| Personnel de santé ³ | 96,6 | 52,3 | 84,9 | 4 511 | 18,5 | 4 358 |
| Sage-femme traditionnelle | 93,8 | 48,3 | 77,2 | 173 | 17,3 | 163 |
| Autre | 97,6 | 56,8 | 82,5 | 396 | 21,8 | 387 |
| Personne | 96,1 | 72,9 | 90,4 | 421 | 9,4 | 404 |
| Lieu de l'accouchement | | | | | | |
| Établissement de santé | 96,7 | 53,3 | 85,3 | 4 680 | 17,9 | 4 525 |
| Maison | 96,4 | 58,4 | 84,0 | 738 | 17,5 | 712 |
| Autre | 90,6 | 58,3 | 74,9 | 84 | 30,8 | 76 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 96,9 | 51,3 | 81,1 | 242 | 24,6 | 234 |
| Autres villes | 96,6 | 53,1 | 83,3 | 1 863 | 19,0 | 1 800 |
| Ensemble urbain | 96,6 | 52,8 | 83,0 | 2 105 | 19,7 | 2 035 |
| Rural | 96,5 | 54,8 | 86,1 | 3 397 | 17,0 | 3 278 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 96,5 | 72,4 | 95,6 | 766 | 6,8 | 738 |
| Atacora | 98,0 | 54,4 | 75,9 | 499 | 21,3 | 490 |
| Atlantique | 96,1 | 58,0 | 85,6 | 595 | 23,9 | 572 |
| Borgou | 96,3 | 53,7 | 85,4 | 730 | 9,4 | 704 |
| Collines | 96,0 | 21,2 | 77,6 | 353 | 18,6 | 339 |
| Couffo | 98,0 | 45,2 | 78,8 | 375 | 10,9 | 367 |
| Donga | 96,6 | 69,7 | 90,8 | 391 | 14,5 | 377 |
| Littoral | 96,9 | 51,3 | 81,1 | 242 | 24,6 | 234 |
| Mono | 96,5 | 58,3 | 79,3 | 225 | 26,2 | 217 |
| Ouémé | 96,8 | 44,0 | 84,0 | 479 | 32,9 | 464 |
| Plateau | 93,8 | 36,5 | 77,8 | 340 | 44,8 | 319 |
| Zou | 96,9 | 60,2 | 91,5 | 508 | 6,3 | 492 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 96,5 | 57,3 | 87,0 | 3 458 | 16,8 | 3 338 |
| Primaire | 96,2 | 49,6 | 82,1 | 1 036 | 20,6 | 997 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 97,2 | 47,9 | 82,6 | 731 | 18,6 | 710 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 96,4 | 47,0 | 76,1 | 277 | 21,8 | 267 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 96,3 | 55,9 | 84,6 | 1 153 | 15,9 | 1 110 |
| Second | 96,7 | 57,1 | 86,6 | 1 139 | 16,2 | 1 102 |
| Moyen | 96,4 | 53,9 | 86,3 | 1 134 | 16,8 | 1 093 |
| Quatrième | 96,8 | 51,4 | 84,9 | 1 097 | 19,5 | 1 062 |
| Le plus élevé | 96,5 | 51,7 | 81,8 | 979 | 22,4 | 945 |
| Ensemble | 96,6 | 54,1 | 84,9 | 5 502 | 18,0 | 5 312 |

Note : Le tableau est basé sur les enfants derniers-nés, dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, cela qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête.

¹ Y compris les enfants qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance.

² C'est-à-dire les enfants à qui on a donné autre chose que le lait maternel pendant les trois premiers jours.

³ Médecin, infirmière et sage-femme.

Tableau 11.3. Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère par type d'allaitement, pourcentage actuellement allaité ; pourcentage de tous les enfants de moins de 2 ans utilisant un biberon, selon l'âge en mois, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge en mois | Type d'allaitement | | | | | | | | | | Effectif des derniers-nés de moins de 2 ans | | | |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------|-------|---|---|----------------------------------|--|
| | Non allaité | Exclusivement allaité | Allaité et eau seulement | | Allaité et liquides non lactés ¹ | | Allaités et autres laits | | Allaités et aliments de complément | Total | Pourcentage actuellement allaité | Effectif des derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère | Pourcentage utilisant un biberon | Effectif de tous les enfants de moins de 2 ans |
| | | | Allaité et eau seulement | Allaité et liquides non lactés ¹ | Allaités et autres laits | Allaités et aliments de complément | | | | | | | | |
| 0-1 | 4,9 | 63,6 | 20,3 | 7,0 | 1,7 | 2,6 | 100,0 | 95,1 | 498 | 5,5 | 513 | | | |
| 2-3 | 4,3 | 37,7 | 35,4 | 10,8 | 2,1 | 9,7 | 100,0 | 95,7 | 468 | 10,9 | 482 | | | |
| 4-5 | 2,0 | 19,6 | 30,1 | 20,4 | 3,8 | 24,1 | 100,0 | 98,0 | 420 | 16,1 | 428 | | | |
| 6-8 | 3,6 | 5,3 | 20,2 | 15,3 | 1,6 | 53,9 | 100,0 | 96,4 | 804 | 24,9 | 817 | | | |
| 9-11 | 4,8 | 2,1 | 11,8 | 7,0 | 1,9 | 72,4 | 100,0 | 95,2 | 682 | 20,3 | 701 | | | |
| 12-17 | 12,7 | 0,4 | 7,3 | 2,2 | 0,8 | 76,7 | 100,0 | 87,3 | 1 177 | 13,9 | 1 223 | | | |
| 18-23 | 49,1 | 0,3 | 2,6 | 0,8 | 0,5 | 46,6 | 100,0 | 50,9 | 1 221 | 11,7 | 1 292 | | | |
| 0-3 | 4,6 | 51,1 | 27,6 | 8,9 | 1,9 | 6,0 | 100,0 | 95,4 | 966 | 8,1 | 996 | | | |
| 0-5 | 3,8 | 41,5 | 28,4 | 12,4 | 2,4 | 11,5 | 100,0 | 96,2 | 1 387 | 10,5 | 1 423 | | | |
| 6-9 | 3,5 | 4,8 | 18,2 | 13,8 | 1,8 | 57,8 | 100,0 | 96,5 | 1 049 | 25,0 | 1 067 | | | |
| 12-15 | 8,8 | 0,4 | 8,2 | 1,7 | 0,6 | 80,4 | 100,0 | 91,2 | 748 | 13,4 | 771 | | | |
| 12-23 | 31,2 | 0,3 | 4,9 | 1,5 | 0,6 | 61,4 | 100,0 | 68,8 | 2 398 | 12,8 | 2 515 | | | |
| 20-23 | 57,6 | 0,2 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 38,9 | 100,0 | 42,4 | 828 | 11,7 | 882 | | | |

Note : Les données sur l'allaitement se rapportent à une période de 24 heures (hier et la nuit dernière). Les enfants classés dans la catégorie « Allaitement et eau seulement » ne reçoivent aucun complément liquide ou solide. Les catégories « Non allaité », « Allaité exclusivement », « Allaité et eau seulement », « Jus/liquides non lactés » et « Aliments de complément » (solides et semi solides) sont hiérarchiques et mutuellement exclusives et la somme des pourcentages égale 100 %. Ainsi, les enfants qui sont allaités et qui reçoivent des liquides non lactés et qui ne reçoivent pas d'autres laits et qui ne reçoivent pas d'aliments de complément sont classés dans la catégorie « Liquides non lactés » même s'ils reçoivent également de l'eau. Tout enfant qui reçoit des aliments de complément est classé dans cette catégorie tant qu'il est toujours allaité.

¹ Les liquides non lactés comprennent les jus, les boissons à base de jus, les bouillons et les autres liquides.

Tableau 11.4 Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement

Pourcentage d'enfants nourris selon les différentes pratiques alimentaires de l'ANJE, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Indicateur | Pourcentage | Effectif |
|--|-------------|----------|
| Allaitement exclusif du nourrisson à moins de 6 mois | 41,5 | 1 387 |
| Allaitement exclusif à 4-5 mois | 19,6 | 420 |
| Allaitement prolongé à 1 an | 91,2 | 748 |
| Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous (6-8 mois) | 55,9 | 804 |
| Allaitement prolongé à 2 ans | 42,4 | 828 |
| Allaitement à l'âge approprié (0-23 mois) ¹ | 56,4 | 5 271 |
| Allaitement prédominant (0-5 mois) ² | 82,3 | 1 387 |
| Nourri au biberon (0-23 mois) | 15,0 | 5 456 |

¹ Pour les enfants de 0-5 mois : exclusivement allaités ; pour les enfants de 6-23 mois : lait maternel et aliments de complément.

² Soit exclusivement allaités ou allaité et eau seulement et/ou liquides non lactés seulement.

Tableau 11.5 Durée médiane de l'allaitement

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants nés au cours des 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Durée médiane (en mois) de l'allaitement des enfants nés au cours des 3 années ayant précédé l'enquête ¹ | | |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|
| | Allaitement | Allaitement exclusif | Allaitement prédominant ² |
| Sexe | | | |
| Masculin | 20,5 | 1,8 | 6,4 |
| Féminin | 20,4 | 2,3 | 6,3 |
| Résidence | | | |
| Cotonou | 19,2 | a | 4,9 |
| Autres villes | 19,3 | 1,5 | 6,3 |
| Ensemble urbain | 19,3 | 1,3 | 6,1 |
| Rural | 21,2 | 2,4 | 6,5 |
| Département | | | |
| Alibori | 22,2 | 2,8 | 6,1 |
| Atacora | 22,2 | 3,0 | 7,6 |
| Atlantique | 17,6 | (1,4) | 6,2 |
| Borgou | 22,1 | 1,4 | 6,5 |
| Collines | 19,6 | 2,8 | 6,7 |
| Couffo | 21,7 | (2,1) | 6,0 |
| Donga | 21,6 | (2,7) | 7,2 |
| Littoral | 19,2 | a | 4,9 |
| Mono | (21,3) | a | 7,2 |
| Ouémé | 18,1 | (1,2) | 6,5 |
| Plateau | 19,8 | a | 6,1 |
| Zou | 19,5 | 3,4 | 6,1 |
| Niveau d'instruction | | | |
| Aucun | 21,4 | 2,1 | 6,4 |
| Primaire | 19,4 | 2,0 | 6,8 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 18,2 | 2,2 | 6,2 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 17,8 | (2,5) | 5,3 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 21,6 | 2,3 | 7,0 |
| Second | 21,8 | 2,3 | 6,3 |
| Moyen | 21,0 | 2,1 | 6,0 |
| Quatrième | 19,7 | 1,9 | 6,7 |
| Le plus élevé | 17,9 | 1,4 | 5,9 |
| Ensemble | 20,4 | 2,1 | 6,4 |
| Moyenne pour tous les enfants | 20,4 | 3,7 | 8,2 |

Note : Les durées médiane et moyenne de l'allaitement sont basées sur le statut d'allaitement de l'enfant au moment de l'enquête (statut actuel). Y compris les enfants vivants et décédés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Pour les enfants derniers-nés de moins de 24 mois vivant avec leur mère et qui sont allaités, l'information pour déterminer si l'allaitement est exclusif et prédominant est basée sur le rappel des aliments consommés pendant une période de 24 heures. On suppose que les derniers-nés de 24 mois ou plus qui vivent avec leur mère et qui sont allaités ne reçoivent ni un allaitement exclusif, ni un allaitement prédominant. On suppose que les enfants derniers-nés qui ne vivent pas actuellement avec leur mère et tous les enfants qui ne sont pas des derniers-nés ne sont pas actuellement allaités.

² Soit exclusivement allaités ou qui ont reçu le lait maternel, de l'eau et/ou des liquides non lactés seulement.

a = Non présenté parce que moins de 50 % des enfants de cette catégorie sont exclusivement allaités ou ne reçoivent que de l'eau en plus du lait maternel.

Tableau 11.6. Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit avant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 2 ans vivant avec leur mère, par type d'aliments consommés le jour ou la nuit avant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon l'âge. EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge en mois | Aliments solides ou semi solides | | | | | | | | | | | Effectif d'enfants de moins de 2 ans | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|--------------------------------------|--|---------------------------|--------|---|--------------------------------------|
| | Liquides | | | Fruits et légumes | | | | Préparations à base de légumes et de tubercules | | | | | Préparation à base de légumes et de noix | Viande, poisson, volaille | Œufs | Fromage, yaourt, autres produits laitiers | Préparations solides ou semi-solides |
| | Lait en poudre pour enfant | Autres liquides ² | Autres lait ¹ | Aliments enrichis pour bébé | Préparations à base de céréales ³ | Fruits et légumes riches en vitamine A ⁴ | Autres fruits et légumes | Préparations à base de racines et de tubercules | Autres fruits et légumes | Préparations à base de légumes et de tubercules | | | | | | | |
| ENFANTS ALLAITÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-1 | 2,1 | 1,3 | 9,4 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 474 | |
| 2-3 | 2,2 | 2,5 | 16,6 | 1,2 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 9,9 | 448 | |
| 4-5 | 5,3 | 4,9 | 34,1 | 4,0 | 14,5 | 3,5 | 2,6 | 4,2 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 24,6 | 412 | |
| 6-8 | 5,0 | 8,3 | 49,8 | 7,1 | 33,0 | 16,7 | 12,9 | 18,0 | 11,8 | 22,7 | 11,7 | 11,7 | 13,6 | 13,6 | 55,8 | 775 | |
| 9-11 | 4,1 | 10,3 | 55,8 | 5,8 | 36,2 | 22,2 | 20,0 | 26,4 | 20,2 | 38,4 | 18,2 | 18,2 | 18,8 | 18,8 | 75,7 | 649 | |
| 12-17 | 4,8 | 15,4 | 58,4 | 7,3 | 40,8 | 35,3 | 30,0 | 40,2 | 29,2 | 53,4 | 24,4 | 24,4 | 23,9 | 23,9 | 87,7 | 1 028 | |
| 18-23 | 5,5 | 19,7 | 55,1 | 5,3 | 40,5 | 38,5 | 31,1 | 52,5 | 32,1 | 58,1 | 27,1 | 27,1 | 31,1 | 31,1 | 91,3 | 621 | |
| 6-23 | 4,8 | 13,4 | 55,0 | 6,5 | 37,8 | 28,5 | 23,8 | 34,2 | 23,5 | 43,4 | 20,4 | 20,4 | 21,7 | 21,7 | 77,9 | 3 072 | |
| Ensemble | 4,3 | 10,2 | 44,3 | 5,1 | 28,3 | 20,4 | 17,1 | 24,5 | 16,7 | 31,1 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 15,5 | 57,9 | 4 406 | |
| ENFANTS NON ALLAITÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 | |
| 2-3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | |
| 4-5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |
| 6-8 | (19,2) | (12,7) | (54,3) | (12,9) | (39,0) | (26,3) | (16,2) | (27,6) | (14,2) | (25,1) | (23,6) | (23,6) | (17,9) | (17,9) | (54,5) | 29 | |
| 9-11 | (2,4) | (13,8) | (64,2) | (4,3) | (46,5) | (35,1) | (23,2) | (33,5) | (24,2) | (28,7) | (37,1) | (37,1) | (26,6) | (26,6) | (78,3) | 33 | |
| 12-17 | 5,7 | 21,5 | 64,7 | 6,7 | 45,2 | 37,6 | 43,1 | 42,1 | 28,8 | 67,9 | 30,4 | 30,4 | 32,0 | 32,0 | 95,2 | 150 | |
| 18-23 | 5,2 | 14,0 | 64,0 | 10,2 | 45,5 | 43,5 | 41,8 | 47,8 | 35,8 | 66,3 | 29,0 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | 95,4 | 600 | |
| 6-23 | 5,7 | 15,3 | 63,8 | 9,4 | 45,3 | 41,4 | 40,4 | 45,4 | 33,3 | 63,6 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 93,2 | 812 | |
| Ensemble | 6,1 | 14,9 | 61,1 | 9,2 | 43,3 | 39,4 | 38,1 | 43,0 | 31,4 | 60,2 | 27,7 | 27,7 | 28,0 | 28,0 | 88,5 | 864 | |

Note : Les données sur l'allaitement et sur les aliments consommés se rapportent à la période de « 24 heures » (hier et la nuit dernière). Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les Autres lait comprennent le lait d'animal, qu'il soit frais, en boîte, ou en poudre.

² N'inclut pas l'eau plate. Inclut les jus, les boissons à base de jus, les bouillons clairs ou d'autres liquides non lactés

³ Inclut les aliments enrichis pour bébés

⁴ Comprend des fruits et légumes comme les citrouilles, les ignames ou les courges rouges ou jaunes, les carottes, les pommes de terre douces jaunes, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres, papayes, goyave, et d'autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A ainsi que l'huile de palme rouge, de noix de palme ou de sauce de pulpe de noix.

Tableau 11.7. Apport alimentaire minimum acceptable

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable basé sur l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et le nombre de fois qu'ils ont été nourris durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les enfants de 6-23 mois allaités, pourcentage nourri selon : | | | | | Parmi les enfants de 6-23 mois non allaités, pourcentage ayant reçu : | | | | | Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu : | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | Diversité alimentaire minimum ¹ | Fréquence minimum des repas ² | Apport alimentaire minimum acceptable ³ | Effectif d'enfants de 6-23 mois allaités | Lait ou produits laitiers ⁴ | Diversité alimentaire minimum ¹ | Fréquence minimum des repas ⁵ | Apport alimentaire minimum acceptable ⁶ | Effectif d'enfants de 6-23 mois non allaités | Lait maternel, lait ou produits laitiers ⁷ | Diversité alimentaire minimum ¹ | Fréquence minimum des repas ⁸ | Apport alimentaire minimum acceptable ⁹ | Effectif de tous les enfants de 6-23 mois | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Âge en mois | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-8 | 13,6 | 42,0 | 10,8 | 775 | (20,4) | (23,6) | (34,5) | (5,2) | 29 | 97,1 | 13,9 | 41,8 | 10,6 | 804 | |
| 9-11 | 19,8 | 33,0 | 9,6 | 649 | (15,6) | (29,8) | (20,1) | (3,4) | 33 | 95,9 | 20,3 | 32,4 | 9,3 | 682 | |
| 12-17 | 31,5 | 49,4 | 18,7 | 1 028 | 23,2 | 34,2 | 46,5 | 10,6 | 150 | 90,2 | 31,8 | 49,0 | 17,6 | 1 177 | |
| 18-23 | 37,8 | 53,1 | 24,3 | 621 | 17,5 | 40,2 | 47,0 | 9,2 | 600 | 59,5 | 39,0 | 50,1 | 16,9 | 1 221 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 26,1 | 44,1 | 15,5 | 1 574 | 19,7 | 38,1 | 46,5 | 9,5 | 408 | 83,5 | 28,6 | 44,6 | 14,3 | 1 983 | |
| Féminin | 25,4 | 45,6 | 16,4 | 1 498 | 17,5 | 38,0 | 44,2 | 8,6 | 403 | 82,5 | 28,1 | 45,3 | 14,7 | 1 901 | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 30,4 | 44,0 | 19,5 | 136 | 44,8 | 52,3 | 58,7 | 23,0 | 54 | 84,3 | 36,6 | 48,2 | 20,5 | 190 | |
| Autres villes | 22,5 | 44,0 | 14,6 | 993 | 19,9 | 38,4 | 49,3 | 8,7 | 326 | 80,2 | 26,4 | 45,3 | 13,2 | 1 319 | |
| Ensemble urbain | 23,4 | 44,0 | 15,2 | 1 128 | 23,4 | 40,4 | 50,7 | 10,7 | 380 | 80,7 | 27,7 | 45,7 | 14,1 | 1 508 | |
| Rural | 27,1 | 45,3 | 16,3 | 1 944 | 14,4 | 36,1 | 40,7 | 7,6 | 432 | 84,4 | 28,8 | 44,5 | 14,7 | 2 376 | |
| Département | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 44,2 | 53,7 | 29,6 | 439 | 38,3 | 57,4 | 48,5 | 27,1 | 80 | 90,5 | 46,2 | 52,9 | 29,2 | 519 | |
| Atacora | 16,9 | 38,5 | 12,7 | 309 | (7,8) | (12,8) | (39,4) | (6,3) | 45 | 88,4 | 16,4 | 38,6 | 11,9 | 353 | |
| Atlantique | 18,8 | 41,0 | 10,1 | 285 | 8,7 | 29,1 | 36,6 | 4,3 | 142 | 69,6 | 22,2 | 39,5 | 8,1 | 427 | |
| Borgou | 30,2 | 42,2 | 17,9 | 459 | 48,4 | 52,3 | 60,7 | 16,1 | 86 | 91,9 | 33,7 | 45,1 | 17,6 | 545 | |
| Collines | 31,4 | 25,7 | 5,4 | 189 | 7,2 | 32,2 | 12,0 | 2,1 | 49 | 80,7 | 31,6 | 22,9 | 4,7 | 238 | |
| Couffo | 24,3 | 52,8 | 19,3 | 214 | (19,6) | (49,1) | (56,7) | (9,1) | 41 | 87,1 | 28,3 | 53,4 | 17,7 | 255 | |
| Donga | 17,6 | 47,5 | 10,9 | 221 | 5,3 | 22,2 | 35,1 | 1,6 | 44 | 84,1 | 18,3 | 45,4 | 9,4 | 265 | |
| Littoral | 30,4 | 44,0 | 19,5 | 136 | 44,8 | 52,3 | 58,7 | 23,0 | 54 | 84,3 | 36,6 | 48,2 | 20,5 | 190 | |
| Mono | 17,7 | 30,0 | 8,8 | 130 | (14,7) | (37,0) | (40,4) | (7,5) | 26 | 85,6 | 21,0 | 31,8 | 8,6 | 157 | |
| Ouémé | 8,3 | 46,9 | 6,7 | 246 | 8,6 | 19,0 | 48,5 | 0,9 | 103 | 73,0 | 11,5 | 47,4 | 5,0 | 349 | |
| Plateau | 18,6 | 44,4 | 9,8 | 174 | 4,8 | 39,7 | 34,9 | 3,1 | 53 | 77,8 | 23,5 | 42,2 | 8,2 | 227 | |
| Zou | 31,7 | 57,1 | 22,9 | 271 | 11,0 | 53,4 | 59,2 | 7,5 | 87 | 78,3 | 37,0 | 57,6 | 19,1 | 358 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 26,5 | 44,4 | 16,5 | 2 005 | 17,7 | 36,0 | 44,2 | 8,6 | 445 | 85,0 | 28,2 | 44,4 | 15,1 | 2 450 | |
| Primaire | 20,9 | 44,6 | 11,4 | 560 | 12,7 | 39,2 | 41,1 | 7,7 | 163 | 80,3 | 25,0 | 43,8 | 10,5 | 723 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 26,6 | 45,2 | 17,1 | 384 | 17,3 | 37,5 | 46,4 | 9,2 | 136 | 78,4 | 29,5 | 45,5 | 15,0 | 519 | |
| Secondaire 2 nd cycle ou plus | 33,7 | 51,2 | 22,6 | 124 | 41,7 | 50,2 | 61,1 | 15,1 | 68 | 79,5 | 39,5 | 54,7 | 20,0 | 192 | |

À suivre...

Tableau 11.7—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les enfants de 6-23 mois allaités, pourcentage nourri selon : | | | | Parmi les enfants de 6-23 mois non allaités, pourcentage ayant reçu : | | | | Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu : | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | Diversité alimentaire minimum ¹ | Fréquence minimum des repas ² | Apport alimentaire minimum acceptable ³ | Effectif d'enfants de 6-23 mois allaités | Lait ou produits laitiers ⁴ | Diversité alimentaire minimum ¹ | Fréquence minimum des repas ⁵ | Apport alimentaire minimum acceptable ⁶ | Effectif d'enfants de 6-23 mois non allaités | Lait ou produits laitiers ⁷ | Diversité alimentaire minimum ¹ | Fréquence minimum des repas ⁸ | Apport alimentaire minimum acceptable ⁹ | Effectif de tous les enfants de 6-23 mois |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 24,6 | 40,9 | 16,3 | 672 | 24,1 | 30,5 | 7,7 | 130 | 87,7 | 25,5 | 42,3 | 14,9 | 803 | |
| Second | 24,9 | 44,7 | 15,2 | 671 | 15,0 | 38,8 | 9,6 | 117 | 87,4 | 26,9 | 43,3 | 14,4 | 788 | |
| Moyen | 27,1 | 48,8 | 16,4 | 651 | 11,3 | 45,3 | 6,9 | 158 | 82,7 | 30,7 | 46,9 | 14,5 | 808 | |
| Quatrième | 26,6 | 43,8 | 15,6 | 595 | 12,7 | 29,3 | 7,0 | 192 | 78,7 | 27,2 | 43,3 | 13,5 | 787 | |
| Le plus élevé | 25,9 | 46,3 | 16,1 | 483 | 27,9 | 44,9 | 12,9 | 215 | 77,8 | 31,7 | 49,4 | 15,2 | 698 | |
| Ensemble | 25,8 | 44,8 | 15,9 | 3 072 | 18,6 | 38,1 | 9,0 | 812 | 83,0 | 28,3 | 44,9 | 14,5 | 3 884 | |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Enfants qui ont reçu des aliments de cinq groupes ou plus des huit groupes alimentaires suivants: a. lait maternel ; b. préparation commerciale pour bébés, lait autre que le lait maternel, fromage ou yaourt ou autres produits laitiers ; c. préparations à base de céréales, de racines ou de tubercules et les préparations enrichies pour bébés à base de céréales ; d. fruits et légumes riches en vitamine A et huile de palme rouge ; e. autres fruits et légumes ; g. œufs viande, poisson et coquillage (et abats) ; h. légumes et noix.

² Pour les enfants allaités, la fréquence minimum des repas consiste à recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et au moins trois fois par jour pour ceux de 9-23 mois.

³ On considère que les enfants allaités de 6-23 mois reçoivent un apport alimentaire minimum acceptable s'ils sont nourris selon la diversité minimum alimentaire telle que décrite dans la note 1 et la fréquence minimum des repas telle que défini dans la note 2.

⁴ Y compris au moins deux repas comptant une préparation commerciale pour bébés, du lait d'animal frais, en boîte en poudre et du yaourt.

⁵ Pour les enfants de 6-23 mois non allaités, on considère que la fréquence minimum des repas est de recevoir des aliments solides, semi-solides, ou mous ou des préparations à base de lait au moins quatre fois par jour. L'un, au moins, des aliments doit être solide, semi-solide ou mou.

⁶ On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent d'autres laits ou des produits laitiers au moins deux fois par jour, s'ils sont nourris selon la fréquence minimum des repas telle que définie à la note 5 et s'ils reçoivent des aliments solides, semi-solides, ou mous provenant d'au moins quatre groupes d'aliments, non compris le groupe d'aliments comprenant le lait ou les produits laitiers.

⁷ Lait maternel ou pas de lait maternel et recevant au moins deux repas de préparations commerciales pour bébés, de lait d'animal frais, en boîte ou en poudre et de yaourt.

⁸ Les enfants nourris le nombre minimum de fois recommandé par jour selon leur âge et selon qu'ils sont allaités ou non comme décrit aux notes 2 et 5.

⁹ On considère que les enfants de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent le lait maternel, d'autres laits ou des produits laitiers comme décrit à la note 8, s'ils sont nourris selon la diversité alimentaire minimum comme décrit à la note 1 et selon la fréquence minimum des repas comme décrit aux notes 2 et 5.

Tableau 11.8 Prévalence de l'anémie chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois considérés comme étant anémiés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Anémie selon le niveau d'hémoglobine | | | | Effectif d'enfants de 6-59 mois |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Anémie (<11,0 g/dl) | Anémie légère (10,0-10,9 g/dl) | Anémie modérée (7,0-9,9 g/dl) | Anémie sévère (<7,0 g/dl) | |
| Age en mois | | | | | |
| 6-8 | 87,1 | 26,0 | 58,2 | 2,9 | 431 |
| 9-11 | 88,9 | 30,6 | 55,8 | 2,5 | 363 |
| 12-17 | 84,3 | 25,7 | 53,1 | 5,5 | 658 |
| 18-23 | 77,4 | 26,0 | 46,6 | 4,7 | 685 |
| 24-35 | 70,9 | 29,6 | 38,0 | 3,3 | 1 309 |
| 36-47 | 65,2 | 26,7 | 35,2 | 3,4 | 1 356 |
| 48-59 | 59,9 | 28,3 | 30,1 | 1,5 | 1 369 |
| Sexe | | | | | |
| Masculin | 72,0 | 26,3 | 42,2 | 3,5 | 3 136 |
| Féminin | 71,0 | 29,1 | 39,0 | 2,9 | 3 035 |
| Interview de la mère | | | | | |
| Interviewée | 72,1 | 27,8 | 41,1 | 3,3 | 5 571 |
| Mère non interviewée et vivant dans le ménage | 70,4 | 37,6 | 28,9 | 3,9 | 95 |
| Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ¹ | 66,0 | 24,7 | 38,4 | 3,0 | 506 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 61,1 | 33,6 | 26,9 | 0,6 | 275 |
| Autres villes | 66,8 | 28,1 | 36,5 | 2,3 | 2 050 |
| Ensemble urbain | 66,1 | 28,7 | 35,3 | 2,1 | 2 325 |
| Rural | 74,8 | 27,0 | 43,9 | 3,9 | 3 846 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 75,0 | 26,4 | 44,8 | 3,8 | 787 |
| Atacora | 84,7 | 24,9 | 51,3 | 8,5 | 555 |
| Atlantique | 67,5 | 31,0 | 34,1 | 2,4 | 675 |
| Borgou | 74,4 | 22,6 | 47,9 | 4,0 | 818 |
| Collines | 66,2 | 29,8 | 34,3 | 2,1 | 385 |
| Couffo | 76,8 | 25,8 | 47,6 | 3,4 | 445 |
| Donga | 75,8 | 28,8 | 43,6 | 3,4 | 403 |
| Littoral | 61,1 | 33,6 | 26,9 | 0,6 | 275 |
| Mono | 67,5 | 31,5 | 33,4 | 2,6 | 293 |
| Ouémé | 72,7 | 33,7 | 37,4 | 1,6 | 552 |
| Plateau | 71,1 | 23,3 | 46,1 | 1,6 | 338 |
| Zou | 59,1 | 26,7 | 30,2 | 2,1 | 645 |
| Niveau d'instruction de la mère² | | | | | |
| Aucun | 74,2 | 26,6 | 43,6 | 4,0 | 3 822 |
| Primaire | 68,9 | 30,5 | 36,7 | 1,8 | 974 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 68,4 | 29,6 | 36,7 | 2,0 | 664 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 57,8 | 34,4 | 23,4 | 0,0 | 205 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 79,3 | 24,6 | 49,2 | 5,5 | 1 216 |
| Second | 74,5 | 25,0 | 45,3 | 4,3 | 1 249 |
| Moyen | 76,5 | 28,7 | 44,1 | 3,7 | 1 313 |
| Quatrième | 68,0 | 29,2 | 36,7 | 2,0 | 1 289 |
| Le plus élevé | 57,9 | 31,0 | 26,4 | 0,5 | 1 103 |
| Ensemble | 71,5 | 27,7 | 40,6 | 3,2 | 6 171 |

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé la nuit dans le ménage ayant précédé l'interview et qui ont été testés pour l'anémie. La prévalence de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998. Hémoglobine en grammes par décilitre (g/dl).

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 11.9 Présence de sel iodé dans le ménage

Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé et pourcentage ne disposant pas de sel dans le ménage et, parmi les ménages dont le sel a été testé, pourcentage ayant du sel iodé selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi tous les ménages, pourcentage | | | Effectif de ménages | Parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé : | |
|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|
| | Dont le sel a été testé | disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé ¹ | Ne disposant pas de sel dans le ménage | | Pourcentage disposant de sel iodé | Effectif de ménages |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 89,4 | 1,3 | 9,3 | 852 | 84,6 | 761 |
| Autres villes | 93,7 | 0,6 | 5,7 | 5 252 | 88,9 | 4 919 |
| Ensemble urbain | 93,1 | 0,7 | 6,2 | 6 104 | 88,3 | 5 680 |
| Rural | 94,5 | 0,8 | 4,8 | 8 052 | 90,6 | 7 608 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 98,1 | 0,1 | 1,7 | 1 192 | 96,7 | 1 169 |
| Atacora | 97,0 | 0,4 | 2,6 | 923 | 98,6 | 896 |
| Atlantique | 90,2 | 0,9 | 8,9 | 1 969 | 84,3 | 1 776 |
| Borgou | 95,7 | 1,0 | 3,3 | 1 498 | 92,9 | 1 433 |
| Collines | 94,5 | 1,7 | 3,8 | 981 | 92,8 | 927 |
| Couffo | 92,4 | 0,2 | 7,3 | 1 108 | 97,9 | 1 024 |
| Donga | 96,4 | 0,4 | 3,2 | 740 | 95,2 | 714 |
| Littoral | 89,4 | 1,3 | 9,3 | 852 | 84,6 | 761 |
| Mono | 92,0 | 2,2 | 5,8 | 879 | 78,0 | 808 |
| Ouémé | 91,2 | 0,5 | 8,3 | 1 633 | 85,0 | 1 489 |
| Plateau | 96,1 | 0,4 | 3,6 | 984 | 90,7 | 946 |
| Zou | 96,1 | 0,3 | 3,6 | 1 399 | 83,7 | 1 344 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 95,6 | 0,5 | 3,9 | 2 501 | 91,1 | 2 392 |
| Second | 94,6 | 0,6 | 4,8 | 2 675 | 92,0 | 2 530 |
| Moyen | 94,0 | 1,0 | 5,1 | 2 798 | 90,0 | 2 630 |
| Quatrième | 92,7 | 0,5 | 6,7 | 2 951 | 88,4 | 2 737 |
| Le plus élevé | 92,8 | 1,1 | 6,1 | 3 231 | 87,2 | 3 000 |
| Ensemble | 93,9 | 0,7 | 5,4 | 14 156 | 89,6 | 13 288 |

¹ Y compris les ménages dans lesquels le sel n'a pas pu être testé pour des raisons techniques ou logistiques incluant la disponibilité de kits de tests.

Tableau 11.10 Consommation de micronutriments par les enfants

Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère, pourcentages qui ont consommé des aliments riches en vitamine A et des aliments riches en fer au cours des 24 heures ayant précédé l'interview ; parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments multiples dans les 7 jours ayant précédé l'interview; parmi tous les enfants de 6-59 mois, pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 mois ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les 7 jours ayant précédé l'interview et pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les 6 mois ayant précédé l'interview, et parmi tous les enfants de 6-59 mois qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage qui disposait de sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère : | | | Parmi tous les enfants de 6-23 mois : | | | Parmi tous les enfants de 6-59 mois : | | | Parmi les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dans lequel le sel a été testé : | |
|------------------------------------|--|---|--------------------|---|--------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------|
| | Pourcentage ayant consommé des aliments riches en vitamine A dans les dernières 24 heures ¹ | Pourcentage ayant consommé des aliments riches en fer dans les dernières 24 heures ² | Effectif d'enfants | Pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments au cours des sept derniers jours | Effectif d'enfants | Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les 7 derniers jours ³ | Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois ⁴ | Pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les 6 derniers mois ⁵ | Effectif d'enfants | Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé ⁶ | Effectif de ménages |
| Âge en mois | | | | | | | | | | | |
| 6-8 | 28,5 | 25,3 | 804 | 1,4 | 817 | 21,4 | 43,9 | 21,7 | 817 | 90,6 | 795 |
| 9-11 | 49,0 | 42,9 | 682 | 1,2 | 701 | 27,0 | 55,0 | 32,4 | 701 | 90,8 | 686 |
| 12-17 | 66,8 | 59,7 | 1 177 | 2,0 | 1 223 | 27,5 | 58,4 | 39,1 | 1 223 | 91,7 | 1 185 |
| 18-23 | 74,4 | 67,0 | 1 221 | 1,4 | 1 292 | 27,9 | 54,8 | 44,3 | 1 292 | 92,6 | 1 257 |
| 24-35 | na | na | na | na | na | 25,2 | 52,9 | 43,0 | 2 365 | 90,6 | 2 319 |
| 36-47 | na | na | na | na | na | 22,2 | 52,2 | 37,1 | 2 450 | 92,0 | 2 395 |
| 48-59 | na | na | na | na | na | 20,4 | 49,2 | 38,5 | 2 416 | 91,2 | 2 363 |
| Sexe | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 57,5 | 51,3 | 1 983 | 1,4 | 2 056 | 23,5 | 53,1 | 38,3 | 5 722 | 91,1 | 5 596 |
| Féminin | 58,9 | 52,6 | 1 901 | 1,7 | 1 976 | 24,4 | 51,4 | 38,3 | 5 541 | 91,7 | 5 404 |
| Allaitement | | | | | | | | | | | |
| Allaité | 53,5 | 47,5 | 3 072 | 1,5 | 3 139 | 24,1 | 52,4 | 31,5 | 3 360 | 91,4 | 3 280 |
| Non allaité | 75,7 | 68,8 | 812 | 1,8 | 893 | 23,8 | 52,2 | 41,1 | 7 902 | 91,4 | 7 720 |
| Âge de la mère | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 49,4 | 44,4 | 269 | 1,5 | 277 | 17,8 | 48,7 | 29,6 | 402 | 90,5 | 390 |
| 20-29 | 58,6 | 52,2 | 2 191 | 1,5 | 2 280 | 23,5 | 51,3 | 36,9 | 5 797 | 91,1 | 5 662 |
| 30-39 | 59,5 | 53,2 | 1 212 | 1,9 | 1 254 | 25,9 | 53,3 | 41,1 | 4 094 | 91,3 | 4 010 |
| 40-49 | 56,9 | 52,0 | 213 | 0,4 | 220 | 20,5 | 54,5 | 38,1 | 970 | 93,7 | 938 |
| Résidence | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 67,0 | 65,1 | 190 | 1,5 | 199 | 43,9 | 61,2 | 70,2 | 512 | 86,3 | 483 |
| Autres villes | 59,3 | 53,2 | 1 319 | 1,4 | 1 368 | 26,6 | 56,6 | 44,4 | 3 896 | 90,1 | 3 821 |
| Ensemble urbain | 60,3 | 54,7 | 1 508 | 1,4 | 1 568 | 28,6 | 57,1 | 47,4 | 4 408 | 89,7 | 4 304 |
| Rural | 56,8 | 50,2 | 2 376 | 1,6 | 2 465 | 20,9 | 49,1 | 32,4 | 6 855 | 92,5 | 6 695 |

À suivre...

Tableau 11.10—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère : | | Parmi tous les enfants de 6-23 mois : | | Parmi tous les enfants de 6-59 mois : | | Parmi les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dans lequel le sel a été testé : | | |
|--|--|---|---|--------------------|--|--|---|--|---------------------|
| | Pourcentage ayant consommé des aliments riches en vitamine A dans les dernières 24 heures ¹ | Pourcentage ayant consommé des aliments riches en fer dans les dernières 24 heures ² | Pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments au cours des sept derniers jours | Effectif d'enfants | Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les 7 derniers jours ³ | Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois ^{4,5} | Effectif d'enfants | Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé ⁶ | Effectif de ménages |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 69,4 | 64,6 | 3,7 | 537 | 5,2 | 34,9 | 1 493 | 97,4 | 1 481 |
| Atacora | 36,3 | 28,3 | 0,4 | 363 | 21,3 | 68,4 | 1 000 | 99,0 | 990 |
| Atlantique | 58,2 | 52,7 | 0,0 | 446 | 37,6 | 71,6 | 1 301 | 85,2 | 1 253 |
| Borgou | 55,2 | 41,9 | 3,0 | 545 | 12,2 | 44,1 | 1 514 | 93,3 | 1 495 |
| Collines | 55,8 | 52,5 | 2,2 | 248 | 30,5 | 59,9 | 712 | 93,7 | 691 |
| Couffo | 56,4 | 50,8 | 0,0 | 265 | 12,2 | 36,6 | 737 | 97,6 | 712 |
| Donga | 43,8 | 39,6 | 0,0 | 274 | 23,9 | 75,2 | 720 | 95,7 | 718 |
| Littoral | 67,0 | 65,1 | 1,5 | 199 | 43,9 | 61,2 | 512 | 86,3 | 483 |
| Mono | 63,9 | 56,4 | 1,1 | 164 | 32,2 | 44,9 | 499 | 79,0 | 480 |
| Ouémé | 56,1 | 52,7 | 0,4 | 366 | 25,0 | 39,7 | 1 022 | 85,5 | 985 |
| Plateau | 53,3 | 46,9 | 2,7 | 236 | 42,6 | 49,1 | 684 | 90,3 | 660 |
| Zou | 78,9 | 74,2 | 1,8 | 376 | 29,7 | 52,9 | 1 070 | 86,1 | 1 052 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | |
| Aucun | 57,9 | 50,8 | 1,6 | 2 542 | 19,4 | 49,1 | 7 418 | 92,3 | 7 244 |
| Primaire | 53,8 | 47,9 | 0,6 | 747 | 29,4 | 57,4 | 2 040 | 88,4 | 1 992 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 60,3 | 56,9 | 2,1 | 543 | 34,4 | 57,6 | 1 332 | 91,2 | 1 303 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 71,8 | 67,9 | 2,7 | 200 | 40,9 | 64,7 | 473 | 91,0 | 460 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 50,7 | 40,8 | 2,4 | 829 | 12,8 | 43,0 | 2 402 | 94,1 | 2 350 |
| Second | 55,4 | 48,4 | 1,1 | 820 | 18,8 | 46,9 | 2 254 | 93,8 | 2 205 |
| Moyen | 59,6 | 53,7 | 1,1 | 840 | 22,6 | 53,0 | 2 267 | 90,8 | 2 211 |
| Quatrième | 61,0 | 56,6 | 1,5 | 813 | 28,2 | 57,7 | 2 280 | 89,9 | 2 233 |
| Le plus élevé | 64,8 | 61,3 | 1,7 | 729 | 39,1 | 62,0 | 2 060 | 87,9 | 2 000 |
| Ensemble | 58,2 | 51,9 | 1,6 | 4 032 | 23,9 | 52,2 | 11 262 | 91,4 | 11 000 |

na = Non applicable

¹ Y compris la viande (et abats), poisson, volaille, œufs, citrouilles, ignames ou courges rouges ou jaunes, carottes, pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres, papayes mûres et autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A, et l'huile de palme rouge

² Y compris la viande (et les abats), le poisson, la volaille et œufs.

³ Basé sur le souvenir de la mère.

⁴ Basé sur le souvenir de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible).

⁵ Les vermifuges contre les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et les schistosomiases.

⁶ Sont exclus les enfants vivant dans un ménage dans lesquels le sel n'a pas été testé.

Tableau 11.11 État nutritionnel des femmes

Parmi les femmes de 15-49 ans, pourcentage ayant une taille inférieure à 145 cm, un Indice de Masse Corporelle (IMC) moyen et pourcentage ayant certains niveaux d'IMC, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Indice de Masse Corporelle (IMC) ¹ | | | | | | | | | | Effectif de femmes | |
|--|---|--------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | Taille | | Normal | | Maigre | | En surpoids/ obèse | | ≥25,0 (Total en surpoids ou obèse) | ≥30,0 (Obèse) | | |
| | Pourcentage en dessous de 145 cm | Effectif de femmes | Indice de Masse Corporelle moyen (IMC) | 18,5-24,9 (Total normal) | <18,5 (Total maigre) | 17,0-18,4 (Maigreur légère) | <17,0 (Maigreur modérée et sévère) | 25,0-29,9 (Surpoids) | | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 2,8 | 1 670 | 20,7 | 72,8 | 20,5 | 14,5 | 6,0 | 6,7 | 5,9 | 0,9 | 1 518 | |
| 20-29 | 1,4 | 2 942 | 22,5 | 70,1 | 10,0 | 7,9 | 2,1 | 19,9 | 14,9 | 5,0 | 2 343 | |
| 30-39 | 0,9 | 2 088 | 24,6 | 54,1 | 7,7 | 6,1 | 1,6 | 38,2 | 22,1 | 16,1 | 1 775 | |
| 40-49 | 0,9 | 1 362 | 25,1 | 51,6 | 6,5 | 4,9 | 1,6 | 41,9 | 23,6 | 18,3 | 1 310 | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 1,1 | 475 | 26,0 | 46,2 | 6,1 | 5,2 | 0,9 | 47,7 | 23,3 | 24,4 | 439 | |
| Autres villes | 1,3 | 2 889 | 23,9 | 57,4 | 10,0 | 7,4 | 2,6 | 32,6 | 20,1 | 12,6 | 2 524 | |
| Ensemble urbain | 1,2 | 3 364 | 24,2 | 55,7 | 9,4 | 7,1 | 2,3 | 34,9 | 20,5 | 14,3 | 2 963 | |
| Rural | 1,6 | 4 698 | 22,3 | 68,6 | 12,3 | 9,3 | 3,0 | 19,1 | 13,3 | 5,8 | 3 983 | |
| Département | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 0,6 | 920 | 23,1 | 64,9 | 10,0 | 7,3 | 2,7 | 25,1 | 17,5 | 7,6 | 770 | |
| Atacora | 1,6 | 680 | 21,3 | 72,3 | 15,4 | 12,2 | 3,2 | 12,3 | 9,9 | 2,5 | 585 | |
| Atlantique | 1,9 | 1 035 | 23,8 | 58,8 | 9,8 | 7,1 | 2,7 | 31,4 | 16,7 | 14,7 | 910 | |
| Borgou | 1,2 | 939 | 22,3 | 68,2 | 11,9 | 8,5 | 3,4 | 19,9 | 13,8 | 6,2 | 783 | |
| Collines | 0,8 | 558 | 23,1 | 67,6 | 8,3 | 5,8 | 2,5 | 24,1 | 15,0 | 9,0 | 482 | |
| Couffo | 0,5 | 519 | 22,2 | 72,9 | 9,3 | 7,9 | 1,3 | 17,8 | 13,6 | 4,2 | 433 | |
| Donga | 0,4 | 463 | 23,7 | 64,5 | 5,6 | 4,0 | 1,7 | 29,9 | 22,5 | 7,4 | 375 | |
| Littoral | 1,1 | 475 | 26,0 | 46,2 | 6,1 | 5,2 | 0,9 | 47,7 | 23,3 | 24,4 | 439 | |
| Mono | 3,3 | 373 | 23,0 | 60,4 | 13,5 | 10,0 | 3,6 | 26,1 | 17,0 | 9,0 | 326 | |
| Ouémé | 1,5 | 755 | 23,9 | 53,0 | 13,1 | 9,5 | 3,6 | 33,8 | 21,3 | 12,5 | 682 | |
| Plateau | 2,1 | 489 | 22,5 | 64,5 | 15,5 | 11,3 | 4,2 | 20,0 | 13,0 | 6,9 | 416 | |
| Zou | 2,6 | 857 | 22,9 | 64,3 | 12,4 | 10,1 | 2,3 | 23,3 | 15,3 | 8,0 | 745 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 1,3 | 4 464 | 23,0 | 65,0 | 10,4 | 7,9 | 2,4 | 24,6 | 16,3 | 8,3 | 3 785 | |
| Primaire | 2,4 | 1 569 | 23,6 | 58,1 | 12,2 | 9,0 | 3,2 | 29,7 | 16,9 | 12,8 | 1 349 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,6 | 1 459 | 22,7 | 65,1 | 12,4 | 9,6 | 2,8 | 22,5 | 14,5 | 8,0 | 1 295 | |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | 0,2 | 569 | 24,2 | 56,7 | 10,0 | 6,6 | 3,4 | 33,3 | 20,5 | 12,9 | 517 | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 2,2 | 1 290 | 21,2 | 72,3 | 16,3 | 12,2 | 4,0 | 11,5 | 9,4 | 2,0 | 1 080 | |
| Second | 1,7 | 1 455 | 22,0 | 71,7 | 12,2 | 9,9 | 2,3 | 16,0 | 11,7 | 4,3 | 1 213 | |
| Moyen | 1,4 | 1 664 | 22,6 | 68,1 | 10,9 | 8,4 | 2,6 | 20,9 | 15,2 | 5,7 | 1 432 | |
| Quatrième | 1,1 | 1 788 | 23,5 | 59,4 | 10,6 | 7,6 | 3,0 | 30,0 | 19,5 | 10,6 | 1 542 | |
| Le plus élevé | 1,2 | 1 864 | 25,3 | 50,1 | 7,4 | 5,3 | 2,1 | 42,5 | 22,5 | 20,0 | 1 678 | |
| Ensemble | 1,5 | 8 061 | 23,1 | 63,1 | 11,1 | 8,3 | 2,7 | 25,8 | 16,4 | 9,4 | 6 946 | |

Note : L'Indice de masse Corporelle (IMC) est le ratio du poids en kilogrammes par rapport au carré de la taille en mètres (kg/m²).

¹ Sont exclues les femmes enceintes et les femmes ayant eu une naissance dans les 2 mois précédents.

Tableau 11.12 Prévalence de l'anémie chez les femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans atteintes d'anémie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Anémie selon le niveau d'hémoglobine | | | | Effectif de femmes | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-----------|
| | | Anémie | Légère | Modérée | | Sévère |
| | Non-enceinte | <12,0 g/dl | 11,0-11,9 g/dl | 8,0-10,9 g/dl | | <8,0 g/dl |
| Enceinte | <11,0 g/dl | 10,0-10,9 g/dl | 7,0-9,9 g/dl | <7,0 g/dl | | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | | 57,4 | 25,6 | 29,5 | 2,3 | 1 662 |
| 20-29 | | 56,7 | 25,6 | 29,5 | 1,5 | 2 926 |
| 30-39 | | 57,7 | 25,1 | 30,5 | 2,1 | 2 074 |
| 40-49 | | 60,5 | 26,4 | 32,3 | 1,8 | 1 356 |
| Nombre d'enfants déjà nés | | | | | | |
| 0 | | 55,8 | 25,2 | 28,6 | 2,1 | 2 038 |
| 1 | | 58,9 | 27,5 | 29,3 | 2,1 | 1 025 |
| 2-3 | | 57,0 | 24,4 | 30,8 | 1,9 | 1 933 |
| 4-5 | | 57,9 | 25,6 | 30,3 | 2,0 | 1 578 |
| 6+ | | 60,3 | 26,5 | 32,5 | 1,3 | 1 445 |
| Maternité | | | | | | |
| Enceinte | | 68,4 | 22,5 | 43,7 | 2,2 | 872 |
| Allaite | | 56,5 | 27,0 | 28,1 | 1,4 | 2 300 |
| Ni l'un, ni l'autre | | 56,4 | 25,5 | 28,9 | 2,0 | 4 847 |
| Utilise un DIU | | | | | | |
| Oui | | 61,6 | 24,1 | 37,0 | 0,5 | 98 |
| Non | | 57,7 | 25,6 | 30,2 | 1,9 | 7 920 |
| Utilisation de cigarettes¹ | | | | | | |
| Fume des cigarettes | | 65,1 | 24,1 | 35,9 | 5,0 | 115 |
| Ne fume pas des cigarettes | | 57,6 | 25,6 | 30,2 | 1,8 | 7 903 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | | 60,7 | 30,0 | 27,3 | 3,4 | 463 |
| Autres villes | | 57,0 | 25,8 | 29,8 | 1,4 | 2 871 |
| Ensemble urbain | | 57,5 | 26,4 | 29,4 | 1,7 | 3 334 |
| Rural | | 57,9 | 25,1 | 30,8 | 2,0 | 4 685 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | | 57,5 | 25,2 | 29,9 | 2,3 | 919 |
| Atacora | | 67,4 | 28,0 | 37,3 | 2,2 | 681 |
| Atlantique | | 60,2 | 27,5 | 31,3 | 1,4 | 1 030 |
| Borgou | | 51,1 | 22,0 | 27,2 | 2,0 | 924 |
| Collines | | 39,5 | 18,4 | 20,0 | 1,1 | 560 |
| Couffo | | 61,3 | 23,9 | 35,0 | 2,4 | 514 |
| Donga | | 50,0 | 27,5 | 21,7 | 0,9 | 462 |
| Littoral | | 60,7 | 30,0 | 27,3 | 3,4 | 463 |
| Mono | | 58,9 | 27,8 | 30,1 | 1,0 | 372 |
| Ouémé | | 69,5 | 26,4 | 40,9 | 2,2 | 746 |
| Plateau | | 70,5 | 25,6 | 43,3 | 1,6 | 491 |
| Zou | | 48,7 | 26,7 | 20,3 | 1,7 | 857 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | | 59,3 | 25,3 | 31,7 | 2,2 | 4 451 |
| Primaire | | 58,6 | 28,1 | 29,2 | 1,2 | 1 558 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | | 53,8 | 24,1 | 28,1 | 1,6 | 1 451 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | | 53,4 | 25,3 | 26,5 | 1,6 | 559 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | | 63,1 | 26,7 | 34,5 | 2,0 | 1 290 |
| Second | | 58,3 | 24,0 | 32,6 | 1,7 | 1 449 |
| Moyen | | 58,4 | 26,7 | 29,5 | 2,2 | 1 663 |
| Quatrième | | 55,8 | 25,1 | 29,0 | 1,7 | 1 782 |
| Le plus élevé | | 54,8 | 25,7 | 27,3 | 1,9 | 1 836 |
| Ensemble | | 57,7 | 25,6 | 30,2 | 1,9 | 8 018 |

Note : La prévalence est ajustée en fonction de l'altitude et du statut tabagique, si l'information est disponible, en utilisant les formules du CDC (CDC 1998).

¹ Y compris les cigarettes commerciales et cigarettes roulées.

Tableau 11.13 Consommation de micronutriments par les mères

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, pendant la grossesse de leur dernier enfant et pourcentage qui ont pris des vermifuges au cours de la grossesse de leur dernier enfant et parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête et qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Parmi les femmes ayant eu un enfant dans les 5 dernières années : | | | | | | Parmi les femmes ayant eu un enfant dans les 5 dernières années qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé : | | | |
|--|---|------|-------|------|--------------------------|-------|--|--------------------|--|-------|
| | Nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, en comprimés ou en sirop, au cours de la grossesse de leur dernière naissance | | | | | | Pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges pendant la grossesse de la dernière naissance | Effectif de femmes | Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé ¹ | |
| | Aucun | <60 | 60-89 | 90+ | Ne sait pas/ manquant | Total | | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 19,0 | 23,6 | 5,3 | 43,4 | 8,7 | 100,0 | 52,6 | 506 | 90,1 | 491 |
| 20-29 | 14,0 | 20,5 | 5,8 | 46,7 | 13,0 | 100,0 | 63,3 | 4 472 | 91,3 | 4 374 |
| 30-39 | 12,9 | 18,8 | 5,9 | 48,2 | 14,2 | 100,0 | 68,4 | 3 190 | 91,2 | 3 118 |
| 40-49 | 16,0 | 16,5 | 6,6 | 47,1 | 13,7 | 100,0 | 63,9 | 862 | 93,8 | 836 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 2,9 | 17,1 | 3,4 | 60,3 | 16,4 | 100,0 | 90,6 | 408 | 85,7 | 389 |
| Autres villes | 9,6 | 17,8 | 5,8 | 52,4 | 14,4 | 100,0 | 70,2 | 3 115 | 90,2 | 3 050 |
| Ensemble urbain | 8,8 | 17,7 | 5,5 | 53,3 | 14,7 | 100,0 | 72,6 | 3 523 | 89,7 | 3 439 |
| Rural | 17,5 | 20,9 | 6,1 | 43,1 | 12,4 | 100,0 | 59,4 | 5 508 | 92,5 | 5 381 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 26,7 | 22,3 | 3,5 | 40,7 | 6,7 | 100,0 | 50,4 | 1 226 | 97,0 | 1 219 |
| Atacora | 23,2 | 23,5 | 9,7 | 29,9 | 13,7 | 100,0 | 33,8 | 800 | 98,8 | 793 |
| Atlantique | 2,0 | 8,2 | 5,2 | 71,6 | 13,0 | 100,0 | 89,2 | 1 043 | 85,0 | 998 |
| Borgou | 35,0 | 12,8 | 5,9 | 37,9 | 8,4 | 100,0 | 33,8 | 1 164 | 93,2 | 1 147 |
| Collines | 6,0 | 24,4 | 9,0 | 52,6 | 7,9 | 100,0 | 64,4 | 604 | 93,7 | 590 |
| Couffo | 10,6 | 20,5 | 6,9 | 27,8 | 34,2 | 100,0 | 57,9 | 583 | 98,1 | 564 |
| Donga | 10,9 | 13,9 | 10,6 | 46,7 | 17,8 | 100,0 | 65,3 | 599 | 95,2 | 597 |
| Littoral | 2,9 | 17,1 | 3,4 | 60,3 | 16,4 | 100,0 | 90,6 | 408 | 85,7 | 389 |
| Mono | 9,0 | 33,5 | 3,7 | 40,5 | 13,4 | 100,0 | 73,2 | 393 | 80,8 | 378 |
| Ouémé | 3,5 | 19,7 | 3,4 | 54,7 | 18,7 | 100,0 | 94,0 | 798 | 86,0 | 763 |
| Plateau | 9,5 | 29,5 | 7,4 | 38,0 | 15,6 | 100,0 | 76,1 | 550 | 90,2 | 532 |
| Zou | 5,1 | 24,5 | 3,8 | 59,3 | 7,3 | 100,0 | 78,2 | 863 | 85,6 | 849 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucun | 18,8 | 19,0 | 6,3 | 42,9 | 13,0 | 100,0 | 57,5 | 5 807 | 92,3 | 5 675 |
| Primaire | 7,4 | 22,5 | 5,6 | 51,1 | 13,5 | 100,0 | 73,5 | 1 650 | 88,3 | 1 614 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,9 | 21,4 | 4,6 | 55,6 | 13,5 | 100,0 | 80,2 | 1 150 | 91,6 | 1 119 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,3 | 13,8 | 4,1 | 65,4 | 15,4 | 100,0 | 84,9 | 423 | 90,5 | 412 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 33,7 | 17,9 | 5,8 | 31,3 | 11,3 | 100,0 | 40,9 | 1 827 | 94,0 | 1 788 |
| Second | 16,7 | 22,8 | 6,1 | 41,8 | 12,7 | 100,0 | 57,1 | 1 827 | 93,7 | 1 790 |
| Moyen | 11,1 | 22,0 | 7,1 | 47,6 | 12,3 | 100,0 | 64,4 | 1 837 | 91,4 | 1 791 |
| Quatrième | 6,1 | 19,6 | 6,3 | 53,8 | 14,1 | 100,0 | 74,4 | 1 857 | 89,8 | 1 817 |
| Le plus élevé | 2,3 | 15,9 | 3,8 | 61,9 | 16,1 | 100,0 | 87,7 | 1 683 | 87,8 | 1 634 |
| Ensemble | 14,1 | 19,7 | 5,9 | 47,1 | 13,3 | 100,0 | 64,6 | 9 031 | 91,4 | 8 819 |

¹ Non compris les femmes des ménages dans lesquels le sel n'a pas été testé.

Résultats clés

- **Mortalité infanto-juvénile** : Au Bénin, pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, sur 1 000 naissances vivantes, 96 sont décédées avant leur cinquième anniversaire.
- **Mortalité infantile** : Pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, sur 1 000 naissances vivantes, 55 sont décédées avant leur premier anniversaire.
- **Variation selon l'intervalle avec la naissance précédente** : Le risque de décès des enfants de moins de 5 ans a tendance à diminuer de manière importante avec l'allongement de la durée de l'intervalle intergénéral, passant de 165 ‰ quand la durée est inférieure à 2 ans à 68 ‰ quand elle est d'au moins 4 années.
- **Variation selon quintile de bien-être économique** : Le risque de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire a tendance à diminuer du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 108 ‰ à 60 ‰.

La mortalité des enfants est non seulement un indicateur du niveau de développement socio-économique d'un pays, mais il permet aussi d'identifier les problèmes et d'évaluer les besoins en matière de santé dans un pays. Les informations sur la mortalité des enfants permettent également d'identifier les enfants à hauts risques de mortalité et de mettre en place des stratégies pour réduire ces risques, comme par exemple, la promotion de l'espacement des naissances.

Ce chapitre présente les niveaux, tendances et différentiels de la mortalité périnatale, néonatale, infantile et infanto-juvénile. Il présente aussi les facteurs biodémographiques et les comportements procréateurs qui contribuent à augmenter les risques de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Les indicateurs de mortalité sont calculés à partir d'informations obtenues à partir de l'historique des naissances, dans lequel les femmes déclarent toutes les naissances qu'elles ont eues. Pour chaque enfant, la date de naissance, l'état de survie, l'âge actuel ou l'âge au décès sont collectés.

La qualité des estimations de la mortalité calculées à partir des informations provenant de l'historique des naissances dépend de la capacité de la mère à se souvenir de tous les enfants à qui elle a donné naissance mais aussi de leur date de naissance et de leur âge au décès. Les problèmes qui peuvent affecter la qualité des données sont :

- L'omission sélective dans l'historique des naissances de celles qui n'ont pas survécu ; ce qui peut induire une sous-estimation de la mortalité des enfants.
- Le déplacement des dates de naissances ; ce qui peut biaiser les tendances de la mortalité. Cela arrive quand un enquêteur enregistre sciemment une naissance à une date différente de celle à laquelle elle s'est produite. Cela peut aussi arriver quand un enquêteur essaye de diminuer sa charge de travail en esquivant toutes les questions supplémentaires qui portent sur les naissances ayant eu lieu au cours des 5 années avant l'enquête.

- La mauvaise déclaration de l'âge au décès : une mauvaise déclaration de l'âge de l'enfant au décès peut biaiser les variations par âge de la mortalité, en particulier si l'effet net de la mauvaise déclaration de l'âge est le transfert des décès d'une tranches d'âges à une autre.
- La corrélation entre les risques de mortalité des mères et des enfants : toute méthode de mesure de la mortalité des enfants qui repose sur les déclarations de la mère, comme l'historique des naissances, suppose que la mortalité adulte féminine n'est pas élevée, ou si c'est le cas, qu'il y a peu ou aucune corrélation entre les risques de mortalité des mères et ceux de leurs enfants.

Les indicateurs de la qualité des données de la mortalité sur lesquels les estimations de ce chapitre sont basées, figurent en Annexe C, **Tableaux C.3 à C.6**.

12.1 MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS

Quotient de mortalité néonatale : probabilité de décéder avant d'atteindre un mois.

Quotient de mortalité post-néonatale : probabilité de décéder entre le premier mois et le premier anniversaire (calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale).

Quotient de mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire.

Quotient de mortalité juvénile : probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire.

Quotient de mortalité infanto-juvénile : probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire.

Les résultats du **Tableau 12.1** révèlent qu'au Bénin, le quotient de mortalité infantile pour la période de 5 ans avant l'enquête est estimée à 55 %. Ces résultats montrent qu'environ un enfant sur 20 décède avant d'atteindre son premier anniversaire. Quant à la mortalité juvénile, elle est estimée à 44 %, ce qui signifie qu'environ un enfant sur 25 décède entre le premier et le cinquième anniversaire.

Les deux composantes de la mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité néonatale et la mortalité postnéonatale, sont estimées respectivement à 30 % et à 25 %. Le poids de la mortalité néonatale dans la mortalité infantile est donc plus important que celui de la mortalité post-néonatale (55 % par rapport à 45 %).


Globalement, le quotient de mortalité infanto-juvénile est de 96 %. En d'autres termes, environ un enfant sur dix n'atteint pas son cinquième anniversaire.

Tendances : En excluant les taux calculés avec l'EDSB-IV, comme il a été dit auparavant ont été sous-estimés, le **Graphique 12.1** montre une baisse continue de la mortalité des enfants depuis 2001. La vitesse de cette baisse, cependant, aurait diminué au cours des 10-12 dernières années.

Le risque de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire est passé de 160 % en 2001 à 96 % en 2017-2018 : soit une baisse de 64 points de pourcentage en 16 ans. Si l'on veut réaliser l'objectif

Graphique 12.1 Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Décès pour 1 000 naissances vivantes par période de 5 ans avant l'enquête



* L'évaluation de la qualité des données de l'EDSB-IV de 2011-2012 avait révélé une sous-estimation des indicateurs de mortalité des enfants due à la sous-déclarations des naissances. Pour cela, ces estimations sont inclus dans le graphique mais exclut des lignes de tendances.

de l'ODD3 qui fixe le taux de mortalité infanto-juvénile à atteindre en 2030 à 25 ‰, on réalise l'importance de l'effort à faire dans le cas où la même tendance se maintiendrait.

Sur la même période, le quotient de mortalité infantile est passé de 89 ‰ à 55 ‰ (soit une diminution de 34 points de pourcentage) et celui de la mortalité néonatale est passé de 38 ‰ à 30 ‰ (soit une baisse de 8 points de pourcentage).

Variations par caractéristique

La mortalité des enfants varie selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Les niveaux de mortalité par sexe et par milieu de résidence présentés sont calculés pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête (**Tableau 12.2**).

- Quel que soit le type de mortalité considéré, le risque de décès est plus élevé en milieu rural. Ainsi, le quotient de mortalité infanto-juvénile est de 81 ‰ pour le milieu urbain et 106 ‰ pour le milieu rural. Pour ce qui est de la mortalité infantile, ce risque est de 49 ‰ pour le milieu urbain contre 59 ‰ pour le milieu rural.
- Quel que soit le type de mortalité, on note une surmortalité masculine. Pour la mortalité infantile, le quotient est de 62 ‰ pour le sexe masculin contre 48 ‰ pour le sexe féminin (**Tableau 12.2**).


Les estimations des niveaux de mortalité selon les autres caractéristiques sociodémographiques telles que le département de résidence, le niveau d'instruction de la mère et le quintile de bien-être économique, sont calculées pour la période des 10 années avant l'enquête (**Tableau 12.3**). Cette période de référence plus longue permet de disposer dans chaque sous-groupe d'un nombre de cas suffisamment important pour permettre le calcul des indicateurs.

- C'est dans la Donga et l'Atacora que le quotient de mortalité infanto-juvénile est le plus élevé avec des niveaux respectifs de 129 ‰ et 122 ‰ (**Graphique 12.2**). A l'opposé, l'Ouémé et le Littoral enregistrent les niveaux les plus faibles (respectivement 74 ‰ et 64 ‰). En ce qui concerne la mortalité infantile, on constate qu'elle est plus élevée dans la Donga et le Plateau avec respectivement 85 ‰ et 78 ‰, tandis que ses niveaux les plus faibles sont observés dans le Littoral (45 ‰) et l'Ouémé (28 ‰). Le quotient de mortalité néonatale varie d'un maximum de 45 ‰ dans la Donga à un minimum de 16 ‰ dans l'Ouémé.

- Plus le niveau d'instruction de la mère est élevé, plus les risques de mortalité des enfants sont faibles. En effet, le quotient de mortalité infantile est plus élevé chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction (62 ‰) que chez ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (57 ‰). La mortalité juvénile est estimée à 49 ‰ pour les enfants dont la mère n'a aucun niveau

Graphique 12.2 Mortalité infanto-juvénile par département

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



d'instruction, a 39 % quand la mère a le niveau primaire et a 25 % quand elle a le niveau secondaire 1^{er} cycle.

- Le niveau de vie du ménage est négativement associé aux risques de mortalité aux jeunes âges. Les risques de décès pour les enfants dont les ménages sont classés dans les deux quintiles de bien-être économique les plus pauvres, sont en général plus élevés que ceux du quintile le plus riche. Ainsi, le quotient de mortalité infanto-juvénile varie de 108 ‰ dans le quintile le plus bas et 124 ‰ dans le second quintile, à 60 ‰ dans le quintile le plus élevé (**Graphique 12.3**).

12.2 FACTEURS DE RISQUE BIODÉMOGRAPHIQUES

De nombreuses études ont mis en évidence le rôle déterminant de certains facteurs de risque (en relation avec les caractéristiques de la mère et de l'enfant) sur les différences de mortalité des enfants. Les **Tableaux 12.2** et **12.3** présentent les niveaux de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile en fonction de ces facteurs de risque.


Les enfants dont la mère était âgée de moins de 20 ans à leur naissance courent un risque plus élevé de décéder avant d'atteindre leur 5^{ème} anniversaire que ceux dont la mère était âgée de 20-29 ans (119 ‰ contre 98 ‰).

Le rang de naissance influence les probabilités de décéder des enfants de moins de 5 ans : globalement, les risques de mortalité augmentent avec le rang de naissance, passant pour la mortalité infantile de 58 ‰ au rang un à 79 ‰ aux rangs 7 et plus et, pour la mortalité infanto-juvénile, de respectivement 96 ‰ à 134 ‰.


Le risque de décès chez les enfants avant le 5^e anniversaire varie en fonction de l'intervalle intergénéral (temps écoulé par rapport à la naissance précédente). En effet, le quotient de mortalité infanto-juvénile a tendance à diminuer avec l'augmentation de l'intervalle entre naissances, passant de 165 ‰ quand l'intervalle est inférieur à 2 ans à 82 ‰ quand il est de 3 ans et à 68 ‰ quand il est d'au moins 4 années (**Graphique 12.4**).

La taille des enfants à la naissance affecte aussi les risques de décéder. Le quotient de mortalité infantile chez les enfants petits/très petits à la naissance est de 75 ‰ contre 46 ‰ pour ceux qui étaient moyens/gros. De même, le quotient de mortalité néonatale parmi les enfants petits/très petits à la naissance est pratiquement le double de celui des enfants de poids moyen/gros (45 ‰ contre 23 ‰).

Graphique 12.3 Mortalité infanto-juvénile par bien-être économique du ménage



Graphique 12.4 Mortalité des enfants de moins de 5 ans selon l'intervalle avec la naissance précédente



12.3 MORTALITÉ PÉRINATALE

Taux de mortalité périnatale

Les décès périnataux comprennent les mort-nés (décès fœtaux qui se sont produits après 7 mois de grossesse) et les décès néonataux précoces (décès de naissances vivantes qui se sont produits entre 0-6 jours). Le taux de mortalité périnatale est la somme des décès périnataux divisés par le nombre de grossesses de 7 mois ou plus, exprimé pour 1000.

Échantillon : Nombre de grossesses de 7 mois ou plus des femmes de 15-49 ans au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.


Pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, 121 mort-nés et 335 décès néonataux précoces ont été enregistrés pour 13 663 grossesses de 7 mois ou plus. Le taux de mortalité périnatale est donc estimé à 33 ‰ (Tableau 12.4).

Variations par caractéristique

- Les maternités précoces (avant 20 ans) et tardives (après 40 ans) sont associées à des risques accrus de mortalité périnatale. En effet, le taux de mortalité périnatale est plus élevé parmi les femmes qui ont eu leur naissance avant l'âge de 20 ans ou après 40 ans (respectivement 40 ‰ et 59 ‰) contre 28 ‰ quand l'âge de la mère était de 20-29 ans (Graphique 12.5).
- Le niveau de la mortalité périnatale est nettement plus faible à Cotonou que dans le reste du pays (19 ‰ contre 33-34 ‰ dans les autres villes ou dans le milieu rural).
- Les départements du Plateau et de l'Atlantique présentent les niveaux les plus élevés (respectivement 64 ‰ et 45 ‰). A l'opposé, le Littoral et l'Atacora enregistrent les niveaux les plus faibles (respectivement 19 ‰ et 21 ‰).

Graphique 12.5 Mortalité périnatale par l'âge de la mère à la naissance de l'enfant

Décès pour 1 000 grossesses de 7 mois ou plus pour les 5 années ayant précédé l'enquête



12.4 COMPORTEMENTS PROCRÉATEURS À HAUTS RISQUES

Certaines caractéristiques démographiques et biologiques comme l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, le rang de naissance de l'enfant et l'intervalle intergénésiq ue jouent un rôle déterminant dans la survie des enfants aux jeunes âges. Les résultats de ces études révèlent que la probabilité de décès des enfants est plus élevée parmi ceux qui sont nés des mères adolescentes (moins de 18 ans) ou de mère d'âges avancés (plus de 34 ans). Un intervalle intergénésiq ue court (moins de 24 mois après la naissance précédente) et un rang de naissance élevé (supérieur à trois) augmentent les risques de décès des enfants. Les risques de décès sont plus élevés lorsque ces facteurs sont combinés.

- Plus de la moitié des naissances ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête (54 %) sont classées dans la catégorie à hauts risques évitables : 36 % sont à haut risque unique et 18 % à hauts risques multiples (Tableau 12.5).
- Par ailleurs, 28 % des naissances ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête ne sont situées dans aucune catégorie à haut risque évitable. Par rapport à cette catégorie :

- Les naissances issues de la catégorie à haut risque unique ont un ratio de risque de 1,19 : un âge précoce à la maternité et un intervalle intergénérisique court sont associées à des risques de mortalité élevés (ratio de risque de respectivement 1,36 et 1,67).
- Les naissances issues de la catégorie à haut risque multiple ont un ratio de risque de 1,64 et plus particulièrement celles cumulant les trois risques (âge de la mère supérieur à 34 ans, intervalle intergénérisique inférieur à 24 mois et rang de naissance supérieur à 3) et celles cumulant les deux risques (intervalle intergénérisique inférieur à 24 mois et rang de naissance supérieur à 3) dont les ratios de risques sont de respectivement 2,19 et 2,32.
- Les résultats montrent enfin que 17 % des femmes actuellement en union ne courent aucun risque si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, alors que 5 % sont dans la catégorie à risque inévitable. Plus des trois quarts des femmes en union (79 %) seraient classées dans une catégorie à haut risque évitable si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête dont 32 % dans la catégorie à haut risque unique et 47 % dans celle à haut risque multiple (**Tableau 12.5**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la mortalité des enfants, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 12.1** Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans
- **Tableau 12.2** Quotients de mortalité des enfants sur une période de 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques
- **Tableau 12.3** Quotients de mortalité des enfants sur une période de 10 ans selon d'autres caractéristiques
- **Tableau 12.4** Mortalité périnatale
- **Tableau 12.5** Comportement procréateur à hauts risques

Tableau 12.1 Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Quotients de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de 5 ans ayant précédé l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Nombre d'années avant l'enquête | Mortalité néonatale (NN) | Mortalité postnéonatale (PNN) ¹ | Mortalité infantile (1q ₀) | Mortalité juvénile (4q ₁) | Mortalité infanto-juvénile (5q ₀) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| 0-4 | 30 | 25 | 55 | 44 | 96 |
| 5-9 | 35 | 29 | 65 | 47 | 109 |
| 10-14 | 34 | 35 | 69 | 51 | 116 |

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

Tableau 12.2 Quotients de mortalité des enfants sur une période de 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques démographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique démographique | Mortalité néonatale (NN) | Mortalité postnéonatale (PNN) ¹ | Mortalité infantile (1q ₀) | Mortalité juvénile (4q ₁) | Mortalité infanto-juvénile (5q ₀) |
|-------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| Sexe de l'enfant | | | | | |
| Masculin | 36 | 26 | 62 | 44 | 104 |
| Féminin | 24 | 24 | 48 | 43 | 89 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 15 | 15 | 30 | 15 | 44 |
| Autres villes | 29 | 22 | 51 | 36 | 85 |
| Ensemble urbain | 28 | 21 | 49 | 33 | 81 |
| Rural | 31 | 27 | 59 | 50 | 106 |
| Ensemble | 30 | 25 | 55 | 44 | 96 |

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

Tableau 12.3 Quotients de mortalité des enfants sur une période de 10 ans selon d'autres caractéristiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête, selon d'autres caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique démographique | Mortalité néonatale (NN) | Mortalité postnéonatale (PNN) ¹ | Mortalité infantile (iQ ₀) | Mortalité juvénile (4q ₁) | Mortalité infanto-juvénile (5q ₀) |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| Âge de la mère à la naissance de l'enfant | | | | | |
| <20 | 41 | 29 | 70 | 53 | 119 |
| 20-29 | 28 | 27 | 55 | 45 | 98 |
| 30-39 | 34 | 27 | 61 | 42 | 100 |
| 40-49 | 56 | 21 | 78 | (42) | (117) |
| Rang de naissance | | | | | |
| 1 | 35 | 23 | 58 | 41 | 96 |
| 2-3 | 27 | 26 | 53 | 41 | 92 |
| 4-6 | 32 | 29 | 61 | 49 | 107 |
| 7+ | 45 | 33 | 79 | 61 | 134 |
| Intervalle avec la naissance précédente² | | | | | |
| <2 années | 58 | 46 | 104 | 68 | 165 |
| 2 années | 26 | 29 | 55 | 49 | 101 |
| 3 années | 23 | 21 | 44 | 41 | 82 |
| 4 années+ | 27 | 16 | 44 | 25 | 68 |
| Taille à la naissance³ | | | | | |
| Petit/très petit | 45 | 31 | 75 | na | na |
| Moyen ou plus gros que la moyenne | 23 | 23 | 46 | na | na |
| Département | | | | | |
| Alibori | 28 | 26 | 53 | 47 | 98 |
| Atacora | 27 | 36 | 63 | 63 | 122 |
| Atlantique | 43 | 23 | 66 | 46 | 108 |
| Borgou | 31 | 21 | 52 | 37 | 87 |
| Collines | 37 | 28 | 66 | 40 | 103 |
| Couffo | 30 | 32 | 62 | 54 | 112 |
| Donga | 45 | 40 | 85 | 48 | 129 |
| Littoral | 24 | 21 | 45 | 20 | 64 |
| Mono | 36 | 26 | 62 | 45 | 104 |
| Ouémé | 16 | 12 | 28 | 47 | 74 |
| Plateau | 43 | 35 | 78 | 45 | 119 |
| Zou | 36 | 32 | 67 | 43 | 108 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | |
| Aucun | 33 | 30 | 62 | 49 | 109 |
| Primaire | 37 | 20 | 57 | 39 | 94 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 29 | 23 | 52 | 25 | 77 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 31 | 26 | 57 | (51) | (105) |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 30 | 33 | 63 | 48 | 108 |
| Second | 39 | 32 | 70 | 58 | 124 |
| Moyen | 30 | 27 | 56 | 53 | 106 |
| Quatrième | 39 | 25 | 65 | 41 | 103 |
| Le plus élevé | 24 | 15 | 39 | 22 | 60 |

Note : Les valeurs entre parenthèse sont basées sur 250-499 cas non pondérés de personnes-années d'exposition au risque de décéder.
na = Non applicable

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale.

² Non compris les naissances de rang 1.

³ Quotients pour la période des 5 années avant l'enquête.

Tableau 12.4 Mortalité périnatale

Effectif de mort-nés, de décès néonataux précoces et taux de mortalité périnatale pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Effectifs de mort-nés ¹ | Effectif de décès néonataux précoces ² | Taux de mortalité périnatale ³ | Effectif de grossesses de 7 mois ou plus |
|--|------------------------------------|---|---|--|
| Âge de la mère à la naissance de l'enfant | | | | |
| <20 | 19 | 51 | 40 | 1 751 |
| 20-29 | 57 | 158 | 28 | 7 592 |
| 30-39 | 35 | 101 | 37 | 3 730 |
| 40-49 | 10 | 25 | 59 | 590 |
| Intervalle en mois avec la naissance précédente⁴ | | | | |
| Première grossesse | 31 | 74 | 37 | 2 827 |
| <15 | 13 | 57 | 43 | 1 648 |
| 15-26 | 30 | 92 | 34 | 3 631 |
| 27-38 | 23 | 51 | 27 | 2 695 |
| 39+ | 23 | 62 | 30 | 2 861 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 3 | 7 | 19 | 571 |
| Autres villes | 36 | 120 | 33 | 4 678 |
| Ensemble urbain | 39 | 127 | 32 | 5 249 |
| Rural | 82 | 208 | 34 | 8 414 |
| Département | | | | |
| Alibori | 23 | 35 | 31 | 1 845 |
| Atacora | 6 | 20 | 21 | 1 214 |
| Atlantique | 18 | 52 | 45 | 1 567 |
| Borgou | 6 | 43 | 28 | 1 779 |
| Collines | 6 | 21 | 31 | 870 |
| Couffo | 13 | 15 | 31 | 909 |
| Donga | 7 | 27 | 37 | 930 |
| Littoral | 3 | 7 | 19 | 571 |
| Mono | 5 | 15 | 33 | 615 |
| Ouémé | 14 | 17 | 26 | 1 203 |
| Plateau | 10 | 44 | 64 | 863 |
| Zou | 10 | 37 | 36 | 1 297 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucun | 84 | 214 | 33 | 8 985 |
| Primaire | 19 | 76 | 38 | 2 482 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 11 | 36 | 29 | 1 620 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 7 | 9 | 28 | 575 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 22 | 55 | 26 | 2 925 |
| Second | 23 | 87 | 39 | 2 814 |
| Moyen | 24 | 59 | 30 | 2 753 |
| Quatrième | 31 | 89 | 43 | 2 756 |
| Le plus élevé | 21 | 45 | 28 | 2 414 |
| Ensemble | 121 | 335 | 33 | 13 663 |

¹ Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.

² Les décès néonataux précoces sont des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.

³ Équivaut à la somme du nombre de mort-nés et de décès néonataux précoces divisée par le nombre de grossesse à 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000.

⁴ Les catégories correspondent aux intervalles entre naissances de <24 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 48 mois ou+ en supposant une durée de grossesse de 9 mois.

Tableau 12.5 Comportement procréateur à hauts risques

Répartition (en %) des enfants nés dans les 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de haut risque de mortalité, ratio de risque et répartition (en %) des femmes actuellement en union par catégorie de risque si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Catégories de risques | Naissances dans les 5 années avant l'enquête | | Pourcentage de femmes actuellement en union ¹ |
|--|--|------------------|--|
| | Pourcentage de naissances | Ratio de risques | |
| Dans aucune catégorie à haut risque | 28,3 | 1,00 | 16,5^a |
| Catégorie à risque inévitable | | | |
| Naissance de rang 1, âge entre 18 et 34 ans | 18,0 | 1,07 | 4,7 |
| Dans une des catégories à hauts risques évitables | 53,7 | 1,34 | 78,8 |
| Catégorie à haut risque unique | | | |
| Âge de la mère <18 | 4,3 | 1,36 | 0,5 |
| Âge de la mère >34 | 1,1 | 0,71 | 2,8 |
| Intervalle inter génésique <24 mois | 6,2 | 1,67 | 11,3 |
| Rang de naissance >3 | 24,1 | 1,06 | 17,2 |
| Sous total | 35,7 | 1,19 | 31,8 |
| Catégorie à hauts risques multiples | | | |
| Âge <18 et intervalle inter génésique <24 mois ² | 0,2 | (1,24) | 0,3 |
| Âge >34 et intervalle inter génésique <24 mois | 0,1 | * | 0,2 |
| Âge >34 et rang de naissance >3 | 11,5 | 1,30 | 28,1 |
| Âge >34 et intervalle inter génésique <24 mois et rang de naissance >3 | 1,2 | 2,19 | 5,2 |
| Intervalle inter génésique <24 mois et rang de naissance >3 | 5,0 | 2,32 | 13,3 |
| Sous total | 18,1 | 1,64 | 47,0 |
| Total | 100,0 | na | 100,0 |
| Dans une des catégories de hauts risques évitables | | | |
| Âge de la mère <18 | 4,5 | 1,36 | 0,7 |
| Âge de la mère >34 | 13,9 | 1,32 | 36,3 |
| Intervalle intergénésique <24 mois | 19,2 | 1,47 | 45,0 |
| Rang de naissance >3 | 41,8 | 1,31 | 63,7 |
| Effectif de naissances/femmes | 13 643 | na | 11 168 |

Note : Le rapport de risque est le rapport de la proportion de naissances décédées parmi les naissances appartenant à chaque catégorie à haut risque spécifique à la proportion de naissances décédées parmi celles n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques. Les valeurs entre parenthèse sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = non applicable

¹ Les femmes sont classées dans les catégories à risque selon le statut qu'elles auraient à la naissance de l'enfant si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête : âge actuel inférieur à 17 ans et 3 mois ou supérieur à 34 ans et 2 mois, la dernière naissance a eu lieu il y a moins de 15 mois ou la dernière naissance était de rang 3 ou plus

² Y compris la catégorie : âge <18 ans et rang de naissance >3

^a Y compris les femmes stérilisées

Résultats clés

- **Connaissance de la transmission et de la prévention :** Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans, respectivement 16 % et 22 % ont une connaissance « approfondie » des moyens de transmission et de prévention du VIH.
- **Connaissance de la transmission de la mère à l'enfant :** 71 % des femmes de 15-49 ans, contre 56 % des hommes de 15-49 ans savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse.
- **Stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH :** 76 % des femmes et 70 % des hommes de 15-49 ans ont des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH.
- **Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête :** Parmi les enquêtés de 15-49 ans, 62 % des femmes et 80 % des hommes n'ont jamais effectué un test.
- **Connaissance complète du VIH :** Parmi les jeunes de 15-24 ans 15 % des femmes et 19 % des hommes ont une connaissance « approfondie » du VIH.

L'épidémie du VIH/sida constitue encore un problème de santé publique malgré les multiples efforts réalisés dans la lutte contre la maladie. Le Syndrome de l'Immunodéficience Acquise (SIDA) se caractérise par l'apparition d'un ensemble de signes consécutifs à l'effondrement du système immunitaire du corps humain. Le sida est la phase ultime de l'infection par le VIH. Celui-ci se transmet essentiellement par voie sexuelle au contact du sang contaminé ou de la mère à l'enfant. Le premier cas de sida a été découvert au Bénin en 1985. Depuis plusieurs années, le sida est classé comme une maladie prioritaire au Bénin. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, des mesures ont été mises en œuvre par le Programme National de la Lutte contre le sida (PNLS), le Comité National de la Lutte contre le sida (CNLS) ainsi que d'autres ONG.

Au cours de l'EDSB-V, des données concernant le niveau de connaissance du VIH/sida, des moyens de prévention et de transmission, des attitudes et du comportement des hommes et des femmes vis-à-vis de cette maladie ont été collectées. Ces données sont utiles pour renforcer le programme de prévention et pour évaluer les résultats des interventions en cours.

13.1 CONNAISSANCE DU VIH/SIDA, DES MOYENS DE TRANSMISSION ET DE PRÉVENTION

Au Bénin, 92 % des femmes et 91 % d'hommes ont déclaré avoir entendu parler du VIH/sida (**Tableau 13.1**).

Les résultats montrent que 72 % des femmes et 74 % des hommes de 15-49 ans savent que l'utilisation des condoms au cours de chaque rapport sexuel peut réduire le risque de contracter le VIH. En outre, la même proportion de femmes et d'hommes de 15-49 ans (80 %) savent aussi que la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté peut aussi réduire le risque de contracter le VIH. Globalement, 68 % des femmes et 70 % des hommes connaissent à la fois ces deux moyens de prévention (**Tableau 13.2**).


Tendances : Entre 2001 et 2006, le pourcentage de femmes connaissant les deux méthodes de prévention a augmenté, passant de 42 % à 73 %. Cette tendance à l'augmentation s'est inversée puisque ce pourcentage a diminué pour ne concerner que 65 % des femmes en 2011-2012, puis 68 % en 2017-2018. Chez les hommes la tendance a évolué de la même manière passant de 45 % en 2001 à 83 % en 2006 et de 74 % en 2011-2012 à 70 % en 2017-2018.

Variations par caractéristique

- C'est parmi les femmes et les hommes de 15-19 ans que le niveau de connaissance des deux méthodes de prévention du VIH est le plus faible (respectivement 59 % et 56 %).
- Les résultats montrent des écarts de connaissance entre les départements. C'est dans le département du Borgou que le pourcentage de femmes qui connaissent les deux moyens de prévention du VIH est le plus faible (44 %) et c'est dans les Collines (75 %), l'Atlantique et le Plateau (74 % dans les deux cas) qu'il est le plus élevé. Chez les hommes de 15-49 ans, c'est dans les départements du Zou (48 %) et de l'Alibori (55 %) que les pourcentages sont les plus faibles et dans le Plateau (88 %) et le Mono (87 %) qu'ils sont les plus élevés (**Graphiques 13.1a** et **13.1b**).


Graphique 13.1a Connaissance du VIH/sida par département : Femme

Pourcentage de femmes qui connaissent les deux moyens de prévention du VIH



Graphique 13.1b Connaissance du VIH/sida par département : Homme

Pourcentage d'hommes qui connaissent les deux moyens de prévention du VIH



- En ce qui concerne le niveau d'instruction, on constate que la connaissance des deux méthodes de prévention est plus faible chez les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction (64 %) et plus élevée chez celles qui ont un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus (82 %). On observe la même tendance chez les hommes.

Connaissance « approfondie » du VIH

Savoir que l'utilisation régulière du condom à chaque rapport sexuel et n'avoir qu'un seul partenaire sexuel fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH, savoir qu'une personne paraissant en bonne santé peut cependant avoir le VIH et rejeter les deux idées locales erronées les plus courantes sur la transmission ou la prévention du VIH.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans et 15-24 ans

Dans l'ensemble, 16 % des femmes et 22 % des hommes de 15-49 ans ont une connaissance considérée comme « approfondie » du sida. Parmi les jeunes de 15-24 ans, ces pourcentages sont respectivement de 15 % et 19 %.

Par ailleurs, 20 % des femmes et 28 % des hommes de 15-49 ans savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida et rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes selon lesquelles le VIH peut être transmis par les piqûres de moustiques et en partageant le repas d'une personne qui a le sida.

Dans le groupe d'âges 15-24 ans, ces proportions sont de 19 % chez les femmes et de 25 % chez les hommes (**Tableau 13.3**).

Tendances : De 2006 à 2011-2012 le pourcentage de femmes ayant une connaissance approfondie du VIH a augmenté passant de 14 % à 22 %. Cette tendance à la hausse ne s'est pas poursuivie puisqu'en 2017-2018, le pourcentage n'est que de seulement 16 %. Chez les hommes, on note qu'entre 2006 et 2011-2012, le pourcentage de ceux qui avaient une connaissance considérée comme « approfondie » du sida n'avait pratiquement pas changé (31 % contre 30 %). Par contre, depuis 2011-2012, on note une baisse, le pourcentage n'étant plus que de 22 %.

Variations par caractéristique

- C'est dans les groupes d'âges 15-19 ans et 40-49 ans que les pourcentages de femmes ayant une connaissance considérée comme « approfondie » sont les plus faibles. À l'opposé, on note un pourcentage plus élevé parmi celles de 25-29 ans et 30-39 ans (17 % dans les deux cas). Chez les hommes, c'est parmi les plus jeunes de 15-19 ans que le pourcentage de ceux qui possèdent les informations correctes sur la connaissance du VIH est le plus faible (14 % contre 26 % à 25-29 ans) (**Tableau 13.3**).


13.2 CONNAISSANCE DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT

Augmenter le niveau de connaissance générale sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant et réduire le risque de transmission en utilisant des médicaments antirétroviraux sont essentiel pour parvenir à réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant (TME). Pour évaluer la connaissance de la TME, on a demandé aux enquêtés si le VIH pouvait être transmis de la mère à l'enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement ou par l'allaitement et, si une mère ayant le VIH pouvait réduire le risque de transmission à son enfant en prenant certains médicaments pendant la grossesse.

Les résultats du **Tableau 13.4** montrent que 71 % des femmes et 56 % des hommes de 15-49 ans savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse, 72 % des femmes et 61 % des hommes savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant l'accouchement et enfin 74 % des femmes et 60 % des hommes connaissent la possibilité de transmission par l'allaitement. Par ailleurs, 54 % des femmes et 46 % des hommes interviewés au cours de l'enquête savent que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère (**Graphique 13.2**).

Graphique 13.2 Connaissance de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME)

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans




Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage de femmes connaissant la possibilité de transmission du VIH par l'allaitement a diminué, passant de 78 % à 70 % en 2011-2012 et à 74 % en 2017-2018. Chez les hommes, on note la même tendance, le pourcentage de ceux qui connaissent cette voie de transmission étant passé de 74 % à 60 % dans la même période.

De 2006 à 2017-2018, le pourcentage de ceux qui savent que le risque de la TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère a augmenté aussi bien chez les femmes que chez les hommes (**Graphique 13.3**).

Graphique 13.3 Connaissance de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME) : Tendances

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère



Variations par caractéristique

- C'est parmi les femmes et les hommes les plus jeunes (15-19 ans) que les pourcentages de ceux qui connaissent tous les éléments de la transmission maternelle du VIH sont les plus faibles.
- Chez les femmes, la méthode la plus connue est la transmission par l'allaitement (74 %) alors que chez les hommes la méthode la plus connue est la transmission pendant l'accouchement (61 %).

13.3 COMPORTEMENTS DE STIGMATISATION ENVERS LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

Un niveau élevé de stigmatisation et de discrimination dans une population peut avoir un impact négatif sur la volonté des individus d'effectuer des tests et sur l'adhésion à des thérapies antirétrovirales (TAR) dans les programmes TAR. Par conséquent, la diminution de ces comportements de stigmatisation et de discrimination dans une population est un indicateur important de la réussite de tout programme dont l'objectif est le contrôle et la prévention du VIH/sida.

Comportements discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

Pour évaluer les comportements discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH, on a posé aux femmes et aux hommes deux questions. Les enquêtés ayant des comportements discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH sont ceux qui ont déclaré qu'ils n'achèteraient pas de légumes frais à un commerçant ou un vendeur s'ils savent que cette personne a le VIH, ou ceux qui ont déclaré que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à fréquenter l'école avec les enfants qui n'ont pas le VIH.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH ou du sida


Les résultats montrent que les attitudes discriminatoires sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, 54 % des femmes ne pensent pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants non infectés contre 42 % chez les hommes. De même, le pourcentage de femmes qui n'achèteraient pas de légumes frais à un commerçant qui a le VIH est de 71 % contre 65 % chez les hommes. Globalement, 76 % des femmes contre 70 % des hommes se comporteraient, dans certaines situations, de façon discriminatoire vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH/sida (**Tableau 13.5**).

Variations par caractéristique

- On note des variations importantes entre milieux de résidence : c'est à Cotonou que les pourcentages de femmes de 15-49 ans qui ont exprimé des opinions discriminatoires sont les plus faibles (57 % contre 79 %).
- Chez les femmes, les comportements discriminatoires sont moins fréquents dans le Littoral que dans le Plateau (57 % contre 92 %). Chez les hommes, on observe un écart de même amplitude entre l'Ouémé et l'Alibori (47 % contre 86 %).
- Chez les femmes comme chez les hommes, on constate que le niveau d'instruction influence les comportements vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH : les pourcentages de femmes et d'hommes qui se comporteraient de façon discriminatoires dans certaines situations ont tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant chez les femmes de 80 % parmi celles sans niveau d'instruction à 51 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, chez les hommes, de respectivement 82 % à 50 % (**Graphique 13.4**).

Graphique 13.4 Comportements discriminatoires* à l'égard des personnes vivant avec le VIH par niveau d'instruction

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant entendu parler du VIH



* Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH devraient fréquenter l'école avec les enfants séronégatifs ou qui n'achèteraient pas des légumes frais à un commerçant ayant le VIH.

13.4 PARTENAIRES SEXUELS MULTIPLES

Étant donné que la transmission du virus du sida s'effectue aussi par voie sexuelle, il est admis que l'infléchissement de la pandémie du sida passe nécessairement par un changement de comportements sexuels. Pour évaluer l'exposition au risque de contracter le virus du sida, au cours de l'EDSB-V, des questions ont été posées sur le nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'enquête.


Parmi les femmes âgées de 15-49 ans, 2 % ont déclaré avoir eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois avant l'enquête et 13 % ont déclaré avoir eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient comme si elles étaient mariées. Parmi celles ayant eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, 23 % ont déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels (**Tableau 13.6.1**).

Chez les hommes de 15-49 ans, les pourcentages sont plus élevés : 22 % ont déclaré avoir eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois avant l'enquête, 31 % ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient comme s'ils étaient mariés et 32 % ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels (**Tableau 13.6.2**).

Le nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie est de 2,1 chez les femmes de 15-49 ans contre 6,0 chez les hommes du même groupe d'âges (**Graphique 13.5**).

Graphique 13.5 Rapports sexuels et utilisation du condom avec un partenaire non régulier

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans



Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient comme si elles étaient mariées est plus élevé chez les femmes célibataires (42 %) et chez celles en rupture d'union (divorcées, séparées ou veuves) (41 %) que chez les femmes en union (1 %).
- Parmi les femmes de 15-49 ans, c'est dans le Littoral qu'on relève le pourcentage le plus élevé (20 %) de celles qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni leur partenaire avec qui elles vivaient comme si elles étaient mariées ; par comparaison, dans le Couffo, ce pourcentage est de 7 %.
- Chez les femmes comme chez les hommes, on constate que l'utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels avec un partenaire non régulier a tendance à augmenter avec le niveau d'instruction, passant, chez les femmes de 12 % parmi celles sans niveau d'instruction à 37 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, chez les hommes, de respectivement 16 % à 51 % (**Tableaux 13.6.1 et 13.6.2**).

13.5 RAPPORTS SEXUELS PAYANTS

Le fait de payer en échange de rapports sexuels crée une situation d'inégalité entre les partenaires pour négocier des rapports sexuels sans risque. Au cours de l'enquête, on a demandé aux hommes s'il leur était déjà arrivé de payer pour des rapports sexuels et si cela était arrivé au cours des 12 derniers mois.

Parmi les hommes de 15-49 ans, 8 % ont déclaré avoir déjà eu des rapports sexuels payants et 4 % en avaient eu au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois, 44 % ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels (**Tableau 13.7**).

Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage d'hommes ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois a augmenté, passant de 1 % à 4 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'hommes ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois est plus élevé dans le groupe d'âges 20-24 ans (6 %) que dans les autres.

13.6 COUVERTURE EN SERVICES DE TESTS DU VIH

La connaissance du statut sérologique vis-à-vis du VIH aide les personnes négatives au VIH à prendre des décisions spécifiques et avoir des comportements sexuels à moindre risques pour ne pas contracter la maladie. Parmi les personnes vivant avec le VIH, la connaissance de leur statut sérologique leur permet de prendre des mesures pour protéger leurs partenaires sexuels, d'accéder à des soins et de recevoir un traitement.

13.6.1 Connaissance de services de test du VIH


Les données montrent que le pourcentage des femmes de 15-49 ans qui savent où se rendre pour effectuer un test du VIH est plus élevé (56 %) que celui des hommes (52 %) du même groupe d'âges. Par ailleurs, Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant effectué un test et ayant reçu le résultat est environ deux fois plus faible que chez les femmes (18 % contre 35 %). En outre, le pourcentage de femmes ayant reçu le résultat du dernier test effectué au cours des 12 derniers mois est deux fois plus élevé que celui des hommes (14 % contre 7 %). Parmi les femmes de 15-49 ans, 62 % n'ont jamais effectué un test contre 80 % chez les hommes du même groupe d'âges (Tableaux 13.8.1 et 13.8.2 et Graphique 13.6).

Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage de femmes et d'hommes qui connaissent un endroit où effectuer un test du VIH a nettement augmenté, passant chez les femmes de 19 % à 56 % et, chez les hommes, de 37 % à 52 %.

Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage de femmes qui ont reçu le résultat du dernier test effectué au cours des 12 derniers mois a doublé, passant de 7 % à 14 %. Par contre, chez les hommes, l'augmentation a été plus faible (de 5 % à 7 % dans la même période) (Graphique 13.7).


Graphique 13.6 Test du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans



Graphique 13.7 Test du VIH récent : Tendances

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant fait un test du VIH dans l'année précédant l'enquête et ayant reçu le résultat




Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant effectué un test de dépistage et qui ont eu reçu les résultats du dernier test varie entre département : chez les femmes, il varie d'un minimum de 20 % dans le département du Borgou à un maximum de 61 % dans le Littoral (**Graphique 13.8a**). Chez les hommes, c'est l'Alibori qui enregistre le pourcentage le plus faible (5 %) et le Littoral qui enregistre le plus élevé (44 %) (**Graphique 13.8b**).


Graphique 13.8a Test du VIH par département : Femme

Pourcentage de femmes ayant fait un test du VIH et a reçu le résultat



Graphique 13.8b Test du VIH par département : Homme


Pourcentage d'hommes ayant fait un test du VIH et a reçu le résultat



- Chez les femmes comme chez les hommes, on constate que les pourcentages de ceux qui ont fait un test au cours des 12 derniers et qui en ont reçu le résultat augmentent avec le niveau d’instruction. Chez les femmes, le pourcentage passe de 11 % parmi celles sans niveau d’instruction à 33 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et chez les hommes, de respectivement 2 % à 20 % (**Graphique 13.9**).

Graphique 13.9 Test du VIH récent par niveau d’instruction

Pourcentage de femmes et d’hommes de 15-49 ans ayant fait un test du VIH dans l’année précédant l’enquête et ayant reçu le résultat



- Le pourcentage de femmes et d’hommes ayant une connaissance de leur statut sérologique récent est plus élevé dans les ménages du quintile le plus élevé que dans les autres.

13.6.2 Test du VIH chez les femmes enceintes


Le dépistage précoce du VIH chez les femmes enceintes est primordial pour réduire la transmission Mère-Enfant ; de même, informer les femmes enceintes sur le VIH contribue également à la prévention et à la réduction du risque de transmission.

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les deux dernières années, 36 % ont reçu des conseils sur le VIH avant le test au cours d’une visite prénatale. Globalement, 30 % des femmes ont reçu des conseils sur le VIH avant le test, ont effectué le test lors d’une visite prénatale et ont reçu le résultat. En outre, 40 % des femmes ont effectué un test du VIH avant l’accouchement et ont reçu le résultat (**Tableau 13.9**).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui ont reçu des conseils sur le VIH, fait un test du VIH au cours d’une visite prénatale et reçu le résultat a plus que doublé, passant de 12 % à 30 % (**Graphique 13.10**).

Graphique 13.10 Test du VIH pendant la grossesse : Tendances

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des 2 années précédant l’enquête, qui ont reçu le conseil sur le VIH, qui ont fait un test du VIH au cours d’une visite prénatale et qui ont reçu le résultat



13.7 CIRCONCISION

Parmi les hommes âgés de 15-49 ans, 95 % sont circoncis. Dans 13 % des cas la circoncision a été effectuée par un agent de santé professionnel et dans 79 % des cas elle été réalisée par des praticiens traditionnels, famille ou amis (**Tableau 13.10**).

Tendance : Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans circoncis n'a pas varié depuis 2006 : de 97 % à 95 % (**Graphique 13.11**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans circoncis par un agent de santé professionnel est plus élevé à Cotonou (32 %) qu'en milieu rural (10 %).
- Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans circoncis par un agent de santé professionnel varie de 40 % dans le Mono à 1 % dans l'Alibori.
- Le recours à un praticien traditionnel pour effectuer la circoncision a tendance à diminuer des générations anciennes aux plus récentes, passant de 85 % parmi les hommes de 40-49 ans à 74 % parmi ceux de 15-24 ans.

Graphique 13.11 Tendances de la circoncision

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont circoncis



| EDSB-III 2006 | EDSB-IV 2011-2012 | EDSB-V 2017-2018 |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 97 | 93 | 95 |

13.8 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES DÉCLARÉES

Infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes

On a demandé aux enquêtés qui avaient déjà eu des rapports sexuels s'ils avaient eu une IST ou des symptômes d'IST (pertes/écoulements malodorants et anormaux du vagin /pénis ou une plaie/ulcère génital) dans les 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels

Dans l'ensemble, 17 % des femmes de 15-49 ans ont déclaré avoir eu une IST ou des symptômes associés à une IST contre 5 % chez les hommes de 15-49 ans (**Tableau 13.11**). Parmi ces femmes, 28 % ont recherché des traitements dans un centre de santé (clinique, hôpital, médecin ou autre professionnel de santé) et 61 % n'ont recherché aucun conseil ou traitement. Chez les hommes ces pourcentages sont de respectivement 28 % et 46 % (**Tableau 13.12**).

13.9 CONNAISSANCE DU VIH/SIDA ET COMPORTEMENTS PARMIS LES JEUNES

Cette section porte sur la connaissance du VIH/sida et sur les comportements parmi les jeunes de 15-24 ans ; Les résultats permettent de savoir dans quelle mesure les jeunes ont des comportements qui leur font courir des risques de contracter le VIH.

13.9.1 Connaissance

La connaissance des moyens de transmission du VIH est essentielle pour permettre aux individus d'éviter de contracter le VIH ; cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les jeunes car, à cette période de la vie, les relations sexuelles peuvent être de courte durée avec un nombre de partenaires plus élevé ou des comportements à risques plus fréquents.

Les résultats du **Tableau 13.13** montrent que 15 % des femmes de 15-24 ans et 19 % des hommes de 15-24 ans ont une connaissance considérée comme « approfondie » du VIH.

13.9.2 Premiers rapports sexuels

Les jeunes femmes qui ont leurs premiers rapports sexuels à un âge précoce courent, en général, un risque plus élevé de tomber enceintes ou de contracter une IST que celles qui commencent leur vie sexuelle plus tard. L'utilisation régulière du condom contribue à réduire de tels risques.

Parmi les jeunes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, 12 % sont des femmes et 8 % sont des hommes. Les femmes qui ont eu leur rapport sexuel avant 18 ans représentent 62 % contre 39 % d'hommes (**Tableau 13.14**).

Tendances : De 1996 à 2017-2018, le pourcentage de jeunes femmes qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans a légèrement diminué, passant de 14 % à 12 %. Chez les hommes, par contre, on note une tendance plus nette à la baisse, le pourcentage ayant eu leurs premiers rapports sexuels à un âge précoce étant passé de 19 % en 1996 à 16 % en 2011-2012 et à 8 % en 2017-2018.

Le pourcentage d'hommes qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans a également diminué passant de 55 % en 1996 à 39 % en 2017-2018. Chez les jeunes femmes, on note aussi une tendance à la baisse, mais plus légère que chez les hommes, le pourcentage étant passé de 64 % à 62 %.

Variations par caractéristique

- Dans l'ensemble urbain, 10 % de jeunes femmes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans contre 14 % en milieu rural.
- Le pourcentage de femmes ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant de 17 % parmi celles sans niveau d'instruction à 5 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. Chez les hommes, la tendance est moins nette mais on constate que parmi ceux sans niveau d'instruction, 3 % avaient déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans contre 9 % parmi les autres (**Tableau 13.14**).

13.9.3 Rapports sexuels pré-nuptiaux

Le **Tableau 13.15** montre que parmi les célibataires de 15-24 ans, 54 % des jeunes filles et 55 % des jeunes hommes n'ont jamais eu de rapport sexuel.

13.9.4 Partenaires sexuels multiples

Le **Tableau 13.16.1** présente des informations sur les jeunes femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec des partenaires multiples au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, au cours des 12 derniers mois, 3 % ont eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois, 24 % ont eu des rapports sexuels avec une personne qui n'est ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient. Parmi ces dernières, 32 % ont déclaré avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel.

Dans l'ensemble, 10 % des jeunes hommes de 15-24 ans ont eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois avant l'enquête. Un pourcentage élevé (34 %) des jeunes hommes de ce groupe d'âge ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non marital ou non cohabitant. Parmi eux, 31 % ont déclaré avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel (**Tableau 13.16.2**).

13.9.5 Couverture en services de tests du VIH

Rechercher un endroit où faire un test du VIH peut être plus difficile pour des jeunes que pour des adultes car de nombreux jeunes n'ont pas l'habitude de fréquenter les services de santé pour eux-mêmes et parce que les jeunes rencontrent souvent des obstacles pour obtenir ces services.

Parmi les jeunes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 16 % des femmes ont déclaré avoir effectué un test du VIH au cours des 12 derniers mois et avoir reçu le résultat du dernier test. Chez les hommes, ce pourcentage est nettement plus faible (6 %). Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant effectué un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois augmente avec l'âge, passant, chez les femmes, de 10 % à 15-19 ans à 19 % à 20-24 ans et, chez les hommes de respectivement 4 % à 6 % (**Tableau 13.17**).

Tendances : Entre 2006 et 2011-2012, le pourcentage de jeunes femmes ayant effectué un test au cours des 12 derniers mois a augmenté, passant de 10 % à 19 % pour diminuer légèrement par la suite et se situer à 16 % en 2017-2018. Chez les hommes, on note la même mais avec des variations beaucoup plus faibles, le pourcentage étant passé de respectivement 6 % à 8 % et à 6 %.

13.10 Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH

Le **Tableau 13.18** présente des informations sur les pourcentages de femmes et des hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler des autotests de dépistage du VIH. Dans l'ensemble, 8 % de femmes et 5 % des hommes ont entendu parler de l'autotest du VIH. Seulement 1 % des femmes et moins d'un pour cent des hommes ont utilisé un autotest du VIH.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la connaissance, attitudes et comportements vis-à-vis du VIH/sida, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 13.1** Connaissance du VIH ou du sida
- **Tableau 13.2** Connaissance des moyens de prévention du VIH
- **Tableau 13.3** Connaissance « approfondie » du VIH
- **Tableau 13.4** Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant
- **Tableau 13.5** Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH
- **Tableau 13.6.1** Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme
- **Tableau 13.6.2** Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme
- **Tableau 13.7** Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants
- **Tableau 13.8.1** Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme
- **Tableau 13.8.2** Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme
- **Tableau 13.9** Femmes enceintes conseillées et ayant effectué un test du VIH
- **Tableau 13.10** Circoncision
- **Tableau 13.11** Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST
- **Tableau 13.12** Femmes et hommes ayant recherché un traitement contre les IST
- **Tableau 13.13** Connaissance « approfondie » du VIH parmi les jeunes
- **Tableau 13.14** Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes
- **Tableau 13.15** Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes
- **Tableau 13.16.1** Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme
- **Tableau 13.16.2** Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme
- **Tableau 13.17** Tests du VIH récents parmi les jeunes
- **Tableau 13.18** Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH

Tableau 13.1 Connaissance du VIH ou du sida

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH ou du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | Homme | |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Ont entendu parler du VIH ou du sida | Effectif de femmes | Ont entendu parler du VIH ou du sida | Effectif d'hommes |
| Groupe d'âges | | | | |
| 15-24 | 89,2 | 3 040 | 87,5 | 2 666 |
| 15-19 | 86,7 | 1 617 | 83,5 | 1 548 |
| 20-24 | 92,0 | 1 423 | 93,0 | 1 118 |
| 25-29 | 92,4 | 1 502 | 92,8 | 1 156 |
| 30-39 | 92,9 | 1 961 | 94,0 | 1 693 |
| 40-49 | 94,1 | 1 203 | 94,2 | 1 211 |
| État matrimonial | | | | |
| Célibataire | 90,4 | 1 900 | 87,9 | 2 860 |
| A déjà eu des rapports sexuels | 95,8 | 963 | 95,2 | 1 519 |
| N'a jamais eu de rapports sexuels | 84,8 | 937 | 79,6 | 1 341 |
| En union | 91,7 | 5 409 | 93,8 | 3 675 |
| En rupture d'union | 94,7 | 396 | 93,6 | 191 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 98,4 | 460 | 98,6 | 390 |
| Autres villes | 92,9 | 2 843 | 93,9 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 93,7 | 3 303 | 94,5 | 2 877 |
| Rural | 89,9 | 4 403 | 88,8 | 3 849 |
| Département | | | | |
| Alibori | 88,8 | 947 | 70,8 | 917 |
| Atacora | 94,1 | 614 | 98,1 | 560 |
| Atlantique | 95,9 | 971 | 94,7 | 822 |
| Borgou | 71,8 | 890 | 98,4 | 823 |
| Collines | 98,0 | 588 | 89,7 | 448 |
| Couffo | 98,0 | 515 | 99,2 | 409 |
| Donga | 90,4 | 413 | 95,4 | 445 |
| Littoral | 98,4 | 460 | 98,6 | 390 |
| Mono | 95,4 | 375 | 98,2 | 354 |
| Ouémé | 88,9 | 724 | 77,2 | 618 |
| Plateau | 94,3 | 474 | 97,0 | 340 |
| Zou | 96,6 | 736 | 96,6 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucun | 88,7 | 4 245 | 84,8 | 2 426 |
| Primaire | 92,3 | 1 547 | 92,0 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 96,3 | 1 356 | 94,4 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 99,6 | 558 | 99,3 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 85,3 | 1 424 | 83,1 | 1 248 |
| Second | 88,5 | 1 551 | 88,5 | 1 315 |
| Moyen | 91,9 | 1 422 | 93,2 | 1 282 |
| Quatrième | 94,9 | 1 574 | 93,1 | 1 317 |
| Le plus élevé | 96,0 | 1 734 | 97,0 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 91,5 | 7 706 | 91,3 | 6 727 |
| 50-64 | na | na | 94,9 | 868 |
| Ensemble 15-64 | na | na | 91,7 | 7 595 |

na = Non applicable

Tableau 13.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui, en réponse à une question déterminée, ont déclaré que l'on pouvait réduire les risques de contracter le VIH en utilisant des condoms à chaque rapport sexuel et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté et qui n'a pas d'autres partenaires sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | | Homme | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| | En utilisant des condoms ¹ | En limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ² | En utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ^{1,2} | Effectif de femmes | En utilisant des condoms ¹ | En limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ² | En utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ^{1,2} | Effectif d'hommes |
| Groupe d'âges | | | | | | | | |
| 15-24 | 67,9 | 76,0 | 63,4 | 3 040 | 68,0 | 72,4 | 63,0 | 2 666 |
| 15-19 | 63,7 | 71,8 | 59,0 | 1 617 | 61,5 | 66,5 | 56,0 | 1 548 |
| 20-24 | 72,7 | 80,8 | 68,4 | 1 423 | 77,1 | 80,6 | 72,7 | 1 118 |
| 25-29 | 74,9 | 81,9 | 70,3 | 1 502 | 77,8 | 83,9 | 74,2 | 1 156 |
| 30-39 | 74,4 | 82,4 | 70,5 | 1 961 | 79,2 | 83,9 | 75,2 | 1 693 |
| 40-49 | 73,4 | 82,5 | 69,2 | 1 203 | 78,1 | 84,9 | 74,7 | 1 211 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 78,9 | 84,7 | 72,9 | 460 | 74,3 | 75,7 | 69,0 | 390 |
| Autres villes | 74,2 | 81,7 | 69,4 | 2 843 | 79,1 | 83,4 | 75,4 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 74,8 | 82,1 | 69,9 | 3 303 | 78,5 | 82,3 | 74,5 | 2 877 |
| Rural | 69,5 | 78,1 | 65,6 | 4 403 | 71,2 | 77,4 | 66,8 | 3 849 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 72,5 | 84,2 | 71,4 | 947 | 57,8 | 64,1 | 55,0 | 917 |
| Atacora | 72,8 | 84,2 | 68,5 | 614 | 78,2 | 89,2 | 75,1 | 560 |
| Atlantique | 79,6 | 85,0 | 74,4 | 971 | 80,7 | 88,1 | 77,9 | 822 |
| Borgou | 46,7 | 60,5 | 43,5 | 890 | 83,4 | 87,0 | 78,4 | 823 |
| Collines | 79,1 | 83,1 | 74,9 | 588 | 70,4 | 78,3 | 65,3 | 448 |
| Couffo | 76,4 | 85,8 | 71,9 | 515 | 84,6 | 83,2 | 73,8 | 409 |
| Donga | 72,7 | 80,1 | 69,0 | 413 | 72,4 | 87,0 | 66,4 | 445 |
| Littoral | 78,9 | 84,7 | 72,9 | 460 | 74,3 | 75,7 | 69,0 | 390 |
| Mono | 70,1 | 77,4 | 61,7 | 375 | 88,7 | 93,4 | 87,0 | 354 |
| Ouémé | 69,8 | 72,2 | 64,1 | 724 | 73,0 | 75,1 | 72,4 | 618 |
| Plateau | 79,1 | 83,3 | 73,9 | 474 | 91,0 | 91,5 | 88,3 | 340 |
| Zou | 73,9 | 83,2 | 70,2 | 736 | 55,6 | 57,2 | 48,1 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 67,8 | 77,3 | 64,0 | 4 245 | 68,0 | 73,4 | 63,5 | 2 426 |
| Primaire | 72,1 | 78,7 | 67,2 | 1 547 | 72,9 | 79,2 | 68,7 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 78,5 | 83,7 | 72,7 | 1 356 | 77,3 | 81,6 | 72,8 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 84,7 | 92,0 | 81,6 | 558 | 85,2 | 89,6 | 81,8 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 62,8 | 74,5 | 59,2 | 1 424 | 65,4 | 70,5 | 60,3 | 1 248 |
| Second | 67,8 | 75,1 | 63,1 | 1 551 | 71,4 | 75,8 | 66,2 | 1 315 |
| Moyen | 72,0 | 80,1 | 68,3 | 1 422 | 73,8 | 81,4 | 70,0 | 1 282 |
| Quatrième | 77,2 | 83,4 | 71,8 | 1 574 | 74,9 | 80,6 | 71,0 | 1 317 |
| Le plus élevé | 77,6 | 84,7 | 73,6 | 1 734 | 83,8 | 87,5 | 80,5 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 71,8 | 79,8 | 67,5 | 7 706 | 74,3 | 79,5 | 70,1 | 6 727 |
| 50-64 | na | na | na | na | 78,7 | 87,0 | 76,0 | 868 |
| Ensemble 15-64 | na | na | na | na | 74,8 | 80,4 | 70,8 | 7 595 |

na = Non applicable

¹ En utilisant des condoms à chaque rapport sexuel.

² Un partenaire qui n'a pas d'autres partenaires.

Tableau 13.3 Connaissance « approfondie » sur le VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'une personne paraissant en bonne santé pouvait néanmoins avoir contracté le VIH et qui, en réponse à des questions déterminées, rejettent de manière correcte, conceptions erronées sur la transmission ou la prévention du VIH et pourcentage ayant une connaissance « approfondie » sur le VIH, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Pourcentage de répondants qui déclarent que : | | | | Pourcentage ayant déclaré qu'une personne en bonne santé peut avoir le VIH et qui rejette les deux conceptions erronées locales les plus courantes ¹ | Pourcentage avec une connaissance complète du VIH ² | Effectif d'enquêtés |
|----------------|--|--|---|--|---|--|---------------------|
| | Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le VIH | Le VIH ne peut pas être transmis par des piqûres de moustiques | Le VIH ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels | Une personne ne peut pas devenir infectée en partageant les repas avec une personne ayant le VIH | | | |
| FEMME | | | | | | | |
| 15-24 | 65,6 | 40,8 | 40,0 | 40,8 | 19,4 | 15,0 | 3 040 |
| 15-19 | 61,4 | 40,0 | 39,3 | 39,0 | 19,3 | 14,1 | 1 617 |
| 20-24 | 70,3 | 41,6 | 40,8 | 42,8 | 19,5 | 16,1 | 1 423 |
| 25-29 | 71,3 | 39,6 | 34,6 | 41,6 | 20,7 | 16,6 | 1 502 |
| 30-39 | 70,6 | 39,4 | 32,3 | 43,4 | 21,0 | 17,0 | 1 961 |
| 40-49 | 70,5 | 36,8 | 31,1 | 42,0 | 18,7 | 13,0 | 1 203 |
| Ensemble 15-49 | 68,7 | 39,6 | 35,6 | 41,8 | 19,9 | 15,5 | 7 706 |
| HOMME | | | | | | | |
| 15-24 | 70,4 | 41,1 | 46,0 | 49,5 | 24,6 | 18,6 | 2 666 |
| 15-19 | 63,4 | 38,0 | 42,7 | 44,5 | 20,9 | 14,4 | 1 548 |
| 20-24 | 80,1 | 45,3 | 50,5 | 56,4 | 29,8 | 24,3 | 1 118 |
| 25-29 | 79,9 | 47,1 | 48,5 | 56,2 | 30,7 | 26,1 | 1 156 |
| 30-39 | 80,9 | 47,4 | 49,9 | 54,7 | 30,3 | 25,3 | 1 693 |
| 40-49 | 79,6 | 45,6 | 48,1 | 55,4 | 28,6 | 23,5 | 1 211 |
| Ensemble 15-49 | 76,3 | 44,5 | 47,8 | 53,0 | 27,8 | 22,4 | 6 727 |
| 50-64 | 80,6 | 43,4 | 41,7 | 51,4 | 28,4 | 24,5 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 76,8 | 44,4 | 47,1 | 52,8 | 27,9 | 22,7 | 7 595 |

¹ Les deux conceptions locales erronées les plus courantes : Le sida peut être transmis par des piqûres de moustiques et en partageant les repas d'une personne qui a le sida.

² Sont considérés comme ayant une connaissance « approfondie », les enquêtés qui savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH, ceux qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du sida.

Tableau 13.4 Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse, pendant l'accouchement ; par l'allaitement et par les trois moyens ; pourcentage sachant que le risque de transmission maternelle du VIH à l'enfant (TME) peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère durant la grossesse, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Pourcentage sachant que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant : | | | | Pourcentage sachant que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère | Effectif d'enquêtés |
|----------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|
| | Pendant la grossesse | Pendant l'accouchement | Par l'allaitement | Par les trois moyens | | |
| FEMME | | | | | | |
| 15-24 | 66,6 | 65,9 | 69,2 | 60,3 | 50,0 | 3 040 |
| 15-19 | 64,0 | 62,7 | 65,9 | 57,4 | 44,8 | 1 617 |
| 20-24 | 69,4 | 69,6 | 73,0 | 63,5 | 55,9 | 1 423 |
| 25-29 | 70,7 | 73,9 | 75,8 | 66,7 | 57,1 | 1 502 |
| 30-39 | 75,1 | 77,1 | 77,3 | 70,7 | 56,1 | 1 961 |
| 40-49 | 74,6 | 75,8 | 76,5 | 68,9 | 55,6 | 1 203 |
| Ensemble 15-49 | 70,8 | 71,9 | 73,7 | 65,5 | 53,8 | 7 706 |
| HOMME | | | | | | |
| 15-24 | 50,8 | 54,6 | 54,6 | 41,4 | 39,6 | 2 666 |
| 15-19 | 46,2 | 49,7 | 51,6 | 38,1 | 35,0 | 1 548 |
| 20-24 | 57,0 | 61,4 | 58,8 | 46,0 | 46,0 | 1 118 |
| 25-29 | 59,3 | 65,0 | 63,9 | 48,9 | 50,9 | 1 156 |
| 30-39 | 60,0 | 65,8 | 63,7 | 49,9 | 51,0 | 1 693 |
| 40-49 | 61,2 | 65,1 | 62,5 | 49,8 | 47,6 | 1 211 |
| Ensemble 15-49 | 56,4 | 61,1 | 59,9 | 46,3 | 45,8 | 6 727 |
| 50-64 | 64,6 | 68,4 | 64,2 | 53,2 | 50,1 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 57,4 | 61,9 | 60,4 | 47,1 | 46,3 | 7 595 |

Tableau 13.5 Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH

Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH ou du sida, pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants qui sont VIH négatifs, pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH et pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | | Homme | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs | Pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH | Pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ¹ | Effectif de femmes qui ont entendu parler du VIH ou du sida | Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec des enfants VIH négatifs | Pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH | Pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ¹ | Effectif d'hommes qui ont entendu parler du VIH ou du sida |
| Groupe d'âges | | | | | | | | |
| 15-24 | 52,7 | 69,5 | 74,3 | 2 712 | 42,3 | 67,4 | 72,1 | 2 332 |
| 15-19 | 54,7 | 71,4 | 76,3 | 1 402 | 44,3 | 68,8 | 72,9 | 1 292 |
| 20-24 | 50,6 | 67,5 | 72,1 | 1 309 | 39,8 | 65,7 | 71,1 | 1 040 |
| 25-29 | 54,7 | 71,8 | 75,7 | 1 388 | 41,3 | 64,8 | 70,8 | 1 073 |
| 30-39 | 55,8 | 72,0 | 75,7 | 1 823 | 44,0 | 64,2 | 69,7 | 1 592 |
| 40-49 | 55,9 | 72,7 | 77,5 | 1 131 | 41,4 | 61,5 | 66,4 | 1 142 |
| État matrimonial | | | | | | | | |
| Célibataire | 50,5 | 67,9 | 73,3 | 1 717 | 41,4 | 65,2 | 70,0 | 2 514 |
| À déjà eu des rapports sexuels | 47,7 | 61,5 | 67,6 | 923 | 39,0 | 63,2 | 68,4 | 1 447 |
| N'a jamais eu de rapports sexuels | 53,8 | 75,4 | 79,8 | 794 | 44,7 | 67,8 | 72,1 | 1 067 |
| En union | 56,3 | 72,7 | 76,6 | 4 961 | 43,4 | 64,8 | 70,4 | 3 447 |
| En rupture d'union | 47,3 | 64,6 | 70,6 | 376 | 35,6 | 66,6 | 69,0 | 179 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 32,1 | 51,6 | 56,8 | 453 | 24,6 | 61,1 | 64,1 | 385 |
| Autres villes | 50,8 | 69,7 | 74,1 | 2 641 | 36,5 | 56,5 | 62,9 | 2 335 |
| Ensemble urbain | 48,1 | 67,0 | 71,5 | 3 093 | 34,8 | 57,1 | 63,1 | 2 720 |
| Rural | 59,4 | 74,3 | 78,5 | 3 960 | 48,4 | 71,3 | 75,8 | 3 420 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 59,3 | 65,0 | 66,6 | 841 | 70,3 | 72,9 | 85,7 | 649 |
| Atacora | 37,5 | 62,7 | 66,6 | 577 | 37,4 | 70,9 | 72,7 | 550 |
| Atlantique | 44,3 | 70,7 | 75,2 | 931 | 43,6 | 58,7 | 65,3 | 779 |
| Borgou | 68,2 | 82,7 | 84,5 | 639 | 36,1 | 68,5 | 74,1 | 810 |
| Collines | 64,2 | 71,3 | 80,0 | 576 | 49,7 | 77,6 | 80,2 | 402 |
| Couffo | 64,5 | 77,2 | 84,6 | 505 | 51,4 | 64,9 | 71,9 | 406 |
| Donga | 37,3 | 67,6 | 69,3 | 374 | 46,2 | 61,0 | 64,4 | 424 |
| Littoral | 32,1 | 51,6 | 56,8 | 453 | 24,6 | 61,1 | 64,1 | 385 |
| Mono | 44,6 | 72,5 | 77,1 | 358 | 27,9 | 56,9 | 60,4 | 348 |
| Ouémé | 60,5 | 70,9 | 79,1 | 644 | 39,1 | 44,8 | 47,0 | 478 |
| Plateau | 69,5 | 88,6 | 92,1 | 446 | 50,9 | 76,3 | 81,8 | 330 |
| Zou | 61,3 | 73,5 | 75,7 | 711 | 27,2 | 66,6 | 70,2 | 580 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 60,3 | 77,0 | 80,4 | 3 764 | 54,8 | 75,9 | 81,9 | 2 059 |
| Primaire | 58,4 | 73,8 | 78,9 | 1 428 | 45,5 | 69,6 | 73,5 | 1 436 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 45,2 | 61,9 | 67,9 | 1 306 | 39,7 | 60,6 | 66,7 | 1 452 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 26,2 | 46,0 | 50,5 | 556 | 20,4 | 46,3 | 50,3 | 1 193 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 59,8 | 75,3 | 77,9 | 1 215 | 58,5 | 77,4 | 84,0 | 1 037 |
| Second | 62,5 | 76,9 | 81,3 | 1 373 | 49,5 | 71,4 | 76,8 | 1 164 |
| Moyen | 57,9 | 73,7 | 78,0 | 1 307 | 44,9 | 68,6 | 74,1 | 1 194 |
| Quatrième | 53,7 | 71,4 | 76,0 | 1 494 | 40,6 | 63,5 | 68,7 | 1 226 |
| Le plus élevé | 41,8 | 60,9 | 66,4 | 1 664 | 25,4 | 50,2 | 53,9 | 1 518 |
| Ensemble 15-49 | 54,4 | 71,1 | 75,5 | 7 053 | 42,4 | 65,0 | 70,2 | 6 140 |
| 50-64 | na | na | na | na | 40,8 | 61,8 | 65,4 | 824 |
| Ensemble 15-64 | na | na | na | na | 42,2 | 64,6 | 69,6 | 6 964 |

na = Non applicable

¹ Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs et/ou qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH.

Tableau 13.6.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme

Parmi toutes les femmes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient; parmi les femmes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'un partenaire sexuel, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels; parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne; Parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Toutes les femmes | | | Femmes ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois | | Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | | Femmes ayant déjà eu des rapports sexuels ¹ | |
|--|--|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | Effectif de femmes | Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels | Effectif de femmes | Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne | Effectif de femmes | Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie | Effectif de femmes |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-24 | 2,6 | 24,2 | 6 273 | 32,1 | 163 | 26,1 | 1 516 | 1,9 | 4 329 |
| 15-19 | 2,7 | 26,1 | 3 350 | 38,7 | 91 | 25,7 | 873 | 1,7 | 1 602 |
| 20-24 | 2,5 | 22,0 | 2 923 | 23,8 | 72 | 26,7 | 644 | 2,1 | 2 728 |
| 25-29 | 0,9 | 8,0 | 2 986 | (8,8) | 25 | 12,7 | 239 | 2,2 | 2 952 |
| 30-39 | 1,1 | 5,0 | 4 085 | (1,6) | 44 | 9,2 | 204 | 2,2 | 4 063 |
| 40-49 | 0,8 | 6,1 | 2 585 | * | 21 | 7,5 | 159 | 2,2 | 2 566 |
| État matrimonial | | | | | | | | | |
| Célibataire | 4,0 | 42,0 | 3 889 | 34,7 | 154 | 25,5 | 1 635 | 2,1 | 1 914 |
| En union | 0,5 | 1,2 | 11 168 | 3,6 | 59 | 13,8 | 130 | 2,1 | 11 137 |
| En rupture d'union | 4,7 | 40,6 | 871 | (6,2) | 41 | 6,1 | 354 | 3,0 | 859 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 3,0 | 20,3 | 958 | (35,3) | 28 | 22,6 | 195 | 2,8 | 804 |
| Autres villes | 1,5 | 14,4 | 5 803 | 25,0 | 86 | 26,9 | 835 | 2,2 | 4 996 |
| Ensemble urbain | 1,7 | 15,2 | 6 761 | 27,6 | 115 | 26,1 | 1 029 | 2,3 | 5 800 |
| Rural | 1,5 | 11,9 | 9 167 | 19,0 | 139 | 17,3 | 1 089 | 2,0 | 8 109 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 2,4 | 9,7 | 1 878 | (31,0) | 46 | 31,9 | 183 | 1,8 | 1 738 |
| Atacora | 5,3 | 19,2 | 1 302 | 23,3 | 69 | 16,5 | 250 | 3,1 | 1 176 |
| Atlantique | 1,1 | 14,5 | 2 037 | * | 23 | 25,4 | 296 | 2,3 | 1 726 |
| Borgou | 1,2 | 12,4 | 1 839 | * | 22 | 20,2 | 228 | 1,8 | 1 659 |
| Collines | 1,1 | 19,1 | 1 151 | * | 12 | 15,3 | 219 | 2,0 | 1 020 |
| Couffo | 0,1 | 6,5 | 1 041 | * | 1 | 30,7 | 67 | 1,5 | 857 |
| Donga | 0,5 | 7,8 | 881 | * | 4 | 22,6 | 69 | 2,1 | 804 |
| Littoral | 3,0 | 20,3 | 958 | (35,3) | 28 | 22,6 | 195 | 2,8 | 804 |
| Mono | 1,1 | 11,7 | 759 | * | 8 | 38,4 | 89 | 2,2 | 644 |
| Ouémé | 0,3 | 12,2 | 1 507 | * | 4 | 15,2 | 183 | 1,8 | 1 269 |
| Plateau | 1,7 | 11,3 | 970 | * | 17 | 12,4 | 110 | 1,7 | 839 |
| Zou | 1,2 | 14,3 | 1 606 | * | 19 | 20,3 | 229 | 2,3 | 1 375 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucun | 1,1 | 6,9 | 8 785 | 14,6 | 92 | 11,7 | 609 | 2,0 | 8 331 |
| Primaire | 1,9 | 14,8 | 3 148 | 13,7 | 60 | 13,8 | 467 | 2,3 | 2 602 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,4 | 23,3 | 2 847 | 41,4 | 68 | 27,6 | 665 | 2,2 | 2 063 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 2,9 | 32,9 | 1 147 | (24,7) | 34 | 36,5 | 377 | 2,5 | 913 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 1,6 | 8,8 | 2 735 | (21,1) | 43 | 16,0 | 240 | 1,9 | 2 483 |
| Second | 1,2 | 10,8 | 3 030 | (6,9) | 35 | 19,1 | 326 | 1,9 | 2 666 |
| Moyen | 1,8 | 13,4 | 3 104 | (21,1) | 55 | 15,8 | 415 | 2,1 | 2 761 |
| Quatrième | 1,5 | 14,4 | 3 405 | (26,4) | 52 | 22,0 | 491 | 2,2 | 2 961 |
| Le plus élevé | 1,9 | 17,7 | 3 654 | 31,1 | 68 | 28,2 | 647 | 2,5 | 3 040 |
| Ensemble 15-49 | 1,6 | 13,3 | 15 928 | 22,9 | 254 | 21,6 | 2 118 | 2,1 | 13 910 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques.

Tableau 13.6.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme

Parmi tous les hommes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient; parmi les hommes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'une partenaire sexuelle, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels; parmi les hommes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne; Parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Tous les hommes | | Hommes ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois | | Parmi les hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | | Parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels ¹ | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|---|-------------------|
| | Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | Effectif d'hommes | Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels | Effectif d'hommes | Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne | Effectif d'hommes | Nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie | Effectif d'hommes |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-24 | 9,7 | 33,5 | 2 666 | 30,9 | 258 | 31,1 | 894 | 3,8 | 1 352 |
| 15-19 | 3,6 | 21,5 | 1 548 | 26,2 | 55 | 27,4 | 334 | 2,5 | 450 |
| 20-24 | 18,1 | 50,1 | 1 118 | 32,2 | 203 | 33,2 | 560 | 4,4 | 902 |
| 25-29 | 25,7 | 44,7 | 1 156 | 16,2 | 297 | 32,1 | 517 | 6,0 | 1 102 |
| 30-39 | 31,2 | 26,3 | 1 693 | 9,2 | 528 | 33,8 | 446 | 7,0 | 1 623 |
| 40-49 | 30,5 | 17,1 | 1 211 | 6,0 | 369 | 27,1 | 207 | 7,5 | 1 153 |
| État matrimonial | | | | | | | | | |
| Célibataire | 9,5 | 41,2 | 2 860 | 35,5 | 272 | 32,2 | 1 179 | 3,9 | 1 495 |
| En union | 31,3 | 20,9 | 3 675 | 8,0 | 1 150 | 32,0 | 769 | 6,9 | 3 553 |
| En rupture d'union | 16,3 | 60,6 | 191 | (31,6) | 31 | 21,4 | 116 | 7,4 | 182 |
| Type d'union | | | | | | | | | |
| En union polygame | 74,5 | 14,6 | 816 | 2,9 | 607 | 28,5 | 119 | 8,8 | 784 |
| En union non polygame | 19,0 | 22,7 | 2 860 | 13,8 | 542 | 32,6 | 650 | 6,3 | 2 769 |
| Non actuellement en union | 9,9 | 42,4 | 3 051 | 35,1 | 303 | 31,2 | 1 295 | 4,3 | 1 676 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 22,9 | 40,0 | 390 | 34,8 | 89 | 48,0 | 156 | 6,7 | 288 |
| Autres villes | 22,4 | 33,2 | 2 487 | 15,4 | 558 | 40,5 | 825 | 6,6 | 1 937 |
| Ensemble urbain | 22,5 | 34,1 | 2 877 | 18,1 | 647 | 41,7 | 981 | 6,6 | 2 224 |
| Rural | 20,9 | 28,1 | 3 849 | 10,1 | 805 | 22,3 | 1 083 | 5,6 | 3 005 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 18,7 | 25,0 | 917 | 4,2 | 171 | 24,2 | 230 | 4,2 | 686 |
| Atacora | 21,7 | 39,2 | 560 | 5,1 | 121 | 10,5 | 219 | 4,9 | 446 |
| Atlantique | 28,5 | 38,0 | 822 | 15,9 | 234 | 36,6 | 312 | 9,2 | 621 |
| Borgou | 13,7 | 20,8 | 823 | 12,8 | 113 | 44,1 | 171 | 2,9 | 656 |
| Collines | 23,3 | 35,5 | 448 | 14,1 | 104 | 25,2 | 159 | 6,6 | 350 |
| Couffo | 28,4 | 27,6 | 409 | 13,9 | 116 | 32,6 | 113 | 6,4 | 327 |
| Donga | 9,1 | 22,3 | 445 | (15,9) | 40 | 14,6 | 99 | 5,0 | 338 |
| Littoral | 22,9 | 40,0 | 390 | 34,8 | 89 | 48,0 | 156 | 6,7 | 288 |
| Mono | 21,1 | 30,1 | 354 | 20,3 | 75 | 41,2 | 107 | 4,9 | 265 |
| Ouémé | 16,2 | 24,5 | 618 | 13,5 | 100 | 45,0 | 152 | 8,9 | 463 |
| Plateau | 21,8 | 31,9 | 340 | 7,7 | 74 | 22,7 | 109 | 6,4 | 297 |
| Zou | 35,6 | 39,5 | 600 | 14,3 | 214 | 33,2 | 237 | 7,3 | 492 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucun | 23,3 | 22,2 | 2 426 | 5,8 | 565 | 15,8 | 539 | 5,4 | 2 054 |
| Primaire | 24,0 | 31,3 | 1 562 | 10,5 | 374 | 27,3 | 488 | 7,1 | 1 235 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 16,7 | 33,4 | 1 538 | 18,3 | 257 | 32,3 | 513 | 5,7 | 978 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 21,3 | 43,5 | 1 201 | 31,1 | 256 | 50,9 | 523 | 6,4 | 962 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 19,9 | 23,4 | 1 248 | 2,6 | 248 | 12,1 | 291 | 4,5 | 1 003 |
| Second | 19,2 | 25,5 | 1 315 | 11,4 | 252 | 22,6 | 335 | 5,8 | 991 |
| Moyen | 20,6 | 29,6 | 1 282 | 13,0 | 264 | 25,7 | 380 | 5,6 | 990 |
| Quatrième | 23,1 | 33,7 | 1 317 | 11,7 | 304 | 32,3 | 444 | 6,5 | 1 027 |
| Le plus élevé | 24,5 | 39,3 | 1 565 | 24,3 | 384 | 48,6 | 614 | 7,5 | 1 217 |
| Ensemble 15-49 | 21,6 | 30,7 | 6 727 | 13,7 | 1 452 | 31,5 | 2 064 | 6,0 | 5 229 |
| 50-64 | 22,7 | 10,5 | 868 | 2,9 | 197 | 19,4 | 91 | 8,7 | 833 |
| Ensemble 15-64 | 21,7 | 28,4 | 7 595 | 12,4 | 1 650 | 31,0 | 2 155 | 6,4 | 6 062 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont donné des réponses non numériques.

Tableau 13.7 Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels payants et pourcentage ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois et, parmi ces derniers, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels payants, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Parmi tous les hommes : | | | Parmi les hommes ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois : | |
|----------------|--|---|-------------------|---|-------------------|
| | Pourcentage ayant déjà eu des rapports sexuels payants | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois | Effectif d'hommes | Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels payants | Effectif d'hommes |
| 15-24 | 5,3 | 3,5 | 2 666 | 35,9 | 94 |
| 15-19 | 2,6 | 2,0 | 1 548 | (23,1) | 32 |
| 20-24 | 8,9 | 5,6 | 1 118 | 42,3 | 62 |
| 25-29 | 9,3 | 3,4 | 1 156 | (51,4) | 39 |
| 30-39 | 10,8 | 4,3 | 1 693 | 47,1 | 73 |
| 40-49 | 10,3 | 3,2 | 1 211 | (48,5) | 39 |
| Ensemble 15-49 | 8,3 | 3,7 | 6 727 | 43,7 | 246 |
| 50-64 | 9,9 | 1,8 | 868 | * | 16 |
| Ensemble 15-64 | 8,5 | 3,4 | 7 595 | 42,4 | 261 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.8.1 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui savent où on peut faire un test du VIH ; répartition (en %) des femmes de 15-49 ans selon qu'elles ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test ; pourcentage de femmes ayant déjà fait un test du VIH et pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Répartition (en %) des femmes selon qu'elles ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test | | | | Total | Pourcentage ayant déjà fait un test du VIH | Pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test | Effectif de femmes |
|--|---|--------------------------------------|--|---|-------|--|---|--------------------|
| | Pourcentage sachant où on peut faire un test du VIH | A fait un test et a reçu le résultat | A fait un test mais n'a pas reçu le résultat | N'a jamais fait de test du VIH ¹ | | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | |
| 15-24 | 45,1 | 22,2 | 2,8 | 75,0 | 100,0 | 25,0 | 12,0 | 3 040 |
| 15-19 | 34,2 | 10,8 | 1,9 | 87,3 | 100,0 | 12,7 | 6,3 | 1 617 |
| 20-24 | 57,4 | 35,2 | 3,7 | 61,1 | 100,0 | 38,9 | 18,4 | 1 423 |
| 25-29 | 65,0 | 43,2 | 4,3 | 52,4 | 100,0 | 47,6 | 18,0 | 1 502 |
| 30-39 | 66,1 | 45,7 | 4,3 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 17,5 | 1 961 |
| 40-49 | 58,9 | 36,8 | 3,8 | 59,4 | 100,0 | 40,6 | 9,2 | 1 203 |
| État matrimonial | | | | | | | | |
| Célibataire | 40,0 | 15,9 | 1,8 | 82,3 | 100,0 | 17,7 | 8,3 | 1 900 |
| A déjà eu des rapports sexuels | 52,6 | 25,8 | 2,6 | 71,6 | 100,0 | 28,4 | 13,1 | 963 |
| N'a jamais eu de rapports sexuels | 27,1 | 5,7 | 1,0 | 93,3 | 100,0 | 6,7 | 3,4 | 937 |
| En union | 61,7 | 40,4 | 4,2 | 55,3 | 100,0 | 44,7 | 16,2 | 5 409 |
| En rupture d'union | 63,8 | 44,5 | 3,7 | 51,8 | 100,0 | 48,2 | 14,0 | 396 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 74,8 | 60,7 | 2,2 | 37,1 | 100,0 | 62,9 | 25,9 | 460 |
| Autres villes | 61,7 | 41,1 | 3,5 | 55,3 | 100,0 | 44,7 | 16,7 | 2 843 |
| Ensemble urbain | 63,5 | 43,9 | 3,3 | 52,8 | 100,0 | 47,2 | 18,0 | 3 303 |
| Rural | 51,2 | 27,6 | 3,8 | 68,6 | 100,0 | 31,4 | 11,2 | 4 403 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 49,8 | 25,6 | 1,1 | 73,3 | 100,0 | 26,7 | 8,2 | 947 |
| Atacora | 55,4 | 23,9 | 3,5 | 72,6 | 100,0 | 27,4 | 10,0 | 614 |
| Atlantique | 67,6 | 44,5 | 5,6 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 19,0 | 971 |
| Borgou | 39,6 | 19,6 | 4,4 | 76,0 | 100,0 | 24,0 | 10,1 | 890 |
| Collines | 60,0 | 27,8 | 2,8 | 69,4 | 100,0 | 30,6 | 15,2 | 588 |
| Couffo | 51,0 | 34,6 | 4,3 | 61,1 | 100,0 | 38,9 | 14,0 | 515 |
| Donga | 55,8 | 35,7 | 0,5 | 63,8 | 100,0 | 36,2 | 20,2 | 413 |
| Littoral | 74,8 | 60,7 | 2,2 | 37,1 | 100,0 | 62,9 | 25,9 | 460 |
| Mono | 59,1 | 36,5 | 5,0 | 58,5 | 100,0 | 41,5 | 15,7 | 375 |
| Ouémé | 55,9 | 43,3 | 2,7 | 53,9 | 100,0 | 46,1 | 11,5 | 724 |
| Plateau | 47,2 | 29,4 | 6,3 | 64,4 | 100,0 | 35,6 | 10,1 | 474 |
| Zou | 66,5 | 42,3 | 4,7 | 52,9 | 100,0 | 47,1 | 16,3 | 736 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 51,4 | 28,9 | 3,9 | 67,2 | 100,0 | 32,8 | 10,9 | 4 245 |
| Primaire | 56,6 | 36,6 | 3,6 | 59,8 | 100,0 | 40,2 | 13,8 | 1 547 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 61,5 | 38,9 | 3,4 | 57,7 | 100,0 | 42,3 | 17,1 | 1 356 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 82,5 | 61,7 | 2,2 | 36,1 | 100,0 | 63,9 | 32,6 | 558 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 40,1 | 19,1 | 2,8 | 78,1 | 100,0 | 21,9 | 7,4 | 1 424 |
| Second | 47,7 | 24,5 | 3,3 | 72,2 | 100,0 | 27,8 | 9,5 | 1 551 |
| Moyen | 54,1 | 30,1 | 4,6 | 65,2 | 100,0 | 34,8 | 12,6 | 1 422 |
| Quatrième | 65,1 | 41,5 | 4,8 | 53,7 | 100,0 | 46,3 | 16,4 | 1 574 |
| Le plus élevé | 71,8 | 53,7 | 2,7 | 43,6 | 100,0 | 56,4 | 22,9 | 1 734 |
| Ensemble 15-49 | 56,4 | 34,6 | 3,6 | 61,8 | 100,0 | 38,2 | 14,1 | 7 706 |

¹ Y compris : Ne sait pas/manquant.

Tableau 13.8.2 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui savent où on peut faire un test du VIH ; répartition (en %) des hommes de 15-49 ans selon qu'ils ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'ils ont reçu, ou non, les résultats du dernier test ; pourcentage d'hommes ayant déjà fait un test du VIH et pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage sachant où on peut faire un test du VIH | Répartition (en %) des hommes selon qu'ils ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'ils ont reçu, ou non, les résultats du dernier test | | | Total | Pourcentage ayant déjà fait un test du VIH | Pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test | Effectif d'hommes |
|--|---|---|--|---|-------|--|---|-------------------|
| | | A fait un test et a reçu le résultat | A fait un test mais n'a pas reçu le résultat | N'a jamais fait de test du VIH ¹ | | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | |
| 15-24 | 43,1 | 11,2 | 1,4 | 87,4 | 100,0 | 12,6 | 4,8 | 2 666 |
| 15-19 | 34,4 | 7,0 | 0,9 | 92,1 | 100,0 | 7,9 | 3,5 | 1 548 |
| 20-24 | 55,1 | 17,0 | 2,1 | 80,8 | 100,0 | 19,2 | 6,6 | 1 118 |
| 25-29 | 58,5 | 23,2 | 1,4 | 75,5 | 100,0 | 24,5 | 7,9 | 1 156 |
| 30-39 | 57,3 | 24,2 | 1,9 | 73,9 | 100,0 | 26,1 | 10,3 | 1 693 |
| 40-49 | 58,5 | 21,5 | 1,8 | 76,6 | 100,0 | 23,4 | 6,8 | 1 211 |
| État matrimonial | | | | | | | | |
| Célibataire | 45,7 | 13,3 | 1,2 | 85,5 | 100,0 | 14,5 | 5,5 | 2 860 |
| A déjà eu des rapports sexuels | 57,5 | 18,6 | 1,6 | 79,8 | 100,0 | 20,2 | 6,7 | 1 519 |
| N'a jamais eu de rapports sexuels | 32,3 | 7,3 | 0,8 | 91,8 | 100,0 | 8,2 | 4,0 | 1 341 |
| En union | 56,9 | 22,1 | 2,0 | 75,9 | 100,0 | 24,1 | 8,3 | 3 675 |
| En rupture d'union | 55,5 | 21,4 | 0,9 | 77,6 | 100,0 | 22,4 | 7,9 | 191 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 77,2 | 43,5 | 2,0 | 54,4 | 100,0 | 45,6 | 16,3 | 390 |
| Autres villes | 54,2 | 21,9 | 1,4 | 76,7 | 100,0 | 23,3 | 9,2 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 57,3 | 24,8 | 1,5 | 73,6 | 100,0 | 26,4 | 10,2 | 2 877 |
| Rural | 48,2 | 13,5 | 1,7 | 84,8 | 100,0 | 15,2 | 4,7 | 3 849 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 43,4 | 4,5 | 0,3 | 95,2 | 100,0 | 4,8 | 3,5 | 917 |
| Atacora | 62,9 | 19,5 | 2,3 | 78,2 | 100,0 | 21,8 | 8,9 | 560 |
| Atlantique | 56,7 | 25,7 | 2,4 | 71,9 | 100,0 | 28,1 | 7,6 | 822 |
| Borgou | 54,3 | 11,7 | 0,7 | 87,6 | 100,0 | 12,4 | 3,8 | 823 |
| Collines | 41,2 | 13,4 | 2,0 | 84,6 | 100,0 | 15,4 | 3,6 | 448 |
| Couffo | 68,9 | 28,1 | 1,7 | 70,2 | 100,0 | 29,8 | 7,6 | 409 |
| Donga | 45,6 | 18,5 | 3,3 | 78,2 | 100,0 | 21,8 | 12,8 | 445 |
| Littoral | 77,2 | 43,5 | 2,0 | 54,4 | 100,0 | 45,6 | 16,3 | 390 |
| Mono | 73,1 | 26,2 | 0,9 | 72,9 | 100,0 | 27,1 | 5,8 | 354 |
| Ouémé | 23,5 | 14,3 | 0,2 | 85,5 | 100,0 | 14,5 | 8,4 | 618 |
| Plateau | 43,8 | 17,6 | 1,3 | 81,1 | 100,0 | 18,9 | 5,7 | 340 |
| Zou | 52,6 | 18,4 | 3,3 | 78,3 | 100,0 | 21,7 | 6,6 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 39,7 | 7,3 | 1,2 | 91,5 | 100,0 | 8,5 | 2,2 | 2 426 |
| Primaire | 45,5 | 12,5 | 1,7 | 85,8 | 100,0 | 14,2 | 3,9 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 56,1 | 19,8 | 2,0 | 78,2 | 100,0 | 21,8 | 7,9 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 80,5 | 46,5 | 1,9 | 51,6 | 100,0 | 48,4 | 19,9 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 40,4 | 7,6 | 1,6 | 90,8 | 100,0 | 9,2 | 2,2 | 1 248 |
| Second | 43,8 | 10,7 | 1,9 | 87,4 | 100,0 | 12,6 | 3,7 | 1 315 |
| Moyen | 50,2 | 15,7 | 1,7 | 82,7 | 100,0 | 17,3 | 5,4 | 1 282 |
| Quatrième | 55,0 | 18,3 | 1,9 | 79,8 | 100,0 | 20,2 | 6,8 | 1 317 |
| Le plus élevé | 67,4 | 35,7 | 1,1 | 63,2 | 100,0 | 36,8 | 15,4 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 52,1 | 18,4 | 1,6 | 80,0 | 100,0 | 20,0 | 7,1 | 6 727 |
| 50-64 | 58,5 | 21,8 | 2,2 | 76,0 | 100,0 | 24,0 | 6,0 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 52,8 | 18,8 | 1,7 | 79,5 | 100,0 | 20,5 | 6,9 | 7 595 |

¹ Y compris : Ne sait pas/manquant.

Tableau 13.9 Femmes enceintes conseillées et ayant effectué un test du VIH

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH au cours d'une visite prénatale, pourcentage ayant effectué un test du VIH pendant une visite prénatale pour leur naissance la plus récente selon, qu'elles ont reçu ou non le résultat du test et qu'elles ont reçu ou non des conseils après le test; pourcentage ayant effectué un test du VIH pendant une visite prénatale ou l'accouchement pour leur naissance la plus récente, selon qu'elles ont reçu ou non le résultat du test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH au cours d'une visite prénatale ¹ | Pourcentage ayant fait un test du VIH durant une visite prénatale et qui : | | | Pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH, ayant fait un test du VIH pendant une visite prénatale et ayant reçu le résultat | Pourcentage ayant fait un test du VIH pendant une visite prénatale ou pendant l'accouchement et qui : ² | | Effectif de femmes qui ont eu une naissance dans les 2 dernières années ³ |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | ont reçu les résultats et : | Ont reçu des conseils après le test | N'ont pas reçu de conseils après le test | | N'ont pas reçu les résultats | Ont reçu le résultat | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | |
| 15-24 | 31,6 | 24,4 | 9,8 | 3,9 | 25,5 | 35,4 | 4,2 | 909 |
| 15-19 | 27,4 | 22,9 | 6,8 | 4,3 | 22,5 | 30,6 | 5,1 | 204 |
| 20-24 | 32,9 | 24,8 | 10,7 | 3,8 | 26,4 | 36,8 | 3,9 | 705 |
| 25-29 | 36,3 | 29,3 | 10,1 | 4,0 | 29,9 | 41,3 | 4,0 | 829 |
| 30-39 | 38,9 | 29,7 | 12,3 | 3,7 | 33,9 | 43,8 | 3,5 | 798 |
| 40-49 | 38,1 | 32,9 | 8,3 | 4,5 | 32,8 | 43,8 | 4,5 | 156 |
| État matrimonial | | | | | | | | |
| Célibataire | 48,7 | 36,6 | 16,5 | 4,7 | 41,9 | 53,1 | 4,7 | 101 |
| En union | 35,1 | 27,8 | 10,2 | 3,9 | 29,2 | 39,6 | 4,0 | 2 529 |
| En rupture d'union | 32,5 | 22,1 | 16,1 | 2,3 | 31,6 | 42,5 | 2,3 | 63 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 65,3 | 55,5 | 25,6 | 4,9 | 60,8 | 82,9 | 4,9 | 102 |
| Autres villes | 41,1 | 32,6 | 12,9 | 3,5 | 35,6 | 47,6 | 3,7 | 954 |
| Ensemble urbain | 43,4 | 34,8 | 14,1 | 3,7 | 38,0 | 51,0 | 3,8 | 1 056 |
| Rural | 30,5 | 23,5 | 8,3 | 4,1 | 24,4 | 33,2 | 4,0 | 1 637 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 26,4 | 24,3 | 1,7 | 0,4 | 21,5 | 26,2 | 0,4 | 390 |
| Atacora | 25,2 | 21,6 | 3,9 | 4,5 | 21,4 | 25,8 | 4,5 | 246 |
| Atlantique | 47,9 | 32,0 | 20,9 | 7,1 | 37,7 | 53,3 | 7,7 | 284 |
| Borgou | 19,1 | 14,6 | 3,4 | 3,3 | 14,1 | 19,9 | 2,2 | 379 |
| Collines | 35,9 | 23,7 | 13,4 | 5,0 | 25,3 | 38,5 | 5,6 | 174 |
| Couffo | 47,5 | 29,6 | 16,4 | 5,0 | 40,5 | 48,2 | 5,0 | 187 |
| Donga | 35,1 | 31,1 | 11,2 | 0,4 | 30,9 | 43,4 | 0,4 | 190 |
| Littoral | 65,3 | 55,5 | 25,6 | 4,9 | 60,8 | 82,9 | 4,9 | 102 |
| Mono | 39,4 | 34,1 | 11,5 | 4,3 | 34,6 | 46,9 | 4,3 | 95 |
| Ouémé | 38,6 | 36,7 | 13,4 | 4,0 | 34,8 | 50,1 | 4,0 | 236 |
| Plateau | 27,4 | 19,7 | 11,7 | 5,3 | 24,7 | 35,7 | 6,6 | 184 |
| Zou | 53,6 | 40,4 | 13,3 | 5,8 | 45,7 | 60,9 | 5,9 | 226 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 28,3 | 21,5 | 8,0 | 3,9 | 22,7 | 31,4 | 3,8 | 1 683 |
| Primaire | 42,5 | 34,3 | 10,4 | 4,1 | 36,1 | 45,9 | 4,6 | 529 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 50,7 | 38,0 | 20,7 | 3,9 | 44,3 | 59,4 | 3,9 | 332 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 59,4 | 55,9 | 17,7 | 3,4 | 54,8 | 77,0 | 3,4 | 149 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 18,6 | 12,3 | 5,6 | 3,4 | 14,1 | 18,9 | 3,1 | 629 |
| Second | 27,9 | 22,8 | 6,8 | 3,0 | 22,1 | 30,8 | 3,4 | 585 |
| Moyen | 39,0 | 29,2 | 9,4 | 5,3 | 31,8 | 40,2 | 4,9 | 507 |
| Quatrième | 41,9 | 34,9 | 14,5 | 4,5 | 35,3 | 52,3 | 5,1 | 511 |
| Le plus élevé | 57,8 | 46,8 | 18,9 | 3,6 | 52,5 | 67,6 | 3,4 | 460 |
| Ensemble 15-49 | 35,6 | 28,0 | 10,6 | 3,9 | 29,8 | 40,2 | 3,9 | 2 693 |

¹ « Conseils » signifie ici que quelqu'un a parlé à l'enquêtée des trois sujets suivants: 1) la transmission du virus du sida de la mère au bébé, 2) la prévention du virus et 3) effectuer un test du VIH.

² La question concernant le test du VIH pendant l'accouchement n'a été posée qu'aux femmes qui ont accouché en établissement de santé.

³ Sont incluses dans le dénominateur les femmes qui n'ont pas reçu de soins prénatals pour leur dernière naissance ayant eu lieu au cours des deux dernières années.

Tableau 13.10 Circoncision

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans selon leur statut vis-à-vis de la circoncision et selon la personne qui a pratiqué la circoncision et pourcentage d'hommes circoncis, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Circoncis par : | | | Non circoncis | Ne sait pas/ manquant | Total | Pourcentage d'hommes circoncis ¹ | Effectif d'hommes |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------|---|-------------------|
| | Personnel de santé/ professionnel | Praticien traditionnel/ famille/amis | Autre/ ne sait pas/ manquant | | | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | |
| 15-24 | 17,0 | 74,2 | 2,3 | 6,0 | 0,4 | 100,0 | 93,6 | 2 666 |
| 15-19 | 17,1 | 74,7 | 2,0 | 5,7 | 0,4 | 100,0 | 93,8 | 1 548 |
| 20-24 | 16,9 | 73,6 | 2,7 | 6,5 | 0,3 | 100,0 | 93,2 | 1 118 |
| 25-29 | 13,4 | 77,3 | 2,9 | 6,1 | 0,3 | 100,0 | 93,6 | 1 156 |
| 30-39 | 10,6 | 83,0 | 2,3 | 4,0 | 0,1 | 100,0 | 95,8 | 1 693 |
| 40-49 | 8,4 | 85,3 | 2,1 | 4,0 | 0,2 | 100,0 | 95,9 | 1 211 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 32,3 | 59,1 | 5,8 | 2,5 | 0,2 | 100,0 | 97,3 | 390 |
| Autres villes | 15,3 | 78,8 | 2,1 | 3,5 | 0,2 | 100,0 | 96,2 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 17,6 | 76,1 | 2,6 | 3,4 | 0,2 | 100,0 | 96,4 | 2 877 |
| Rural | 9,9 | 81,1 | 2,2 | 6,5 | 0,3 | 100,0 | 93,2 | 3 849 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 0,8 | 98,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 100,0 | 99,2 | 917 |
| Atacora | 2,9 | 47,6 | 6,2 | 42,0 | 1,3 | 100,0 | 56,7 | 560 |
| Atlantique | 16,4 | 81,3 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 100,0 | 99,2 | 822 |
| Borgou | 6,3 | 87,1 | 4,2 | 2,3 | 0,2 | 100,0 | 97,6 | 823 |
| Collines | 16,9 | 79,0 | 2,3 | 1,8 | 0,0 | 100,0 | 98,2 | 448 |
| Couffo | 33,0 | 64,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 409 |
| Donga | 5,2 | 85,5 | 0,9 | 8,1 | 0,3 | 100,0 | 91,7 | 445 |
| Littoral | 32,3 | 59,1 | 5,8 | 2,5 | 0,2 | 100,0 | 97,3 | 390 |
| Mono | 40,0 | 58,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 99,7 | 354 |
| Ouémé | 13,7 | 80,4 | 2,5 | 3,2 | 0,2 | 100,0 | 96,5 | 618 |
| Plateau | 12,6 | 84,1 | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 99,1 | 340 |
| Zou | 8,3 | 89,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 100,0 | 98,6 | 600 |
| Religion | | | | | | | | |
| Vodoun | 19,9 | 66,9 | 1,5 | 11,0 | 0,7 | 100,0 | 88,3 | 717 |
| Autre traditionnelles | 5,2 | 81,5 | 4,4 | 8,9 | 0,0 | 100,0 | 91,1 | 71 |
| Islam | 5,2 | 90,0 | 2,7 | 1,9 | 0,1 | 100,0 | 98,0 | 2 236 |
| Catholique | 19,8 | 70,9 | 3,1 | 5,9 | 0,2 | 100,0 | 93,8 | 1 739 |
| Protestante Méthodiste | 11,9 | 85,6 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 99,1 | 205 |
| Autre Protestants | 15,9 | 77,9 | 0,8 | 5,1 | 0,3 | 100,0 | 94,6 | 292 |
| Célestes | 12,3 | 84,2 | 1,4 | 1,9 | 0,2 | 100,0 | 97,9 | 409 |
| Autres chrétiens | 18,7 | 75,7 | 2,0 | 3,1 | 0,4 | 100,0 | 96,5 | 586 |
| Autres religions | 10,1 | 85,6 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 100,0 | 98,8 | 76 |
| Aucune | 10,5 | 68,4 | 1,8 | 18,3 | 0,9 | 100,0 | 80,8 | 396 |
| Ensemble 15-49 | 13,2 | 79,0 | 2,4 | 5,2 | 0,3 | 100,0 | 94,6 | 6 727 |
| 50-64 | 5,0 | 88,9 | 2,1 | 3,7 | 0,3 | 100,0 | 96,0 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 12,3 | 80,1 | 2,4 | 5,0 | 0,3 | 100,0 | 94,7 | 7 595 |

¹ Y compris tous les hommes ayant déclaré être circoncis, quel que soit le prestataire qui a pratiqué la circoncision.

Tableau 13.11 Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST

Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, pourcentage ayant déclaré avoir eu une IST et/ou des symptômes d'IST, au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | | | | | | | | Homme | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---|-------------------------|--|--|
| | Pourcentage de femmes ayant eu au cours des 12 derniers mois : | | | | | Effectif de femmes ayant déjà eu des rapports sexuels | | | | | Pourcentage d'hommes ayant eu au cours des 12 derniers mois : | | | |
| | IST | Pertes vaginales anormales/ malodorantes | Plaie/ulcère génital | IST/pertes génitales/ plaie ou ulcère | IST/pertes génitales/ plaie ou ulcère | IST | IST/pertes génitales/ plaie ou ulcère | IST | IST/pertes génitales/ plaie ou ulcère | IST | Écoulement anormal du pénis | Plaie ou ulcère génital | IST/écoulement anormal du pénis/ plaie ou ulcère | Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-24 | 7,5 | 14,7 | 7,5 | 18,9 | 18,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,2 | 5,9 | 1 368 | |
| 15-19 | 8,4 | 15,3 | 8,3 | 20,8 | 20,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 1,8 | 7,2 | 450 | |
| 20-24 | 7,0 | 14,3 | 7,1 | 17,9 | 17,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 5,2 | 918 | |
| 25-29 | 7,7 | 13,2 | 5,5 | 17,4 | 17,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 1,5 | 6,1 | 1 124 | |
| 30-39 | 6,6 | 10,4 | 5,3 | 14,9 | 14,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 2,0 | 4,5 | 1 684 | |
| 40-49 | 6,0 | 9,8 | 5,4 | 13,7 | 13,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1 210 | |
| État matrimonial | | | | | | | | | | | | | | |
| Célibataire | 7,5 | 15,2 | 7,4 | 19,9 | 19,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 6,2 | 1 519 | |
| En union | 6,9 | 11,9 | 6,1 | 16,1 | 16,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 4,5 | 3 675 | |
| En rupture d'union | 7,3 | 10,6 | 2,1 | 13,6 | 13,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 1,7 | 1,0 | 5,0 | 191 | |
| Circoncis | | | | | | | | | | | | | | |
| Oui ¹ | na | na | na | na | na | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 5,0 | 5 117 | |
| Non | na | na | na | na | na | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 0,8 | 4,5 | 259 | |
| Ne sait pas/manquant | na | na | na | na | na | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 9,9 | 14,1 | 4,3 | 18,0 | 18,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 3,5 | 325 | |
| Autres villes | 7,2 | 12,2 | 6,5 | 16,3 | 16,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 1,9 | 5,1 | 1 990 | |
| Ensemble urbain | 7,5 | 12,5 | 6,2 | 16,6 | 16,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 4,9 | 2 315 | |
| Rural | 6,6 | 12,1 | 5,9 | 16,5 | 16,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,7 | 5,0 | 3 071 | |
| Département | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 18,1 | 24,0 | 10,7 | 30,0 | 30,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 2,5 | 689 | |
| Atacora | 2,1 | 9,9 | 5,7 | 14,7 | 14,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 4,0 | 8,3 | 450 | |
| Atlantique | 6,9 | 11,5 | 4,7 | 15,3 | 15,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 4,5 | 11,4 | 667 | |
| Borgou | 5,0 | 15,3 | 9,0 | 19,5 | 19,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 0,9 | 3,9 | 671 | |
| Collines | 5,1 | 6,8 | 4,9 | 11,1 | 11,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 1,8 | 5,9 | 363 | |
| Couffo | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4,4 | 2,1 | 6,3 | 337 | |
| Donga | 1,9 | 10,9 | 5,0 | 13,8 | 13,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 0,2 | 2,7 | 339 | |
| Littoral | 9,9 | 14,1 | 4,3 | 18,0 | 18,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 3,5 | 325 | |
| Mono | 8,1 | 18,9 | 9,1 | 22,6 | 22,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 5,2 | 7,7 | 274 | |
| Ouémé | 3,6 | 5,5 | 2,1 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473 | |
| Plateau | 7,6 | 8,8 | 3,0 | 14,8 | 14,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 300 | |
| Zou | 7,1 | 8,3 | 4,2 | 12,8 | 12,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 0,9 | 4,2 | 498 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 7,1 | 12,0 | 6,3 | 16,3 | 16,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | 3,8 | 2 094 | |
| Primaire | 5,7 | 10,5 | 5,0 | 14,2 | 14,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 4,8 | 1 273 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 7,5 | 13,2 | 6,5 | 17,6 | 17,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 2,5 | 7,3 | 1 009 | |
| Secondaire 2 nd cycle ou plus | 8,8 | 17,7 | 6,0 | 22,4 | 22,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 1,8 | 1,4 | 5,3 | 1 010 | |

A suivre...

Tableau 13.11—Suite

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | | | | Homme | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|--|-----|---|-----------------------------|---|---|--|--|
| | Pourcentage de femmes ayant eu au cours des 12 derniers mois : | | | Pourcentage d'hommes ayant eu au cours des 12 derniers mois : | | | IST/écoulement anormal du pénis/ plaie ou ulcère | | | Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels | | |
| | IST | Pertes vaginales anormales/ malodorantes | Plaque/ulcère génital | IST/pertes génitales/ plaie ou ulcère | Effectif de femmes ayant déjà eu des rapports sexuels | IST | Écoulement anormal du pénis | Plaque ou ulcère génital | IST/écoulement anormal du pénis/ plaie ou ulcère | Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels | | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 7,5 | 13,6 | 7,4 | 18,4 | 1 298 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 5,7 | 1 021 | | |
| Second | 7,3 | 12,6 | 5,9 | 16,6 | 1 348 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 4,3 | 1 010 | | |
| Moyen | 5,4 | 10,3 | 5,5 | 14,3 | 1 279 | 2,9 | 2,6 | 1,4 | 4,7 | 1 009 | | |
| Quatrième | 7,4 | 12,6 | 6,0 | 16,6 | 1 385 | 2,6 | 3,9 | 2,0 | 5,9 | 1 053 | | |
| Le plus élevé | 7,3 | 12,3 | 5,5 | 16,6 | 1 458 | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 4,4 | 1 292 | | |
| Ensemble 15-49 | 7,0 | 12,3 | 6,0 | 16,5 | 6 769 | 2,7 | 2,7 | 1,7 | 5,0 | 5 386 | | |
| 50-64 | na | na | na | na | na | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 2,1 | 868 | | |
| Ensemble 15-64 | na | na | na | na | na | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 4,6 | 6 254 | | |

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

1 Y compris tous les hommes ayant déclaré être circoncis, sans tenir compte du prestataire.

Tableau 13.12 Femmes et hommes ayant recherché un traitement contre les IST

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant déclaré avoir une IST ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois qui ont recherché des conseils ou un traitement, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Source de conseils ou traitements | Pourcentage de femmes | Pourcentage d'hommes |
|---|-----------------------|----------------------|
| Clinique/hôpital/médecin privé/autre professionnel de santé | 27,7 | 28,4 |
| Conseils ou médicaments d'une boutique/pharmacie | 7,5 | 4,1 |
| Conseils ou traitements d'une autre source | 4,8 | 19,2 |
| Pas de conseils ou traitements | 61,2 | 46,0 |
| Effectif avec IST ou symptômes d'IST | 1 118 | 268 |

IST : Infection sexuellement transmissible

Tableau 13.13 Connaissance « approfondie » du VIH parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans ayant une connaissance « approfondie » du VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme de 15-24 ans | | Homme de 15-24 ans | |
|---|---|--------------------|---|-------------------|
| | Pourcentage ayant eu une connaissance « approfondie » sur le VIH ¹ | Effectif de femmes | Pourcentage ayant eu une connaissance « approfondie » sur le VIH ¹ | Effectif d'hommes |
| Groupe d'âges | | | | |
| 15-19 | 14,1 | 1 617 | 14,4 | 1 548 |
| 15-17 | 11,4 | 999 | 11,8 | 1 006 |
| 18-19 | 18,5 | 618 | 19,3 | 542 |
| 20-24 | 16,1 | 1 423 | 24,3 | 1 118 |
| 20-22 | 14,6 | 922 | 23,6 | 723 |
| 23-24 | 18,8 | 501 | 25,6 | 395 |
| État matrimonial | | | | |
| Célibataire | 16,5 | 1 746 | 18,8 | 2 357 |
| A déjà eu des rapports sexuels | 20,9 | 824 | 22,9 | 1 059 |
| N'a jamais eu de rapports sexuels | 12,6 | 922 | 15,4 | 1 298 |
| En union | 13,1 | 1 294 | 17,1 | 309 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 25,2 | 170 | 30,2 | 149 |
| Autres villes | 19,3 | 1 120 | 21,2 | 940 |
| Ensemble urbain | 20,1 | 1 289 | 22,5 | 1 089 |
| Rural | 11,3 | 1 751 | 15,9 | 1 577 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucun | 8,2 | 1 049 | 8,8 | 619 |
| Primaire | 8,9 | 765 | 8,6 | 543 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 20,8 | 917 | 19,4 | 970 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 36,4 | 309 | 38,6 | 534 |
| Ensemble | 15,0 | 3 040 | 18,6 | 2 666 |

¹ Sont considérés comme ayant une connaissance « approfondie », les jeunes qui savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH, ceux qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du sida. Les composantes de la connaissance « approfondie » sont présentées aux Tableaux 13.2 et 13.3.

Tableau 13.14 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 18-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme de 15-24 ans | | Femme de 18-24 ans | | Homme de 15-24 ans | | Homme de 18-24 ans | |
|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans | Effectif de femmes de 15-24 | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | Effectif de femmes de 18-24 | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans | Effectif d'hommes de 15-24 | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | Effectif d'hommes de 18-24 |
| Groupe d'âges | | | | | | | | |
| 15-19 | 12,0 | 3 350 | na | na | 6,2 | 1 548 | na | na |
| 15-17 | 11,1 | 2 097 | na | na | 5,8 | 1 006 | na | na |
| 18-19 | 13,4 | 1 253 | 63,5 | 1 253 | 7,0 | 542 | 41,5 | 542 |
| 20-24 | 12,4 | 2 923 | 61,0 | 2 923 | 9,5 | 1 118 | 38,2 | 1 118 |
| 20-22 | 12,1 | 1 913 | 62,4 | 1 913 | 9,0 | 723 | 38,3 | 723 |
| 23-24 | 12,9 | 1 010 | 58,2 | 1 010 | 10,6 | 395 | 38,1 | 395 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 5,1 | 351 | 46,1 | 225 | 14,8 | 149 | 48,1 | 104 |
| Autres villes | 10,5 | 2 280 | 54,9 | 1 531 | 5,9 | 940 | 36,7 | 593 |
| Ensemble urbain | 9,8 | 2 631 | 53,7 | 1 756 | 7,2 | 1 089 | 38,4 | 697 |
| Rural | 13,9 | 3 641 | 67,5 | 2 420 | 7,9 | 1 577 | 39,9 | 963 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 17,0 | 2 186 | 71,1 | 1 645 | 2,9 | 619 | 31,1 | 395 |
| Primaire | 12,5 | 1 516 | 66,0 | 895 | 9,0 | 543 | 46,0 | 297 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 8,8 | 1 928 | 56,0 | 1 118 | 9,2 | 970 | 42,4 | 518 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 4,9 | 643 | 37,0 | 518 | 8,7 | 534 | 38,5 | 451 |
| Ensemble | 12,2 | 6 273 | 61,7 | 4 176 | 7,6 | 2 666 | 39,3 | 1 660 |

na = Non applicable

Tableau 13.15 Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes

Parmi les femmes et les hommes de 15-24 ans célibataires, pourcentage qui n'ont jamais eu de rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femmes de 15-24 ans | | Hommes de 15-24 ans | |
|---|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
| | Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels | Effectif de femmes célibataires | Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels | Effectif d'hommes célibataires |
| Groupe d'âges | | | | |
| 15-19 | 64,1 | 2 722 | 71,4 | 1 538 |
| 15-17 | 73,2 | 1 933 | 84,3 | 1 003 |
| 18-19 | 42,0 | 789 | 47,1 | 535 |
| 20-24 | 21,6 | 876 | 24,4 | 819 |
| 20-22 | 24,2 | 661 | 29,2 | 578 |
| 23-24 | 13,5 | 215 | 13,0 | 241 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 51,5 | 271 | 44,2 | 145 |
| Autres villes | 53,3 | 1 446 | 56,0 | 850 |
| Ensemble urbain | 53,0 | 1 717 | 54,3 | 996 |
| Rural | 54,5 | 1 881 | 55,6 | 1 361 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucun | 55,2 | 770 | 61,9 | 509 |
| Primaire | 58,7 | 902 | 59,0 | 472 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 54,7 | 1 392 | 58,6 | 893 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 40,8 | 534 | 37,5 | 483 |
| Ensemble 15-24 | 53,8 | 3 598 | 55,1 | 2 357 |

Tableau 13.16.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme

Parmi toutes les jeunes femmes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient ; parmi les femmes de 15-24 ans ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé pendant les derniers rapports sexuels et pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins 10 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femmes de 15-24 ans | | | Femmes de 15-24 ans ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois | | Femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois | |
|---|--|--|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non-marital, non-cohabitant | Effectif de femmes | Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels | Effectif de femmes | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins dix ans | Effectif de femmes |
| Groupe d'âges | | | | | | | |
| 15-19 | 2,7 | 26,1 | 3 350 | 38,7 | 91 | 25,7 | 873 |
| 15-17 | 2,5 | 22,3 | 2 097 | (28,7) | 52 | 22,9 | 468 |
| 18-19 | 3,1 | 32,3 | 1 253 | (52,2) | 39 | 28,9 | 405 |
| 20-24 | 2,5 | 22,0 | 2 923 | 23,8 | 72 | 26,7 | 644 |
| 20-22 | 2,7 | 24,0 | 1 913 | 22,6 | 51 | 25,2 | 460 |
| 23-24 | 2,1 | 18,2 | 1 010 | * | 21 | 30,4 | 184 |
| État matrimonial | | | | | | | |
| Célibataire | 3,8 | 39,9 | 3 598 | 37,0 | 138 | 27,1 | 1 437 |
| En union | 0,9 | 3,0 | 2 674 | (4,5) | 25 | 9,0 | 80 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 4,3 | 31,7 | 351 | * | 15 | 27,9 | 111 |
| Autres villes | 2,5 | 26,2 | 2 280 | 36,8 | 56 | 33,5 | 598 |
| Ensemble urbain | 2,7 | 27,0 | 2 631 | 38,4 | 71 | 32,6 | 710 |
| Rural | 2,5 | 22,2 | 3 641 | 27,2 | 92 | 20,4 | 807 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucun | 1,9 | 14,8 | 2 186 | (25,7) | 41 | 15,3 | 324 |
| Primaire | 2,5 | 22,4 | 1 516 | (20,6) | 38 | 16,1 | 340 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,9 | 29,7 | 1 928 | 47,0 | 56 | 30,2 | 572 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 4,2 | 43,5 | 643 | (26,9) | 27 | 42,4 | 280 |
| Ensemble 15-24 | 2,6 | 24,2 | 6 273 | 32,1 | 163 | 26,1 | 1 516 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.16.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme

Parmi tous les jeunes hommes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse ni la partenaire avec qui ils vivaient ; parmi les hommes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé pendant les derniers rapports sexuels ; parmi les jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse ni la partenaire avec qui ils vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec ce partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Hommes de 15-24 ans | | | Hommes de 15-24 ans ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois | | Hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse ni la partenaire avec qui ils vivaient | |
|---|--|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois | Pourcentage ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non-marital, non-cohabitant | Effectif d'hommes | Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels | Effectif d'hommes | Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec ce partenaire | Effectif d'hommes |
| Groupe d'âges | | | | | | | |
| 15-19 | 3,6 | 21,5 | 1 548 | 26,2 | 55 | 27,4 | 334 |
| 15-17 | 1,7 | 11,3 | 1 006 | * | 17 | 26,1 | 114 |
| 18-19 | 7,0 | 40,6 | 542 | (27,8) | 38 | 28,1 | 220 |
| 20-24 | 18,1 | 50,1 | 1 118 | 32,2 | 203 | 33,2 | 560 |
| 20-22 | 14,2 | 47,4 | 723 | 34,5 | 103 | 31,0 | 343 |
| 23-24 | 25,4 | 55,2 | 395 | 29,8 | 100 | 36,8 | 218 |
| État matrimonial | | | | | | | |
| Célibataire | 7,9 | 34,1 | 2 357 | 35,8 | 186 | 31,6 | 804 |
| En union | 23,4 | 29,2 | 309 | 18,2 | 72 | 26,1 | 90 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 18,6 | 39,9 | 149 | (58,5) | 28 | 49,1 | 60 |
| Autres villes | 9,2 | 31,7 | 940 | 35,7 | 86 | 45,5 | 298 |
| Ensemble urbain | 10,5 | 32,9 | 1 089 | 41,2 | 114 | 46,1 | 358 |
| Rural | 9,1 | 34,0 | 1 577 | 22,8 | 144 | 21,0 | 536 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucun | 8,2 | 29,0 | 619 | 8,4 | 51 | 12,7 | 179 |
| Primaire | 10,4 | 32,3 | 543 | 26,1 | 57 | 23,5 | 176 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 8,3 | 31,4 | 970 | 30,8 | 80 | 32,8 | 305 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 13,2 | 43,8 | 534 | 51,2 | 70 | 48,6 | 234 |
| Ensemble 15-24 | 9,7 | 33,5 | 2 666 | 30,9 | 258 | 31,1 | 894 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.17 Tests du VIH récents parmi les jeunes

Parmi les jeunes femmes et les jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, pourcentage ayant été testé pour le VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | | Hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | |
|------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|
| | Pourcentage ayant effectué un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test | Effectif de femmes | Pourcentage ayant effectué un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test | Effectif d'hommes |
| Groupe d'âges | | | | |
| 15-19 | 9,9 | 697 | 3,8 | 340 |
| 15-17 | 5,4 | 297 | 1,6 | 115 |
| 18-19 | 13,2 | 400 | 4,9 | 225 |
| 20-24 | 19,0 | 1 194 | 6,3 | 770 |
| 20-22 | 17,5 | 756 | 4,1 | 447 |
| 23-24 | 21,6 | 438 | 9,3 | 323 |
| État matrimonial | | | | |
| Célibataire | 11,9 | 707 | 6,0 | 804 |
| En union | 17,9 | 1 185 | 4,3 | 306 |
| Ensemble 15-24 | 15,6 | 1 892 | 5,5 | 1 110 |

Tableau 13.18 Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler des autotests de dépistage du VIH et pourcentage qui ont utilisé un autotest de dépistage du VIH, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | Homme | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | A entendu parler de l'autotest du VIH | A utilisé un autotest du VIH | Effectif de femmes | A entendu parler de l'autotest du VIH | A utilisé un autotest du VIH | Effectif d'hommes |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 7,1 | 1,4 | 1 617 | 2,3 | 0,0 | 1 548 |
| 20-24 | 8,1 | 1,5 | 1 423 | 4,8 | 0,2 | 1 118 |
| 25-29 | 8,7 | 1,1 | 1 502 | 5,5 | 0,5 | 1 156 |
| 30-34 | 11,5 | 1,5 | 1 028 | 7,3 | 1,3 | 881 |
| 35-39 | 7,9 | 0,8 | 933 | 8,0 | 1,2 | 812 |
| 40-44 | 9,6 | 1,6 | 607 | 6,2 | 0,4 | 620 |
| 45-49 | 6,5 | 1,0 | 595 | 6,6 | 0,6 | 592 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 18,0 | 3,9 | 460 | 14,3 | 1,0 | 390 |
| Autres villes | 10,1 | 1,3 | 2 843 | 5,6 | 0,5 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 11,2 | 1,7 | 3 303 | 6,8 | 0,5 | 2 877 |
| Rural | 6,3 | 1,0 | 4 403 | 4,2 | 0,5 | 3 849 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 5,5 | 1,1 | 947 | 5,0 | 1,0 | 917 |
| Atacora | 3,4 | 0,8 | 614 | 3,6 | 0,4 | 560 |
| Atlantique | 10,5 | 1,1 | 971 | 7,6 | 0,3 | 822 |
| Borgou | 4,8 | 1,3 | 890 | 1,9 | 0,0 | 823 |
| Collines | 4,4 | 1,0 | 588 | 4,1 | 0,1 | 448 |
| Couffo | 15,9 | 2,6 | 515 | 17,0 | 0,8 | 409 |
| Donga | 4,9 | 0,8 | 413 | 2,6 | 0,7 | 445 |
| Littoral | 18,0 | 3,9 | 460 | 14,3 | 1,0 | 390 |
| Mono | 14,8 | 2,0 | 375 | 4,6 | 0,6 | 354 |
| Ouémé | 7,9 | 0,0 | 724 | 2,4 | 0,6 | 618 |
| Plateau | 13,9 | 0,7 | 474 | 3,2 | 0,4 | 340 |
| Zou | 5,6 | 1,3 | 736 | 2,8 | 0,6 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 5,5 | 0,6 | 4 245 | 2,5 | 0,1 | 2 426 |
| Primaire | 6,8 | 1,1 | 1 547 | 3,8 | 0,1 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 11,9 | 2,1 | 1 356 | 4,5 | 0,6 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 27,1 | 4,5 | 558 | 14,1 | 1,9 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 3,7 | 0,7 | 1 424 | 3,2 | 0,2 | 1 248 |
| Second | 5,6 | 1,0 | 1 551 | 4,0 | 0,2 | 1 315 |
| Moyen | 6,7 | 0,8 | 1 422 | 4,1 | 0,5 | 1 282 |
| Quatrième | 8,3 | 1,0 | 1 574 | 4,2 | 0,4 | 1 317 |
| Le plus élevé | 16,3 | 2,6 | 1 734 | 10,1 | 1,2 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 8,4 | 1,3 | 7 706 | 5,3 | 0,5 | 6 727 |
| 50-64 | na | na | na | 5,9 | 0,2 | 868 |
| Ensemble 15-64 | na | na | na | 5,4 | 0,5 | 7 595 |

na = Non applicable

Résultats clés

- **Emploi et type de rémunération** : Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans en union, respectivement 84 % et 99 % avaient travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Le pourcentage de femmes non rémunérées pour leur travail est plus élevé que celui des hommes (14 % contre 4 %). Par contre, dans une même proportion, les femmes et les hommes ont été rémunérés en argent uniquement (respectivement 70 % et 71 %).
- **Contrôle de l'utilisation des gains de la femme** : Au Bénin, 73 % des femmes en union qui gagnent de l'argent décident elles-mêmes de son utilisation. Dans 19 % des cas, cette décision est prise conjointement dans le couple mais dans 8 % des cas, c'est le conjoint qui décide principalement de l'utilisation de leurs gains.
- **Participation dans la prise de décision** : Globalement, 36 % des femmes en union ont participé à la prise des trois décisions à savoir : les soins de santé de la femme, les achats importants pour le ménage et les visites à la famille ou parents de la femme. Par contre, 27 % n'ont été impliquées dans la prise d'aucune de ces décisions.
- **Opinions concernant le fait qu'un mari batte sa femme/partenaire** : Parmi les femmes de 15-49 ans, 32 % pensent qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme pour au moins une des raisons suivantes : brûle la nourriture, argumente avec lui, sort sans le lui dire, néglige les enfants et refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui. Chez les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage est de 16 %.

Ce chapitre est consacré à l'analyse des résultats concernant le pouvoir d'action des femmes en termes d'emploi, de revenus, de gestion de leurs gains. Il aborde aussi les écarts de revenus par rapport à ceux de leurs conjoints. En outre, à partir des réponses des femmes à des questions spécifiques, deux indicateurs différents du pouvoir d'action des femmes ont été élaborés : la participation des femmes dans la prise de décision dans le ménage et l'opinion des femmes sur le fait de battre son épouse/partenaire.

14.1 EMPLOI DES FEMMES ET DES HOMMES EN UNION

Emploi

On considère que les enquêtés ont travaillé s'ils ont effectué n'importe quel travail autre que leur travail domestique au cours des 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union

Rémunération en argent pour le travail effectué

On demande aux enquêtés s'ils sont payés en argent ou en nature pour le travail effectué. Seuls ceux qui ont été payés en argent seulement ou en argent et en nature sont considérés comme ayant gagné de l'argent pour leur travail.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union ayant travaillé au cours des 12 derniers mois

Au Bénin, un peu plus de huit femmes sur dix (84 %) et la quasi-totalité des hommes (99 %) en union, ont travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Les résultats par type de rémunération montrent que le pourcentage de femmes non rémunérées pour leur travail est plus élevé que celui des hommes (14 % contre 4 %). Dans une même proportion, les femmes et les hommes en union ont été rémunérés en argent uniquement (respectivement 70 % et 71 %) (Tableau 14.1) et 14 % des femmes contre 24 % des hommes âgés de 15-49 ans ont été rémunérés en argent et en nature.


Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, les pourcentages des femmes et d'hommes en union de 15-49 ans ayant travaillé à n'importe quel moment, au cours des 12 derniers mois, ont augmenté, passant chez les femmes de 74 % à 84 % et, chez les hommes, de 95 % à 99 % sur la période.

Variations par caractéristique

Les variations selon l'âge sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes. En effet, de 58 % à 15-19 ans, le pourcentage de femmes ayant travaillé passe à 88 % à 30-34 ans et atteint 93 % à 45-49 ans. Chez les hommes, il n'y a pratiquement pas de variations avec l'âge, le pourcentage s'établissant à 99 %, quel que soit le groupe d'âges (Graphique 14.1, Tableau 14.1).

Graphique 14.1 Emploi par âge

Pourcentage de femmes et d'hommes actuellement en union qui ont travaillé à n'importe quel moment au cours des 12 mois avant l'enquête



14.2 CONTRÔLE DES GAINS DE LA FEMME

Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné

On considère que les enquêtés contrôlent l'utilisation de l'argent qu'ils/elles ont gagné s'ils/elles décident, soit seul(e)s, soit ensemble avec leur conjoint de l'utilisation de leur argent.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ont été payés en argent pour leur travail au cours des 12 derniers mois.

Le contrôle de l'utilisation du revenu de la femme est considéré comme l'un des indicateurs du statut de la femme. En effet, il permet de mesurer son niveau d'autonomie financière. Pour en obtenir une évaluation, on a demandé aux femmes de 15-49 ans, en union, ayant travaillé au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête et ayant gagné de l'argent, qui décidait principalement de l'utilisation de l'argent qu'elles avaient gagné.

Globalement, les femmes béninoises en union qui travaillent ont une autonomie financière assez élevée, puisque 73 % d'entre elles décident elles-mêmes de l'utilisation de leurs gains et 19 % décident ensemble avec leur conjoint. Dans la grande majorité des cas, les femmes béninoises participent dans la décision concernant l'utilisation de leurs gains (92 %) (**Tableau 14.2.1**). Par contre, 8 % des femmes ont déclaré que c'est le conjoint qui décide principalement de l'utilisation de leurs gains (**Graphique 14.2**).

Au cours de l'enquête, on a également demandé aux femmes si elles pensent qu'elles gagnent plus, moins ou à peu près la même chose que leurs maris/partenaires. Les résultats montrent qu'environ les trois quarts (76 %) des femmes en union ayant travaillé pensent gagner moins que leurs conjoints, 8 % à peu près la même chose et 7 % ont déclaré qu'elles pensaient gagner plus que leurs conjoints.

Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, on note une légère augmentation de la proportion de femmes en union qui décident de l'utilisation de leurs revenus, celle-ci étant passée de 70 % à 73 % au cours de la période. À l'opposé, la proportion de femmes ayant déclaré que le conjoint décidait principalement de l'utilisation de leurs revenus a diminué, passant de 12 % à 8 %.

Variations par caractéristique


- Le pourcentage de femmes ayant un contrôle sur la décision d'utilisation de leurs gains a tendance à augmenter avec le nombre d'enfants vivants, passant de 69 % à la parité 0 à 75 % à la parité 5 ou plus.
- Le milieu de résidence influence aussi leur degré d'autonomie financière puisque 76 % des femmes du milieu urbain décident principalement de l'utilisation de leurs gains contre 72 % en milieu rural.
- On note des écarts importants entre départements, le pourcentage de femmes qui décident principalement de l'utilisation de leurs revenus variant de 93 % dans l'Ouémé à 31 % dans le Couffo.

14.3 CONTRÔLE DES GAINS DE L'HOMME

Au cours de l'EDSB-V, on a aussi demandé aux hommes en union qui avaient été rémunérés en argent qui décidait principalement de l'utilisation de leurs gains. Dans plus des trois quarts des cas (76 %), les hommes ont déclaré qu'ils décident eux-mêmes de l'utilisation de leurs revenus. Toutefois, dans 21 % des cas, les épouses/partenaires sont impliquées dans la décision. Seulement 1 % des hommes laissent la gestion de leurs revenus à leur épouse/partenaire (**Tableau 14.2.2**). Le tableau présente également la répartition des femmes dont le mari/partenaire a gagné de l'argent selon la personne qui décide de l'utilisation des gains de l'homme. Il s'agit donc ici de l'opinion des femmes. On ne note pas de différences importantes entre les déclarations des femmes et des hommes : 74 % des femmes contre 76 % des hommes ont déclaré que la décision d'utilisation des gains de l'homme est prise principalement par l'homme et 20 % des femmes contre 21 %

Graphique 14.2 Contrôle des gains de la femme

Répartition (en %) des femmes actuellement en union qui ont gagné de l'argent au cours des 12 mois avant l'enquête



des hommes ont déclaré que la décision est prise conjointement. Par contre, 7 % des femmes contre 1 % des hommes ont déclaré que c'est la femme qui décide seul de l'utilisation de ses propres gains.

14.4 CONTRÔLE PAR LES FEMMES DE L'UTILISATION DE LEURS PROPRES GAINS ET DE CEUX DE LEUR CONJOINT

Les résultats du **Tableau 14.3** montrent que l'importance des gains de la femme n'influence pas de manière importante sa capacité de décision financière : 76 % des femmes qui pensent gagner plus que leur conjoint décident principalement de l'utilisation de leurs gains contre 75 % quand elles pensent gagner moins. Le fait que le conjoint ne travaille pas ou ne gagne pas d'argent semble affecter davantage la capacité de décision des femmes puisque 84 % des femmes dans cette situation décident principalement de l'utilisation de leurs gains. De même, on ne constate pas non plus que l'importance des gains de la femme influence de manière importante la décision d'utilisation des gains de l'homme, ce dernier ayant le dernier mot que la femme pense gagner plus ou moins que lui. On peut cependant mentionner que quand la femme pense gagner à peu près la même chose que son conjoint, il est plus fréquent que la décision d'utilisation des gains de l'homme soit une décision conjointe (55 %).

14.5 POSSESSION DE BIENS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES

Possession d'une maison ou de terres

Enquêtés possédant une maison ou des terres, soit seuls ou conjointement avec quelqu'un d'autre

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

La possession de certains biens (maisons ou terres) peut conférer une certaine autonomie financière, sociale et peut avoir aussi un effet bénéfique pour les ménages. Pour les femmes, être propriétaires de biens peut renforcer leur autonomie, leur niveau de revenu, voire leur pouvoir d'achat, et aussi leur permettre d'accéder aux instances de décision et les protéger en cas de rupture d'union. On a demandé aux hommes et femmes de 15-49 ans s'ils possédaient des maisons ou des terres, seuls ou avec quelqu'un d'autre.

La grande majorité des femmes de 15-49 ans ont déclaré ne pas posséder de maison (85 %), ni de terres (87 %). Un très faible pourcentage de femmes a déclaré posséder seules des maisons (3 %) et/ou des terres (6 %). Par comparaison, on constate que le pourcentage d'hommes ayant déclaré ne pas posséder de maison est plus faible que celui des femmes (66 % contre 85 %). Près d'un quart des hommes de 15-49 ans possèdent seuls une maison contre seulement 3 % des femmes. De même, il est plus fréquent que les hommes possèdent des terres que les femmes (27 % contre 6 %) (**Tableaux 14.4.1 et 14.4.2**).

Variations par caractéristique

- Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, le pourcentage possédant seul une propriété augmente avec l'âge, passant chez les femmes de 2 % à 20-24 ans à 9 % à 45-49 ans et, chez les hommes, de respectivement 8 % à 59 %. La tendance est identique pour la possession de terres.
- Pour les hommes, il est plus fréquent de posséder seul une maison ou des terres en milieu rural (respectivement 28 % et 32 %) qu'en milieu urbain (respectivement 19 % et 21 %).
- Chez les hommes, la possession de maison comme de terres, seuls ou en commun, devient moins fréquente au fur et à mesure que le niveau d'instruction augmente. On note la même tendance chez les femmes, mais avec des écarts plus faibles.

14.6 POSSESSION D'UN TITRE DE PROPRIÉTÉ POUR LA MAISON ET LES TERRES

Possession d'un titre de propriété pour une maison ou des terres

Un acte ou un titre de propriété pour la maison ou les terres est disponible et le nom de l'enquêté y figure

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans possédant une maison ou des terres

Au Bénin, il est peu fréquent de posséder un titre de propriété pour une maisons ou des terres et que le nom figure sur le document (**Tableaux 14.5.1, 14.5.2, 14.6.1, et 14.6.2**).

La possession d'un compte bancaire et d'un téléphone portable peut contribuer à renforcer l'autonomie et l'indépendance financière. Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, on a demandé aux enquêtés s'ils utilisaient un compte dans une banque ou dans une institution financière et s'ils possédaient un téléphone portable. À


14.7 POSSESSION ET UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES ET DE TÉLÉPHONES PORTABLES

ceux qui possédaient un téléphone portable, on a demandé s'ils l'utilisaient pour effectuer des transactions financières.

Les résultats mettent en évidence des disparités importantes entre les femmes et les hommes (**Tableaux 14.7.1 et 14.7.2**). Le pourcentage d'hommes qui utilisent un compte dans une banque ou dans une institution financière est deux fois plus élevé que chez les femmes (14 % contre 6 %) (**Graphique 14.3**). De même, 80 % des hommes contre 51 % des femmes possèdent un téléphone portable. Parmi ceux qui possèdent un téléphone portable, 37 % d'hommes contre 27 % de femmes l'utilisent pour leurs transactions financières.

Graphique 14.3 Possession de biens

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans par possession de biens



Variations selon certaines caractéristiques

- L'utilisation d'un compte bancaire et la possession d'un téléphone portable sont plus répandues en milieu urbain qu'en milieu rural. Par exemple, en milieu urbain, 10 % des femmes utilisent un compte bancaire et 64 % possèdent un téléphone portable contre, respectivement, 4 % et 42 % en milieu rural. On retrouve ce même type de variation chez les hommes (**Tableau 14.7.1**).
- Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, les pourcentages de ceux qui utilisent un compte bancaire et qui possèdent un téléphone portable augmentent avec le niveau d'instruction : 87 % des femmes ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus possèdent un téléphone portable et 32 % possèdent et utilisent un compte en banque contre respectivement 43 % et 3 % parmi celles sans niveau d'instruction.
- L'utilisation d'un compte bancaire et la possession d'un téléphone portable varient de manière importante en fonction du niveau de bien-être du ménage, tant chez les femmes que chez les hommes : dans le quintile le plus bas, 1 % des femmes et 3 % des hommes utilisent un compte en banque contre respectivement 36 % et 17 % dans le quintile le plus élevé.

14.8 PARTICIPATION DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA PRISE DE DÉCISION

Participation dans les décisions importantes du ménage

On considère que les femmes participent dans les prises de décision du ménage si elles décident seules ou ensemble avec leurs conjoints sur les trois sujets suivants : (1) les propres soins de santé de la femme, (2) les achats importants du ménage et (3) les visites de la femme à sa famille ou à ses parents.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans actuellement en union


Dans le but d'évaluer le rôle et le niveau d'implication des femmes dans les prises de décision au niveau du ménage, des questions ont été posées pour savoir si, l'enquêtée ou une autre personne, avait le dernier mot dans certaines décisions. Trois aspects ont été abordés : les décisions concernant les soins de santé de la femme, les achats importants pour le ménage et les visites à la famille ou parents de la femme.

Dans 67 % des cas, les femmes participent à la décision concernant les visites à leur famille ou à leurs parents et ce type de décision est pris principalement par la femme dans 21 % des cas (**Tableau 14.8** et **Graphique 14.4**). Environ cinq femmes sur dix, soit 46 %, sont impliquées dans la prise de décision concernant leurs propres soins de santé et dans 12 % des cas, elles décident seules. Pour les achats importants du ménage, le pourcentage de femmes associées à la prise de décision est de 47 % et seulement une femme sur dix en décide seule. Globalement, 36 % des femmes en union participent à la prise des 3 décisions et 27 % ne sont impliquées dans aucune de ces décisions (**Tableau 14.9.1**).

Au cours de l'enquête, une question a été posée aux hommes en union pour savoir s'ils participaient à la prise de certaines décisions. Dans la quasi-totalité des cas, les hommes ont participé à la prise de décisions, cela quelle que soit la décision. Par exemple, 97 % des hommes participent à la prise de la décision concernant leurs propres soins de santé et 93 % dans la décision concernant les achats importants du ménage. Seulement 2 % des hommes n'ont été impliqués dans la prise d'aucune décision (**Tableau 14.9.2**).

Graphique 14.4 Participation des femmes dans la prise de décision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ont participé à la prise de certaines décisions



Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant participé à la prise des trois décisions est plus élevé en milieu urbain (41 %) qu'en milieu rural (33 %).
- Le pourcentage de femmes impliquées dans la prise des trois décisions est plus élevé dans le département du Mono (56 %) et plus faible dans le département de l'Alibori (18 %).
- Le pourcentage de femmes ayant participé aux trois décisions augmente avec le quintile de bien-être économique passant de 27 % dans le quintile le plus bas à 48 % dans le quintile le plus élevé.

14.9 OPINION CONCERNANT LE FAIT DE BATTRE SON ÉPOUSE/PARTENAIRE

Opinion concernant le fait de battre son épouse/partenaire

On a demandé aux enquêtés s'ils pensaient qu'il est justifié qu'un mari/partenaire batte ou frappe son épouse/partenaire pour chacune des cinq raisons suivantes : elle brûle la nourriture, elle argumente avec lui, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants, et elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui. Si les enquêtés répondent « oui » pour, au moins, une raison, on considère qu'ils justifient le fait de battre une épouse /partenaire.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Pour évaluer le degré de tolérance vis-à-vis de la violence domestique, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensaient qu'il est justifié que, pour certaines raisons citées, un homme batte sa femme/partenaire. Un peu moins du tiers des femmes (32 %) pensent que pour, au moins une des raisons citées, il est justifié qu'un homme batte sa femme. Le pourcentage de femmes justifiant la violence conjugale dans le cas où la femme néglige les enfants est le plus élevé (23 %), suivi de celui où la femme sort sans avertir son mari et elle argumente avec lui (21 % dans les deux cas) (**Tableau 14.10.1**).

Le pourcentage d'hommes qui pensent qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme pour, au moins, une des raisons est nettement plus faible que celui observé chez les femmes (16 % contre 32 %) (**Tableau 14.10.2** et **Graphique 14.5**).


Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, le pourcentage de femmes justifie le recours à la violence conjugale pour au moins une des raisons citées a doublé, passant de 16 % à 32 %. Chez les hommes, ce pourcentage est demeuré pratiquement le même (15 % en 2011-2012 contre 16 % en 2017-2018).

Variations par caractéristique

- L'opinion selon laquelle il est justifié qu'un homme batte sa femme pour au moins une raison est plus répandue parmi les femmes et les hommes du milieu rural (respectivement 37 % et 19 %) que ceux du milieu urbain (respectivement 25 % et 11 %).
- L'opinion selon laquelle il est justifié que pour, au moins une raison, un homme a le droit de battre sa femme/partenaire varie avec le niveau d'instruction chez les femmes comme chez les hommes. Parmi les femmes sans niveau d'instruction, 37 % justifient le recours à la violence conjugale contre 12 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. Chez les hommes, ces pourcentages sont respectivement de 21 % et 6 %.

Graphique 14.5 Opinions concernant le fait de battre sa femme

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui pensent que, pour certaines raisons, il est justifié qu'un homme batte sa femme



- L'opinion selon laquelle un homme a le droit de battre sa femme/partenaire est moins répandue parmi les femmes et les hommes dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé que dans le plus bas (respectivement 19 % et 7 % contre 38 % et 26 %).

14.10 NÉGOCIATION DE RAPPORTS SEXUELS

Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire

La connaissance des moyens de transmission du VIH se révèle moins utile quand les personnes ne peuvent pas négocier des rapports sexuels sans risque avec leurs partenaires. Pour connaître les opinions concernant la négociation de rapports sexuels à moindre risques avec le mari ou partenaire, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des rapports sexuels avec d'autres femmes ou qu'elle demande à utiliser un condom si elle sait qu'il a une IST.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari si elle sait qu'il a des rapports sexuels avec d'autres femmes ou qu'elle demande à utiliser un condom si elle sait qu'il a une IST. Environ deux femmes sur dix (39 %) et près d'un homme sur deux (48 %) pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes (**Tableau 14.11**). Dans des proportions plus élevées, les femmes et les hommes pensent qu'il est justifié qu'une femme demande à utiliser un condom au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST (respectivement 56 % et 70 %).

Variations selon certaines caractéristiques

- Le pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (43 % contre 36 %). De même, la proportion de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'une femme demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST est légèrement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (60 % contre 53 %). Chez les hommes, on observe ce même type de variations.
- Le pourcentage de femmes qui pensent qu'une femme a le droit de refuser des rapports sexuels avec son mari si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes a tendance à augmenter avec le niveau d'instruction, passant de 32 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 55 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. De même, le pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié de demander à utiliser un condom quand le conjoint a une IST passe respectivement de 51 % à 77 %. Chez les hommes, on note également ce même type d'influence.
- Les résultats selon le niveau de bien-être économique montrent que du quintile le plus bas au plus élevé, les pourcentages de femmes qui pensent qu'il est justifié de négocier des rapports sexuels sans risque augmentent, passant pour le refus des rapports sexuels de 25 % à 49 % et pour l'utilisation de condom de 46 % à 69 %. De même, chez les hommes, le pourcentage de ceux qui justifient le refus de rapports sexuels augmente de manière importante du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 35 % à 59 %. Concernant l'utilisation de condom dans le cas où l'homme a une IST, on note aussi la même tendance, le pourcentage passant respectivement de 57 % à 81 %.

Capacité à négocier des rapports sexuels avec le mari/partenaire

Pourcentage d'enquêtées qui peuvent refuser des rapports sexuels à leur mari/partenaire quand elles ne souhaitent pas en avoir et pourcentage qui peuvent demander à leur mari/partenaire d'utiliser un condom.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Pour évaluer la capacité des femmes à négocier des rapports sexuels à moindre risques avec leur mari, on a demandé aux femmes si elles peuvent refuser d'avoir des rapports sexuels avec leur mari si elles ne voulaient pas en avoir. On a aussi demandé aux femmes si elles pouvaient demander à leur conjoint d'utiliser un condom. Dans 57 % des cas, les femmes ont déclaré qu'elles pouvaient refuser des rapports sexuels à leurs mari/partenaires quand elles ne souhaitaient pas en avoir et 40 % ont déclaré qu'elles pouvaient demander à leurs maris/partenaires d'utiliser un préservatif (**Tableau 14.12**).

14.11 INDICATEURS DU POUVOIR D'ACTION DES FEMMES

Le **Tableau 14.13** présente le croisement de deux indicateurs de mesure du pouvoir d'action des femmes, à savoir le nombre de décisions (cf. **Tableau 14.9.1** relatif à la liste des décisions) auxquelles la femme a participé, soit seule, soit en commun avec son conjoint, et le nombre de raisons pour lesquelles la femme pense qu'il est justifié qu'un mari/partenaire batte sa femme. Le premier indicateur reflète le pouvoir décisionnel exercé par la femme dans son environnement proche et dans des domaines qui affectent sa propre vie. Plus le nombre de décisions auxquelles la femme est associée est élevé, ici entre 0 et 3, plus on considère que son niveau d'autonomie est élevé. Le deuxième indicateur mesure le degré d'approbation des femmes concernant le recours à la violence conjugale dans certaines situations (cf. **Tableau 14.10.1**). Les valeurs de cette échelle sont comprises entre 0 et 5. On considère qu'un score élevé indique un niveau d'acceptation élevé de la violence conjugale et est associé à un pouvoir d'action plus faible.

Les données du **Tableau 14.13** font apparaître, une relation positive entre les deux indicateurs du pouvoir d'action des femmes, à savoir que le pourcentage de femmes qui ne justifient pour aucune raison le recours à la violence conjugale augmente avec le nombre de décisions auxquelles la femme a participé, passant de 58 % quand la femme n'a participé à aucune décision à 74 % quand elle a participé aux trois décisions. De même, le pourcentage de femmes ayant participé à la prise de toutes les décisions diminue nettement avec le nombre de raisons justifiant qu'un homme batte sa femme/partenaire, passant de 41 % quand le nombre de raisons est de 0 à 26 % quand ce nombre est de 3-4 et à 28 % quand il est de 5.

Le **Tableau 14.14** présente la répartition des femmes de 15-49 ans selon l'utilisation de méthodes contraceptives en fonction des deux indicateurs du pouvoir d'action des femmes, à savoir le nombre de décisions auxquelles la femme a participé, et le nombre de raisons pour lesquelles la femme pense qu'il est justifié qu'un mari/partenaire batte sa femme.

En ce qui concerne l'utilisation contraceptive, on constate que le pourcentage de femmes utilisatrices augmente légèrement avec le nombre de décisions auxquelles la femme a participé. Le pourcentage passe de 12 % à 18 % pour une méthode et de 10 % à 14 % pour une méthode moderne. Par contre, la relation entre l'utilisation d'une méthode de contraception et le deuxième indicateur est moins nette.

Le **Tableau 14.15** ne met pas en évidence d'association très claire entre le nombre idéal d'enfants et le nombre de décisions auxquelles la femme a participé, le nombre idéal d'enfants variant de 5,6 pour aucune décision à 5,2 quand le nombre de décision est de 3. Par contre, il semble que le nombre idéal d'enfants augmente avec le nombre de raisons justifiant le recours à la violence conjugale, passant de 4,9 quand ne justifient pour aucune raison ce comportement à 5,8 quand elles le tolèrent pour 5 raisons. Concernant les pourcentages de femmes ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, on constate qu'ils diminuent légèrement avec le nombre de décisions, passant de 35 % à 31 % ainsi qu'avec le nombre de raisons justifiant la violence conjugale, passant de 33 % à 31 %.

Par ailleurs, les résultats du **Tableau 14.16** mettent en évidence l'influence de la participation des femmes à la prise de décision sur les indicateurs de santé maternelle ; en effet, les pourcentages de femmes ayant reçu des soins prénatals passent de 82 % quand la femme n'a été associée à la prise d'aucune décision à 89 % quand elle a été impliquée à la prise de 1-2 décisions et à 93 % quand ce nombre est de 3. Concernant le pourcentage de femmes ayant bénéficié d'une assistance à l'accouchement, le pourcentage passe respectivement de 71 % à 84 % et à 88 %. Enfin, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals augmente aussi avec le nombre de décisions, variant de 59 % à 67 % et à 72 %.

Les indicateurs de santé maternelle sont aussi influencés par l'opinion des femmes sur la violence conjugale. Globalement, les pourcentages de femmes ayant bénéficié de ces trois services ont tendance à diminuer avec l'augmentation du nombre de raisons justifiant le recours à la violence conjugale.

Pour des informations sur les indicateurs du pouvoir d'action des femmes, voir (**Tableau 14.13**), et pour des informations sur le planning familial, la santé reproductive, et la mortalité des enfants selon le pouvoir d'action des femmes, voir les **Tableaux 14.14, 14.15, 14.16, et 14.17**.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le pouvoir d'action des femmes, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 14.1** **Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union**
- **Tableau 14.2.1** **Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint**
- **Tableau 14.2.2** **Contrôle de l'argent gagné par les hommes**
- **Tableau 14.3** **Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains de leur mari/partenaire**
- **Tableau 14.4.1** **Possession de biens : Femme**
- **Tableau 14.4.2** **Possession de biens : Homme**
- **Tableau 14.5.1** **Possession d'un titre de propriété pour une maison : Femme**
- **Tableau 14.5.2** **Possession d'un titre de propriété pour une maison : Homme**
- **Tableau 14.6.1** **Possession d'un titre de propriété pour des terres : Femme**
- **Tableau 14.6.2** **Possession d'un titre de propriété pour des terres : Homme**
- **Tableau 14.7.1** **Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Femme**
- **Tableau 14.7.2** **Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Homme**
- **Tableau 14.8** **Participation dans la prise de décision**
- **Tableau 14.9.1** **Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 14.9.2** **Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 14.10.1** **Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme**
- **Tableau 14.10.2** **Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme**
- **Tableau 14.11** **Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire**
- **Tableau 14.12** **Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari/partenaire**
- **Tableau 14.13** **Indicateurs du pouvoir d'action des femmes**
- **Tableau 14.14** **Utilisation actuelle de la contraception selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes**
- **Tableau 14.15** **Nombre idéal d'enfants et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes**

- **Tableau 14.16** Soins de santé maternelle, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes
- **Tableau 14.17** Mortalité des enfants de moins de cinq ans selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Tableau 14.1 Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant travaillé à n'importe quel moment, au cours des 12 derniers mois et répartition (en %) des femmes et des hommes actuellement en union et ayant travaillé au cours des 12 derniers mois par type de rémunération, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Parmi les enquêtés actuellement en union : | | Répartition des enquêtés actuellement en union ayant travaillé au cours des 12 derniers mois par type de rémunération | | | | | Effectif d'enquêtés |
|----------------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------|---------------------|
| | Pourcentage ayant travaillé au cours des 12 derniers mois | Effectif d'enquêtés | Argent uniquement | Argent et en nature | En nature seulement | Non rémunéré | Total | |
| FEMME | | | | | | | | |
| 15-19 | 58,4 | 618 | 51,2 | 11,2 | 3,3 | 34,3 | 100,0 | 361 |
| 20-24 | 73,2 | 1 966 | 65,0 | 12,7 | 1,7 | 20,6 | 100,0 | 1 440 |
| 25-29 | 84,3 | 2 658 | 72,6 | 13,1 | 0,8 | 13,4 | 100,0 | 2 240 |
| 30-34 | 88,4 | 2 035 | 71,8 | 14,6 | 1,2 | 12,5 | 100,0 | 1 798 |
| 35-39 | 90,3 | 1 706 | 73,9 | 14,5 | 1,3 | 10,3 | 100,0 | 1 540 |
| 40-44 | 93,8 | 1 166 | 70,9 | 17,6 | 1,4 | 10,1 | 100,0 | 1 094 |
| 45-49 | 93,2 | 1 020 | 71,3 | 16,3 | 0,9 | 11,5 | 100,0 | 951 |
| Ensemble 15-49 | 84,4 | 11 168 | 70,3 | 14,3 | 1,3 | 14,0 | 100,0 | 9 424 |
| HOMME | | | | | | | | |
| 15-19 | * | 9 | * | * | * | * | * | 9 |
| 20-24 | 99,2 | 284 | 66,4 | 25,5 | 0,9 | 7,3 | 100,0 | 281 |
| 25-29 | 99,6 | 735 | 72,3 | 23,3 | 0,3 | 4,1 | 100,0 | 732 |
| 30-34 | 99,3 | 777 | 75,5 | 21,2 | 0,4 | 2,9 | 100,0 | 772 |
| 35-39 | 99,7 | 754 | 68,8 | 27,3 | 0,7 | 3,1 | 100,0 | 752 |
| 40-44 | 99,1 | 574 | 72,4 | 23,9 | 0,1 | 3,5 | 100,0 | 569 |
| 45-49 | 99,2 | 543 | 68,9 | 26,6 | 0,6 | 3,9 | 100,0 | 539 |
| Ensemble 15-49 | 99,4 | 3 675 | 71,3 | 24,4 | 0,5 | 3,8 | 100,0 | 3 653 |
| 50-64 | 93,8 | 782 | 61,3 | 34,1 | 0,8 | 3,7 | 100,0 | 734 |
| Ensemble 15-64 | 98,4 | 4 457 | 69,6 | 26,1 | 0,5 | 3,8 | 100,0 | 4 387 |

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 14.2.1 Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont gagné de l'argent pour leur travail au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme et répartition selon que les femmes gagnent plus ou moins que leur conjoint selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme : | | | | | Gains de la femme par rapport à ceux du conjoint : | | | | | | Effectif de femmes |
|--|---|----------------------------|----------------------------|-------|-------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|--------------------|
| | Principalement la femme | Femme et conjoint ensemble | Principalement le conjoint | Autre | Total | Plus que le conjoint | Moins que le conjoint | A peu près la même chose | Le conjoint ne gagne pas d'argent | Ne sait pas | Total | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 69,3 | 17,8 | 10,6 | 2,4 | 100,0 | 3,4 | 90,2 | 2,5 | 1,1 | 2,8 | 100,0 | 225 |
| 20-24 | 69,4 | 20,2 | 9,9 | 0,5 | 100,0 | 6,1 | 80,0 | 6,8 | 0,8 | 6,2 | 100,0 | 1 119 |
| 25-29 | 72,0 | 20,2 | 7,6 | 0,2 | 100,0 | 4,3 | 80,0 | 6,9 | 1,3 | 7,5 | 100,0 | 1 921 |
| 30-34 | 73,9 | 18,3 | 7,8 | 0,0 | 100,0 | 6,2 | 77,5 | 7,6 | 0,9 | 7,9 | 100,0 | 1 553 |
| 35-39 | 72,6 | 18,8 | 8,6 | 0,0 | 100,0 | 8,8 | 73,6 | 7,9 | 1,4 | 8,3 | 100,0 | 1 360 |
| 40-44 | 77,6 | 15,8 | 6,6 | 0,0 | 100,0 | 9,8 | 71,9 | 8,6 | 1,6 | 8,0 | 100,0 | 968 |
| 45-49 | 77,9 | 16,3 | 5,8 | 0,0 | 100,0 | 12,6 | 66,8 | 9,1 | 1,5 | 9,9 | 100,0 | 833 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 69,4 | 21,7 | 7,3 | 1,6 | 100,0 | 6,7 | 81,6 | 6,6 | 0,3 | 4,9 | 100,0 | 372 |
| 1-2 | 71,3 | 20,0 | 8,4 | 0,2 | 100,0 | 5,8 | 78,6 | 7,4 | 1,3 | 6,9 | 100,0 | 2 506 |
| 3-4 | 74,0 | 17,9 | 8,0 | 0,1 | 100,0 | 6,3 | 76,6 | 7,4 | 1,0 | 8,8 | 100,0 | 2 750 |
| 5+ | 75,3 | 17,3 | 7,4 | 0,0 | 100,0 | 9,8 | 72,9 | 7,9 | 1,6 | 7,7 | 100,0 | 2 350 |
| Résidence | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 78,8 | 16,3 | 4,7 | 0,2 | 100,0 | 4,9 | 77,2 | 5,1 | 1,3 | 11,5 | 100,0 | 436 |
| Autres villes | 75,5 | 18,7 | 5,8 | 0,0 | 100,0 | 6,8 | 74,6 | 8,2 | 1,2 | 9,2 | 100,0 | 2 899 |
| Ensemble urbain | 75,9 | 18,4 | 5,6 | 0,1 | 100,0 | 6,6 | 74,9 | 7,8 | 1,3 | 9,5 | 100,0 | 3 335 |
| Rural | 71,5 | 18,7 | 9,5 | 0,3 | 100,0 | 7,7 | 77,4 | 7,3 | 1,2 | 6,4 | 100,0 | 4 643 |
| Département | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 85,1 | 1,4 | 13,4 | 0,1 | 100,0 | 11,0 | 86,8 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 802 |
| Atacora | 86,7 | 7,7 | 5,7 | 0,0 | 100,0 | 4,5 | 61,3 | 15,9 | 6,8 | 11,5 | 100,0 | 397 |
| Atlantique | 76,0 | 21,3 | 2,7 | 0,1 | 100,0 | 8,2 | 75,7 | 8,3 | 0,8 | 6,9 | 100,0 | 1 066 |
| Borgou | 76,6 | 10,4 | 12,7 | 0,3 | 100,0 | 6,6 | 78,5 | 5,6 | 0,4 | 8,9 | 100,0 | 860 |
| Collines | 71,0 | 19,5 | 9,0 | 0,5 | 100,0 | 7,8 | 78,9 | 10,9 | 0,8 | 1,6 | 100,0 | 601 |
| Couffo | 30,9 | 56,3 | 12,5 | 0,4 | 100,0 | 10,0 | 76,0 | 5,6 | 0,3 | 8,1 | 100,0 | 640 |
| Donga | 87,6 | 7,1 | 5,1 | 0,2 | 100,0 | 3,0 | 77,5 | 1,8 | 5,7 | 12,1 | 100,0 | 373 |
| Littoral | 78,8 | 16,3 | 4,7 | 0,2 | 100,0 | 4,9 | 77,2 | 5,1 | 1,3 | 11,5 | 100,0 | 436 |
| Mono | 73,0 | 22,2 | 4,7 | 0,1 | 100,0 | 9,0 | 72,0 | 11,6 | 0,3 | 7,2 | 100,0 | 457 |
| Ouémé | 92,9 | 4,3 | 2,7 | 0,0 | 100,0 | 4,2 | 72,4 | 4,0 | 0,7 | 18,6 | 100,0 | 890 |
| Plateau | 70,7 | 20,6 | 8,3 | 0,5 | 100,0 | 7,1 | 74,4 | 12,7 | 2,6 | 3,2 | 100,0 | 609 |
| Zou | 55,4 | 33,8 | 10,8 | 0,0 | 100,0 | 6,9 | 77,9 | 10,6 | 0,0 | 4,6 | 100,0 | 846 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 72,9 | 17,8 | 9,2 | 0,2 | 100,0 | 7,4 | 77,2 | 7,2 | 1,3 | 6,9 | 100,0 | 5 157 |
| Primaire | 75,0 | 19,2 | 5,6 | 0,2 | 100,0 | 6,5 | 75,1 | 7,9 | 1,0 | 9,5 | 100,0 | 1 545 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 73,8 | 19,3 | 6,5 | 0,4 | 100,0 | 7,3 | 75,4 | 7,3 | 1,1 | 8,9 | 100,0 | 919 |
| Secondaire 2 ^e cycle ou plus | 71,5 | 25,5 | 2,9 | 0,0 | 100,0 | 6,6 | 73,2 | 11,2 | 0,5 | 8,5 | 100,0 | 357 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 72,9 | 15,7 | 11,0 | 0,4 | 100,0 | 7,4 | 77,4 | 7,3 | 1,3 | 6,5 | 100,0 | 1 231 |
| Second | 69,0 | 19,8 | 11,0 | 0,2 | 100,0 | 9,6 | 76,0 | 7,3 | 1,1 | 6,0 | 100,0 | 1 447 |
| Moyen | 73,1 | 18,0 | 8,6 | 0,2 | 100,0 | 6,9 | 76,0 | 8,3 | 1,9 | 7,0 | 100,0 | 1 669 |
| Quatrième | 74,7 | 19,0 | 6,2 | 0,2 | 100,0 | 7,5 | 76,3 | 7,8 | 0,6 | 7,8 | 100,0 | 1 828 |
| Le plus élevé | 75,9 | 19,7 | 4,3 | 0,1 | 100,0 | 5,1 | 76,4 | 6,9 | 1,2 | 10,4 | 100,0 | 1 803 |
| Ensemble | 73,3 | 18,6 | 7,9 | 0,2 | 100,0 | 7,2 | 76,4 | 7,5 | 1,2 | 7,7 | 100,0 | 7 978 |

Tableau 14.2.2 Contrôle de l'argent gagné par les hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ont été rémunérés en argent et répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union dont le mari/partenaire a été rémunéré en argent, en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Homme | | | | | | Femme | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------|-------|--------------------|
| | Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par l'homme : | | | | | | Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par l'homme : | | | | | |
| | Principalement la femme | Femme et mari/partenaire ensemble | Principalement l'homme | Autre | Total | Effectif d'hommes | Principalement la femme | Femme et mari/partenaire ensemble | Principalement l'homme | Autre | Total | Effectif de femmes |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | * | * | * | * | 100,0 | 7 | 4,9 | 18,2 | 75,2 | 1,7 | 100,0 | 607 |
| 20-24 | 1,6 | 19,5 | 70,2 | 8,7 | 100,0 | 258 | 6,1 | 18,8 | 74,7 | 0,4 | 100,0 | 1 946 |
| 25-29 | 1,1 | 21,3 | 72,7 | 4,8 | 100,0 | 699 | 5,3 | 19,6 | 75,0 | 0,1 | 100,0 | 2 626 |
| 30-34 | 0,9 | 18,3 | 78,6 | 2,2 | 100,0 | 746 | 6,2 | 19,7 | 74,0 | 0,2 | 100,0 | 2 018 |
| 35-39 | 1,3 | 19,6 | 78,7 | 0,4 | 100,0 | 723 | 7,0 | 20,4 | 72,6 | 0,0 | 100,0 | 1 682 |
| 40-44 | 1,6 | 20,2 | 77,9 | 0,3 | 100,0 | 548 | 7,9 | 19,3 | 72,6 | 0,1 | 100,0 | 1 148 |
| 45-49 | 1,5 | 24,8 | 73,4 | 0,3 | 100,0 | 515 | 10,3 | 21,2 | 68,5 | 0,0 | 100,0 | 1 003 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,7 | 20,6 | 73,3 | 5,5 | 100,0 | 236 | 6,6 | 20,2 | 72,9 | 0,3 | 100,0 | 680 |
| 1-2 | 1,1 | 20,2 | 74,4 | 4,3 | 100,0 | 1 035 | 5,8 | 20,2 | 73,5 | 0,5 | 100,0 | 3 771 |
| 3-4 | 1,3 | 21,2 | 76,4 | 1,1 | 100,0 | 951 | 6,8 | 18,9 | 74,2 | 0,1 | 100,0 | 3 529 |
| 5+ | 1,5 | 20,2 | 77,5 | 0,9 | 100,0 | 1 274 | 7,2 | 19,6 | 73,2 | 0,1 | 100,0 | 3 050 |
| Résidence | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 1,6 | 21,5 | 76,9 | 0,0 | 100,0 | 178 | 8,7 | 22,1 | 69,1 | 0,2 | 100,0 | 544 |
| Autres villes | 1,1 | 17,3 | 80,5 | 1,1 | 100,0 | 1 268 | 6,9 | 19,0 | 74,0 | 0,1 | 100,0 | 3 833 |
| Ensemble urbain | 1,2 | 17,8 | 80,0 | 1,0 | 100,0 | 1 446 | 7,2 | 19,4 | 73,4 | 0,1 | 100,0 | 4 377 |
| Rural | 1,4 | 22,4 | 73,1 | 3,2 | 100,0 | 2 050 | 6,2 | 19,8 | 73,7 | 0,3 | 100,0 | 6 653 |
| Département | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 0,4 | 7,1 | 79,6 | 12,8 | 100,0 | 486 | 7,0 | 10,4 | 82,6 | 0,0 | 100,0 | 1 548 |
| Atacora | 0,2 | 31,2 | 68,3 | 0,3 | 100,0 | 282 | 6,1 | 25,6 | 68,1 | 0,2 | 100,0 | 848 |
| Atlantique | 2,0 | 35,3 | 61,7 | 0,9 | 100,0 | 440 | 4,7 | 19,8 | 75,3 | 0,2 | 100,0 | 1 299 |
| Borgou | 1,2 | 29,5 | 68,9 | 0,4 | 100,0 | 486 | 5,7 | 9,8 | 84,1 | 0,4 | 100,0 | 1 377 |
| Collines | 0,0 | 25,4 | 73,9 | 0,7 | 100,0 | 230 | 6,0 | 25,7 | 67,3 | 0,9 | 100,0 | 731 |
| Couffo | 0,0 | 28,6 | 70,2 | 1,2 | 100,0 | 217 | 3,2 | 33,9 | 62,7 | 0,1 | 100,0 | 737 |
| Donga | 1,1 | 21,4 | 77,6 | 0,0 | 100,0 | 150 | 5,2 | 10,2 | 84,5 | 0,2 | 100,0 | 690 |
| Littoral | 1,6 | 21,5 | 76,9 | 0,0 | 100,0 | 178 | 8,7 | 22,1 | 69,1 | 0,2 | 100,0 | 544 |
| Mono | 3,7 | 14,5 | 81,2 | 0,5 | 100,0 | 154 | 6,1 | 23,6 | 70,2 | 0,0 | 100,0 | 513 |
| Ouémé | 2,1 | 2,1 | 95,7 | 0,0 | 100,0 | 343 | 6,0 | 6,4 | 87,5 | 0,0 | 100,0 | 975 |
| Plateau | 0,6 | 11,2 | 87,2 | 1,0 | 100,0 | 216 | 10,7 | 24,8 | 64,5 | 0,0 | 100,0 | 691 |
| Zou | 2,7 | 16,1 | 80,5 | 0,7 | 100,0 | 314 | 10,3 | 38,2 | 51,1 | 0,5 | 100,0 | 1 078 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 0,9 | 17,8 | 77,2 | 4,1 | 100,0 | 1 602 | 6,7 | 18,6 | 74,6 | 0,2 | 100,0 | 7 319 |
| Primaire | 1,8 | 24,2 | 73,4 | 0,5 | 100,0 | 887 | 6,8 | 20,7 | 72,3 | 0,1 | 100,0 | 1 957 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,4 | 21,9 | 75,4 | 1,3 | 100,0 | 514 | 6,4 | 21,1 | 71,9 | 0,6 | 100,0 | 1 276 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,4 | 21,1 | 77,2 | 0,2 | 100,0 | 493 | 4,7 | 27,3 | 67,9 | 0,1 | 100,0 | 478 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 1,2 | 22,2 | 72,2 | 4,5 | 100,0 | 725 | 5,3 | 14,5 | 79,9 | 0,3 | 100,0 | 2 135 |
| Second | 0,5 | 23,2 | 71,6 | 4,7 | 100,0 | 674 | 7,4 | 19,0 | 73,2 | 0,4 | 100,0 | 2 195 |
| Moyen | 1,7 | 22,0 | 75,3 | 1,0 | 100,0 | 623 | 6,4 | 21,5 | 72,0 | 0,2 | 100,0 | 2 189 |
| Quatrième | 1,8 | 19,8 | 77,2 | 1,1 | 100,0 | 690 | 7,8 | 21,5 | 70,5 | 0,2 | 100,0 | 2 312 |
| Le plus élevé | 1,3 | 16,0 | 82,6 | 0,1 | 100,0 | 783 | 5,8 | 21,4 | 72,6 | 0,1 | 100,0 | 2 199 |
| Ensemble 15-49 | 1,3 | 20,5 | 76,0 | 2,3 | 100,0 | 3 496 | 6,6 | 19,6 | 73,6 | 0,2 | 100,0 | 11 030 |
| 50-64 | 0,7 | 23,3 | 75,7 | 0,2 | 100,0 | 700 | na | na | na | na | na | na |
| Ensemble 15-64 | 1,2 | 21,0 | 75,9 | 1,9 | 100,0 | 4 196 | na | na | na | na | na | na |

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = Non applicable

Tableau 14.3 Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains de leur mari/partenaire

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant gagné de l'argent au cours des 12 derniers mois en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme et répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union dont le mari/partenaire a gagné de l'argent en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le mari/partenaire, selon l'importance des gains de la femme par rapport à ceux de son mari/partenaire, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Gains de la femme par rapport à ceux de son mari/partenaire | Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme : | | | | | Effectif de femmes | Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le mari-partenaire : | | | | | Effectif de femmes |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------------------|
| | Principalement la femme | Femme et mari/partenaire ensemble | Principalement le mari/partenaire | Autre | Total | | Principalement la femme | Femme et mari/partenaire ensemble | Principalement le mari/partenaire | Autre | Total | |
| Plus que son mari/partenaire | 75,5 | 17,5 | 7,0 | 0,0 | 100,0 | 575 | 19,6 | 19,2 | 60,9 | 0,3 | 100,0 | 575 |
| Moins que son mari/partenaire | 74,5 | 16,3 | 8,9 | 0,2 | 100,0 | 6 093 | 5,5 | 18,6 | 75,8 | 0,1 | 100,0 | 6 093 |
| À peu près la même chose | 50,6 | 46,6 | 2,8 | 0,1 | 100,0 | 599 | 4,6 | 55,1 | 40,3 | 0,0 | 100,0 | 599 |
| Conjoint n'a pas gagné d'argent ou n'a pas travaillé | 83,6 | 11,2 | 5,2 | 0,0 | 100,0 | 94 | na | na | na | na | na | na |
| La femme a travaillé mais n'a pas gagné d'argent | na | na | na | na | na | 0 | 8,5 | 18,4 | 72,5 | 0,7 | 100,0 | 1 421 |
| La femme n'a pas travaillé | na | na | na | na | na | 0 | 4,2 | 13,7 | 81,8 | 0,3 | 100,0 | 1 728 |
| Ensemble ¹ | 73,3 | 18,6 | 7,9 | 0,2 | 100,0 | 7 978 | 6,6 | 19,6 | 73,6 | 0,2 | 100,0 | 11 030 |

na = Non applicable

¹ Y compris les cas où la femme ne sait pas si elle a gagné plus ou moins que son mari/partenaire.

Tableau 14.4.1 Possession de biens : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par possession de maison ou de terres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage possédant une maison : | | | Pourcentage ne possédant pas de maison | Total | Pourcentage possédant des terres : | | | Pourcentage ne possédant pas de terre | Total | Effectif de femmes |
|--|------------------------------------|-----------|--------------------|--|-------|------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------|--------------------|
| | Seule | En commun | Seule et en commun | | | Seule | En commun | Seule et en commun | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 0,9 | 3,2 | 0,9 | 95,0 | 100,0 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | 97,0 | 100,0 | 3 350 |
| 20-24 | 1,6 | 7,2 | 2,1 | 89,1 | 100,0 | 3,7 | 4,9 | 1,0 | 90,5 | 100,0 | 2 923 |
| 25-29 | 2,5 | 10,3 | 2,3 | 84,9 | 100,0 | 4,8 | 7,2 | 1,2 | 86,9 | 100,0 | 2 986 |
| 30-34 | 3,1 | 12,0 | 2,9 | 82,0 | 100,0 | 6,2 | 9,3 | 1,1 | 83,5 | 100,0 | 2 202 |
| 35-39 | 5,0 | 14,4 | 2,8 | 77,8 | 100,0 | 9,1 | 9,1 | 1,2 | 80,6 | 100,0 | 1 882 |
| 40-44 | 6,3 | 15,8 | 3,2 | 74,7 | 100,0 | 11,4 | 9,4 | 1,4 | 77,8 | 100,0 | 1 320 |
| 45-49 | 9,0 | 15,5 | 2,9 | 72,7 | 100,0 | 12,6 | 8,1 | 1,2 | 78,1 | 100,0 | 1 265 |
| Résidence | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 3,0 | 8,2 | 3,9 | 84,9 | 100,0 | 3,6 | 2,3 | 0,5 | 93,6 | 100,0 | 958 |
| Autres villes | 2,4 | 7,9 | 1,9 | 87,9 | 100,0 | 4,6 | 4,5 | 0,6 | 90,3 | 100,0 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 2,5 | 8,0 | 2,1 | 87,4 | 100,0 | 4,4 | 4,2 | 0,6 | 90,8 | 100,0 | 6 761 |
| Rural | 3,7 | 11,2 | 2,3 | 82,7 | 100,0 | 6,6 | 7,9 | 1,2 | 84,2 | 100,0 | 9 167 |
| Département | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 1,4 | 19,5 | 1,0 | 78,1 | 100,0 | 2,1 | 8,8 | 0,1 | 89,1 | 100,0 | 1 878 |
| Atacora | 1,7 | 11,6 | 1,7 | 85,0 | 100,0 | 2,1 | 9,7 | 0,4 | 87,8 | 100,0 | 1 302 |
| Atlantique | 2,4 | 3,4 | 0,4 | 93,8 | 100,0 | 5,6 | 2,4 | 0,1 | 91,9 | 100,0 | 2 037 |
| Borgou | 6,3 | 6,3 | 0,2 | 87,3 | 100,0 | 16,9 | 4,6 | 0,5 | 78,0 | 100,0 | 1 839 |
| Collines | 2,9 | 15,5 | 0,8 | 80,8 | 100,0 | 5,7 | 13,7 | 1,4 | 79,3 | 100,0 | 1 151 |
| Couffo | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 97,2 | 100,0 | 4,6 | 0,7 | 0,2 | 94,5 | 100,0 | 1 041 |
| Donga | 0,3 | 22,8 | 1,9 | 75,0 | 100,0 | 1,3 | 21,1 | 0,7 | 76,8 | 100,0 | 881 |
| Littoral | 3,0 | 8,2 | 3,9 | 84,9 | 100,0 | 3,6 | 2,3 | 0,5 | 93,6 | 100,0 | 958 |
| Mono | 3,6 | 10,7 | 2,2 | 83,5 | 100,0 | 6,5 | 7,5 | 0,9 | 85,0 | 100,0 | 759 |
| Ouémé | 1,1 | 2,8 | 0,1 | 96,1 | 100,0 | 1,6 | 1,4 | 0,3 | 96,7 | 100,0 | 1 507 |
| Plateau | 2,6 | 14,6 | 8,0 | 74,8 | 100,0 | 6,7 | 8,7 | 2,5 | 82,2 | 100,0 | 970 |
| Zou | 9,1 | 7,9 | 9,2 | 73,8 | 100,0 | 7,4 | 3,0 | 4,5 | 85,1 | 100,0 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 3,9 | 12,9 | 2,4 | 80,8 | 100,0 | 7,4 | 8,7 | 1,1 | 82,8 | 100,0 | 8 785 |
| Primaire | 2,4 | 7,3 | 2,2 | 88,1 | 100,0 | 4,2 | 4,5 | 0,9 | 90,4 | 100,0 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,1 | 5,6 | 2,0 | 90,3 | 100,0 | 2,5 | 3,0 | 0,9 | 93,6 | 100,0 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 2,3 | 4,4 | 1,7 | 91,6 | 100,0 | 4,1 | 1,9 | 0,6 | 93,4 | 100,0 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 3,6 | 13,9 | 1,6 | 80,9 | 100,0 | 8,1 | 10,0 | 0,8 | 81,2 | 100,0 | 2 735 |
| Second | 3,8 | 12,8 | 2,4 | 81,0 | 100,0 | 6,6 | 8,6 | 1,4 | 83,5 | 100,0 | 3 030 |
| Moyen | 2,5 | 9,7 | 2,5 | 85,3 | 100,0 | 5,9 | 6,8 | 1,0 | 86,3 | 100,0 | 3 104 |
| Quatrième | 3,0 | 7,9 | 2,5 | 86,6 | 100,0 | 4,5 | 4,9 | 1,0 | 89,6 | 100,0 | 3 405 |
| Le plus élevé | 3,1 | 6,3 | 2,1 | 88,4 | 100,0 | 4,1 | 2,7 | 0,7 | 92,5 | 100,0 | 3 654 |
| Ensemble | 3,2 | 9,8 | 2,2 | 84,7 | 100,0 | 5,7 | 6,3 | 1,0 | 87,0 | 100,0 | 15 928 |

Tableau 14.4.2 Possession de biens : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par possession de maison ou de terres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage possédant une maison : | | | Pourcentage ne possédant pas de maison | Total | Pourcentage possédant des terres : | | | Pourcentage ne possédant pas de terres | Total | Effectif d'hommes |
|--|------------------------------------|-----------|-------------------|--|-------|------------------------------------|-----------|-------------------|--|-------|-------------------|
| | Seul | En commun | Seul et en commun | | | Seul | En commun | Seul et en commun | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 1,0 | 2,9 | 3,6 | 92,5 | 100,0 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 91,0 | 100,0 | 1 548 |
| 20-24 | 7,7 | 4,2 | 4,7 | 83,5 | 100,0 | 11,5 | 4,3 | 4,7 | 79,4 | 100,0 | 1 118 |
| 25-29 | 19,3 | 7,5 | 4,4 | 68,8 | 100,0 | 26,1 | 7,1 | 4,0 | 62,9 | 100,0 | 1 156 |
| 30-34 | 31,4 | 7,0 | 4,7 | 57,0 | 100,0 | 37,6 | 5,5 | 4,8 | 52,2 | 100,0 | 881 |
| 35-39 | 42,1 | 8,7 | 3,1 | 46,2 | 100,0 | 44,6 | 5,7 | 4,3 | 45,4 | 100,0 | 812 |
| 40-44 | 52,7 | 7,2 | 4,8 | 35,3 | 100,0 | 52,6 | 6,5 | 4,1 | 36,8 | 100,0 | 620 |
| 45-49 | 58,8 | 10,5 | 4,0 | 26,6 | 100,0 | 56,6 | 5,8 | 4,0 | 33,6 | 100,0 | 592 |
| Résidence | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 7,6 | 3,9 | 0,7 | 87,8 | 100,0 | 9,7 | 2,5 | 0,3 | 87,5 | 100,0 | 390 |
| Autres villes | 20,9 | 4,8 | 4,0 | 70,3 | 100,0 | 22,3 | 3,8 | 3,7 | 70,2 | 100,0 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 19,1 | 4,7 | 3,5 | 72,7 | 100,0 | 20,6 | 3,6 | 3,3 | 72,5 | 100,0 | 2 877 |
| Rural | 27,7 | 7,3 | 4,6 | 60,3 | 100,0 | 31,9 | 6,4 | 4,8 | 56,9 | 100,0 | 3 849 |
| Département | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 28,9 | 13,6 | 2,3 | 55,2 | 100,0 | 26,7 | 15,7 | 3,1 | 54,5 | 100,0 | 917 |
| Atacora | 31,4 | 1,4 | 31,5 | 35,7 | 100,0 | 34,1 | 1,3 | 30,6 | 34,1 | 100,0 | 560 |
| Atlantique | 14,5 | 15,1 | 1,4 | 69,1 | 100,0 | 17,6 | 6,5 | 1,9 | 74,0 | 100,0 | 822 |
| Borgou | 29,5 | 7,1 | 2,9 | 60,6 | 100,0 | 41,0 | 8,4 | 2,6 | 48,0 | 100,0 | 823 |
| Collines | 32,4 | 3,3 | 0,0 | 64,4 | 100,0 | 50,0 | 1,6 | 0,0 | 48,4 | 100,0 | 448 |
| Couffo | 33,8 | 9,2 | 4,1 | 52,9 | 100,0 | 35,0 | 8,7 | 5,2 | 51,1 | 100,0 | 409 |
| Donga | 31,9 | 2,0 | 0,6 | 65,6 | 100,0 | 37,6 | 0,8 | 0,2 | 61,4 | 100,0 | 445 |
| Littoral | 7,6 | 3,9 | 0,7 | 87,8 | 100,0 | 9,7 | 2,5 | 0,3 | 87,5 | 100,0 | 390 |
| Mono | 15,4 | 6,1 | 1,2 | 77,3 | 100,0 | 13,5 | 2,4 | 0,7 | 83,3 | 100,0 | 354 |
| Ouémé | 15,4 | 0,5 | 3,2 | 80,9 | 100,0 | 4,5 | 1,4 | 2,2 | 91,9 | 100,0 | 618 |
| Plateau | 32,6 | 0,7 | 0,0 | 66,7 | 100,0 | 33,1 | 0,3 | 0,5 | 66,1 | 100,0 | 340 |
| Zou | 16,5 | 0,2 | 0,0 | 83,3 | 100,0 | 23,9 | 0,3 | 0,0 | 75,9 | 100,0 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucun | 34,5 | 7,3 | 5,5 | 52,7 | 100,0 | 37,5 | 7,2 | 5,8 | 49,5 | 100,0 | 2 426 |
| Primaire | 27,6 | 7,6 | 3,1 | 61,7 | 100,0 | 28,9 | 4,6 | 3,5 | 63,0 | 100,0 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 13,3 | 3,8 | 4,4 | 78,5 | 100,0 | 16,7 | 3,3 | 4,0 | 76,1 | 100,0 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 12,0 | 5,2 | 2,4 | 80,3 | 100,0 | 16,8 | 4,5 | 1,8 | 76,9 | 100,0 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 35,1 | 9,3 | 6,9 | 48,7 | 100,0 | 36,0 | 8,9 | 7,5 | 47,6 | 100,0 | 1 248 |
| Second | 28,0 | 6,4 | 5,8 | 59,8 | 100,0 | 33,8 | 5,5 | 5,4 | 55,3 | 100,0 | 1 315 |
| Moyen | 26,5 | 6,2 | 3,6 | 63,8 | 100,0 | 30,2 | 5,3 | 4,4 | 60,1 | 100,0 | 1 282 |
| Quatrième | 20,2 | 6,8 | 3,5 | 69,6 | 100,0 | 23,9 | 4,5 | 2,9 | 68,8 | 100,0 | 1 317 |
| Le plus élevé | 13,1 | 3,2 | 1,6 | 82,1 | 100,0 | 14,4 | 2,4 | 1,2 | 81,9 | 100,0 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 24,0 | 6,2 | 4,1 | 65,6 | 100,0 | 27,1 | 5,2 | 4,1 | 63,6 | 100,0 | 6 727 |
| 50-64 | 65,4 | 6,7 | 5,2 | 22,7 | 100,0 | 59,5 | 6,2 | 4,3 | 30,0 | 100,0 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 28,8 | 6,3 | 4,3 | 60,7 | 100,0 | 30,8 | 5,3 | 4,2 | 59,8 | 100,0 | 7 595 |

Tableau 14.5.1 Possession d'un titre de propriété pour une maison : Femme

Parmi les femmes de 15-49 ans qui possèdent une maison, répartition (en %) selon que la maison possédée a un titre de propriété et selon que le nom de la femme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | La maison a un titre de propriété et : | | | | Total | Effectif de femmes possédant une maison ² |
|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------|--|
| | Le nom de la femme figure sur le titre | Le nom de la femme ne figure pas sur le titre | N'a pas de titre de propriété | Ne sait pas/ manquant ¹ | | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 2,4 | 14,5 | 76,9 | 6,3 | 100,0 | 168 |
| 20-24 | 2,6 | 15,0 | 74,6 | 7,8 | 100,0 | 320 |
| 25-29 | 7,8 | 11,5 | 74,9 | 5,7 | 100,0 | 451 |
| 30-34 | 14,5 | 13,5 | 66,6 | 5,4 | 100,0 | 397 |
| 35-39 | 16,1 | 14,8 | 64,0 | 5,1 | 100,0 | 418 |
| 40-44 | 16,2 | 8,8 | 72,6 | 2,4 | 100,0 | 334 |
| 45-49 | 24,8 | 7,4 | 64,4 | 3,3 | 100,0 | 346 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 9,9 | 14,6 | 69,1 | 6,4 | 100,0 | 145 |
| Autres villes | 18,8 | 10,6 | 65,0 | 5,5 | 100,0 | 705 |
| Ensemble urbain | 17,3 | 11,3 | 65,7 | 5,7 | 100,0 | 850 |
| Rural | 10,5 | 12,6 | 72,2 | 4,7 | 100,0 | 1 583 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 4,5 | 21,2 | 73,0 | 1,4 | 100,0 | 412 |
| Atacora | 5,2 | 4,6 | 89,8 | 0,4 | 100,0 | 195 |
| Atlantique | 36,7 | 18,3 | 34,7 | 10,3 | 100,0 | 125 |
| Borgou | 12,3 | 11,0 | 59,5 | 17,3 | 100,0 | 234 |
| Collines | 7,7 | 6,7 | 84,5 | 1,1 | 100,0 | 221 |
| Couffo | (20,8) | (7,7) | (71,5) | (0,0) | 100,0 | 29 |
| Donga | 0,6 | 14,6 | 81,7 | 3,2 | 100,0 | 221 |
| Littoral | 9,9 | 14,6 | 69,1 | 6,4 | 100,0 | 145 |
| Mono | 59,7 | 3,4 | 36,1 | 0,8 | 100,0 | 126 |
| Ouémé | 31,1 | 9,9 | 56,7 | 2,3 | 100,0 | 59 |
| Plateau | 20,2 | 10,6 | 59,7 | 9,6 | 100,0 | 245 |
| Zou | 6,6 | 10,3 | 78,6 | 4,5 | 100,0 | 421 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 10,8 | 11,7 | 72,3 | 5,2 | 100,0 | 1 686 |
| Primaire | 15,2 | 10,3 | 68,8 | 5,7 | 100,0 | 376 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 16,8 | 15,1 | 64,7 | 3,4 | 100,0 | 275 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 29,0 | 18,4 | 47,6 | 5,0 | 100,0 | 96 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 6,4 | 8,9 | 79,2 | 5,4 | 100,0 | 522 |
| Second | 7,5 | 10,7 | 74,9 | 7,0 | 100,0 | 575 |
| Moyen | 9,7 | 14,7 | 72,7 | 2,9 | 100,0 | 456 |
| Quatrième | 17,0 | 12,8 | 65,1 | 5,2 | 100,0 | 455 |
| Le plus élevé | 27,0 | 14,6 | 54,2 | 4,2 | 100,0 | 424 |
| Ensemble | 12,8 | 12,1 | 70,0 | 5,1 | 100,0 | 2 433 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les femmes qui ont une maison avec un titre/acte de propriété, mais qui ne savent pas si leur nom est sur le titre/acte (ou cette information est manquante) et les femmes qui ne savent pas s'il y a un acte/titre de propriété pour la maison (ou cette information est manquante)

² Y compris les femmes qui possèdent une maison seules, en commun ou seules et en commun.

Tableau 14.5.2 Possession d'un titre de propriété pour une maison : Homme

Parmi les hommes de 15-49 ans qui possèdent une maison, répartition (en %) selon que la maison possédée a un titre de propriété et selon que le nom de l'homme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | La maison a un titre de propriété et : | | | | Total | Effectif d'hommes possédant une maison ² |
|--|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| | Le nom de l'homme figure sur le titre | Le nom de l'homme ne figure pas sur le titre | N'a pas de titre de propriété | Ne sait pas/ manquant ¹ | | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 0,8 | 2,7 | 89,1 | 7,4 | 100,0 | 117 |
| 20-24 | 2,8 | 4,7 | 91,9 | 0,6 | 100,0 | 185 |
| 25-29 | 8,1 | 2,3 | 88,6 | 1,0 | 100,0 | 361 |
| 30-34 | 17,4 | 3,1 | 78,6 | 0,8 | 100,0 | 379 |
| 35-39 | 19,6 | 2,3 | 77,7 | 0,4 | 100,0 | 437 |
| 40-44 | 27,9 | 2,7 | 69,4 | 0,0 | 100,0 | 401 |
| 45-49 | 25,6 | 4,8 | 69,3 | 0,4 | 100,0 | 434 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 37,0 | 14,2 | 48,2 | 0,6 | 100,0 | 47 |
| Autres villes | 27,8 | 3,3 | 67,4 | 1,5 | 100,0 | 739 |
| Ensemble urbain | 28,4 | 4,0 | 66,2 | 1,4 | 100,0 | 786 |
| Rural | 12,2 | 2,8 | 84,4 | 0,6 | 100,0 | 1 527 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 3,9 | 3,0 | 92,8 | 0,3 | 100,0 | 410 |
| Atacora | 2,5 | 2,1 | 93,1 | 2,3 | 100,0 | 360 |
| Atlantique | 24,4 | 3,5 | 72,0 | 0,0 | 100,0 | 254 |
| Borgou | 7,4 | 2,8 | 89,0 | 0,8 | 100,0 | 324 |
| Collines | 12,9 | 2,2 | 84,9 | 0,0 | 100,0 | 160 |
| Couffo | 44,2 | 2,5 | 52,3 | 1,1 | 100,0 | 193 |
| Donga | 9,6 | 1,8 | 88,6 | 0,0 | 100,0 | 153 |
| Littoral | 37,0 | 14,2 | 48,2 | 0,6 | 100,0 | 47 |
| Mono | 41,7 | 9,2 | 49,0 | 0,0 | 100,0 | 80 |
| Ouémé | 43,4 | 1,0 | 50,9 | 4,7 | 100,0 | 118 |
| Plateau | 22,3 | 3,6 | 74,1 | 0,0 | 100,0 | 113 |
| Zou | 50,7 | 5,2 | 44,1 | 0,0 | 100,0 | 100 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 11,7 | 2,3 | 85,3 | 0,7 | 100,0 | 1 148 |
| Primaire | 21,7 | 2,9 | 75,1 | 0,3 | 100,0 | 598 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 21,4 | 4,0 | 73,1 | 1,6 | 100,0 | 331 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 31,8 | 7,2 | 59,4 | 1,7 | 100,0 | 237 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 4,0 | 2,3 | 93,0 | 0,7 | 100,0 | 640 |
| Second | 11,8 | 2,6 | 85,2 | 0,4 | 100,0 | 528 |
| Moyen | 13,4 | 3,5 | 82,6 | 0,5 | 100,0 | 464 |
| Quatrième | 26,5 | 4,2 | 68,1 | 1,2 | 100,0 | 400 |
| Le plus élevé | 55,0 | 4,3 | 38,6 | 2,0 | 100,0 | 280 |
| Ensemble 15-49 | 17,7 | 3,2 | 78,2 | 0,8 | 100,0 | 2 314 |
| 50-64 | 37,8 | 3,5 | 58,2 | 0,6 | 100,0 | 671 |
| Ensemble 15-64 | 22,2 | 3,2 | 73,7 | 0,8 | 100,0 | 2 985 |

¹ Y compris les hommes qui ont une maison avec un titre/acte de propriété, mais qui ne savent pas si leur nom est sur le titre/acte (ou cette information est manquante), et les hommes qui ne savent pas s'il y a un acte/titre de propriété pour la maison (ou cette information est manquante)

² Y compris les hommes qui possèdent une maison seuls, en commun ou seuls et en commun.

Tableau 14.6.1 Possession d'un titre de propriété pour des terres : Femme

Parmi les femmes de 15-49 ans qui possèdent des terres, répartition (en %) selon que les terres possédées ont un titre de propriété et selon que le nom de la femme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Les terres ont un titre de propriété et : | | | | Total | Effectif de femmes possédant des terres ² |
|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------|--|
| | Le nom de la femme figure sur le titre | Le nom de la femme ne figure pas sur le titre | N'a pas de titre de propriété | Ne sait pas/ manquant ¹ | | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 1,7 | 19,5 | 74,7 | 4,1 | 100,0 | 99 |
| 20-24 | 11,1 | 14,0 | 70,5 | 4,3 | 100,0 | 279 |
| 25-29 | 11,2 | 10,0 | 75,4 | 3,5 | 100,0 | 391 |
| 30-34 | 21,6 | 14,0 | 61,2 | 3,2 | 100,0 | 364 |
| 35-39 | 29,7 | 12,1 | 55,1 | 3,1 | 100,0 | 366 |
| 40-44 | 28,1 | 8,0 | 62,4 | 1,4 | 100,0 | 293 |
| 45-49 | 28,6 | 6,3 | 63,9 | 1,2 | 100,0 | 277 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 54,5 | 11,1 | 32,0 | 2,4 | 100,0 | 61 |
| Autres villes | 27,2 | 12,5 | 57,3 | 3,0 | 100,0 | 562 |
| Ensemble urbain | 29,9 | 12,4 | 54,9 | 2,9 | 100,0 | 623 |
| Rural | 16,6 | 10,8 | 69,7 | 2,9 | 100,0 | 1 447 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 7,5 | 47,0 | 42,6 | 2,9 | 100,0 | 205 |
| Atacora | 12,6 | 1,2 | 86,3 | 0,0 | 100,0 | 159 |
| Atlantique | 55,9 | 11,7 | 28,5 | 3,9 | 100,0 | 165 |
| Borgou | 4,4 | 6,1 | 82,5 | 7,0 | 100,0 | 404 |
| Collines | 12,4 | 2,3 | 84,8 | 0,5 | 100,0 | 239 |
| Couffo | 65,8 | 5,1 | 29,2 | 0,0 | 100,0 | 58 |
| Donga | 6,3 | 22,9 | 69,4 | 1,5 | 100,0 | 204 |
| Littoral | 54,5 | 11,1 | 32,0 | 2,4 | 100,0 | 61 |
| Mono | 69,1 | 4,1 | 25,4 | 1,4 | 100,0 | 114 |
| Ouémé | (48,2) | (5,8) | (44,1) | (1,9) | 100,0 | 50 |
| Plateau | 24,9 | 3,7 | 69,0 | 2,4 | 100,0 | 173 |
| Zou | 8,8 | 6,5 | 81,5 | 3,1 | 100,0 | 238 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 16,1 | 11,6 | 69,1 | 3,2 | 100,0 | 1 510 |
| Primaire | 26,8 | 9,9 | 60,7 | 2,6 | 100,0 | 303 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 31,1 | 10,0 | 57,0 | 1,9 | 100,0 | 182 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 60,3 | 13,5 | 26,2 | 0,0 | 100,0 | 75 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 9,5 | 8,5 | 79,0 | 2,9 | 100,0 | 515 |
| Second | 16,3 | 10,0 | 69,2 | 4,5 | 100,0 | 501 |
| Moyen | 16,1 | 14,4 | 68,0 | 1,5 | 100,0 | 425 |
| Quatrième | 24,3 | 11,9 | 60,9 | 3,0 | 100,0 | 354 |
| Le plus élevé | 51,2 | 13,3 | 33,4 | 2,2 | 100,0 | 275 |
| Ensemble | 20,6 | 11,3 | 65,2 | 2,9 | 100,0 | 2 069 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les femmes qui ont des terres avec un titre/acte de propriété, mais qui ne savent pas si leur nom est sur le titre/acte (ou cette information est manquante) et les femmes qui ne savent pas s'il y a un acte/titre de propriété pour les terres (ou cette information est manquante).

² Y compris les femmes qui possèdent des terres seules, en commun ou seules et en commun.

Tableau 14.6.2 Possession d'un titre de propriété pour des terres : Homme

Parmi les hommes de 15-49 ans qui possèdent des terres, répartition (en %) selon que les terres possédées ont un titre de propriété et selon que le nom de l'homme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Les terres ont un titre de propriété et : | | | | Total | Effectif d'hommes possédant des terres ² |
|--|---|--|-------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| | Le nom de l'homme figure sur le titre | Le nom de l'homme ne figure pas sur le titre | N'a pas de titre de propriété | Ne sait pas/ manquant ¹ | | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 0,7 | 2,4 | 86,6 | 10,2 | 100,0 | 139 |
| 20-24 | 7,2 | 2,5 | 89,4 | 0,9 | 100,0 | 230 |
| 25-29 | 17,9 | 1,5 | 80,6 | 0,0 | 100,0 | 430 |
| 30-34 | 20,3 | 1,9 | 77,4 | 0,4 | 100,0 | 421 |
| 35-39 | 21,7 | 2,3 | 75,9 | 0,0 | 100,0 | 443 |
| 40-44 | 23,7 | 1,5 | 74,7 | 0,0 | 100,0 | 392 |
| 45-49 | 22,3 | 2,7 | 75,0 | 0,0 | 100,0 | 393 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 60,1 | 4,5 | 35,4 | 0,0 | 100,0 | 49 |
| Autres villes | 28,2 | 2,3 | 68,3 | 1,2 | 100,0 | 742 |
| Ensemble urbain | 30,1 | 2,5 | 66,3 | 1,1 | 100,0 | 791 |
| Rural | 13,2 | 1,9 | 84,4 | 0,6 | 100,0 | 1 657 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 1,6 | 0,8 | 97,6 | 0,0 | 100,0 | 417 |
| Atacora | 0,9 | 0,0 | 96,7 | 2,3 | 100,0 | 369 |
| Atlantique | 55,1 | 6,2 | 38,7 | 0,0 | 100,0 | 214 |
| Borgou | 4,1 | 1,3 | 92,8 | 1,8 | 100,0 | 428 |
| Collines | 2,5 | 0,8 | 96,7 | 0,0 | 100,0 | 231 |
| Couffo | 66,2 | 3,9 | 29,2 | 0,7 | 100,0 | 200 |
| Donga | 9,2 | 0,0 | 90,8 | 0,0 | 100,0 | 172 |
| Littoral | 60,1 | 4,5 | 35,4 | 0,0 | 100,0 | 49 |
| Mono | 59,6 | 10,7 | 29,6 | 0,0 | 100,0 | 59 |
| Ouémé | (54,1) | (0,0) | (44,7) | (1,2) | 100,0 | 50 |
| Plateau | 20,0 | 1,6 | 78,5 | 0,0 | 100,0 | 115 |
| Zou | 29,7 | 6,0 | 64,4 | 0,0 | 100,0 | 145 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 10,7 | 0,9 | 87,8 | 0,5 | 100,0 | 1 226 |
| Primaire | 23,2 | 3,1 | 72,9 | 0,8 | 100,0 | 577 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 22,7 | 2,7 | 73,0 | 1,7 | 100,0 | 368 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 39,0 | 4,2 | 56,5 | 0,2 | 100,0 | 277 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 5,4 | 1,6 | 92,7 | 0,3 | 100,0 | 655 |
| Second | 12,5 | 1,2 | 86,0 | 0,3 | 100,0 | 588 |
| Moyen | 15,2 | 1,2 | 81,9 | 1,6 | 100,0 | 511 |
| Quatrième | 25,1 | 3,7 | 70,1 | 1,2 | 100,0 | 411 |
| Le plus élevé | 59,0 | 4,2 | 36,3 | 0,5 | 100,0 | 283 |
| Ensemble 15-49 | 18,7 | 2,1 | 78,5 | 0,7 | 100,0 | 2 448 |
| 50-64 | 32,6 | 1,1 | 65,7 | 0,6 | 100,0 | 607 |
| Ensemble 15-64 | 21,4 | 1,9 | 76,0 | 0,7 | 100,0 | 3 056 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

¹ Y compris les hommes qui ont des terres avec un titre/acte de propriété, mais qui ne savent pas si leur nom est sur le titre/acte (ou cette information est manquante), et les hommes qui ne savent pas s'il y a un acte/titre de propriété pour les terres (ou cette information est manquante).

² Y compris les hommes qui possèdent des terres seuls, en commun ou seuls et en commun.

Tableau 14.7.1 Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont et utilisent un compte dans une banque ou une autre institution financière et pourcentage qui possède un téléphone portable ; parmi les femmes possédant un téléphone portable, pourcentage qui l'ont utilisé pour effectuer des transactions financières, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | A et utilise un compte bancaire | Possède un téléphone portable | Effectif de femmes | Utilise un téléphone portable pour des transactions financières | Effectif de femmes qui possède un téléphone portable |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|--|
| Groupe d'âges | | | | | |
| 15-19 | 1,0 | 25,5 | 3 350 | 21,3 | 853 |
| 20-24 | 4,7 | 55,2 | 2 923 | 31,3 | 1 614 |
| 25-29 | 6,6 | 57,6 | 2 986 | 28,9 | 1 720 |
| 30-34 | 9,9 | 58,0 | 2 202 | 28,3 | 1 277 |
| 35-39 | 9,7 | 60,6 | 1 882 | 24,5 | 1 140 |
| 40-44 | 10,1 | 59,6 | 1 320 | 23,6 | 787 |
| 45-49 | 9,4 | 59,3 | 1 265 | 24,1 | 750 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 21,8 | 78,6 | 958 | 48,6 | 753 |
| Autres villes | 8,0 | 61,0 | 5 803 | 33,3 | 3 539 |
| Ensemble urbain | 10,0 | 63,5 | 6 761 | 36,0 | 4 292 |
| Rural | 3,8 | 42,0 | 9 167 | 16,8 | 3 850 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 1,7 | 34,2 | 1 878 | 11,7 | 642 |
| Atacora | 2,5 | 34,1 | 1 302 | 18,0 | 444 |
| Atlantique | 9,3 | 61,4 | 2 037 | 32,3 | 1 250 |
| Borgou | 4,9 | 47,8 | 1 839 | 24,7 | 878 |
| Collines | 6,6 | 53,4 | 1 151 | 23,1 | 615 |
| Couffo | 3,4 | 36,6 | 1 041 | 19,7 | 381 |
| Donga | 2,5 | 52,0 | 881 | 17,9 | 458 |
| Littoral | 21,8 | 78,6 | 958 | 48,6 | 753 |
| Mono | 6,9 | 51,1 | 759 | 29,4 | 388 |
| Ouémé | 7,5 | 61,0 | 1 507 | 30,1 | 919 |
| Plateau | 6,6 | 55,0 | 970 | 11,4 | 533 |
| Zou | 6,6 | 54,8 | 1 606 | 34,1 | 880 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 3,2 | 42,7 | 8 785 | 12,7 | 3 752 |
| Primaire | 6,0 | 55,8 | 3 148 | 26,6 | 1 755 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 6,7 | 57,4 | 2 847 | 37,3 | 1 635 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 31,6 | 87,1 | 1 147 | 63,6 | 1 000 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 0,9 | 23,2 | 2 735 | 6,9 | 635 |
| Second | 2,1 | 34,4 | 3 030 | 10,5 | 1 042 |
| Moyen | 3,0 | 47,2 | 3 104 | 13,4 | 1 465 |
| Quatrième | 5,9 | 63,2 | 3 405 | 24,2 | 2 152 |
| Le plus élevé | 17,4 | 77,9 | 3 654 | 46,4 | 2 846 |
| Ensemble | 6,4 | 51,1 | 15 928 | 26,9 | 8 141 |

Tableau 14.7.2 Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont et utilisent un compte dans une banque ou une autre institution financière et pourcentage qui possède un téléphone portable ; parmi les hommes possédant un téléphone portable, pourcentage qui l'ont utilisé pour effectuer des transactions financières, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | A et utilise un compte bancaire | Possède un téléphone portable | Effectif d'hommes | Utilise un téléphone portable pour des transactions financières | Effectif d'hommes qui possède un téléphone portable |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|
| Groupe d'âges | | | | | |
| 15-19 | 1,9 | 46,9 | 1 548 | 22,1 | 726 |
| 20-24 | 9,9 | 86,8 | 1 118 | 37,1 | 970 |
| 25-29 | 17,1 | 91,8 | 1 156 | 42,8 | 1 061 |
| 30-34 | 24,5 | 91,5 | 881 | 43,4 | 806 |
| 35-39 | 20,3 | 88,6 | 812 | 38,3 | 719 |
| 40-44 | 21,4 | 88,3 | 620 | 38,7 | 547 |
| 45-49 | 18,6 | 87,5 | 592 | 30,9 | 518 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 35,8 | 92,1 | 390 | 60,2 | 360 |
| Autres villes | 18,9 | 82,5 | 2 487 | 46,4 | 2 051 |
| Ensemble urbain | 21,2 | 83,8 | 2 877 | 48,4 | 2 411 |
| Rural | 9,1 | 76,3 | 3 849 | 27,4 | 2 936 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 6,9 | 72,0 | 917 | 17,5 | 660 |
| Atacora | 6,3 | 75,1 | 560 | 20,6 | 420 |
| Atlantique | 20,9 | 82,2 | 822 | 44,2 | 676 |
| Borgou | 9,7 | 76,9 | 823 | 31,1 | 632 |
| Collines | 19,2 | 78,9 | 448 | 42,0 | 353 |
| Couffo | 17,2 | 83,1 | 409 | 51,7 | 340 |
| Donga | 7,5 | 82,2 | 445 | 42,1 | 366 |
| Littoral | 35,8 | 92,1 | 390 | 60,2 | 360 |
| Mono | 17,6 | 79,7 | 354 | 46,9 | 282 |
| Ouémé | 16,6 | 80,1 | 618 | 46,8 | 495 |
| Plateau | 11,7 | 82,6 | 340 | 16,9 | 281 |
| Zou | 12,7 | 80,1 | 600 | 34,9 | 481 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 5,0 | 74,9 | 2 426 | 16,8 | 1 818 |
| Primaire | 10,8 | 79,5 | 1 562 | 33,8 | 1 241 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 10,9 | 75,4 | 1 538 | 39,4 | 1 159 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 41,8 | 94,0 | 1 201 | 70,1 | 1 129 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 2,8 | 66,2 | 1 248 | 10,7 | 826 |
| Second | 5,5 | 73,6 | 1 315 | 18,2 | 968 |
| Moyen | 7,8 | 79,8 | 1 282 | 29,4 | 1 022 |
| Quatrième | 14,8 | 83,9 | 1 317 | 43,2 | 1 105 |
| Le plus élevé | 35,7 | 91,1 | 1 565 | 65,1 | 1 425 |
| Ensemble 15-49 | 14,3 | 79,5 | 6 727 | 36,9 | 5 347 |
| 50-64 | 19,9 | 80,3 | 868 | 31,8 | 697 |
| Ensemble 15-64 | 14,9 | 79,6 | 7 595 | 36,3 | 6 044 |

Tableau 14.8 Participation dans la prise de décision

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, en fonction de la personne qui prend, habituellement, les décisions dans certains domaines, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Décision | Principalement la femme | Femme et mari/partenaire en commun | | Principalement l'homme | Quelqu'un d'autre | Autre | Total | Effectif |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| FEMME | | | | | | | | |
| Soins de santé de la femme | 11,5 | 34,8 | 53,1 | 0,4 | 0,2 | 100,0 | 11 168 | |
| Achats importants du ménage | 8,8 | 38,4 | 52,1 | 0,5 | 0,2 | 100,0 | 11 168 | |
| Visites à sa famille ou à ses parents | 21,4 | 45,1 | 33,0 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 11 168 | |
| HOMME | | | | | | | | |
| Soins de santé du mari/partenaire | 1,5 | 21,7 | 75,5 | 0,9 | 0,4 | 100,0 | 3 675 | |
| Achats importants du ménage | 4,7 | 35,2 | 57,5 | 1,8 | 0,7 | 100,0 | 3 675 | |

Tableau 14.9.1 Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certaines décisions, soit seules, soit en commun avec leur mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Décisions | | | | | Effectif de femmes |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| | Propres soins de santé de la femme | Faire les achats importants du ménage | Visites à sa famille ou parents | Les trois décisions | Aucune des trois décisions | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-19 | 27,0 | 25,6 | 51,5 | 18,7 | 42,1 | 618 |
| 20-24 | 33,1 | 34,4 | 58,3 | 24,9 | 36,3 | 1 966 |
| 25-29 | 43,6 | 44,7 | 65,9 | 33,5 | 28,1 | 2 658 |
| 30-34 | 47,7 | 48,9 | 67,0 | 37,5 | 26,5 | 2 035 |
| 35-39 | 53,1 | 54,2 | 71,4 | 42,1 | 21,8 | 1 706 |
| 40-44 | 58,9 | 58,9 | 74,4 | 47,7 | 19,3 | 1 166 |
| 45-49 | 62,5 | 62,6 | 74,9 | 51,1 | 18,4 | 1 020 |
| Emploi (dans les 12 derniers mois) | | | | | | |
| N'a pas travaillé | 22,0 | 23,0 | 46,1 | 16,3 | 49,9 | 1 744 |
| A travaillé et a été rémunérée en argent | 54,0 | 54,9 | 72,8 | 42,5 | 20,2 | 7 978 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent | 33,5 | 33,9 | 56,5 | 26,1 | 38,5 | 1 446 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | |
| 0 | 36,6 | 35,1 | 58,5 | 27,3 | 35,5 | 689 |
| 1-2 | 41,7 | 42,7 | 64,4 | 32,6 | 30,0 | 3 819 |
| 3-4 | 48,8 | 50,3 | 66,5 | 37,6 | 26,0 | 3 566 |
| 5+ | 51,5 | 51,7 | 70,9 | 41,4 | 23,5 | 3 094 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 63,7 | 62,6 | 77,5 | 50,2 | 15,2 | 551 |
| Autres villes | 49,1 | 50,9 | 70,3 | 39,7 | 24,1 | 3 881 |
| Ensemble urbain | 50,9 | 52,3 | 71,2 | 41,0 | 23,0 | 4 431 |
| Rural | 43,4 | 43,8 | 63,4 | 33,2 | 30,0 | 6 737 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 22,7 | 27,3 | 58,8 | 18,3 | 37,3 | 1 550 |
| Atacora | 41,1 | 39,9 | 72,9 | 35,5 | 24,8 | 892 |
| Atlantique | 63,7 | 66,7 | 74,1 | 52,9 | 16,5 | 1 311 |
| Borgou | 35,8 | 30,4 | 53,6 | 23,2 | 42,4 | 1 381 |
| Collines | 41,2 | 44,2 | 52,8 | 24,9 | 31,8 | 738 |
| Couffo | 52,4 | 46,7 | 68,9 | 35,9 | 25,5 | 743 |
| Donga | 35,3 | 37,6 | 67,3 | 30,0 | 30,4 | 716 |
| Littoral | 63,7 | 62,6 | 77,5 | 50,2 | 15,2 | 551 |
| Mono | 68,0 | 70,6 | 82,5 | 56,1 | 12,1 | 514 |
| Ouémé | 51,1 | 55,4 | 70,8 | 39,2 | 20,6 | 985 |
| Plateau | 44,4 | 43,4 | 63,6 | 33,1 | 28,6 | 709 |
| Zou | 61,7 | 64,2 | 71,8 | 54,5 | 22,9 | 1 080 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 44,1 | 44,5 | 64,9 | 34,2 | 29,1 | 7 409 |
| Primaire | 50,1 | 51,7 | 67,2 | 39,9 | 25,6 | 1 984 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 47,6 | 50,2 | 70,1 | 36,7 | 23,3 | 1 294 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 62,6 | 61,9 | 78,5 | 52,9 | 16,6 | 481 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 35,2 | 35,5 | 60,5 | 26,5 | 34,2 | 2 165 |
| Second | 42,5 | 42,1 | 61,7 | 32,4 | 32,0 | 2 220 |
| Moyen | 45,8 | 47,4 | 66,5 | 35,7 | 27,3 | 2 233 |
| Quatrième | 50,0 | 50,2 | 67,7 | 38,6 | 25,0 | 2 330 |
| Le plus élevé | 57,8 | 60,2 | 76,0 | 48,0 | 18,0 | 2 221 |
| Ensemble | 46,4 | 47,2 | 66,5 | 36,3 | 27,2 | 11 168 |

Tableau 14.9.2 Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement, prennent certaines décisions, soit seuls, soit en commun avec leur épouse/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Décisions | | | | Effectif d'hommes |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | Propres soins de santé de l'homme | Faire les achats importants du ménage | Les deux décisions | Aucune des deux décisions | |
| Groupe d'âges | | | | | |
| 15-19 | * | * | * | * | 9 |
| 20-24 | 91,5 | 84,4 | 82,5 | 6,7 | 284 |
| 25-29 | 96,5 | 91,6 | 90,3 | 2,3 | 735 |
| 30-34 | 98,2 | 93,6 | 93,0 | 1,2 | 777 |
| 35-39 | 98,0 | 92,8 | 92,3 | 1,5 | 754 |
| 40-44 | 97,9 | 95,2 | 95,0 | 2,0 | 574 |
| 45-49 | 98,2 | 95,0 | 94,2 | 1,0 | 543 |
| Emploi (dans les 12 derniers mois) | | | | | |
| N'a pas travaillé | * | * | * | * | 22 |
| A travaillé et a été rémunéré en argent | 97,4 | 93,0 | 92,2 | 1,8 | 3 496 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent | 94,3 | 90,6 | 89,8 | 4,9 | 157 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | |
| 0 | 95,0 | 86,5 | 86,0 | 4,5 | 254 |
| 1-2 | 96,0 | 91,6 | 90,4 | 2,8 | 1 094 |
| 3-4 | 98,4 | 93,7 | 93,2 | 1,2 | 993 |
| 5+ | 97,8 | 94,2 | 93,6 | 1,6 | 1 334 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 98,7 | 91,1 | 91,1 | 1,3 | 182 |
| Autres villes | 97,3 | 93,7 | 93,1 | 2,1 | 1 326 |
| Ensemble urbain | 97,4 | 93,4 | 92,9 | 2,0 | 1 509 |
| Rural | 97,1 | 92,3 | 91,4 | 2,0 | 2 167 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 96,2 | 88,2 | 88,0 | 3,7 | 494 |
| Atacora | 97,5 | 94,9 | 94,9 | 2,5 | 300 |
| Atlantique | 96,3 | 95,3 | 93,4 | 1,8 | 446 |
| Borgou | 98,2 | 97,2 | 96,8 | 1,4 | 493 |
| Collines | 97,9 | 97,5 | 97,1 | 1,7 | 239 |
| Couffo | 97,1 | 94,8 | 92,6 | 0,6 | 222 |
| Donga | 100,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 246 |
| Littoral | 98,7 | 91,1 | 91,1 | 1,3 | 182 |
| Mono | 97,0 | 92,3 | 92,3 | 3,0 | 158 |
| Ouémé | 96,7 | 96,2 | 95,8 | 2,9 | 351 |
| Plateau | 97,8 | 95,8 | 94,7 | 1,0 | 219 |
| Zou | 95,3 | 74,0 | 72,1 | 2,8 | 325 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 97,2 | 92,9 | 92,2 | 2,1 | 1 693 |
| Primaire | 96,9 | 94,0 | 93,1 | 2,2 | 926 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 97,4 | 93,3 | 92,6 | 1,9 | 535 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 97,6 | 89,6 | 88,9 | 1,7 | 521 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 96,9 | 93,0 | 92,6 | 2,7 | 762 |
| Second | 96,5 | 91,6 | 90,5 | 2,4 | 715 |
| Moyen | 97,2 | 94,7 | 93,7 | 1,8 | 680 |
| Quatrième | 97,8 | 92,4 | 91,8 | 1,6 | 718 |
| Le plus élevé | 97,7 | 92,2 | 91,6 | 1,7 | 800 |
| Ensemble 15-49 | 97,2 | 92,8 | 92,0 | 2,0 | 3 675 |
| 50-64 | 98,0 | 94,1 | 93,3 | 1,2 | 782 |
| Ensemble 15-64 | 97,4 | 93,0 | 92,2 | 1,9 | 4 457 |

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 14.10.1 Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle : | | | | | Pourcentage d'accord avec au moins une des raisons citées | Effectif de femmes |
|--|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--|---|--------------------|
| | Brûle la nourriture | Argumente avec lui | Sort sans le lui dire | Néglige les enfants | Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | |
| 15-19 | 13,6 | 18,4 | 17,9 | 19,4 | 10,4 | 28,8 | 3 350 |
| 20-24 | 12,9 | 19,9 | 19,7 | 21,8 | 12,5 | 30,9 | 2 923 |
| 25-29 | 13,1 | 21,9 | 21,3 | 23,2 | 12,4 | 32,2 | 2 986 |
| 30-34 | 13,8 | 21,4 | 23,3 | 23,9 | 13,5 | 33,4 | 2 202 |
| 35-39 | 14,7 | 21,2 | 23,1 | 23,7 | 13,8 | 32,3 | 1 882 |
| 40-44 | 15,1 | 22,1 | 23,4 | 24,8 | 14,0 | 32,9 | 1 320 |
| 45-49 | 17,0 | 24,3 | 24,9 | 25,4 | 16,3 | 36,8 | 1 265 |
| Emploi (dans les 12 derniers mois) | | | | | | | |
| N'a pas travaillé | 11,7 | 19,9 | 20,7 | 20,8 | 13,5 | 29,3 | 3 525 |
| A travaillé et a été rémunérée en argent | 14,6 | 21,5 | 22,6 | 23,5 | 12,9 | 33,1 | 9 676 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent | 14,4 | 19,6 | 17,1 | 21,8 | 11,1 | 30,6 | 2 727 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | |
| 0 | 12,0 | 17,0 | 16,5 | 18,2 | 9,2 | 26,8 | 4 244 |
| 1-2 | 13,0 | 20,8 | 20,5 | 22,8 | 12,8 | 31,3 | 4 464 |
| 3-4 | 14,7 | 22,0 | 23,6 | 23,7 | 13,5 | 33,5 | 3 863 |
| 5+ | 16,6 | 24,5 | 25,5 | 26,7 | 16,3 | 37,0 | 3 357 |
| État matrimonial | | | | | | | |
| Célibataire | 11,8 | 16,1 | 15,3 | 17,3 | 8,4 | 25,7 | 3 889 |
| En union | 14,6 | 22,6 | 23,4 | 24,7 | 14,2 | 34,0 | 11 168 |
| En rupture d'union | 15,1 | 18,5 | 20,3 | 19,7 | 13,1 | 31,3 | 871 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 6,1 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 5,4 | 15,1 | 958 |
| Autres villes | 12,0 | 17,5 | 18,2 | 19,4 | 11,4 | 27,1 | 5 803 |
| Ensemble urbain | 11,2 | 16,2 | 16,9 | 18,0 | 10,6 | 25,4 | 6 761 |
| Rural | 15,9 | 24,3 | 24,5 | 26,0 | 14,4 | 36,6 | 9 167 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | 23,3 | 47,8 | 54,3 | 45,1 | 25,8 | 58,0 | 1 878 |
| Atacora | 14,3 | 17,4 | 15,3 | 19,7 | 14,9 | 30,9 | 1 302 |
| Atlantique | 9,5 | 19,4 | 18,9 | 19,9 | 8,2 | 26,5 | 2 037 |
| Borgou | 6,6 | 13,3 | 12,6 | 12,1 | 9,8 | 19,6 | 1 839 |
| Collines | 23,7 | 23,2 | 24,4 | 30,4 | 19,1 | 45,9 | 1 151 |
| Couffo | 12,0 | 19,1 | 19,3 | 18,8 | 14,1 | 29,1 | 1 041 |
| Donga | 13,9 | 11,2 | 16,3 | 20,4 | 10,3 | 28,4 | 881 |
| Littoral | 6,1 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 5,4 | 15,1 | 958 |
| Mono | 14,4 | 15,4 | 8,7 | 12,4 | 7,8 | 22,9 | 759 |
| Quémé | 8,7 | 15,3 | 15,9 | 16,9 | 6,3 | 24,7 | 1 507 |
| Plateau | 19,6 | 19,9 | 22,1 | 22,9 | 16,6 | 26,5 | 970 |
| Zou | 16,7 | 23,0 | 19,7 | 30,0 | 11,4 | 40,4 | 1 606 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucun | 16,5 | 25,9 | 26,5 | 27,2 | 16,5 | 37,3 | 8 785 |
| Primaire | 13,0 | 17,2 | 17,8 | 19,6 | 10,6 | 29,4 | 3 148 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 10,9 | 14,7 | 15,1 | 17,9 | 7,6 | 25,6 | 2 847 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 3,6 | 7,2 | 5,3 | 7,4 | 2,4 | 12,0 | 1 147 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 16,7 | 27,1 | 26,6 | 27,4 | 18,0 | 38,1 | 2 735 |
| Second | 15,8 | 23,5 | 24,0 | 25,3 | 15,5 | 34,7 | 3 030 |
| Moyen | 17,0 | 24,3 | 25,6 | 26,6 | 14,2 | 37,6 | 3 104 |
| Quatrième | 14,6 | 20,5 | 21,4 | 23,4 | 12,4 | 32,8 | 3 405 |
| Le plus élevé | 7,0 | 11,3 | 11,1 | 12,7 | 5,7 | 19,1 | 3 654 |
| Ensemble | 13,9 | 20,8 | 21,2 | 22,6 | 12,8 | 31,8 | 15 928 |

Tableau 14.10.2 Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme

Pourcentage de tous les hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle : | | | | | Pourcentage d'accord avec au moins, une des raisons citées | Effectif d'hommes |
|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--|--|-------------------|
| | Brûle la nourriture | Argumente avec lui | Sort sans le lui dire | Néglige les enfants | Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | |
| 15-19 | 8,7 | 11,1 | 11,0 | 11,6 | 7,9 | 17,4 | 1 548 |
| 20-24 | 7,8 | 11,0 | 9,8 | 10,6 | 7,5 | 17,2 | 1 118 |
| 25-29 | 7,4 | 11,6 | 8,8 | 10,7 | 9,1 | 17,2 | 1 156 |
| 30-34 | 5,2 | 8,4 | 7,5 | 8,3 | 6,4 | 14,2 | 881 |
| 35-39 | 5,2 | 7,9 | 6,6 | 7,4 | 5,3 | 12,8 | 812 |
| 40-44 | 4,9 | 6,4 | 9,1 | 7,1 | 5,5 | 13,3 | 620 |
| 45-49 | 6,0 | 7,8 | 6,2 | 5,0 | 4,5 | 12,3 | 592 |
| Emploi (dans les 12 derniers mois) | | | | | | | |
| N'a pas travaillé | 4,4 | 6,2 | 5,7 | 6,2 | 3,8 | 10,1 | 851 |
| A travaillé et a été rémunéré en argent | 6,6 | 9,8 | 8,7 | 9,1 | 7,2 | 15,2 | 5 084 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent | 11,0 | 12,6 | 13,0 | 14,3 | 9,3 | 23,4 | 791 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | |
| 0 | 7,9 | 11,1 | 10,3 | 10,8 | 7,9 | 16,7 | 3 089 |
| 1-2 | 5,7 | 8,4 | 7,3 | 8,8 | 6,9 | 14,4 | 1 232 |
| 3-4 | 5,6 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | 5,9 | 15,5 | 1 038 |
| 5+ | 6,5 | 8,3 | 7,4 | 7,7 | 5,9 | 13,8 | 1 367 |
| État matrimonial | | | | | | | |
| Célibataire | 8,0 | 11,0 | 10,3 | 11,0 | 7,8 | 16,9 | 2 860 |
| En union | 5,9 | 8,6 | 7,6 | 8,1 | 6,3 | 14,5 | 3 675 |
| En rupture d'union | 7,0 | 12,0 | 10,1 | 8,8 | 7,6 | 15,0 | 191 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 2,2 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 2,1 | 8,1 | 390 |
| Autres villes | 4,0 | 5,8 | 7,2 | 5,9 | 4,9 | 11,2 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 3,7 | 5,7 | 6,7 | 5,7 | 4,6 | 10,8 | 2 877 |
| Rural | 9,2 | 12,7 | 10,4 | 12,1 | 8,8 | 19,0 | 3 849 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | 22,5 | 28,7 | 17,3 | 26,0 | 22,2 | 38,2 | 917 |
| Atacora | 7,3 | 12,4 | 12,3 | 13,6 | 4,6 | 22,9 | 560 |
| Atlantique | 1,3 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 6,4 | 822 |
| Borgou | 1,3 | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 3,9 | 7,6 | 823 |
| Collines | 4,2 | 4,6 | 13,4 | 7,8 | 11,8 | 19,1 | 448 |
| Couffo | 10,4 | 14,7 | 20,5 | 12,8 | 9,5 | 23,9 | 409 |
| Donga | 10,3 | 8,0 | 7,9 | 10,8 | 4,3 | 16,7 | 445 |
| Littoral | 2,2 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 2,1 | 8,1 | 390 |
| Mono | 0,9 | 4,2 | 4,7 | 3,3 | 1,7 | 5,4 | 354 |
| Quémé | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,9 | 618 |
| Plateau | 0,3 | 2,5 | 4,6 | 2,5 | 0,8 | 7,0 | 340 |
| Zou | 3,0 | 6,1 | 4,1 | 5,8 | 3,5 | 9,6 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucun | 10,7 | 14,0 | 11,6 | 13,5 | 11,1 | 21,1 | 2 426 |
| Primaire | 6,3 | 9,4 | 9,3 | 8,4 | 6,0 | 14,8 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 5,2 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 5,4 | 14,6 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 1,9 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 6,4 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 12,7 | 17,9 | 13,3 | 16,1 | 12,8 | 26,0 | 1 248 |
| Second | 9,5 | 12,0 | 11,8 | 11,8 | 9,7 | 19,1 | 1 315 |
| Moyen | 7,1 | 9,7 | 9,3 | 9,6 | 7,4 | 16,1 | 1 282 |
| Quatrième | 4,2 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 3,6 | 11,4 | 1 317 |
| Le plus élevé | 2,0 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 2,6 | 7,1 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 6,9 | 9,7 | 8,9 | 9,3 | 7,0 | 15,5 | 6 727 |
| 50-64 | 3,3 | 6,9 | 6,4 | 5,6 | 4,0 | 9,9 | 868 |
| Ensemble 15-64 | 6,4 | 9,4 | 8,6 | 8,9 | 6,7 | 14,9 | 7 595 |

Tableau 14.11 Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes et pourcentage qui pense qu'il est justifié qu'une femme demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une infection sexuellement transmissible (IST), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Femme | | | Homme | | |
|--|---|---|--------------------|---|---|-------------------|
| | Il est justifié qu'une femme : | | Effectif de femmes | Il est justifié qu'une femme : | | Effectif d'hommes |
| | Refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes | Demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST | | Refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes | Demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST | |
| Groupe d'âges | | | | | | |
| 15-24 | 39,9 | 55,0 | 3 040 | 45,3 | 67,3 | 2 666 |
| 15-19 | 39,5 | 51,3 | 1 617 | 42,4 | 63,0 | 1 548 |
| 20-24 | 40,3 | 59,2 | 1 423 | 49,4 | 73,3 | 1 118 |
| 25-29 | 37,8 | 56,9 | 1 502 | 48,8 | 72,0 | 1 156 |
| 30-39 | 38,4 | 57,6 | 1 961 | 48,7 | 70,4 | 1 693 |
| 40-49 | 39,0 | 57,5 | 1 203 | 50,3 | 71,1 | 1 211 |
| État matrimonial | | | | | | |
| Célibataire | 44,2 | 55,9 | 1 900 | 46,0 | 68,7 | 2 860 |
| A déjà eu des rapports sexuels | 46,9 | 64,2 | 963 | 54,5 | 75,0 | 1 519 |
| N'a jamais eu de rapports sexuels | 41,4 | 47,4 | 937 | 36,3 | 61,5 | 1 341 |
| En union | 36,1 | 55,8 | 5 409 | 48,7 | 70,3 | 3 675 |
| En rupture d'union | 52,0 | 67,5 | 396 | 51,9 | 69,6 | 191 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 48,5 | 69,6 | 460 | 70,1 | 86,6 | 390 |
| Autres villes | 42,1 | 58,9 | 2 843 | 50,4 | 73,8 | 2 487 |
| Ensemble urbain | 43,0 | 60,4 | 3 303 | 53,0 | 75,6 | 2 877 |
| Rural | 35,9 | 53,4 | 4 403 | 43,6 | 65,1 | 3 849 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 6,1 | 39,9 | 947 | 31,2 | 62,1 | 917 |
| Atacora | 30,1 | 51,2 | 614 | 37,6 | 65,7 | 560 |
| Atlantique | 59,2 | 77,1 | 971 | 66,6 | 80,8 | 822 |
| Borgou | 17,5 | 45,7 | 890 | 10,8 | 57,9 | 823 |
| Collines | 47,4 | 59,0 | 588 | 38,0 | 65,1 | 448 |
| Couffo | 51,7 | 52,4 | 515 | 79,3 | 90,8 | 409 |
| Donga | 30,9 | 59,2 | 413 | 51,8 | 58,9 | 445 |
| Littoral | 48,5 | 69,6 | 460 | 70,1 | 86,6 | 390 |
| Mono | 46,3 | 55,5 | 375 | 65,9 | 93,5 | 354 |
| Ouémé | 60,0 | 70,3 | 724 | 39,7 | 55,4 | 618 |
| Plateau | 48,5 | 56,5 | 474 | 72,2 | 81,0 | 340 |
| Zou | 40,0 | 45,2 | 736 | 58,2 | 65,0 | 600 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucun | 31,7 | 50,6 | 4 245 | 36,2 | 61,2 | 2 426 |
| Primaire | 46,2 | 60,4 | 1 547 | 52,4 | 70,5 | 1 562 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 46,8 | 61,6 | 1 356 | 51,7 | 72,9 | 1 538 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 55,2 | 76,9 | 558 | 59,4 | 81,2 | 1 201 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 25,2 | 46,2 | 1 424 | 34,8 | 56,5 | 1 248 |
| Second | 33,8 | 49,2 | 1 551 | 42,6 | 69,1 | 1 315 |
| Moyen | 40,1 | 56,6 | 1 422 | 48,2 | 66,8 | 1 282 |
| Quatrième | 43,9 | 59,3 | 1 574 | 51,0 | 71,3 | 1 317 |
| Le plus élevé | 49,4 | 68,5 | 1 734 | 58,9 | 81,3 | 1 565 |
| Ensemble 15-49 | 38,9 | 56,4 | 7 706 | 47,7 | 69,6 | 6 727 |
| 50-64 | na | na | na | 53,4 | 72,5 | 868 |
| Ensemble 15-64 | na | na | na | 48,3 | 69,9 | 7 595 |

na = Non applicable

Tableau 14.12 Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari/partenaire

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui peuvent refuser des rapports sexuels à leur mari/partenaire quand elles ne souhaitent pas en avoir et pourcentage qui peuvent demander à leur mari/partenaire d'utiliser un condom, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage pouvant refuser des rapports sexuels à leur mari/partenaire quand elles ne souhaitent pas en avoir | Pourcentage pouvant demander à leur mari/partenaire d'utiliser un condom | Effectif de femmes |
|--|--|--|--------------------|
| Groupe d'âges | | | |
| 15-24 | 55,2 | 40,5 | 1 254 |
| 15-19 | 46,5 | 32,4 | 279 |
| 20-24 | 57,7 | 42,8 | 975 |
| 25-29 | 57,0 | 41,8 | 1 331 |
| 30-39 | 58,3 | 40,3 | 1 794 |
| 40-49 | 56,4 | 37,3 | 1 030 |
| Résidence | | | |
| Cotonou | 73,4 | 65,2 | 251 |
| Autres villes | 58,4 | 41,4 | 1 926 |
| Ensemble urbain | 60,2 | 44,1 | 2 177 |
| Rural | 54,7 | 37,5 | 3 233 |
| Département | | | |
| Alibori | 39,1 | 29,4 | 769 |
| Atacora | 44,3 | 23,2 | 444 |
| Atlantique | 73,3 | 65,6 | 633 |
| Borgou | 46,5 | 19,1 | 687 |
| Collines | 58,0 | 45,2 | 368 |
| Couffo | 70,2 | 42,4 | 356 |
| Donga | 36,3 | 34,4 | 343 |
| Littoral | 73,4 | 65,2 | 251 |
| Mono | 57,9 | 43,5 | 239 |
| Ouémé | 73,4 | 49,6 | 470 |
| Plateau | 77,7 | 37,3 | 359 |
| Zou | 53,6 | 46,0 | 490 |
| Niveau d'instruction | | | |
| Aucun | 52,2 | 32,8 | 3 583 |
| Primaire | 65,0 | 50,0 | 974 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 65,3 | 54,8 | 608 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 72,3 | 71,9 | 244 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 48,1 | 26,1 | 1 133 |
| Second | 52,5 | 33,6 | 1 115 |
| Moyen | 55,4 | 39,8 | 1 034 |
| Quatrième | 61,0 | 45,7 | 1 087 |
| Le plus élevé | 68,4 | 56,9 | 1 039 |
| Ensemble | 56,9 | 40,1 | 5 409 |

Tableau 14.13 Indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui participent à toutes les prises de décision et pourcentage de femmes qui ne sont d'accord avec aucune des raisons justifiant qu'un mari/partenaire batte sa femme, selon les deux indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Indicateur du pouvoir d'action | Pourcentage participant à la prise de toutes les décisions | Pourcentage n'étant d'accord avec aucune des raisons justifiant qu'un mari batte sa femme | Effectif de femmes |
|--|--|---|--------------------|
| Nombre de décisions auxquelles la femme a participé¹ | | | |
| 0 | na | 58,4 | 3 043 |
| 1-2 | na | 64,0 | 4 072 |
| 3 | na | 73,7 | 4 053 |
| Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme² | | | |
| 0 | 40,6 | na | 7 369 |
| 1-2 | 29,9 | na | 1 564 |
| 3-4 | 26,2 | na | 1 445 |
| 5 | 27,7 | na | 790 |

na = Non applicable

¹ Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

² Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.14 Utilisation actuelle de la contraception selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Répartition des femmes de 15-49 ans, actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Indicateur du pouvoir d'action | Méthodes modernes | | | | | | | Total | Effectif de femmes |
|--|-------------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------------------|
| | Une méthode | Une méthode moderne ¹ | Stérilisation féminine | Méthodes modernes temporaires féminines ² | Condom masculin | Une méthode traditionnelle | N'utilise pas actuellement | | |
| Nombre de décisions auxquelles la femme a participé³ | | | | | | | | | |
| 0 | 12,1 | 9,6 | 0,1 | 8,9 | 0,6 | 2,5 | 87,9 | 100,0 | 3 043 |
| 1-2 | 15,3 | 12,5 | 0,2 | 11,2 | 1,1 | 2,7 | 84,7 | 100,0 | 4 072 |
| 3 | 18,3 | 14,4 | 0,2 | 13,2 | 1,0 | 4,0 | 81,7 | 100,0 | 4 053 |
| Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁴ | | | | | | | | | |
| 0 | 15,8 | 13,1 | 0,2 | 11,8 | 1,1 | 2,7 | 84,2 | 100,0 | 7 369 |
| 1-2 | 15,8 | 12,2 | 0,0 | 11,4 | 0,8 | 3,6 | 84,2 | 100,0 | 1 564 |
| 3-4 | 13,5 | 9,6 | 0,2 | 9,0 | 0,4 | 3,9 | 86,5 | 100,0 | 1 445 |
| 5 | 16,2 | 11,7 | 0,0 | 11,0 | 0,7 | 4,4 | 83,8 | 100,0 | 790 |
| Ensemble | 15,5 | 12,4 | 0,2 | 11,3 | 0,9 | 3,1 | 84,5 | 100,0 | 11 168 |

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

¹ Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, pilule du lendemain, méthode des jours fixes (MJF), méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

² Pilule, DIU, injectables, implants, condom féminin, pilule du lendemain, méthode des jours fixes (MJF), méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes

³ Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

⁴ Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.15 Nombre idéal d'enfants et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Nombre moyen idéal d'enfants pour les femmes de 15-49 ans et pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Indicateur du pouvoir d'action | Nombre moyen idéal d'enfants ¹ | Effectif de femmes | Pourcentage de femmes actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale ² | | | Effectif de femmes actuellement en union |
|--|---|--------------------|---|--------------|-------|--|
| | | | Pour espacer | Pour limiter | Total | |
| Nombre de décisions auxquelles la femme a participé³ | | | | | | |
| 0 | 5,6 | 2 839 | 26,7 | 7,9 | 34,7 | 3 043 |
| 1-2 | 5,5 | 3 778 | 22,9 | 9,3 | 32,2 | 4 072 |
| 3 | 5,2 | 3 852 | 19,5 | 11,1 | 30,6 | 4 053 |
| Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁴ | | | | | | |
| 0 | 4,9 | 10 258 | 23,2 | 9,6 | 32,8 | 7 369 |
| 1-2 | 5,4 | 2 049 | 24,4 | 10,1 | 34,5 | 1 564 |
| 3-4 | 5,7 | 1 713 | 19,2 | 8,8 | 28,0 | 1 445 |
| 5 | 5,8 | 951 | 21,5 | 9,8 | 31,4 | 790 |
| Ensemble | 5,1 | 14 971 | 22,7 | 9,6 | 32,3 | 11 168 |

¹ Sont exclues dans le calcul de la moyenne, les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques.

² L'estimation des besoins non satisfaits est basée sur la définition révisée décrite dans Bradley et al., 2012

³ Limité aux seules femmes actuellement en union. Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions

⁴ Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.16 Soins de santé maternelle, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu des soins prénatals, une assistance à l'accouchement et des soins postnatals par du personnel de santé pour leur naissance la plus récente, selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Indicateur du pouvoir d'action | Pourcentage ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié ¹ | Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié ¹ | Pourcentage ayant eu un examen postnatal dans les 2 jours suivant la naissance ² | Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années |
|--|---|--|---|---|
| Nombre de décisions auxquelles la femme a participé³ | | | | |
| 0 | 82,0 | 70,5 | 59,4 | 2 423 |
| 1-2 | 89,3 | 83,9 | 67,3 | 3 125 |
| 3 | 92,9 | 88,3 | 71,8 | 2 800 |
| Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁴ | | | | |
| 0 | 89,1 | 85,4 | 66,0 | 5 963 |
| 1-2 | 88,8 | 78,5 | 65,9 | 1 313 |
| 3-4 | 88,4 | 79,4 | 71,0 | 1 130 |
| 5 | 82,2 | 62,3 | 59,8 | 624 |
| Ensemble | 88,5 | 82,0 | 66,2 | 9 031 |

¹ Les prestataires qualifiés incluent les médecins, les infirmières/sages-femmes

² Y compris les femmes qui ont reçu des soins postnatals d'un médecin, d'une infirmière/sage-femme, d'un agent de santé communautaire ou d'une sage-femme traditionnelle dans les deux jours qui ont suivi la naissance. Y compris les femmes qui ont accouché dans un établissement de santé et celles qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé.

³ Limité aux seules femmes actuellement en union. Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

⁴ Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.17 Mortalité des enfants de moins de cinq ans selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Indicateur du pouvoir d'action | Mortalité infantile ($1q_0$) | Mortalité juvénile ($4Q_1$) | Mortalité infanto-juvénile ($5q_0$) |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Nombre de décisions auxquelles la femme a participé¹ | | | |
| 0 | 60 | 50 | 107 |
| 1-2 | 57 | 41 | 96 |
| 3 | 60 | 45 | 103 |
| Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme² | | | |
| 0 | 60 | 44 | 101 |
| 1-2 | 55 | 53 | 105 |
| 3-4 | 60 | 40 | 98 |
| 5 | 68 | 50 | 114 |

¹ Limité aux seules femmes actuellement en union. Se reporter au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

² Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Résultats clés

- **Mortalité adulte** : La probabilité de décéder entre les âges exacts 15 et 50 ans est estimée à 111 ‰ pour les femmes et 153 ‰ pour les hommes.
- **Mortalité maternelle** : Pour la période des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018, le rapport de mortalité maternelle est estimé à 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.
- **Risque de mortalité maternelle sur la durée de vie (RDV)** : Dans les conditions actuelles de fécondité et de mortalité, environ 1 femme sur 40 (0,023) décèdera des suites de causes maternelles durant sa vie reproductive.
- **Rapport de mortalité liée à la grossesse** : Pour la période des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018, le rapport de mortalité liée à la grossesse est de 433 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Les indicateurs de mortalité adulte et de mortalité maternelle peuvent être utilisés pour évaluer l'état de santé d'une population, en particulier dans les pays en développement comme le Bénin.

L'estimation des taux de mortalité requiert des données complètes et précises sur les décès adultes et maternels. Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des données ont été recueillies sur la survie des frères et sœurs des femmes interrogées pour obtenir une estimation de la mortalité adulte. Les questions pour déterminer si les décès chez les femmes enceintes étaient liés à la grossesse ont permis d'estimer la mortalité liée à la grossesse. Il s'agit d'un indicateur clé de la santé et du bien-être maternel, ainsi que de la qualité des soins maternels.

Ce chapitre présente les niveaux et les tendances de la mortalité adulte et maternelle au Bénin. Il inclut une mesure résumée de la mortalité adulte ($_{35q15}$) qui correspond à la probabilité de décéder entre les âges exacts 15 et 50.

15.1 DONNÉES

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, pour obtenir l'historique des frères et sœurs, l'enquêtrice a d'abord demandé, à chaque femme interrogée, la liste de tous les enfants nés de sa mère biologique. L'enquêtrice demandait ensuite si chacun des frères et sœurs était toujours vivant. Elle demandait ensuite l'âge actuel de chaque frère et sœur vivant et pour les frères et sœurs décédés, l'âge au décès et le nombre d'années écoulées depuis le décès. Quand une enquêtée ne pouvait pas fournir d'informations précises sur l'âge au moment du décès et/ou sur le nombre d'années écoulées, les enquêtrices étaient autorisées à l'aider pour avoir une réponse approximative.

Pour les sœurs décédées à l'âge de 12 ans ou plus, l'enquêtrice posait la ou les questions supplémentaires afin de déterminer si le décès était lié à la maternité : « Est-ce que [NOM DE SŒUR] était enceinte quand elle est morte? » et, dans le cas d'une réponse négative, « Est-ce qu'elle est morte pendant l'accouchement? » et, dans le cas d'une réponse négative, « Est-elle décédée dans les deux mois qui ont suivi la fin de la

grossesse ou de l'accouchement? » et, dans le cas où elle est décédée dans les deux mois qui ont suivi la fin de la grossesse ou de l'accouchement, « Combien de jours après la fin de la grossesse est-elle décédée ? »

Étant donné que les décès accidentels ne sont pas considérés comme des décès maternels, on a demandé à chaque enquêtée si toutes les sœurs décédées étaient décédées à la suite d'un acte de violence ou d'un accident.

Le **Tableau 15.1** présente le nombre de frères et sœurs survivants et décédés déclarés par les enquêtées et la complétude des données sur l'âge actuel des frères et sœurs survivants, l'âge au décès et le nombre d'années écoulées depuis le décès des frères et sœurs décédés.

Dans l'ensemble, 80 122 frères et sœurs ont été enregistrés dans la section mortalité adulte et maternelle de l'EDSB-V 2017-2018. Des données complètes ont été obtenues pour tous les frères et sœurs, quel que soit leur état de survie, qu'il s'agisse de l'âge pour les survivants, de l'âge au décès et du nombre d'années écoulées depuis le décès pour ceux qui sont décédés.

15.2 ÉSTIMATION DIRECTE DE LA MORTALITÉ ADULTE

Taux de mortalité des adultes

Nombre de décès d'adultes pour 1 000 dans la population de 15-49 ans. Les taux de mortalité adulte par groupe d'âges quinquennal sont calculés comme suit : nombre de décès des frères et sœurs de l'enquêtée dans chaque groupe d'âges divisé par le nombre de personnes années d'exposition au risque de décéder dans le groupe d'âges pendant les 7 années ayant précédé l'enquête. Le nombre de décès est le nombre déclaré de décès de frères et de sœurs qui ont eu lieu pendant les 7 années ayant précédé l'enquête. Les personnes-années d'exposition dans chaque groupe d'âges sont calculées pour les frères et sœurs survivants et décédés, basées sur l'âge actuel (pour les survivants) ou l'âge au décès et les années écoulées depuis le décès (pour les décédés).

Échantillon : Frères et sœurs (survivants et décédés) qui étaient âgés de 15-49 ans au cours des 7 années ayant précédé l'enquête, par sexe et par groupe d'âges quinquennal.

Une façon d'évaluer la qualité des données utilisées pour estimer la mortalité maternelle, est d'évaluer la vraisemblance et la fiabilité des estimations de la mortalité adulte globale. Si les taux estimés de mortalité générale adulte sont peu plausibles, les taux basés sur un sous-ensemble de décès (décès maternels en particulier) le seront aussi.

L'estimation directe de la mortalité adulte utilise les âges déclarés au décès et le nombre d'années écoulées depuis le décès des frères et sœurs des enquêtés. Étant donné que les risques d'expositions au décès varient selon l'âge et le sexe, les taux de mortalité adulte sont présentés par groupe d'âges quinquennal et par sexe. Le **Tableau 15.2** et le **Graphique 15.1** présentent les taux de mortalité par âge pour les femmes et pour les hommes de 15-49 ans pour la période des 7 années ayant précédé l'enquête.


Pour disposer d'un nombre suffisamment important de décès d'adultes pour produire une estimation fiable, les taux sont calculés pour la période de 7 ans précédant l'enquête. Néanmoins, les taux de mortalité spécifiques par âge obtenus de cette manière restent soumis à des variations d'échantillonnage considérables. L'utilisation de cette période de 7 ans est un compromis entre le souhait de disposer des données les plus récentes et la nécessité de minimiser l'erreur d'échantillonnage.

- Dans l'ensemble, le niveau de la mortalité adulte est plus élevé parmi les hommes (4,01 décès pour 1000 individus) que parmi les femmes (3,06 décès pour 1000 individus).
- Les niveaux de mortalité augmentent rapidement avec l'âge, surtout chez les hommes. Quel que soit le groupe d'âges, les taux de mortalité des hommes sont plus élevés que ceux des femmes ; l'écart augmente avec l'âge, particulièrement après l'âge de 30 ans.

15.3 TENDANCES DE LA MORTALITÉ ADULTE

Le **Tableau 15.3** présente la probabilité de décéder entre les âges exacts 15 et 50 (${}_{35}q_{15}$) au cours des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018 et l'EDSB-III 2006. En supposant que les taux de mortalité par âge se soient maintenus constants au cours des 7 années avant l'enquête, ${}_{35}q_{15}$ est la probabilité pour un homme ou une femme qui vient d'atteindre 15 ans de décéder avant d'atteindre son cinquantième anniversaire. Les résultats montrent que de 2006 à 2017-2018, la probabilité de décéder entre les âges exacts 15 et 50 ans a baissé chez les femmes (passant de 127 % à 111 %) comme chez les hommes, (passant de 162 % à 153 %).

Graphique 15.1 Taux de mortalité adulte par âge



15.4 ÉSTIMATION DIRECTE DE LA MORTALITÉ MATERNELLE

Taux de mortalité maternelle

Nombre de décès maternels pour 1 000 femmes de 15-49 ans. Les taux de mortalité maternelle par groupe d'âges quinquennal sont calculés en divisant le nombre de décès maternels des sœurs de l'enquêtée dans chaque groupe d'âges par le total des personnes-années d'exposition des sœurs au risque de décéder dans le groupe d'âges au cours des 7 années ayant précédé l'enquête. Le nombre de décès est le nombre déclaré de décès de sœurs qui sont décédées au cours des 7 années ayant précédé l'enquête, soit pendant la grossesse ou l'accouchement, soit pendant les 42 jours qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse, par groupe d'âges au moment du décès ; les décès dus à un accident ou à des actes de violence sont exclus. Les personnes-années d'exposition dans chaque groupe d'âges sont calculées pour les sœurs vivantes et décédées, basées sur leur âge actuel déclaré pour les sœurs survivantes ou l'âge au décès et les années écoulées depuis le décès pour les sœurs décédées

Échantillon : Sœurs (vivantes et décédées) de 15-49 ans durant les 7 années ayant précédé l'enquête, par groupe d'âges quinquennal.

Les décès maternels sont un sous-ensemble de tous les décès de femmes ; ils désignent les décès qui se produisent pendant la grossesse ou l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent l'accouchement ou la fin de la grossesse ; les décès maternels n'incluent pas les décès dus à un accident ou un acte de violence. Il faut noter qu'à cette édition, la définition de la mortalité maternelle a connu des améliorations par l'apport de trois questions supplémentaires adressées à l'enquêtée sur ses sœurs décédées. Deux questions relatives aux décès consécutifs à des actes de violence ou à un accident ont été introduites qui permettent d'exclure ces deux causes des décès maternels. En outre, la dernière question permet de déterminer le nombre de jours après la fin de la grossesse ou de l'accouchement pendant lequel le décès s'est produit puisque dans ce rapport, à la différence des enquêtes précédentes, pour être défini comme maternel, le décès doit avoir eu lieu dans une période de référence de 42 jours après l'accouchement ou la fin de la grossesse.

Dans cette enquête, la variante directe de la méthode des sœurs (Rutenbergh and Sullivan 1991 ; Stanton et al. 1997) est utilisée pour estimer la mortalité maternelle. Le **Tableau 15.4** présente les estimations par âge de la mortalité maternelle pour la période de 7 ans avant l'EDSB-V 2017-2018.

Les résultats montrent que le taux de mortalité maternelle des femmes de 15-49 ans est de 0,73 décès pour 1 000 femmes-années d'exposition. Les données par groupes d'âges quinquennaux révèlent que c'est dans les groupes d'âges 30-34 ans et 35-39 ans que les taux sont les plus élevés (respectivement 1,30 ‰ et 0,83 ‰). Le pourcentage global de décès de femmes qui sont liés à la maternité est de 25 %. Ce pourcentage de décès varie de 14 % parmi les femmes de 45-49 ans à 32 % parmi celles de 30-34 ans. Cependant, étant donné que le nombre total de décès maternels (138) parmi les femmes en âge de reproduction est relativement peu important (**Tableau 15.4**), il convient d'interpréter avec prudence les variations par âge.

Le rapport de mortalité maternelle (RMM) est estimé à 391 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours de la période des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018 (**Tableau 15.5**). L'intervalle de confiance dans lequel se situe la valeur est grand (299 à 484), ce qui s'explique par le faible nombre de décès maternels (138). En d'autres termes, au Bénin, pour mille naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 7 années avant l'enquête, environ 4 femmes sont décédées durant la grossesse, pendant l'accouchement ou dans les 42 jours qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse, non compris les décès dus à des accidents ou à des actes de violence.

Le risque de décès maternel sur la durée de vie est estimé à 0,023 ; exprimé autrement, cela revient à dire qu'environ une femme sur quarante décèdera de causes maternelles durant sa vie reproductive si les conditions de mortalité et de fécondité demeurent inchangées.

15.5 TENDANCES DE LA MORTALITÉ LIÉE À LA GROSSESSE

Taux de mortalité liée à la grossesse

Nombre de décès liés à la grossesse pour 1 000 femmes de 15-49 ans. Les taux de mortalité liés à la grossesse par groupe d'âges quinquennal sont calculés en divisant le nombre de décès de sœurs de l'enquêtée liés à la grossesse dans chaque groupe d'âges par le total des personnes-années d'exposition des sœurs au risque de décéder dans le groupe d'âges durant les 7 années ayant précédé l'enquête. Le nombre de décès est le nombre déclaré de décès de sœurs qui sont décédées au cours des 7 années ayant précédé l'enquête, soit pendant la grossesse ou l'accouchement, soit pendant les 2 mois qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse, par groupe d'âges au moment du décès. Les personnes-années d'exposition dans chaque groupe d'âges sont calculées pour les sœurs survivantes et décédées, basées sur leur âge actuel déclaré pour les sœurs survivantes ou l'âge au décès et les années écoulées depuis le décès pour les sœurs décédées

Échantillon : Sœurs (vivantes et décédées) de 15-49 ans durant les 7 années ayant précédé l'enquête, par groupe d'âges quinquennal.

Rapport de mortalité liée à la grossesse

Nombre de décès liés à la grossesse pour 100 000 naissances vivantes. Le rapport de mortalité liée à la grossesse est calculé en divisant le taux standardisé par âge de mortalité liée à la grossesse pour les femmes de 15-49 ans durant les 7 années ayant précédé l'enquête par le taux global de fécondité générale (TGFG) pour la même période.


Pour comparer avec les estimations des enquêtes EDS précédentes, l'EDSB-V 2017-2018 définit un décès lié à la grossesse comme le décès d'une femme pendant la grossesse ou l'accouchement ou qui se produit dans les deux mois qui suivent l'accouchement ou la fin de la grossesse, quelle que soit la cause du décès. Les estimations de la mortalité liée à la grossesse sont donc basées seulement sur le moment où s'est produit le décès en relation avec la grossesse. Noter que cette définition est différente de la définition du décès lié à la grossesse de l'OMS qui limite la période de référence à 42 jours. Ce que l'EDS actuelle définit comme des décès liés à la grossesse était considéré comme des décès maternels dans les enquêtes EDS précédentes.

Le **Graphique 15.2** présente les estimations du rapport de mortalité liée à la grossesse avec les intervalles de confiance pour les 7 ans précédant les enquêtes EDS 1996, 2006 et 2017-2018 (**Tableau 15.6**). Le rapport de mortalité liée à la grossesse est passé de 498 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 7 années ayant précédé l'EDSB-I 1996 à 400 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 7 années ayant précédé l'EDSB-III 2006, puis à 433 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018.

Le **Graphique 15.2** montre aussi que les intervalles de confiance des deux dernières estimations se chevauchent avec la valeur obtenue dans l'EDSB-I 1996. Il semble donc que la variation apparente du rapport de mortalité liée à la grossesse de 1996 à 2017-2018 n'est pas, en fait, statistiquement significative.

Graphique 15.2 Tendances du Rapport de Mortalité liée à la Grossesse (RMG) avec intervalle de confiance

Décès de femmes dont les causes sont liées à la grossesse pour 100 000 naissances vivantes



LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la mortalité adulte et sur la mortalité maternelle, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 15.1** Complétude de l'information sur les frères et sœurs
- **Tableau 15.2** Taux de mortalité des adultes
- **Tableau 15.3** Quotient de mortalité adulte
- **Tableau 15.4** Mortalité maternelle
- **Tableau 15.5** Rapport de mortalité maternelle
- **Tableau 15.6** Tendances de la mortalité liée à la grossesse

Tableau 15.1 Complétude de l'information sur les frères et sœurs

Effectif des frères et sœurs déclarés par les enquêtées et complétude des données déclarées concernant l'état de survie, l'âge au décès et le nombre d'années écoulées depuis le décès (sans pondération), EDSB-V Bénin 2017-2018

| | Sœurs | | Frères | | Ensemble | |
|-------------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % |
| Ensemble des sœurs et frères | 38 833 | 100,0 | 41 289 | 100,0 | 80 122 | 100,0 |
| Survivants | 35 110 | 90,4 | 36 673 | 88,8 | 71 783 | 89,6 |
| Décédés | 3 722 | 9,6 | 4 605 | 11,2 | 8 327 | 10,4 |
| Non disponible | 1 | 0,0 | 11 | 0,0 | 12 | 0,0 |
| Ensemble des survivants | 35 110 | 100,0 | 36 673 | 100,0 | 71 783 | 100,0 |
| Âge déclaré | 35 110 | 100,0 | 36 673 | 100,0 | 71 783 | 100,0 |
| Ensemble de décédés | 3 722 | 100,0 | 4 605 | 100,0 | 8 327 | 100,0 |
| Âge et nombre d'années déclarés | 3 722 | 100,0 | 4 605 | 100,0 | 8 327 | 100,0 |

Tableau 15.2 Taux de mortalité des adultes

Estimation directe de la mortalité des femmes et des hommes par groupe d'âges pour la période de 7 ans avant l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Décès | Années d'exposition | Taux de mortalité ¹ |
|----------------|-------|---------------------|--------------------------------|
| FEMME | | | |
| 15-19 | 86 | 35 355 | 2,45 |
| 20-24 | 87 | 39 226 | 2,23 |
| 25-29 | 84 | 36 426 | 2,32 |
| 30-34 | 121 | 30 122 | 4,02 |
| 35-39 | 81 | 21 197 | 3,82 |
| 40-44 | 52 | 13 405 | 3,90 |
| 45-49 | 37 | 7 810 | 4,71 |
| Ensemble 15-49 | 549 | 183 543 | 3,06 ^a |
| HOMME | | | |
| 15-19 | 96 | 37 734 | 2,54 |
| 20-24 | 113 | 41 570 | 2,71 |
| 25-29 | 104 | 38 107 | 2,73 |
| 30-34 | 133 | 30 846 | 4,32 |
| 35-39 | 114 | 22 920 | 4,96 |
| 40-44 | 117 | 13 929 | 8,39 |
| 45-49 | 58 | 7 804 | 7,46 |
| Ensemble 15-49 | 734 | 192 911 | 4,01 ^a |

¹ Exprimé pour 1 000 personnes

^a Taux ajusté selon l'âge

Tableau 15.3 Quotient de mortalité adulte

Probabilité de décéder des femmes et des hommes entre les âges exacts de 15-50 ans pour la période de 7 ans avant l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018 et EDSB-III Bénin 2006

| Enquête | Femme | Homme |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| | ${}_{35}q_{15}^1$ | ${}_{35}q_{15}^1$ |
| EDSB-V Bénin 2017-2018 | 111 | 153 |
| EDSB-III Bénin 2006 | 127 | 162 |

¹ Probabilité de décéder entre les âges exacts de 15 et 50 ans exprimés pour 1 000 personnes-années d'exposition.

Tableau 15.4 Mortalité maternelle

Estimation directe des taux de mortalité maternelle pour la période de 7 ans avant l'enquête, par groupe d'âges quinquennal, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Pourcentage de décès de femmes qui sont maternels | Décès maternels ¹ | Années d'exposition | Taux de mortalité maternelle ² |
|----------------|---|------------------------------|---------------------|---|
| 15-19 | 14,7 | 13 | 35 355 | 0,36 |
| 20-24 | 30,9 | 27 | 39 226 | 0,69 |
| 25-29 | 31,0 | 26 | 36 426 | 0,72 |
| 30-34 | 32,3 | 39 | 30 122 | 1,30 |
| 35-39 | 21,8 | 18 | 21 197 | 0,83 |
| 40-44 | 18,7 | 10 | 13 405 | 0,73 |
| 45-49 | 14,1 | 5 | 7 810 | 0,66 |
| Ensemble 15-49 | 25,0 | 138 | 183 543 | 0,73 ^a |

¹ Les décès maternel désignent les décès qui se produisent pendant la grossesse ou l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent l'accouchement ou la fin de la grossesse et n'incluent pas les décès dus à un accident ou à des actes de violence.

² Exprimé pour 1 000 femmes-années d'exposition

^a Taux standardisés par l'âge

Tableau 15.5 Rapport de mortalité maternelle

Indice synthétique de fécondité, taux global de fécondité général, rapport de mortalité maternelle, et risque de mortalité maternelle sur la durée de vie pour la période de 7 ans avant l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

| | |
|---|---------------------|
| Indice synthétique de fécondité (ISF) | 5,9 |
| Taux global de fécondité général (TGFG) ¹ | 186 |
| Rapport de mortalité maternelle (RMM) ² | 391 IC : (299, 484) |
| Risque de mortalité maternelle sur la durée de vie ³ | 0,023 |

IC : Intervalle de confiance

¹ Taux standardisés par âge exprimé pour 1 000 femmes de 15-49 ans

² Exprimé pour 100 000 naissances vivante ; calculé comme suit : [Taux de mortalité maternelle standardisé par âge (présenté au Tableau 15.4) x 100/ TGFG standardisé par âge]

³ Calculé à partir de la formule suivante : $1 - (1 - \text{RMM})^{\text{ISF}}$ où l'ISF est l'indice synthétique de fécondité pour la période de 7 ans avant l'enquête.

Tableau 15.6 Tendances de la mortalité liée à la grossesse

Estimations directes des taux de mortalité liées à la grossesse pour la période 7 ans avant chaque enquête, par groupe d'âge quinquennal, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Age | Taux de mortalité liés à la grossesse ^{1,2} | | |
|--|--|-----------|-----------------|
| | 1989-1996 | 1999-2006 | 2010/11-2017/18 |
| 15-19 | 0,62 | 0,28 | 0,44 |
| 20-24 | 0,91 | 0,48 | 0,78 |
| 25-29 | 1,05 | 0,97 | 0,76 |
| 30-34 | 2,19 | 1,38 | 1,42 |
| 35-39 | 0,74 | 1,20 | 0,94 |
| 40-44 | 1,09 | 0,67 | 0,81 |
| 45-49 | 0,51 | 0,30 | 0,66 |
| Ensemble 15-49 ^a | 1,02 | 0,77 | 0,81 |
| Indice Synthétique de Fécondité (ISF) | 6,0 | 5,7 | 5,9 |
| Taux Globale de Fécondité Générale (TGFG) ³ | 202 | 204 | 186 |
| Rapport de mortalité liée à la grossesse (RMG) ⁴ | 498 | 400 | 433 |
| Intervalle de Confiance | (372-624) | (327-473) | (339-527) |
| Risque de mortalité liée à la grossesse sur la durée de vie ⁵ | 0,032 | 0,023 | 0,025 |

¹ Mortalité liée à la grossesse est définie comme étant le décès d'une femme pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou dans les deux mois suivant la fin de la grossesse, y compris les accidents ou la violence

² Exprimé pour 1 000 femmes-années d'exposition

³ Taux standardisé par âge pour 1 000 femmes âgées de 15-49 ans

⁴ Exprimé pour 100 000 naissances ; calculé comme taux de mortalité liée à la grossesse standardisé par âge x 100/TGFG standardisé par âge

⁵ Calculé à partir de la formule suivante $1 - (1 - \text{RMG})^{\text{ISF}}$ où l'ISF est l'indice synthétique de fécondité pour la période 7 ans avant l'enquête

^a Taux standardisé par âge

Résultats clés

- **Violence physique** : Près de trois femmes de 15-49 ans sur dix (27 %) ont subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans. Les auteurs de ces actes de violence sont le mari/partenaire actuel dans 49 % des cas, quel que soit le statut matrimonial de la femme et, dans 62 % des cas, parmi les femmes en union.
- **Violence sexuelle** : Une femme sur dix (10 %) a déclaré avoir subi des violences sexuelles à un moment quelconque de sa vie ; au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 5 %.
- **Violence conjugale** : Parmi les femmes de 15 à 49 ans en union ou en rupture d'union, 42 % ont déclaré avoir subi, à un moment donné, des actes de violence, que ce soit sous la forme émotionnelle, physique et/ou sexuelle commis par leur mari/partenaire.
- **Blessures dues à la violence conjugale de type physique ou sexuelle** : La proportion de femmes ayant subi, à un moment donné, n'importe quel type de blessures consécutives à des actes de violence physique commis par leur conjoint est de 43 %. Au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 49 %.
- **Recherche d'aide** : Plus d'un tiers (35 %) des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles, ont déclaré avoir recherché de l'aide pour arrêter le cycle de la violence.

La violence basée sur le genre à l'encontre des femmes est reconnue dans le monde entier comme une violation des droits humains fondamentaux. D'importantes recherches ont mis en évidence les conséquences sur la santé, les effets intergénérationnels et les effets démographiques de ce type de violence (United Nations 2006). Ce chapitre porte sur la violence domestique, une forme de violence basée sur le genre. Elle est définie par les Nations Unies comme tout acte de violence pouvant causer aux femmes, aux jeunes filles, aux hommes et aux jeunes garçons un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de libertés.

L'EDSB-V 2017-2018 a inclus un module sur la violence domestique à l'encontre des femmes, une forme de violence basée sur le genre. Dans la moitié des ménages non tirés pour l'enquête homme, le module était administré à une seule femme dans le ménage, même si le ménage comprenait 2 femmes éligibles ou plus. En outre, la confidentialité de l'entretien était essentielle pour assurer la confiance de l'enquêtée et, dans les cas où la confidentialité ne pouvait être garantie, le module n'a pas été administré. Il était aussi important d'établir un climat de confiance pour la validité des données collectées.

16.1 MESURE DE LA VIOLENCE

On a demandé aux femmes célibataires si elles avaient subi des actes de violence commis par n'importe qui et aux femmes non célibataires, si elles avaient subi des actes de violence commis par leur conjoint actuel ou précédent et par d'autres personnes. De manière plus spécifique, la violence commise par le conjoint

actuel pour les femmes actuellement en union et par le conjoint le plus récent pour les femmes précédemment en union a été mesurée en demandant à toutes les femmes non célibataires s'il était déjà arrivé que leur conjoint leur ait fait l'une des choses suivantes :

- La **violence physique conjugale** a été évaluée au moyen des questions suivantes : Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre mari/partenaire vous bouscule, pousse, secoue, ou vous jette quelque chose ; vous gifle ; vous torde le bras ou vous tire les cheveux ; vous frappe à coups de poing ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ; vous donne des coups de pied, vous traîne par terre ou vous batte ; essaye de vous étrangler ou de vous brûler intentionnellement ; menace de vous attaquer avec un couteau, un fusil ou une autre arme ?
- La **violence sexuelle conjugale** a été évaluée à l'aide des questions suivantes : Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre mari/partenaire vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui contre votre propre gré ; vous force physiquement à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ; vous force sous la menace ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?
- La **violence émotionnelle conjugale** a été évaluée à l'aide des questions suivantes : Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre mari/partenaire vous dise ou vous fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ; vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, à vous ou quelqu'un qui vous est proche ; vous insulte ou vous rabaisse ?

En outre, on a collecté des informations auprès de toutes les femmes (en union et non en union) sur des actes de violence physique qu'elles ont subis commis par une personne quelconque (autre que le conjoint actuel ou le conjoint le plus récent) depuis l'âge de 15 ans ; pour cela, on leur a demandé si cette personne les avait frappées, giflées, si elle leur avait donné des coups de pied ou fait quelque chose d'autres pour les blesser physiquement. On a demandé à toutes les femmes si elles avaient subi des actes de violence sexuelle commis par n'importe quelle personne (autre que le conjoint actuel ou le conjoint le plus récent) : on leur a demandé si, quand elles étaient enfant ou à l'âge adulte, il leur était arrivé qu'on les force, de quelque manière que ce soit, à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels qu'elles ne voulaient pas.

Dans ce chapitre, les femmes en union comprennent les femmes ayant déclaré être mariées et celles ayant déclaré qu'elles vivaient avec un homme comme si elles étaient mariées. De même, les conjoints incluent les maris des femmes mariées et les partenaires des femmes avec qui ils ne sont pas mariés mais avec qu'ils vivent ensemble comme s'ils étaient mariés.

16.2 VIOLENCE PHYSIQUE

Actes de violence physique commis par quelqu'un

Pourcentage de femmes qui ont subi des actes de violence physique (commis par un conjoint ou quelqu'un d'autre) depuis l'âge de 15 ans et dans les 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Au Bénin, près de trois femmes de 15-49 ans sur dix (27 %) ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans (**Tableau 16.1**). Au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 12 %.


Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans varie en fonction de l'âge, passant de 22 % chez les femmes de 15-19 ans à 30 % chez celles de 25-29 ans.

- Les résultats selon les départements montrent que le pourcentage de femmes de 15-49 ans victimes d'actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans varie de 20 % dans la Donga et l'Ouémé à 33 % dans l'Alibori.
- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans est plus élevé chez celles qui ont travaillé et qui ont été rémunérées en argent (30 %) que chez les autres.

Le **Graphique 16.1** montre que le pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans, est plus élevé parmi les divorcées/séparées/veuves (36 %) que chez celles qui sont mariées ou qui vivent avec un partenaire (28 %) et que les célibataires (24 %). Les mêmes variations sont observées au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête.

Graphique 16.1 Violence subie par les femmes selon leur état matrimonial



16.2.1 Auteurs des actes de violence physique

On a demandé aux femmes de 15-49 ans qui avaient déclaré avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans qui était l'auteur de ces actes. Le **Tableau 16.2** montre que parmi les femmes ayant déjà été en union, 62 % ont déclaré que le mari/partenaire actuel était responsable de ces actes et 16 % ont déclaré que l'ancien mari ou le partenaire le plus récent s'était rendu coupable de ces actes de violence. Les femmes célibataires ont déclaré dans 35 % des cas que les actes de violence physique subis depuis l'âge de 15 ans avaient été commis par la mère/belle-mère et dans 23 % des cas par un autre parent. Pratiquement une femme célibataire sur cinq (19 %) a incriminé la sœur ou le frère et 17 % ont accusé le père ou le beau-père. (**Tableau 16.2**).

16.3 VIOLENCE SEXUELLE

Violence sexuelle

Pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle (commis par un conjoint ou par quelqu'un d'autre) à un certain moment de leur vie ou dans les 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

16.3.1 Prévalence de la violence sexuelle

Les résultats de l'EDSB-V révèlent qu'une femme de 15-49 ans sur dix (10 %) a subi des actes de violence sexuelle à un moment quelconque¹ de sa vie. Quand on considère seulement les douze derniers mois, ce pourcentage passe à 5 % (**Tableau 16.3**). Quatre pour cent des femmes ont subi les premiers actes de violence sexuelle avant d'atteindre 18 ans exacts. Dans 2 % des cas, ces actes de violence ont eu lieu avant l'âge de 15 ans exacts (**Tableau 16.4**).

¹ Y compris les violences subies au cours des douze derniers mois.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle est nettement plus élevé parmi celles qui ont travaillé et qui ont été rémunérées en argent (11 % à un moment donné et 6 % au cours des 12 derniers mois) que chez celles qui ont travaillé sans contrepartie financière (9 % à un moment donné et 5 % au cours des 12 derniers mois) ou que celles qui ne travaillent pas (7 % à un moment donné et 4 % au cours des 12 derniers mois) (**Tableau 16.3**).
- Les résultats montrent que le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir subi, à un moment donné, des actes de violence sexuelle a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant de 12 % parmi celles sans niveau d'instruction à 8 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. Les résultats concernant les 12 derniers mois suivent la même tendance, passant respectivement de 6 % à 4 %.
- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle ne varie que très peu entre les quatre premiers quintiles, Il est, par contre, plus faible dans le quintile le plus élevé que dans les autres (8 % par rapport à 11 % à un moment donné et 3 % par rapport à 5-7 % dans les 12 derniers mois).

16.3.2 Auteurs des actes de violence sexuelle

Les données du **Tableau 16.5** montrent que parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles, les auteurs sont, dans la majorité des cas, les maris/partenaires actuels (72 %) ou les anciens maris/partenaires (20 %) pour les femmes en union ou en rupture d'union ; les célibataires ont déclaré dans 34 % des cas que l'auteur des violences sexuelles est un ami ou une rencontre et dans 29 % des cas un petit ami actuel ou ancien.

16.4 DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCE

La violence à l'égard des femmes peut se manifester sous plusieurs formes. Le **Tableau 16.6** présente les pourcentages de femmes de 15-49 ans qui ont subi diverses formes de violence. Les résultats sont présentés selon l'âge de la femme.

Dans l'ensemble, un cinquième des femmes de 15-49 ans (20 %) ont subi des violences physiques seulement, 3 % des violences sexuelles seulement. Sept pour cent ont subi des actes de violence physique et sexuelle et 31 % des actes de violence physique ou sexuelle.

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes actuellement enceintes ou qui l'avaient déjà été si elles avaient subi des actes de violence physique pendant une grossesse. Parmi ces femmes, 4 % ont déclaré avoir subi ce genre de comportement alors qu'elles étaient enceintes (**Tableau 16.7**). Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence physique au cours d'une grossesse est plus élevé parmi celles de Cotonou (5 %), dans l'Atacora (7 %) et parmi celles en rupture d'union (7 %) que parmi les autres.

16.5 CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONJOINT

Contrôle exercé par le conjoint

Pourcentage de femmes dont le conjoint actuel (si actuellement en union) ou le plus récent (si précédemment en union) a manifesté, au moins, un des comportements suivants : jaloux ou en colère si elle parle à d'autres hommes ; l'accuse fréquemment d'être infidèle ; ne lui permet pas de rencontrer ses amies ; essaye de limiter ses contacts avec sa famille ; insiste pour savoir où elle est à tout moment.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans non célibataires

Certains comportements dominateurs du mari/partenaire qui ont pour but de contrôler divers aspects de la vie de la femme peuvent être précurseurs d'actes de violence contre la femme. Dans le but de mesurer le niveau de contrôle des maris/partenaires sur les femmes, on a demandé aux femmes en union ou en rupture d'union si leur mari/partenaire avait eu à leur égard certains comportements à savoir :

- Est jaloux si elles parlent à d'autres hommes ;
- Les accuse souvent d'être infidèles ;
- Ne leur permet pas de rencontrer leurs amies ;
- Essaie de limiter leurs contacts avec leur famille ;
- Insiste pour savoir où elles sont à tout moment ;

Les résultats du **Tableau 16.8** montrent dans l'ensemble que 54 % des femmes ont déclaré que leur mari était jaloux si elles parlaient à d'autres hommes ; plus d'une femme sur cinq ont déclaré que leur mari/partenaire les accusait souvent d'être infidèles (21 %), dans 28 % des cas, les femmes ont déclaré que leur mari/partenaire ne leur permettait pas de rencontrer leurs amies. Enfin, 41 % ont déclaré que leur mari/partenaire insistait à tout moment pour savoir où elle se trouvait. Globalement, 28 % des femmes non célibataires ont rapporté que leur mari/partenaire avait manifesté au moins 3 de ces comportements de contrôle.

Variations par caractéristique

- On constate que le pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union dont le mari/partenaire a manifesté au moins 3 types de comportements de contrôle est plus élevé chez les jeunes femmes que chez les plus âgées (39 % chez les 15-19 ans et 31 % à 20-24 ans contre 24 % à 40-49 ans).
- Les résultats montrent des écarts entre milieux de résidence, le pourcentage de femmes ayant déclaré au moins 3 comportements de contrôle variant de 25 % en milieu urbain à 30 % en milieu rural.
- Dans les départements, la proportion des femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant déclaré au moins 3 types de contrôle exercés par le mari/partenaire varie de 14 % dans l'Ouémé à 39 % dans l'Atacora.
- Les proportions de femmes de 15-49 ans non célibataires ayant déclaré au moins 3 types de contrôle exercés par le mari/partenaire diminuent avec le quintile de bien-être économique, passant de 32 % dans le plus bas à 23 % dans le plus élevé.
- On note variations selon que l'enquêtée a peur ou pas de son mari/partenaire, les proportions de femmes qui ont déclaré que leurs maris/partenaires avaient manifesté au moins trois comportements de contrôle à leur égard passant de 50 % chez celles qui en ont peur la plupart du temps à 21 % parmi celles qui en n'ont jamais peur.

16.6 FORMES DE VIOLENCE CONJUGALE

Violence conjugale

Pourcentage de femmes ayant subi l'un des actes spécifiés de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis par leur conjoint actuel (si actuellement en union) ou par le plus récent (si précédemment en union), à n'importe quel moment de leur vie et dans les 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans non célibataires

16.6.1 Prévalence de la violence conjugale


Le **Tableau 16.9** révèle que parmi les femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d'union, 42 % ont déclaré avoir subi, à un moment donné, n'importe quelle forme de violences, qu'elle soit physique, émotionnelle ou sexuelle exercées par leur mari/partenaire ; au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 32 %. Une femme non célibataire sur cinq (20 %) a déclaré avoir subi, à un moment donné, des actes de violence physique de la part d'un mari/partenaire, actuel pour les femmes actuellement en union ou précédent pour les femmes en rupture d'union. Au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 11 %. Dans la majorité des cas, les femmes ont rapporté avoir été giflées (16 % à un moment donné et 8 % au cours des 12 derniers mois) (**Graphique 16.2**).

En outre, 9 % des femmes non célibataires ont rapporté avoir subi, à un moment donné, au moins un acte de violence sexuelle ; au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 6 %. L'acte le plus fréquemment

rapporté est le recours à la violence physique pour imposer des rapports sexuels non souhaités (7 % à un moment donné et 5 % au cours des 12 derniers mois). Enfin, 37 % des femmes non célibataires ont déclaré avoir subi de la part de leur mari/partenaire, actuel ou le plus récent, des actes de violence émotionnelle, en grande partie sous forme d'insultes et d'humiliations (31 % à un moment donné et 24 % au cours des 12 derniers mois).

Graphique 16.2 Types d'actes de violence conjugale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans non célibataires qui ont déjà subi certains actes de violence commis par leur mari/partenaire



Variations par caractéristique

- C'est dans le département du Plateau que le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir subi des actes de violence conjugale, qu'ils soient émotionnels, physiques ou sexuels est le plus élevé (54 %) (**Graphique 16.3**).
- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence conjugale, sous différentes formes, a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant de 44 % parmi celles sans niveau d'instruction à 25 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Tableau 16.10**).


Variations par caractéristique du conjoint et selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Le niveau de la violence conjugale contre la femme peut être influencé par certaines caractéristiques du mari/partenaire et il peut aussi varier en fonction des indicateurs du pouvoir d'action des femmes (**Tableau 16.11**).

- Les femmes dont le mari/partenaire n'a atteint que le niveau d'instruction primaire ont plus fréquemment déclaré avoir été victimes de violence conjugale sous une forme quelconque (46 %) que celles dont le mari a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (28 %).
- La prévalence de la violence conjugale, quelle qu'en soit la forme, augmente avec le nombre de contrôles exercés par le mari/partenaire passant de 23 % chez les femmes dont le conjoint n'a exercé aucun contrôle à 67 %, chez celles dont le mari en a exercé 5.
- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant déclaré avoir subi des actes de violences émotionnelles, physiques ou sexuelles commis par le mari/partenaire actuel ou le plus récent est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (39 % contre 44 %) (**Tableau 16.10**).
- Le niveau de la violence conjugale augmente avec le nombre de raisons pour lesquelles les femmes pensent qu'il est justifié qu'un mari/partenaire batte sa femme, passant de 41 % quand aucune raison ne justifie la violence conjugale à 50 % quand le nombre de raisons est de 5.

Graphique 16.3 Violence conjugale par département


Pourcentage de femmes de 15-49 ans non célibataires qui ont déjà subi des actes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis par leur mari/partenaire



- La prévalence de violence conjugale, qu'elle soit physique sexuelle ou émotionnelle, augmente avec le niveau de consommation d'alcool du mari/partenaire. Plus d'un tiers des femmes (34 %) dont le mari ne boit pas ont déclaré avoir subi des violences conjugales sous une forme quelconque contre 78 % de celles dont le mari est souvent ivre (**Graphique 16.4**).

Graphique 16.4 Violence conjugale selon la consommation d'alcool du mari/partenaire

Pourcentage de femmes non célibataires qui ont déjà subi des actes de violence conjugale (physique, sexuelle ou émotionnelle)



Le **Tableau 16.12** présente le pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par n'importe conjoint au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête.

16.6.2 Premier épisode de violence conjugale

Le **Tableau 16.13** présente parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union et qui n'ont été en union qu'une seule fois, les pourcentages ayant subi des actes de violence conjugale par nombre exact d'années écoulées depuis l'union. On constate que pour 6 % des femmes, le premier épisode de violence s'est produit 2 ans après le début de l'union ; pour 15 % des femmes, il a eu lieu 5 ans après le début de l'union et pour 19 %, il s'est produit 10 ans après le début de l'union.

16.7 BLESSURES DUES À LA VIOLENCE CONJUGALE

Blessures dues à la violence conjugale

Pourcentage de femmes ayant subi les blessures suivantes à la suite d'actes de violence conjugale : entailles, hématomes, ou meurtrissures ; hématomes aux yeux, foulures, luxations ou brûlures ; blessures profondes, os cassés, dents cassées ou autres blessures sérieuses.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans non célibataires qui ont subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par leur conjoint actuel (si en union actuellement) ou par le conjoint le plus récent (si précédemment en union).

Dans l'ensemble, 39 % des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles ont eu, à un moment donné, une blessure quelconque à la suite de ces actes violents perpétrés par leur mari/partenaire. Cette proportion est de 42 % au cours des douze derniers mois. Ces blessures sont sérieuses (par exemple, os ou dents cassés) dans 6 % des cas, à n'importe quel moment et dans 8% des cas récemment (**Tableau 16.14**).

16.8 VIOLENCE INITIÉE PAR LES FEMMES À L'ENCONTRE DE LEUR CONJOINT

Initiation de la violence physique par les épouses/partenaires

Pourcentage de femmes qui ont déjà frappé, giflé, ou donné des coups de pied ou fait autre chose pour blesser physiquement leur conjoint actuel (si actuellement en union) ou le conjoint le plus récent (si précédemment en union) alors que celui-ci ne les avait ni battues, ni blessées physiquement.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans non célibataires

Les **Tableaux 16.15** et **16.16** montrent que 3 % des femmes de 15-49 ans ont exercé des violences physiques sur leurs maris/partenaires actuels, à n'importe quel moment, alors que ceux-ci n'avaient manifesté aucun comportement violent à leur égard. Au cours des douze derniers mois, ce pourcentage est d'environ 2 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant commis des actes de violence physique contre leur mari/partenaire est plus élevé quand les femmes ont, elles-mêmes, subi des comportements violents de la part de leur conjoint que quand elles n'ont jamais été confrontées à de tels comportements (10 % à un moment donné et 12 % au cours des 12 derniers mois contre 1 %). Le recours à la violence physique contre le mari/partenaire par les femmes semble plus fréquent quand les femmes travaillent que quand elles ne travaillent pas (3 % contre 1 %) (**Tableau 16.15**).
- Les résultats selon le département montrent des écarts, le pourcentage de femmes ayant agressé physiquement leur conjoint variant de 0 % dans la Donga à 4 % dans l'Atlantique et le Littoral (**Tableau 16.15**).
- La consommation d'alcool du mari/partenaire influence le recours à la violence physique par les femmes, le pourcentage de femmes ayant agressé physiquement leur conjoint variant de 1 % quand le conjoint ne boit pas à 10 % quand il souvent soûl. (**Tableau 16.16**).
- Le pourcentage de femmes ayant eu des comportements agressifs envers leur mari/partenaire varie avec le nombre de comportements de contrôle que ce dernier a exercés à leur encontre, passant de 2 % quand ce nombre est de 0 à 6 % quand il est de 5.
- Les enquêtées dont le père battait la mère (7 %) ont plus fréquemment commis des actes de violence contre leur conjoint que celles dont le père ne battait pas la mère (2 %) (**Tableau 16.16**).

16.9 RECHERCHE D'AIDE ET SOURCE DE L'AIDE


16.9.1 Recherche d'aide parmi les femmes qui ont subi des actes de violence

Plus d'un tiers (35 %) des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles, ont déclaré avoir recherché de l'aide pour arrêter le cycle de la violence. Par contre, plus d'une femme sur deux (54 %) n'en a jamais parlé à quelqu'un ni recherché de l'aide (**Tableau 16.17**).

La recherche d'aide varie en fonction du type de violence subie ; le pourcentage de femmes ayant recherché de l'aide est plus élevé quand la violence s'est manifestée sous la forme physique seulement que sexuelle seulement (31 % contre 24 %). De même, dans le cas de violence sexuelle seulement, 67% des femmes n'ont jamais recherché d'aide ni parlé à quelqu'un de ce qui leur était arrivé contre 59 % dans le cas de violence physique (**Graphique 16.5**).

Graphique 16.5 Recherche d'aide par type de violence subie

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des actes de violence physique ou sexuelle qui ont recherché de l'aide



Variations par caractéristique

- On note des variations entre départements, le pourcentage de femmes ayant recherché de l'aide passant de 26 % dans le Borgou et 27 % dans l'Atacora à 52 % dans l'Alibori.
- La proportion des femmes ayant recherché de l'aide pour arrêter la violence est plus faible chez les femmes célibataires (32 %) que chez celles en union (35 %) et en rupture d'union (43 %).

16.9.2 Sources auprès desquelles l'aide a été recherchée

Les femmes de 15-49 ans victimes de violence à la fois physique et sexuelle ont recherché dans 74 % des cas de l'aide auprès de leur propre famille. Dans 31 % des cas, elles ont sollicité l'aide de la famille du mari/partenaire et dans 19 % des cas, l'aide d'amis. Les services sociaux n'ont été contactés que dans moins d'un pour cent des cas (**Tableau 16.18**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques des enquêtés, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 16.1** **Violence physique**
- **Tableau 16.2** **Auteurs des violences physiques**
- **Tableau 16.3** **Violence sexuelle**
- **Tableau 16.4** **Âge au moment de la première expérience de violence sexuelle**
- **Tableau 16.5** **Auteurs des violences sexuelles**
- **Tableau 16.6** **Expérience de diverses formes de violence**
- **Tableau 16.7** **Violence pendant la grossesse**
- **Tableau 16.8** **Contrôle exercé par les maris selon les déclarations des épouses**
- **Tableau 16.9** **Formes de violence conjugale**
- **Tableau 16.10** **Violence conjugale selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 16.11** **Violence conjugale selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme**
- **Tableau 16.12** **Violences conjugales au cours des 12 derniers mois**
- **Tableau 16.13** **Premier épisode de violence conjugale selon la durée de l'union**
- **Tableau 16.14** **Blessures dues à la violence conjugale**
- **Tableau 16.15** **Violence des enquêtées contre leurs conjoints selon les caractéristiques des enquêtées**
- **Tableau 16.16** **Violence des enquêtées contre leur conjoint selon les caractéristiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action de l'enquêtée**
- **Tableau 16.17** **Recherche de l'aide pour mettre fin à la violence**
- **Tableau 16.18** **Sources/personnes auprès desquelles l'aide pour mettre fin à la violence a été recherché**

Tableau 16.1 Violence physique

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes qui ont subi des violences physiques au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de femmes qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans ¹ | Pourcentage ayant subi des actes de violence physique au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête | | | Effectif de femmes |
|--|--|--|---------|---------------------------------|--------------------|
| | | Souvent | Parfois | Souvent ou parfois ² | |
| Age | | | | | |
| 15-19 | 22,3 | 4,0 | 9,2 | 13,2 | 1 064 |
| 20-24 | 25,7 | 2,6 | 7,6 | 10,2 | 960 |
| 25-29 | 29,9 | 4,1 | 9,3 | 13,4 | 983 |
| 30-39 | 29,2 | 5,1 | 6,9 | 12,1 | 1 435 |
| 40-49 | 28,7 | 5,3 | 5,7 | 11,0 | 966 |
| Religion | | | | | |
| Vodou | 30,8 | 4,7 | 8,6 | 13,3 | 450 |
| Autre traditionnelle | (24,9) | (9,7) | (9,7) | (19,3) | 36 |
| Islam | 24,8 | 6,9 | 6,7 | 13,6 | 1 581 |
| Catholique | 25,7 | 2,1 | 7,5 | 9,6 | 1 338 |
| Protestant Méthodiste | 21,8 | 3,7 | 4,7 | 8,7 | 250 |
| Autres Protestants | 33,0 | 3,1 | 7,4 | 10,5 | 208 |
| Célestes | 29,3 | 3,9 | 8,8 | 12,7 | 431 |
| Autres chrétiens | 30,5 | 3,1 | 8,6 | 11,7 | 751 |
| Autres religions | 14,4 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 67 |
| Aucune | 34,9 | 4,8 | 12,6 | 17,4 | 295 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 30,9 | 2,9 | 9,5 | 12,5 | 318 |
| Autres villes | 25,9 | 3,7 | 7,8 | 11,6 | 1 962 |
| Ensemble urbain | 26,6 | 3,6 | 8,1 | 11,7 | 2 280 |
| Rural | 27,7 | 4,8 | 7,4 | 12,3 | 3 128 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 33,2 | 15,0 | 6,7 | 21,7 | 600 |
| Atacora | 29,6 | 3,4 | 12,0 | 15,4 | 455 |
| Atlantique | 30,7 | 3,1 | 6,6 | 9,8 | 694 |
| Borgou | 21,1 | 1,6 | 7,0 | 8,7 | 631 |
| Collines | 29,2 | 3,4 | 12,6 | 15,9 | 375 |
| Couffo | 28,0 | 3,2 | 7,4 | 10,6 | 349 |
| Donga | 19,9 | 2,8 | 8,3 | 11,1 | 310 |
| Littoral | 30,9 | 2,9 | 9,5 | 12,5 | 318 |
| Mono | 24,6 | 3,7 | 6,4 | 10,1 | 253 |
| Ouémé | 20,4 | 1,8 | 4,8 | 6,6 | 520 |
| Plateau | 29,4 | 5,9 | 5,5 | 11,5 | 329 |
| Zou | 28,1 | 2,6 | 7,6 | 10,2 | 573 |
| État matrimonial | | | | | |
| Célibataire | 23,5 | 3,2 | 7,9 | 11,1 | 1 258 |
| En union | 27,8 | 4,4 | 7,7 | 12,1 | 3 831 |
| En rupture d'union | 36,1 | 7,5 | 7,6 | 15,1 | 318 |
| Emploi | | | | | |
| A travaillé et a été rémunérée en argent | 30,0 | 4,7 | 7,1 | 11,8 | 3 382 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent | 23,7 | 3,7 | 9,7 | 13,4 | 894 |
| Ne travaille pas | 21,8 | 3,5 | 8,1 | 11,6 | 1 132 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | |
| 0 | 24,1 | 3,3 | 7,3 | 10,6 | 1 397 |
| 1-2 | 26,4 | 3,8 | 8,1 | 11,9 | 1 489 |
| 3-4 | 30,5 | 6,0 | 9,0 | 15,1 | 1 352 |
| 5+ | 28,4 | 4,1 | 6,2 | 10,4 | 1 170 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 28,3 | 6,0 | 7,4 | 13,4 | 3 022 |
| Primaire | 29,3 | 2,9 | 9,1 | 12,0 | 1 047 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 23,7 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 951 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 22,5 | 1,1 | 4,7 | 5,8 | 388 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 26,3 | 5,2 | 8,4 | 13,6 | 869 |
| Second | 30,3 | 5,9 | 9,2 | 15,1 | 977 |
| Moyen | 27,9 | 5,5 | 7,7 | 13,2 | 1 110 |
| Quatrième | 26,4 | 3,1 | 6,9 | 10,0 | 1 200 |
| Le plus élevé | 25,8 | 2,5 | 6,9 | 9,5 | 1 252 |
| Ensemble | 27,3 | 4,3 | 7,7 | 12,0 | 5 408 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les violences subies au cours des 12 derniers mois. Pour les femmes qui étaient en union avant l'âge de 15 ans et qui ont déclaré avoir subi des violences physiques commises par leurs maris, il est possible que ces actes de violence aient été commis avant l'âge de 15 ans.

² Y compris les femmes pour lesquelles la fréquence des actes de violence au cours des 12 mois n'est pas connue.

Tableau 16.2 Auteurs des violences physiques

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans, pourcentage ayant mentionné différents types d'auteurs des violences, selon l'état matrimonial actuel de l'enquêtée, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Auteurs des violences | État matrimonial | | Ensemble |
|--|--------------------------------|-------------|----------|
| | En union ou en rupture d'union | Célibataire | |
| Mari/partenaire actuel | 61,6 | na | 49,2 |
| Ancien mari/partenaires le plus récent | 16,0 | na | 12,8 |
| Petit ami | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| Ancien petit ami | 3,5 | 4,9 | 3,8 |
| Père/Beau-père | 8,0 | 17,2 | 9,8 |
| Mère/Belle-mère | 13,1 | 35,1 | 17,5 |
| Sœur/frère | 9,4 | 18,5 | 11,2 |
| Sœur/Fils | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autre parent | 11,0 | 23,3 | 13,4 |
| Belle-mère | 0,6 | na | 0,7 |
| Beau-père | 0,3 | na | 0,3 |
| Autre parent par alliance | 1,5 | na | 1,4 |
| Enseignant | 1,2 | 10,6 | 3,1 |
| Employeur/quelqu'un au travail | 1,6 | 8,2 | 2,9 |
| Autre | 4,3 | 7,5 | 5,0 |
| Effectif de femmes qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 1 178 | 296 | 1 474 |

Note : Une enquêtée pouvait déclarer plus d'un auteur de violence.
na = Non applicable

Tableau 16.3 Violence sexuelle

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences sexuelles à n'importe quel moment et pourcentage de femmes qui ont subi des violences sexuelles au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage ayant subi des actes de violence : | | Effectif de femmes |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| | A un moment quelconque ¹ | Au cours des 12 derniers mois | |
| Age | | | |
| 15-19 | 6,3 | 2,9 | 1 064 |
| 20-24 | 9,5 | 5,2 | 960 |
| 25-29 | 12,2 | 6,8 | 983 |
| 30-39 | 11,7 | 6,7 | 1 435 |
| 40-49 | 10,5 | 4,0 | 966 |
| Religion | | | |
| Vodoun | 11,6 | 6,7 | 450 |
| Autre traditionnelle | (12,8) | (4,0) | 36 |
| Islam | 8,3 | 3,7 | 1 581 |
| Catholique | 8,9 | 4,4 | 1 338 |
| Protestante Méthodiste | 9,2 | 5,6 | 250 |
| Autres Protestants | 10,8 | 5,5 | 208 |
| Célestes | 11,9 | 7,4 | 431 |
| Autres chrétiens | 14,0 | 7,7 | 751 |
| Autres religions | 4,3 | 4,3 | 67 |
| Aucune | 11,3 | 5,6 | 295 |
| Résidence | | | |
| Cotonou | 10,1 | 2,8 | 318 |
| Autres villes | 8,4 | 4,4 | 1 962 |
| Ensemble urbain | 8,6 | 4,2 | 2 280 |
| Rural | 11,2 | 6,0 | 3 128 |
| Département | | | |
| Alibori | 8,9 | 4,7 | 600 |
| Atacora | 10,6 | 4,1 | 455 |
| Atlantique | 11,3 | 5,7 | 694 |
| Borgou | 11,1 | 5,1 | 631 |
| Collines | 13,4 | 7,1 | 375 |
| Couffo | 12,5 | 7,1 | 349 |
| Donga | 3,9 | 1,8 | 310 |
| Littoral | 10,1 | 2,8 | 318 |
| Mono | 8,2 | 5,0 | 253 |
| Ouémé | 9,0 | 6,3 | 520 |
| Plateau | 13,1 | 9,3 | 329 |
| Zou | 8,2 | 4,0 | 573 |
| État matrimonial | | | |
| Célibataire | 6,1 | 1,7 | 1 258 |
| En union | 11,2 | 6,3 | 3 831 |
| En rupture d'union | 12,4 | 6,0 | 318 |
| Emploi | | | |
| A travaillé et a été rémunéré en argent | 11,4 | 5,8 | 3 382 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent | 9,4 | 4,8 | 894 |
| Ne travaille pas | 6,8 | 4,1 | 1 132 |
| Nombre d'enfants vivants | | | |
| 0 | 6,6 | 2,3 | 1 397 |
| 1-2 | 10,8 | 6,0 | 1 489 |
| 3-4 | 11,8 | 7,1 | 1 352 |
| 5+ | 11,5 | 5,7 | 1 170 |
| Niveau d'instruction | | | |
| Aucun | 11,5 | 6,2 | 3 022 |
| Primaire | 9,6 | 4,8 | 1 047 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 7,2 | 3,3 | 951 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 8,2 | 3,6 | 388 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 10,5 | 6,0 | 869 |
| Second | 10,9 | 6,7 | 977 |
| Moyen | 10,7 | 5,3 | 1 110 |
| Quatrième | 11,4 | 5,5 | 1 200 |
| Le plus élevé | 7,5 | 3,2 | 1 252 |
| Ensemble | 10,1 | 5,2 | 5 408 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les violences subies au cours des 12 derniers mois.

Tableau 16.4 Âge au moment de la première expérience de violence sexuelle

Pourcentage de femmes 15-49 ans qui ont subi les premiers actes de violences sexuelles avant d'atteindre certains âges exacts, selon l'âge actuel et l'état matrimonial actuel, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage qui ont subi les premiers actes de violences sexuelles avant d'atteindre certains âges exacts : | | | | | Pourcentage de femmes qui n'ont jamais suivi de violences sexuelles | Effectif de femmes |
|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | | |
| Âge | | | | | | | |
| 15-19 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | na | na | 93,7 | 1 064 |
| 20-24 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 3,9 | na | 90,5 | 960 |
| 25-29 | 0,2 | 0,9 | 1,5 | 3,9 | 7,2 | 87,8 | 983 |
| 30-39 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 3,3 | 5,0 | 88,3 | 1 435 |
| 40-49 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 3,5 | 5,9 | 89,5 | 966 |
| État matrimonial | | | | | | | |
| Célibataire | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 4,5 | 5,8 | 93,9 | 1 258 |
| En union ou en rupture d'union | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 3,9 | 6,5 | 88,7 | 4 150 |
| Ensemble | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 4,0 | 6,3 | 89,9 | 5 408 |

na = Non applicable

Tableau 16.5 Auteurs des violences sexuelles

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles, pourcentage ayant mentionné différents types d'auteurs des violences, selon l'état matrimonial actuel de l'enquêtée, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Auteurs des violences | État matrimonial | | |
|--|--------------------------------|-------------|----------|
| | En union ou en rupture d'union | Célibataire | Ensemble |
| Mari/partenaire actuel | 71,5 | na | 61,5 |
| Ancien Mari/partenaire | 19,9 | na | 17,1 |
| Petit ami actuel/ancien | 3,4 | 29,3 | 7,0 |
| Frère/Beau-Frère | 0,1 | 1,4 | 0,3 |
| Autre parent | 2,3 | 1,3 | 2,2 |
| Beaux-parents | 0,3 | na | 0,3 |
| Ami propre/Rencontre | 6,9 | 34,1 | 10,8 |
| Ami de la famille | 1,5 | 15,8 | 3,5 |
| Enseignant | 0,6 | 5,5 | 1,3 |
| Inconnu | 3,5 | 6,0 | 3,8 |
| Autre | 0,8 | 6,7 | 1,6 |
| Effectif des femmes ayant subi des actes des violences sexuelles | 469 | 77 | 546 |

Note : Les femmes déjà mariées peuvent signaler jusqu'à trois auteurs: un mari actuel, un ancien mari ou une autre personne qui n'est pas un mari actuel ou un ancien. Les femmes célibataires ne peuvent signaler que la personne qui a été la première à commettre des actes de violence.
na = Non applicable

Tableau 16.6 Expérience de diverses formes de violence

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi diverses formes de violence, selon l'âge actuel, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge | Violence physique seulement | Violence sexuelle seulement | Violence physique et sexuelle | Violence physique ou sexuelle | Effectif de femmes |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15-19 | 18,8 | 2,8 | 3,5 | 25,0 | 1 064 |
| 15-17 | 18,8 | 1,7 | 3,1 | 23,7 | 669 |
| 18-19 | 18,7 | 4,5 | 4,1 | 27,3 | 395 |
| 20-24 | 19,7 | 3,5 | 6,0 | 29,2 | 960 |
| 25-29 | 21,9 | 4,1 | 8,1 | 34,0 | 983 |
| 30-39 | 20,7 | 3,1 | 8,5 | 32,3 | 1 435 |
| 40-49 | 20,7 | 2,5 | 8,0 | 31,2 | 966 |
| Ensemble | 20,4 | 3,2 | 6,9 | 30,5 | 5 408 |

Tableau 16.7 Violence pendant la grossesse

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement enceintes ou qui ont déjà été enceintes, pourcentage de celles qui ont déclaré avoir subi des violences physiques pendant qu'elles étaient enceintes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de femmes ayant subi des violences pendant leur grossesse | Effectif de femmes actuellement enceintes ou l'ayant déjà été |
|--|---|---|
| Age | | |
| 15-19 | 2,4 | 237 |
| 20-24 | 3,9 | 687 |
| 25-29 | 4,4 | 936 |
| 30-39 | 3,7 | 1 420 |
| 40-49 | 3,7 | 957 |
| Religion | | |
| Vodoun | 3,8 | 383 |
| Autre traditionnelle | (3,1) | 32 |
| Islam | 3,5 | 1 292 |
| Catholique | 3,7 | 965 |
| Protestante Méthodiste | 4,2 | 187 |
| Autres Protestants | 5,0 | 157 |
| Célestes | 6,3 | 344 |
| Autres chrétiens | 2,9 | 575 |
| Autres religions | 0,0 | 56 |
| Aucune | 4,5 | 245 |
| Résidence | | |
| Cotonou | 5,3 | 233 |
| Autres villes | 2,6 | 1 479 |
| Ensemble urbain | 3,0 | 1 712 |
| Rural | 4,4 | 2 525 |
| Département | | |
| Alibori | 2,8 | 514 |
| Atacora | 7,1 | 369 |
| Atlantique | 3,4 | 528 |
| Borgou | 3,5 | 476 |
| Collines | 3,4 | 308 |
| Couffo | 2,8 | 265 |
| Donga | 3,2 | 265 |
| Littoral | 5,3 | 233 |
| Mono | 4,2 | 199 |
| Ouémé | 4,7 | 401 |
| Plateau | 3,9 | 251 |
| Zou | 2,3 | 427 |
| État matrimonial | | |
| Célibataire | 5,8 | 182 |
| En union | 3,5 | 3 742 |
| En rupture d'union | 6,6 | 312 |
| Nombre d'enfants vivants | | |
| 0 | 1,8 | 225 |
| 1-2 | 3,8 | 1 489 |
| 3-4 | 4,0 | 1 352 |
| 5+ | 4,0 | 1 170 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucun | 3,6 | 2 730 |
| Primaire | 4,4 | 788 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,2 | 533 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 3,3 | 184 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 4,4 | 750 |
| Second | 4,0 | 797 |
| Moyen | 4,6 | 888 |
| Quatrième | 2,5 | 900 |
| Le plus élevé | 3,6 | 902 |
| Ensemble | 3,8 | 4 237 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 16.8 Contrôle exercé par les maris selon les déclarations des épouses

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant déclaré certains types de contrôle exercé par le mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de femmes dont le mari/partenaire : | | | | | | | Effectif des femmes en union ou en rupture d'union |
|---|---|-------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | Est jaloux si elles parlent à d'autres hommes | Les accuse souvent d'être infidèles | Ne leur permet pas de rencontrer leurs amies | Essaie de limiter leurs contacts avec leur famille | Insiste pour savoir où elles sont à tout moment | A manifesté au moins 3 de ces comportements | N'a manifesté aucun de ces comportements | |
| Age | | | | | | | | |
| 15-19 | 55,8 | 30,7 | 34,6 | 26,1 | 51,3 | 38,7 | 31,9 | 218 |
| 20-24 | 57,3 | 21,5 | 31,0 | 24,0 | 47,0 | 31,4 | 32,5 | 642 |
| 25-29 | 57,3 | 18,1 | 29,1 | 20,9 | 44,3 | 28,6 | 31,8 | 925 |
| 30-39 | 53,7 | 21,8 | 27,6 | 20,4 | 37,5 | 26,5 | 34,1 | 1 408 |
| 40-49 | 46,9 | 21,2 | 24,8 | 16,7 | 35,0 | 24,2 | 40,4 | 956 |
| Religion | | | | | | | | |
| Vodoun | 56,3 | 16,2 | 30,5 | 17,9 | 44,1 | 28,0 | 30,7 | 385 |
| Autre traditionnelle | (56,3) | (21,1) | (25,7) | (25,2) | (35,5) | (28,5) | (40,2) | 32 |
| Islam | 57,7 | 24,2 | 26,8 | 20,9 | 42,3 | 27,9 | 34,5 | 1 277 |
| Catholique | 51,1 | 20,9 | 28,2 | 19,5 | 34,7 | 26,0 | 36,6 | 914 |
| Protestante Méthodiste | 46,6 | 27,2 | 30,0 | 17,2 | 39,4 | 31,0 | 38,3 | 190 |
| Autres Protestants | 60,2 | 23,0 | 35,1 | 23,9 | 50,5 | 30,5 | 25,4 | 159 |
| Célestes | 51,6 | 24,2 | 32,6 | 25,2 | 44,7 | 33,0 | 31,1 | 338 |
| Autres chrétiens | 51,1 | 15,3 | 24,5 | 18,8 | 40,9 | 25,9 | 36,1 | 568 |
| Autres religions | 37,0 | 15,9 | 13,8 | 6,5 | 27,8 | 18,1 | 51,2 | 57 |
| Aucune | 50,4 | 20,3 | 32,2 | 27,7 | 41,4 | 29,8 | 34,9 | 232 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 56,7 | 16,1 | 27,6 | 14,8 | 36,8 | 25,4 | 31,1 | 223 |
| Autres villes | 54,1 | 18,4 | 25,6 | 18,3 | 39,2 | 25,2 | 35,9 | 1 428 |
| Ensemble urbain | 54,4 | 18,1 | 25,9 | 17,8 | 38,9 | 25,3 | 35,3 | 1 651 |
| Rural | 53,0 | 23,3 | 29,7 | 22,3 | 41,8 | 29,5 | 34,3 | 2 499 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 63,5 | 45,8 | 37,0 | 32,5 | 39,5 | 37,9 | 32,2 | 514 |
| Atacora | 63,5 | 25,1 | 37,1 | 30,0 | 51,5 | 38,5 | 24,8 | 346 |
| Atlantique | 54,4 | 22,6 | 30,7 | 21,9 | 43,7 | 29,0 | 28,7 | 517 |
| Borgou | 49,3 | 13,4 | 23,7 | 19,9 | 39,6 | 23,0 | 41,5 | 465 |
| Collines | 45,1 | 25,3 | 22,5 | 18,4 | 37,1 | 29,5 | 42,5 | 289 |
| Couffo | 53,6 | 10,8 | 26,1 | 18,0 | 55,3 | 24,0 | 26,4 | 265 |
| Donga | 66,6 | 10,9 | 20,3 | 9,8 | 54,0 | 20,6 | 24,3 | 262 |
| Littoral | 56,7 | 16,1 | 27,6 | 14,8 | 36,8 | 25,4 | 31,1 | 223 |
| Mono | 45,4 | 11,9 | 25,8 | 21,3 | 31,0 | 22,3 | 43,3 | 199 |
| Ouémé | 39,2 | 10,0 | 18,7 | 10,4 | 24,7 | 14,0 | 48,5 | 393 |
| Plateau | 58,8 | 24,6 | 26,9 | 12,5 | 48,2 | 31,7 | 30,7 | 253 |
| Zou | 47,5 | 20,9 | 33,1 | 23,8 | 32,7 | 31,0 | 39,3 | 425 |
| État matrimonial | | | | | | | | |
| En union | 53,7 | 20,7 | 27,9 | 20,3 | 41,1 | 27,5 | 34,3 | 3 831 |
| En rupture d'union | 52,7 | 27,2 | 31,6 | 22,6 | 35,6 | 32,5 | 39,1 | 318 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | |
| 0 | 57,7 | 22,9 | 29,7 | 21,0 | 45,4 | 29,6 | 29,9 | 259 |
| 1-2 | 57,3 | 21,1 | 29,2 | 22,1 | 44,0 | 29,9 | 32,6 | 1 382 |
| 3-4 | 53,5 | 21,5 | 27,9 | 20,5 | 40,7 | 28,0 | 34,0 | 1 340 |
| 5+ | 48,5 | 20,7 | 26,9 | 18,6 | 35,7 | 24,8 | 38,9 | 1 169 |
| Emploi | | | | | | | | |
| A travaillé et a été rémunéré en argent | 52,5 | 19,8 | 26,2 | 18,5 | 39,9 | 26,2 | 35,3 | 3 077 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent | 61,9 | 29,7 | 35,2 | 27,3 | 45,6 | 33,4 | 26,5 | 506 |
| Ne travaille pas | 52,2 | 21,4 | 33,0 | 25,3 | 40,3 | 31,8 | 38,5 | 566 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 52,6 | 23,1 | 28,1 | 21,7 | 40,7 | 28,3 | 35,4 | 2 743 |
| Primaire | 55,1 | 19,2 | 28,0 | 18,9 | 39,2 | 26,9 | 33,2 | 765 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 56,9 | 17,7 | 30,2 | 20,1 | 43,5 | 29,1 | 32,0 | 480 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 53,9 | 9,6 | 24,0 | 9,0 | 37,9 | 21,0 | 37,2 | 161 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 55,5 | 24,7 | 32,0 | 23,9 | 44,5 | 32,1 | 33,8 | 751 |
| Second | 52,1 | 25,7 | 29,7 | 25,4 | 40,4 | 30,2 | 35,0 | 780 |
| Moyen | 54,8 | 24,1 | 30,2 | 22,4 | 41,3 | 29,3 | 32,3 | 852 |
| Quatrième | 51,5 | 17,7 | 25,0 | 17,6 | 41,2 | 25,6 | 35,8 | 891 |
| Le plus élevé | 54,2 | 15,1 | 24,8 | 14,5 | 36,5 | 22,9 | 36,3 | 875 |
| L'enquêtee a peur de son mari/partenaire | | | | | | | | |
| A peur la plupart du temps | 75,8 | 37,6 | 44,0 | 35,2 | 66,7 | 50,2 | 13,2 | 428 |
| A parfois peur | 60,3 | 25,5 | 30,7 | 23,6 | 43,5 | 30,8 | 29,4 | 1 624 |
| N'a jamais peur | 43,9 | 14,6 | 23,0 | 15,1 | 33,1 | 21,0 | 43,2 | 2 098 |
| Ensemble | 53,6 | 21,2 | 28,2 | 20,5 | 40,7 | 27,8 | 34,7 | 4 150 |

Note : Le mari/partenaire se réfère au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union, et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 16.9 Formes de violence conjugale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant subi diverses formes de violence de la part de leur mari/partenaire à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Formes de violence | A n'importe quel moment | Au cours des 12 derniers mois | Fréquence au cours des 12 mois précédant l'enquête | |
|--|-------------------------|-------------------------------|--|---------|
| | | | Souvent | Parfois |
| VIOLENCE CONJUGALE COMMISE PAR LE MARI/PARTENAIRE ACTUEL OU LE PLUS RÉCENT¹ | | | | |
| Violence physique | | | | |
| N'importe quelle forme | 19,5 | 11,1 | 4,5 | 6,7 |
| A été bousculée, secouée, on a jeté quelque chose contre elle | 9,8 | 6,7 | 2,9 | 3,8 |
| A été giflée | 15,6 | 8,0 | 2,4 | 5,6 |
| A eu le bras tordu ou les cheveux tirés | 4,1 | 2,3 | 0,8 | 1,5 |
| A été frappée à coup de poing ou avec quelque chose qui pouvait faire mal | 7,7 | 4,4 | 1,3 | 3,1 |
| A reçu des coups de pied, a été traînée à terre ou a été battue | 5,3 | 3,1 | 1,1 | 2,0 |
| On a essayé de l'étrangler ou de la brûler | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| A été menacée avec un couteau, un fusil ou un autre type d'arme | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
| Violence sexuelle | | | | |
| N'importe quelle forme | 8,8 | 6,1 | 1,6 | 4,4 |
| A été forcée physiquement à avoir des rapports sexuels avec le mari/partenaire quand elle ne voulait pas | 7,4 | 4,7 | 1,2 | 3,5 |
| A été forcée physiquement à pratiquer certains actes sexuels avec le mari/partenaire qu'elle ne voulait pas. | 3,2 | 2,5 | 0,5 | 2,0 |
| A été forcée sous la menace ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels qu'elle ne voulait pas | 2,7 | 2,0 | 0,8 | 1,3 |
| Violence émotionnelle | | | | |
| N'importe quelle forme | 36,7 | 28,7 | 10,5 | 18,2 |
| Le mari/partenaire a dit ou fait quelque chose pour l'humilier devant d'autres personnes | 25,2 | 18,7 | 6,7 | 12,0 |
| Le mari/partenaire l'a menacée méchamment, elle ou quelqu'un proche d'elle. | 10,9 | 7,9 | 2,5 | 5,4 |
| Le mari/partenaire l'a insultée ou rabaissée. | 30,7 | 23,8 | 7,7 | 16,1 |
| N'importe quelle forme de violence physique et/ou sexuelle | 22,4 | 13,9 | 5,1 | 8,8 |
| N'importe quelle forme de violence émotionnelle, physique et/ou sexuelle | 41,8 | 31,8 | 12,4 | 19,5 |
| VIOLENCE CONJUGALE COMMISE PAR N'IMPORTE QUEL MARI/PARTENAIRE | | | | |
| Violence physique | 20,7 | 11,2 | na | na |
| Violence sexuelle | 9,6 | 6,1 | na | na |
| Violence émotionnelle | 37,6 | 28,7 | na | na |
| N'importe quelle forme de violence physique et/ou sexuelle | 23,8 | 13,9 | na | na |
| N'importe quelle forme de violence émotionnelle ou physique ou sexuelle | 42,8 | 31,9 | na | na |
| Effectif de femmes en union ou en rupture d'union | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 |

na = Non applicable

¹ Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union

Tableau 16.10 Violence conjugale selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par leur mari/partenaire actuel ou le plus récent, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Violence émotionnelle | Violence physique | Violence sexuelle | Violence physique et sexuelle | Violence émotionnelle, physique et sexuelle | Violence physique ou sexuelle | Violence émotionnelle physique ou sexuelle | Effectif de femmes en union ou en rupture d'union |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---|
| Age | | | | | | | | |
| 15-19 | 23,2 | 12,1 | 7,4 | 2,1 | 1,7 | 17,3 | 30,9 | 218 |
| 20-24 | 31,3 | 15,0 | 8,0 | 4,4 | 3,9 | 18,6 | 37,1 | 642 |
| 25-29 | 39,3 | 20,6 | 10,1 | 6,6 | 5,8 | 24,1 | 44,2 | 925 |
| 30-39 | 38,2 | 20,9 | 9,6 | 6,9 | 6,2 | 23,7 | 42,6 | 1 408 |
| 40-49 | 38,8 | 21,0 | 7,1 | 5,3 | 4,8 | 22,8 | 43,8 | 956 |
| Religion | | | | | | | | |
| Vodoun | 43,7 | 21,6 | 11,6 | 7,7 | 7,1 | 25,6 | 48,1 | 385 |
| Autre traditionnelle | (29,5) | (22,7) | (7,4) | (6,5) | (4,9) | (23,6) | (33,3) | 32 |
| Islam | 32,9 | 21,1 | 7,5 | 6,0 | 5,3 | 22,6 | 38,2 | 1 277 |
| Catholique | 34,5 | 17,0 | 7,2 | 3,9 | 3,7 | 20,3 | 40,1 | 914 |
| Protestante Méthodiste | 35,7 | 18,2 | 7,9 | 3,1 | 2,4 | 23,0 | 41,3 | 190 |
| Autres Protestants | 41,4 | 17,9 | 7,8 | 5,1 | 4,6 | 20,6 | 45,3 | 159 |
| Célestes | 41,1 | 18,1 | 10,3 | 7,0 | 6,1 | 21,4 | 44,4 | 338 |
| Autres chrétiens | 38,2 | 17,5 | 11,6 | 6,7 | 5,6 | 22,3 | 43,7 | 568 |
| Autres religions | 20,1 | 4,5 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 6,8 | 22,4 | 57 |
| Aucune | 47,6 | 29,2 | 11,1 | 9,1 | 8,9 | 31,2 | 52,9 | 232 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 31,3 | 16,3 | 6,1 | 4,7 | 3,8 | 17,6 | 36,3 | 223 |
| Autres villes | 34,4 | 18,2 | 7,6 | 4,8 | 4,0 | 21,1 | 39,0 | 1 428 |
| Ensemble urbain | 34,0 | 17,9 | 7,4 | 4,8 | 4,0 | 20,6 | 38,6 | 1 651 |
| Rural | 38,6 | 20,6 | 9,7 | 6,5 | 6,0 | 23,7 | 43,9 | 2 499 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 31,9 | 30,6 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 30,7 | 37,5 | 514 |
| Atacora | 45,8 | 23,3 | 8,2 | 4,1 | 4,1 | 27,3 | 51,0 | 346 |
| Atlantique | 37,2 | 20,9 | 7,8 | 5,7 | 4,8 | 23,1 | 43,2 | 517 |
| Borgou | 37,1 | 18,8 | 11,8 | 9,7 | 9,1 | 20,9 | 41,5 | 465 |
| Collines | 34,4 | 20,3 | 12,4 | 7,4 | 5,0 | 25,3 | 42,7 | 289 |
| Couffo | 31,3 | 14,6 | 11,3 | 5,5 | 5,2 | 20,4 | 36,3 | 265 |
| Donga | 35,4 | 19,4 | 4,1 | 3,3 | 1,7 | 20,1 | 42,0 | 262 |
| Littoral | 31,3 | 16,3 | 6,1 | 4,7 | 3,8 | 17,6 | 36,3 | 223 |
| Mono | 39,2 | 20,0 | 8,3 | 4,8 | 4,5 | 23,5 | 43,8 | 199 |
| Ouémé | 33,4 | 15,2 | 8,7 | 3,3 | 2,9 | 20,7 | 38,3 | 393 |
| Plateau | 50,9 | 16,7 | 12,3 | 7,4 | 6,6 | 21,6 | 53,8 | 253 |
| Zou | 36,2 | 11,8 | 6,5 | 4,1 | 3,8 | 14,2 | 38,9 | 425 |
| État matrimonial | | | | | | | | |
| En union | 36,6 | 18,8 | 8,7 | 5,7 | 5,0 | 21,8 | 41,6 | 3 831 |
| En rupture d'union | 38,2 | 27,6 | 9,8 | 7,5 | 7,3 | 29,9 | 43,7 | 318 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | |
| 0 | 28,9 | 7,7 | 5,6 | 2,7 | 1,8 | 10,6 | 31,9 | 259 |
| 1-2 | 32,9 | 16,4 | 8,4 | 4,7 | 4,3 | 20,1 | 38,2 | 1 382 |
| 3-4 | 40,8 | 23,5 | 9,5 | 6,8 | 6,3 | 26,3 | 45,8 | 1 340 |
| 5+ | 38,3 | 21,2 | 9,1 | 6,8 | 5,8 | 23,5 | 43,7 | 1 169 |
| Emploi | | | | | | | | |
| A travaillé et a été rémunéré en argent | 38,2 | 20,1 | 9,1 | 6,1 | 5,3 | 23,1 | 43,2 | 3 077 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent | 39,4 | 19,5 | 9,8 | 6,0 | 6,0 | 23,2 | 45,3 | 506 |
| Ne travaille pas | 26,2 | 16,1 | 6,3 | 4,1 | 3,7 | 18,2 | 31,1 | 566 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 38,6 | 21,4 | 9,7 | 6,9 | 6,2 | 24,2 | 43,6 | 2 743 |
| Primaire | 38,6 | 19,7 | 7,8 | 4,8 | 4,6 | 22,6 | 43,7 | 765 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 29,6 | 12,7 | 5,3 | 2,8 | 1,8 | 15,2 | 34,4 | 480 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 17,6 | 6,8 | 7,4 | 0,8 | 0,8 | 13,4 | 24,6 | 161 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 38,5 | 19,8 | 9,7 | 7,2 | 7,0 | 22,4 | 42,9 | 751 |
| Second | 38,9 | 23,9 | 10,4 | 8,2 | 7,2 | 26,1 | 45,3 | 780 |
| Moyen | 37,6 | 21,0 | 9,4 | 6,7 | 6,2 | 23,8 | 43,2 | 852 |
| Quatrième | 37,1 | 17,0 | 8,8 | 4,9 | 4,1 | 20,9 | 41,4 | 891 |
| Le plus élevé | 32,0 | 16,4 | 5,8 | 2,7 | 2,0 | 19,5 | 36,7 | 875 |
| Ensemble | 36,7 | 19,5 | 8,8 | 5,8 | 5,2 | 22,4 | 41,8 | 4 150 |

Note : Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 16.11 Violence conjugale selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par leur mari/partenaire actuel ou le plus récent, selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Violence émotionnelle | Violence physique | Violence sexuelle | Violence physique et sexuelle | Violence émotionnelle physique et sexuelle | Violence physique ou sexuelle | Violence émotionnelle ou physique ou sexuelle | Effectif de femmes en union ou en rupture d'union |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| Niveau d'instruction du mari/partenaire¹ | | | | | | | | |
| Aucun | 37,6 | 20,8 | 9,5 | 6,9 | 6,1 | 23,3 | 42,9 | 1 959 |
| Primaire | 40,1 | 21,0 | 9,8 | 6,7 | 5,9 | 24,1 | 45,6 | 814 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 33,2 | 13,8 | 7,7 | 3,6 | 3,2 | 17,9 | 38,5 | 462 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 26,3 | 10,9 | 3,7 | 1,2 | 1,0 | 13,4 | 28,3 | 426 |
| Ne sait pas/manquant | 43,5 | 19,8 | 9,5 | 3,7 | 2,5 | 25,6 | 50,0 | 170 |
| Consommation d'alcool par le mari/partenaire | | | | | | | | |
| Ne boit pas d'alcool | 28,9 | 14,8 | 6,0 | 3,4 | 3,1 | 17,4 | 33,9 | 2 995 |
| Boit mais jamais saoule | 55,1 | 20,1 | 9,4 | 5,2 | 4,6 | 24,3 | 58,5 | 400 |
| Saoule parfois | 53,5 | 30,9 | 16,7 | 13,2 | 11,4 | 34,4 | 58,8 | 535 |
| Saoule souvent | 68,9 | 54,9 | 25,9 | 21,8 | 19,8 | 59,0 | 77,5 | 220 |
| Différence d'instruction entre conjoints¹ | | | | | | | | |
| Mari plus instruit | 34,9 | 17,0 | 8,2 | 4,9 | 4,3 | 20,3 | 39,3 | 1 339 |
| Femme plus instruite | 34,9 | 16,1 | 8,7 | 5,4 | 4,6 | 19,5 | 40,5 | 496 |
| Même niveau d'instruction | 39,6 | 11,7 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 14,7 | 42,7 | 118 |
| Les deux sans instruction | 37,5 | 21,4 | 9,3 | 6,9 | 6,2 | 23,8 | 42,9 | 1 708 |
| Ne sait pas/manquant | 43,5 | 19,8 | 9,5 | 3,7 | 2,5 | 25,6 | 50,0 | 170 |
| Différence d'âge entre conjoints¹ | | | | | | | | |
| Femme plus âgée | 41,0 | 15,5 | 11,3 | 5,5 | 5,2 | 21,3 | 43,1 | 190 |
| Femme de même âge | 26,4 | 17,0 | 5,5 | 3,7 | 2,5 | 18,8 | 31,5 | 90 |
| Femme plus jeune de 1-4 ans | 35,1 | 18,4 | 10,6 | 6,9 | 6,5 | 22,0 | 40,1 | 1 148 |
| Femme plus jeune de 5-9 ans | 36,3 | 20,7 | 7,3 | 5,0 | 4,1 | 23,0 | 42,8 | 1 321 |
| Femme plus jeune de 10 ou + | 38,7 | 17,8 | 8,2 | 5,4 | 4,8 | 20,6 | 42,5 | 1 083 |
| Nombre de contrôles exercés par le mari/partenaire sur sa femme² | | | | | | | | |
| 0 | 18,8 | 9,3 | 3,2 | 1,9 | 1,3 | 10,6 | 22,6 | 1 439 |
| 1-2 | 37,9 | 16,1 | 6,5 | 3,2 | 2,8 | 19,5 | 43,2 | 1 555 |
| 3-4 | 56,8 | 32,6 | 16,9 | 12,3 | 11,0 | 37,2 | 62,6 | 831 |
| 5 | 59,3 | 47,2 | 23,4 | 19,3 | 19,3 | 51,4 | 67,1 | 325 |
| Nombre de décisions auxquelles la femme a participé³ | | | | | | | | |
| 0 | 39,8 | 21,4 | 9,9 | 7,3 | 6,5 | 24,1 | 45,4 | 1 002 |
| 1-2 | 36,5 | 19,3 | 8,2 | 5,3 | 4,5 | 22,3 | 41,4 | 1 382 |
| 3 | 34,5 | 16,5 | 8,3 | 5,0 | 4,5 | 19,8 | 39,2 | 1 447 |
| Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁴ | | | | | | | | |
| 0 | 36,5 | 15,7 | 7,0 | 4,6 | 4,1 | 18,1 | 40,6 | 2 785 |
| 1-2 | 37,4 | 22,1 | 11,2 | 6,3 | 5,3 | 27,0 | 43,7 | 563 |
| 3-4 | 34,6 | 29,4 | 12,7 | 9,3 | 8,2 | 32,9 | 42,0 | 515 |
| 5 | 41,2 | 33,2 | 14,2 | 10,7 | 10,6 | 36,7 | 49,8 | 286 |
| Le père de la femme battait sa femme | | | | | | | | |
| Oui | 62,3 | 44,4 | 20,4 | 16,4 | 15,7 | 48,3 | 69,0 | 403 |
| Non | 33,2 | 16,1 | 7,1 | 4,2 | 3,6 | 18,9 | 38,1 | 3 549 |
| Ne sait pas/manquant | 47,7 | 30,6 | 15,9 | 12,8 | 12,0 | 33,6 | 53,4 | 198 |
| La femme a peur du mari/partenaire | | | | | | | | |
| La plupart du temps | 66,6 | 50,8 | 28,6 | 24,8 | 23,9 | 54,6 | 72,6 | 428 |
| De temps en temps à peur | 40,2 | 23,4 | 8,8 | 5,8 | 4,9 | 26,4 | 46,4 | 1 624 |
| Jamais eu peur | 27,9 | 10,1 | 4,7 | 2,0 | 1,6 | 12,9 | 32,0 | 2 098 |
| Ensemble | 36,7 | 19,5 | 8,8 | 5,8 | 5,2 | 22,4 | 41,8 | 4 150 |

Note : Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.

¹ Comprends seulement les femmes actuellement en union.

² Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 16.8 pour la liste des contrôles.

³ Selon les déclarations de la femme. Comprends seulement les enquêtés qui sont actuellement en union. Voir Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

⁴ Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 16.12 Violences conjugales au cours des 12 derniers mois

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par n'importe quel mari/partenaire au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Violence émotionnelle | Violence physique | Violence sexuelle | Violence physique et sexuelle | Violence émotionnelle physique et sexuelle | Violence physique ou sexuelle | Violence émotionnelle ou physique ou sexuelle | Effectif de femmes en union ou en rupture d'union |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| Age | | | | | | | | |
| 15-19 | 20,6 | 9,0 | 6,9 | 1,7 | 1,7 | 14,1 | 26,0 | 218 |
| 20-24 | 27,1 | 9,2 | 6,3 | 2,5 | 2,4 | 13,0 | 31,7 | 642 |
| 25-29 | 32,2 | 13,0 | 7,2 | 4,5 | 3,8 | 15,7 | 35,2 | 925 |
| 30-39 | 30,6 | 11,5 | 6,8 | 3,5 | 3,4 | 14,7 | 33,2 | 1 408 |
| 40-49 | 25,5 | 10,7 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 11,7 | 28,2 | 956 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 22,8 | 7,8 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 9,1 | 25,8 | 223 |
| Autres villes | 26,0 | 10,4 | 5,7 | 2,8 | 2,5 | 13,3 | 28,6 | 1 428 |
| Ensemble urbain | 25,6 | 10,1 | 5,4 | 2,7 | 2,4 | 12,8 | 28,2 | 1 651 |
| Rural | 30,8 | 11,9 | 6,6 | 3,8 | 3,6 | 14,7 | 34,3 | 2 499 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 27,4 | 21,5 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 21,9 | 32,0 | 514 |
| Atacora | 39,9 | 15,9 | 5,2 | 2,8 | 2,8 | 18,4 | 42,8 | 346 |
| Atlantique | 26,9 | 8,1 | 6,2 | 3,4 | 3,3 | 11,0 | 28,8 | 517 |
| Borgou | 26,7 | 9,8 | 6,9 | 4,7 | 4,3 | 12,0 | 29,4 | 465 |
| Collines | 30,4 | 12,7 | 7,8 | 3,2 | 3,0 | 17,2 | 35,7 | 289 |
| Couffo | 29,1 | 10,4 | 8,4 | 3,3 | 3,1 | 15,5 | 32,7 | 265 |
| Donga | 27,0 | 12,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 13,2 | 29,4 | 262 |
| Littoral | 22,8 | 7,8 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 9,1 | 25,8 | 223 |
| Mono | 31,6 | 11,4 | 6,3 | 3,6 | 2,7 | 14,1 | 35,0 | 199 |
| Ouémé | 22,5 | 5,8 | 8,1 | 2,4 | 2,2 | 11,5 | 26,4 | 393 |
| Plateau | 39,6 | 10,9 | 11,4 | 4,0 | 3,2 | 18,3 | 44,2 | 253 |
| Zou | 26,1 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 6,0 | 27,0 | 425 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucun | 30,6 | 12,5 | 6,7 | 3,9 | 3,7 | 15,3 | 33,7 | 2 743 |
| Primaire | 28,7 | 10,6 | 5,5 | 2,8 | 2,6 | 13,3 | 31,9 | 765 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 23,6 | 6,8 | 4,1 | 1,6 | 1,1 | 9,3 | 26,3 | 480 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 12,7 | 3,0 | 6,1 | 0,4 | 0,4 | 8,7 | 17,9 | 161 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 33,3 | 13,1 | 6,4 | 4,6 | 4,5 | 14,9 | 35,5 | 751 |
| Second | 30,5 | 15,1 | 7,5 | 4,5 | 4,0 | 18,0 | 35,7 | 780 |
| Moyen | 28,3 | 12,3 | 6,7 | 4,0 | 3,8 | 15,0 | 31,8 | 852 |
| Quatrième | 28,6 | 8,5 | 6,2 | 2,5 | 2,3 | 12,2 | 31,1 | 891 |
| Le plus élevé | 23,6 | 7,6 | 4,1 | 1,4 | 1,2 | 10,3 | 26,2 | 875 |
| Ensemble | 28,7 | 11,2 | 6,1 | 3,3 | 3,1 | 13,9 | 31,9 | 4 150 |

Note : N'importe quel mari/partenaire comprend tous les maris/partenaires actuels, les plus récents et les plus anciens maris/partenaires.

Tableau 16.13 Premier épisode de violence conjugale selon la durée de l'union

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union et qui n'ont été en union qu'une seule fois, pourcentage ayant subi leur premier acte de violence physique ou sexuelle commis par leur conjoint actuel, par nombre exact d'années écoulées depuis le début de l'union et selon la durée de l'union, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Durée de l'union | Pourcentage ayant subi leur premier acte de violence conjugale, physique ou sexuelle, par nombre exact d'années écoulées depuis le début de l'union : | | | | N'a subi aucune violence physique ou sexuelle | Effectif de femmes actuellement en union et qui ont été en union qu'une seule fois |
|-----------------------------|---|-------|-------|--------|---|--|
| | Avant l'union | 2 ans | 5 ans | 10 ans | | |
| Année depuis l'union | | | | | | |
| <2 | 0,9 | na | na | na | 89,2 | 289 |
| 2-4 | 0,4 | 9,0 | na | na | 84,8 | 499 |
| 5-9 | 0,3 | 7,9 | 20,2 | na | 75,6 | 741 |
| 10+ | 0,4 | 4,5 | 13,2 | 18,7 | 76,7 | 1 809 |
| Ensemble | 0,4 | 6,4 | 14,8 | 18,7 | 78,8 | 3 338 |

na = Non applicable

Tableau 16.14 Blessures dues à la violence conjugale

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi certaines formes de violence commise par leur conjoint actuel ou le plus récent, pourcentage de femmes qui ont été blessées suite à ces actes de violence, par type de blessures, et selon le type de violence subie, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Type de violence | Coupures, hématomes ou douleurs | Hématomes aux yeux, entorses, luxations ou brûlures | Blessures profondes, os cassés, dents cassées ou autres blessures sérieuses | N'importe quel type de blessure | Effectif de femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles |
|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| Violence physique¹ | | | | | |
| A n'importe quel moment ² | 38,8 | 21,4 | 7,1 | 42,6 | 810 |
| Au cours des 12 derniers mois | 44,5 | 26,5 | 9,9 | 48,8 | 462 |
| Violence sexuelle | | | | | |
| A n'importe quel moment ² | 38,0 | 21,7 | 9,5 | 40,4 | 364 |
| Au cours des 12 derniers mois | 39,9 | 24,8 | 9,7 | 42,3 | 252 |
| Violence physique ou sexuelle¹ | | | | | |
| A n'importe quel moment ² | 35,1 | 18,8 | 6,1 | 38,5 | 932 |
| Au cours des 12 derniers mois | 37,9 | 22,8 | 7,9 | 42,0 | 578 |

Note : Chez les femmes, le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.

¹ Ne comprend pas les femmes qui ont déclaré avoir subi des actes de violence uniquement en réponse à une question directe sur la violence pendant la grossesse.

² Y compris dans les 12 derniers mois

Tableau 16.15 Violence des enquêtées contre leurs conjoints selon les caractéristiques des enquêtées

Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d'union qui ont exercé des violences physiques contre leur conjoint actuel ou le plus récent alors qu'il ne les avait ni battues, ni agressées physiquement, à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon leur propre expérience de violence conjugale et leurs caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de femmes qui ont exercé des violences physiques contre leur mari/partenaire actuel ou le plus récent : | | Effectif de femmes en union ou en rupture d'union |
|---|---|-------------------------------|---|
| | A n'importe quel moment ¹ | Au cours des 12 derniers mois | |
| Enquêtée a subi des violences physiques conjugales | | | |
| A n'importe quel moment ¹ | 10,1 | 5,7 | 810 |
| Au cours des 12 derniers mois | 11,8 | 9,0 | 462 |
| Jamais | 0,7 | 0,4 | 3 340 |
| Groupe d'Age | | | |
| 15-19 | 1,4 | 1,1 | 218 |
| 20-24 | 2,7 | 1,5 | 642 |
| 25-29 | 3,6 | 2,3 | 925 |
| 30-39 | 2,1 | 1,1 | 1 408 |
| 40-49 | 2,4 | 1,3 | 956 |
| Religion | | | |
| Vodoun | 3,2 | 1,4 | 385 |
| Autre traditionnelle | (0,0) | (0,0) | 32 |
| Islam | 2,0 | 1,5 | 1 277 |
| Catholique | 3,3 | 1,4 | 914 |
| Protestante Méthodiste | 3,8 | 2,9 | 190 |
| Autres Protestants | 1,8 | 0,0 | 159 |
| Célestes | 3,0 | 1,8 | 338 |
| Autres chrétiens | 1,8 | 1,2 | 568 |
| Autres religions | 2,4 | 0,0 | 57 |
| Aucune | 3,0 | 2,3 | 232 |
| Résidence | | | |
| Cotonou | 3,5 | 1,2 | 223 |
| Autres villes | 2,3 | 1,2 | 1 428 |
| Ensemble urbain | 2,4 | 1,2 | 1 651 |
| Rural | 2,7 | 1,6 | 2 499 |
| Département | | | |
| Alibori | 3,1 | 2,8 | 514 |
| Atacora | 1,7 | 0,7 | 346 |
| Atlantique | 4,4 | 2,0 | 517 |
| Borgou | 3,0 | 2,3 | 465 |
| Collines | 2,6 | 2,4 | 289 |
| Couffo | 1,8 | 1,3 | 265 |
| Donga | 0,0 | 0,0 | 262 |
| Littoral | 3,5 | 1,2 | 223 |
| Mono | 1,9 | 1,0 | 199 |
| Ouémé | 1,7 | 0,9 | 393 |
| Plateau | 1,8 | 0,7 | 253 |
| Zou | 3,0 | 0,7 | 425 |
| État matrimonial | | | |
| En union | 2,5 | 1,4 | 3 831 |
| En rupture d'union | 4,0 | 1,7 | 318 |
| Emploi | | | |
| A travaillé et a été rémunéré en argent | 2,9 | 1,6 | 3 077 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent | 2,9 | 2,2 | 506 |
| Ne travaille pas | 0,6 | 0,4 | 566 |
| Nombre d'enfants vivants | | | |
| 0 | 0,9 | 0,2 | 259 |
| 1-2 | 2,7 | 1,6 | 1 382 |
| 3-4 | 3,2 | 1,8 | 1 340 |
| 5+ | 2,1 | 1,2 | 1 169 |
| Niveau d'instruction | | | |
| Aucun | 2,5 | 1,6 | 2 743 |
| Primaire | 3,0 | 2,0 | 765 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,5 | 0,5 | 480 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 2,7 | 0,6 | 161 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 2,0 | 1,3 | 751 |
| Second | 4,2 | 2,8 | 780 |
| Moyen | 2,4 | 1,4 | 852 |
| Quatrième | 1,7 | 1,2 | 891 |
| Le plus élevé | 2,7 | 0,7 | 875 |
| Ensemble | 2,6 | 1,5 | 4 150 |

Note : Chez les femmes, le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

na = Non applicable

¹ Y compris dans les 12 derniers mois.

Tableau 16.16 Violence des enquêtées contre leur conjoint selon les caractéristiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action de l'enquêtée

Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d'union qui ont exercé des violences physiques contre leur conjoint actuel ou le plus récent alors qu'il ne les avait ni battues, ni agressées physiquement, à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon les caractéristiques sociodémographiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action de l'enquêtée, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage de femmes qui ont exercé des violences physiques contre leur mari/partenaire actuel ou le plus récent : | | Effectif de femmes en union ou en rupture d'union |
|--|---|-------------------------------|---|
| | A n'importe quel moment ¹ | Au cours des 12 derniers mois | |
| Niveau d'instruction du mari/partenaire² | | | |
| Aucun | 2,5 | 1,7 | 1 959 |
| Primaire | 2,6 | 1,4 | 814 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,9 | 1,2 | 462 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 2,9 | 0,7 | 426 |
| Ne sais pas/manquant | 1,5 | 1,5 | 170 |
| Consommation d'alcool par le conjoint | | | |
| Ne boit pas | 1,3 | 0,7 | 2 995 |
| Boit mais jamais soûl | 3,1 | 1,5 | 400 |
| Soûl parfois | 6,5 | 3,5 | 535 |
| Soûl souvent | 9,5 | 7,1 | 220 |
| Différence d'instruction entre conjoints² | | | |
| Mari plus instruit | 2,4 | 1,2 | 1 339 |
| Femme plus instruite | 2,3 | 0,7 | 496 |
| Même niveau d'instruction | 2,7 | 2,1 | 118 |
| Les deux sans instruction | 2,6 | 1,8 | 1 708 |
| Ne sait pas/manquant | 1,5 | 1,5 | 170 |
| Différence d'âge entre conjoints² | | | |
| Femme plus âgée | 3,4 | 1,8 | 190 |
| Femme du même âge | 1,5 | 0,0 | 90 |
| Femme plus jeune de 1-4 ans | 2,7 | 1,8 | 1 148 |
| Femme plus jeune de 5-9 ans | 2,4 | 1,5 | 1 321 |
| Femme plus jeune de 10 ou + | 2,2 | 1,2 | 1 083 |
| Nombre de contrôles exercés par le mari/partenaire sur sa femme³ | | | |
| 0 | 2,3 | 1,5 | 1 439 |
| 1-2 | 1,6 | 0,8 | 1 555 |
| 3-4 | 3,5 | 1,8 | 831 |
| 5 | 6,2 | 3,8 | 325 |
| Nombre de décisions auxquelles la femme a participé⁴ | | | |
| 0 | 3,1 | 2,2 | 1 002 |
| 1-2 | 2,4 | 1,5 | 1 382 |
| 3 | 2,0 | 0,9 | 1 447 |
| Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁵ | | | |
| 0 | 2,3 | 1,0 | 2 785 |
| 1-2 | 3,4 | 2,6 | 563 |
| 3-4 | 2,9 | 2,2 | 515 |
| 5 | 2,7 | 2,2 | 286 |
| Le père de la femme battait sa femme | | | |
| Oui | 6,6 | 3,3 | 403 |
| Non | 2,0 | 1,2 | 3 549 |
| Ne sait pas/manquant | 4,2 | 2,8 | 198 |
| Il arrive à la femme d'avoir peur de son mari | | | |
| La plupart du temps à peur | 6,5 | 5,2 | 428 |
| Souvent/de temps en temps | 2,4 | 1,1 | 1 624 |
| Jamais eu peur | 1,9 | 1,0 | 2 098 |
| Ensemble | 2,6 | 1,5 | 4 150 |

Note : Le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.

¹ Y compris dans les 12 derniers mois.

² Comprends seulement les femmes actuellement en union.

³ Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 16.8 pour la liste des contrôles.

⁴ Selon les déclarations de la femme. Comprends seulement les enquêtés qui sont actuellement en union. Voir Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

⁵ Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 16.17 Recherche de l'aide pour mettre fin à la violence

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques ou sexuelles selon qu'elles ont recherché de l'aide pour mettre fin à la violence, selon le type de violence et certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Type de violence/ caractéristique sociodémographique | A recherché de l'aide pour arrêter la violence | N'a jamais recherché mais en a parlé a quelqu'un | N'a jamais recherché et n'en a parlé a quelqu'un | Total | Effectif de femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles |
|--|---|---|---|-------|---|
| Type de violence | | | | | |
| Physique seulement | 30,7 | 10,0 | 59,3 | 100,0 | 1 101 |
| Sexuelle seulement | 23,9 | 9,4 | 66,7 | 100,0 | 173 |
| Physique et sexuelle | 51,4 | 15,4 | 33,2 | 100,0 | 374 |
| Age | | | | | |
| 15-19 | 30,2 | 7,3 | 62,5 | 100,0 | 266 |
| 20-24 | 38,9 | 10,4 | 50,6 | 100,0 | 281 |
| 25-29 | 36,0 | 10,3 | 53,7 | 100,0 | 334 |
| 30-39 | 33,0 | 13,6 | 53,4 | 100,0 | 464 |
| 40-49 | 35,9 | 12,5 | 51,6 | 100,0 | 301 |
| Religion | | | | | |
| Vodoun | 41,1 | 12,2 | 46,7 | 100,0 | 154 |
| Autre traditionnelle | * | * | * | 100,0 | 11 |
| Islam | 39,7 | 9,3 | 51,0 | 100,0 | 419 |
| Catholique | 31,7 | 10,8 | 57,5 | 100,0 | 394 |
| Protestante Méthodiste | 34,9 | 8,8 | 56,3 | 100,0 | 65 |
| Autres Protestants | 29,0 | 6,6 | 64,4 | 100,0 | 76 |
| Célestes | 40,4 | 11,4 | 48,2 | 100,0 | 139 |
| Autres chrétiens | 31,6 | 13,9 | 54,4 | 100,0 | 271 |
| Autres religions | * | * | * | 100,0 | 11 |
| Aucune | 24,6 | 11,0 | 64,4 | 100,0 | 108 |
| Résidence | | | | | |
| Cotonou | 31,3 | 12,1 | 56,5 | 100,0 | 108 |
| Autres villes | 35,7 | 10,0 | 54,2 | 100,0 | 569 |
| Ensemble urbain | 35,0 | 10,4 | 54,6 | 100,0 | 676 |
| Rural | 34,5 | 11,7 | 53,8 | 100,0 | 971 |
| Département | | | | | |
| Alibori | 51,7 | 14,6 | 33,7 | 100,0 | 199 |
| Atacora | 27,1 | 5,6 | 67,3 | 100,0 | 154 |
| Atlantique | 30,2 | 9,5 | 60,3 | 100,0 | 242 |
| Borgou | 25,8 | 7,8 | 66,4 | 100,0 | 149 |
| Collines | 33,7 | 12,1 | 54,2 | 100,0 | 128 |
| Couffo | 29,1 | 12,6 | 58,3 | 100,0 | 117 |
| Donga | 45,2 | 3,0 | 51,7 | 100,0 | 63 |
| Littoral | 31,3 | 12,1 | 56,5 | 100,0 | 108 |
| Mono | 40,0 | 13,7 | 46,3 | 100,0 | 69 |
| Ouémé | 32,0 | 14,9 | 53,2 | 100,0 | 132 |
| Plateau | 33,9 | 15,7 | 50,4 | 100,0 | 108 |
| Zou | 39,0 | 11,4 | 49,6 | 100,0 | 178 |
| État matrimonial | | | | | |
| Célibataire | 32,1 | 10,0 | 58,0 | 100,0 | 326 |
| En union | 34,6 | 11,7 | 53,7 | 100,0 | 1 198 |
| En rupture d'union | 42,8 | 8,6 | 48,5 | 100,0 | 122 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | |
| 0 | 31,1 | 10,3 | 58,6 | 100,0 | 370 |
| 1-2 | 36,6 | 9,6 | 53,7 | 100,0 | 457 |
| 3-4 | 35,2 | 12,9 | 52,0 | 100,0 | 453 |
| 5+ | 35,4 | 11,9 | 52,8 | 100,0 | 367 |
| Emploi | | | | | |
| A travaillé et a été rémunéré en argent | 36,6 | 12,0 | 51,4 | 100,0 | 1 125 |
| A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent | 25,7 | 9,5 | 64,7 | 100,0 | 249 |
| Ne travaille pas | 35,0 | 9,1 | 55,8 | 100,0 | 273 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucun | 35,5 | 11,9 | 52,6 | 100,0 | 942 |
| Primaire | 35,8 | 11,6 | 52,6 | 100,0 | 341 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 33,2 | 5,4 | 61,5 | 100,0 | 261 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 27,6 | 17,8 | 54,5 | 100,0 | 103 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 38,6 | 9,7 | 51,7 | 100,0 | 249 |
| Second | 33,6 | 15,1 | 51,4 | 100,0 | 320 |
| Moyen | 33,7 | 12,6 | 53,7 | 100,0 | 346 |
| Quatrième | 39,2 | 9,0 | 51,8 | 100,0 | 366 |
| Le plus élevé | 29,6 | 9,5 | 60,9 | 100,0 | 367 |
| Ensemble | 34,7 | 11,2 | 54,1 | 100,0 | 1 647 |

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 16.18 Sources/personnes auprès desquelles l'aide pour mettre fin à la violence a été recherché

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques ou sexuelles et qui ont recherché de l'aide par type de violence, selon la source/personne auprès de qui l'aide a été recherchée, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Source/personne auprès de laquelle l'aide a été recherchée | Type de violence : | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | Physique seulement | Sexuelle seulement | A la fois physique et sexuelle | Violence physique ou sexuelle |
| Propre famille | 69,6 | (55,0) | 73,9 | 70,0 |
| Famille du mari/partenaire | 25,1 | (21,0) | 31,1 | 26,8 |
| Mari/partenaire | 3,2 | (0,7) | 1,6 | 2,5 |
| Petit ami | 0,7 | (0,0) | 0,0 | 0,4 |
| Ami | 10,5 | (24,6) | 19,0 | 14,4 |
| Voisin | 11,4 | (7,7) | 7,5 | 9,8 |
| Chef religieux | 2,3 | (0,0) | 2,4 | 2,1 |
| Médecin/personnel médical | 0,5 | (3,5) | 1,3 | 1,0 |
| Police | 0,6 | (5,9) | 3,2 | 1,9 |
| Homme de loi | 2,0 | (1,1) | 1,6 | 1,8 |
| Service social | 0,9 | (0,0) | 0,4 | 0,7 |
| Autre | 2,6 | (1,2) | 1,7 | 2,2 |
| Effectif de femmes qui ont recherché de l'aide | 338 | 41 | 192 | 571 |

Note : Les enquêtés peuvent déclarer plus d'une source/personne auprès de laquelle ils ont recherché de l'aide. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Résultats clés

- **Prise en charge de l'hypertension** : Le pourcentage d'hommes qui ont appris d'un prestataire de santé qu'ils avaient de l'hypertension et qui prennent des médicaments pour la contrôler est plus de deux fois plus élevé que celui des femmes (36 % contre 15 %).
- **Niveaux de l'hypertension** : La pression artérielle élevée touche plus les hommes (16 %) que les femmes (13 %).
- **Cancer du col de l'utérus** : Seulement 10 % des femmes ont entendu parler du cancer du col de l'utérus, 5 % connaissent l'existence d'un test de dépistage mais seulement 1 % en a déjà effectué un.
- **Mesure et traitement de la glycémie** : Seulement 8 % des femmes et 6 % des hommes ont eu leur niveau de glycémie mesurée par un prestataire de soins de santé.

Les maladies non transmissibles (MNT) constituent une menace importante et grandissante pour la santé des individus et des populations dans le monde. Les MNT se définissent comme toutes maladies non-infectieuses et non-transmissibles entre personnes. Elles peuvent être chroniques et à progression lente, ou conduire à une mort plus rapide comme certains types d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Le dépistage et la prévention sont les outils essentiels de contrôle des MNT.

L'hypertension artérielle (HTA) en particulier augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et de troubles cognitifs. Il n'y a cependant pas de traitement qui permette de la guérir définitivement. Le traitement antihypertenseur, notamment celui obtenu sur ordonnance, n'a pour but que d'en assurer le contrôle adéquat en abaissant la pression sanguine et prévenir ainsi d'éventuels dommages aux organes (cœur, cerveau, reins, yeux).

Ce chapitre présente les résultats concernant le dépistage et le traitement de l'hypertension artérielle, les niveaux d'hypertension artérielle, les types de maladies non transmissibles, la connaissance et le dépistage de l'examen du cancer du col utérin et de l'hyperglycémie (diabète).

17.1 DEPISTAGE ET TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

Prise en charge de l'hypertension artérielle

Femmes et hommes à qui l'on a prescrit des médicaments pour contrôler la tension artérielle ainsi que celles et ceux qui prennent les médicaments prescrits.

Echantillon : Femmes de 15-49 ans et hommes de 30-64 ans ayant appris d'un prestataire de santé qu'ils souffraient d'hypertension artérielle.

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes de 15-49 ans et aux hommes de 30-64 ans si un médecin ou un autre professionnel de soins de santé avait déjà vérifié leur tension artérielle et si on leur avait dit qu'ils avaient une tension artérielle élevée ou de l'hypertension. On a aussi demandé si des médicaments avaient

été prescrits et si l'enquêté(e) les prenait. Les résultats sont présentés au **Tableau 17.1.1** pour les femmes et au **Tableau 17.1.2** pour les hommes.

Une femme sur trois (62 %) a déjà eu sa tension artérielle contrôlée. Chez les hommes, ce pourcentage tombe à 45 %. Dans cette population, seulement 10 % de femmes et 8 % d'hommes ont été informés qu'ils souffraient d'hypertension.


Parmi les patients ayant appris auprès d'un prestataire de santé qu'ils souffraient d'hypertension, les pourcentages de ceux à qui il a été prescrit des médicaments est relativement élevés et sensiblement identiques pour les deux sexes (68 % dans les deux cas). Cependant, seulement 15 % des femmes 36 % des hommes prennent ces médicaments.

Variations par caractéristique

- Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, les pourcentages de ceux qui ont eu leur tension mesurée augmentent avec l'âge, passant chez les femmes de 52 % à 15-29 ans à 75 % à 40-49 ans et, chez les hommes, de 41 % à 30-39 ans à 51 % à 50-64 ans.
- Les pourcentages de ceux qui ont été informés qu'ils souffraient d'hypertension artérielle augmentent avec l'âge, passant chez les femmes de 6 % à 15-29 ans à 19 % à 40-49 ans et, chez les hommes, de 5 % à 30-39 ans à 14 % à 50-64 ans.
- En milieu urbain, il est plus fréquent qu'en milieu rural de faire mesurer sa tension artérielle (65 % contre 59 % chez les femmes et 51 % contre 40 % chez les hommes). La proportion de femmes informées par un prestataire qu'elles souffraient d'hypertension artérielle est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (12 % contre 9 %). Chez les hommes, l'écart est faible (9 % en urbain contre 8 % en rural) (**Graphique 17.1**).

Graphique 17.1 Mesure de la pression artérielle par un prestataire de soins de santé par résidence

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 30-64 ans pour qui la pression artérielle a été mesurée par un prestataire de soins de santé




- Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant fait contrôler leur tension artérielle ont tendance à augmenter avec le quintile de bien-être économique, passant chez les femmes de 45 % dans le quintile le plus bas à 71 % dans le plus élevé et, chez les hommes, de respectivement 28 % à 61 %.

- Les pourcentages de femmes et d'hommes informés par un prestataire de santé qu'ils avaient de l'hypertension artérielle augmentent du quintile le plus bas au plus élevé, de 6 % à 15 % chez les femmes et de 4 % à 11 % chez les hommes (Graphique 17.2).

Graphique 17.2 Informé par un prestataire souffrant d'hypertension artérielle par bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes 30-49 ans et d'hommes 30-64 ans informé par un prestataire de soins de santé qui souffre d'hypertension artérielle



17.2 PRÉVALENCE ET NIVEAUX D'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Hypertension artérielle élevée

Femmes et hommes ayant une pression artérielle légèrement élevée (niveau 1), modérément élevée (niveau 2) et sévèrement élevée (niveau 3).

Échantillon : Femmes de 30-49 ans et hommes de 30-64 ans pour lesquels la pression artérielle a été mesurée.

Niveaux de tension artérielle au-dessus desquels une femme et un homme sont considérés comme hypertendus (OMS)

| Catégorie | Pression Artérielle Systolique (PAS) | Pression Artérielle Diastolique (PAD) |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| HTA niveau 1 (légère) | 140-159mmHg et/ou | 90-99mmHg |
| HTA niveau 2 (modérée) | 160-179mmHg et/ou | 100-109mmHg |
| HTA niveau 3 (sévère) | ≥180mmHg et/ou | ≥110mmHg |
| HTA systolique isolée | ≥140mmHg et | < 90mmHg |

Échantillon : Femmes de 30-49 ans et hommes de 30-64 ans pour lesquels la tension artérielle a été mesurée.

La tension artérielle correspond à la pression exercée par le flux du sang dans les artères. Elle est exprimée par deux valeurs : la pression systolique et la pression diastolique. Elle est catégorisée, suivant la valeur de chacun de ces deux éléments en hypotension, tension normale et hypertension.

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, la pression artérielle de toutes les femmes de 30-49 ans et de tous les hommes de 30-64 ans a été mesurée dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux. Cette mesure était effectuée à trois reprises au cours de l'interview à l'aide d'un tensiomètre électronique *Digital Blood Pressure Monitor, Model UA-767F*. Les **Tableaux 17.2.1** et **17.2.2** présentent les résultats pour les femmes et pour les hommes.


Au Bénin, 13 % des femmes et 16 % des hommes ont une pression artérielle élevée, avec une dominance de la forme légère (8 % chez les femmes et 11 % chez les hommes) (**Graphique 17.3**).

Variations par caractéristique

- La prévalence de l'hypertension a tendance à augmenter avec l'âge, passant chez les femmes de 9 % à 30-39 ans à 19 % à 40-49 ans et, chez les hommes, de 10 % à 30-39 ans à 17 % à 40-49 ans et à 28 % à 50-64 ans.
- La prévalence de l'hypertension artérielle est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural, que ce soit chez les femmes (16 % contre 11 %) comme chez les hommes (18 % contre 15 %).
- Du quintile le plus bas au plus élevé, la prévalence de l'hypertension a tendance à augmenter, passant chez les femmes de 9 % à 19 % et, chez les hommes de 12 % à 22 %.

Graphique 17.3 Prévalence de l'hypertension et niveaux d'hypertension

Pourcentage de femmes de 30-49 ans et d'hommes de 30-64 ans dont la tension artérielle est élevée et pourcentage ayant différents niveaux de tension artérielle



17.3 PRÉVALENCE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Pour estimer la prévalence des maladies non transmissibles, on a demandé aux femmes de 15-49 ans et aux hommes de 30-64 ans si selon le diagnostic effectué par du personnel médical, ils souffraient des maladies non transmissibles. Les résultats détaillés par type de maladie sont présentés aux **Tableau 17.3**.

17.4 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE L'EXAMEN POUR LE CANCER DU COL UTERIN

Connaissance du cancer du col de l'utérus (ou col utérin) et de l'existence d'un test de détection

Femmes ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus, et celles ayant entendu parler du test pour le cancer du col de l'utérus.

Echantillon : Femmes de 15-49 ans.

Dépistage du cancer du col utérin par un test

Femmes ayant effectué un test pour le cancer du col de l'utérus.

Echantillon : Femmes de 15-49 ans.

Aussi appelé matrice, le col de l'utérus fait partie de l'appareil reproducteur féminin. C'est un passage étroit dans la partie inférieure de l'utérus, reliant ce dernier au vagin. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules du col de l'utérus. Le mot « maligne » signifie que la tumeur peut se propager à d'autres parties du corps (métastases).

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, pour évaluer la connaissance des femmes sur le cancer du col de l'utérus, on leur a non seulement demandé si elles avaient entendu parler du cancer de l'utérus, mais aussi si, elle avait entendu parler d'un test de dépistage pour ce cancer et si elles avaient déjà effectué ce type de test. Les résultats sont présentés au **Tableau 17.4**.

Si 10 % des femmes de 15-49 ans ont entendu parler du cancer du col de l'utérus, seulement 5 % connaissent l'existence d'un test de dépistage de ce cancer, et 1 % en a effectué un. Parmi celles qui ont fait un test,

seules 12 % l'ont effectué il y a moins d'un an. Pour 37 % d'entre elles, le test effectué remonte à une période comprise entre un et trois ans et pour 51 % ce test remonte à plus de 3 ans.


Du fait d'un effectif trop faible de femmes ayant effectué un test de dépistage du cancer du col de l'utérus, les données sur le résultat des tests ne sont pas représentatives et elles ne sont donc pas présentées.

Variations par caractéristique

- La connaissance du cancer du col de l'utérus ainsi que celle du test de dépistage sont plus fréquentes en milieu urbain qu'en milieu rural (respectivement 14 % contre 6 % et 8 % contre 3 %). Le dépistage du cancer de l'utérus est également plus répandu en milieu urbain, en particulier à Cotonou qu'ailleurs (4 % contre moins d'un pour cent ailleurs).
- Les pourcentages de femmes qui ont entendu parler du cancer du col de l'utérus et de celles qui connaissant l'existence d'un test de dépistage augmentent de manière importante avec le niveau d'instruction, passant respectivement de 5 % parmi celles sans niveau d'instruction à 39 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et de 2 % à 25 %. Le pourcentage de femmes ayant effectué un test de dépistage du cancer du col de l'utérus suit la même tendance : moins d'un pour cent à 3 % parmi les plus instruites (**Graphique 17.4**).
- Le niveau de bien-être économique influence également la connaissance des femmes sur le cancer du col de l'utérus, que ce soit la connaissance de la maladie ou de l'existence d'un test de dépistage. De même, dans les quatre premiers quintiles, un pourcentage extrêmement faible de femmes ont déjà effectué un test de dépistage contre 2 % dans le plus élevé.

Graphique 17.4 Femmes ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus par niveau d'instruction

Pourcentage de femmes de 15-49 ans



17.5 DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DE L'HYPERGLYCÉMIE

Dépistage de la glycémie

Femmes et hommes qui ont eu la glycémie mesurée par un prestataire de santé et ceux qui ont appris d'un prestataire de santé qu'ils souffraient de l'hyperglycémie

Echantillon : Femmes de 15-49 ans et hommes de 30-64 ans

L'hyperglycémie est une concentration en glucose (ou du taux de sucre) dans le sang anormalement élevée. Elle est un symptôme révélateur d'un diabète, entraînant certaines complications, notamment au niveau des yeux, des reins, des nerfs, du cœur et des vaisseaux sanguins.

Au cours de l'EDSB-V, on a demandé aux femmes de 15-49 ans et aux hommes de 30-64 ans si un médecin ou un autre professionnel de santé avait déjà mesuré le niveau de sucre dans leur sang et si un prestataire de soins de santé leur avait dit qu'ils avaient un niveau de sucre élevé dans le sang ou du diabète (hyperglycémie). Les résultats sont présentés au **Tableau 17.5.1** pour les femmes et au **Tableau 17.5.2** pour les hommes.

Moins d'une femme sur 10 (8 %) a effectué un test de la glycémie et 1 % d'entre elles ont été informées par un prestataire qu'elles souffraient d'hyperglycémie. Chez les hommes, ces pourcentages sont plus faibles (respectivement 6 % et 1 %).

Variations par caractéristique

- Les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont eu leur niveau de glycémie mesuré sont plus élevés en milieu urbain que rural (respectivement 10 % contre 7 % et 9 % contre 4 %).
- Les pourcentages de femmes et d'hommes informés par un prestataire de santé qu'ils souffraient d'hyperglycémie sont plus élevés en milieu urbain que rural (respectivement 2 % contre moins d'un pour cent et 2 % contre 1 %).
- C'est dans le quintile le plus élevé que les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont eu leur glycémie mesurée sont les plus élevés (respectivement 15 % et 14 %). Par comparaison, dans le quintile le plus bas, ces pourcentages sont respectivement de 4 % et de 3 %).

Parmi les femmes qui ont appris d'un prestataire de santé qu'elles souffraient d'hyperglycémie, 57 % ont été informées dans les 12 mois précédant l'enquête, 52 % ont reçu une prescription des médicaments pour contrôler la glycémie et 38 % prennent des médicaments pour contrôler la glycémie (Données non présentées).

Du fait d'un effectif trop faible des hommes qui ont appris d'un prestataire de santé qu'ils souffraient d'hyperglycémie, les données sur le résultat ne sont pas représentatives et elles ne sont donc pas présentées.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la santé des adultes et les maladies non transmissibles, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 17.1.1** **Prise en charge de l'hypertension artérielle : Femme**
- **Tableau 17.1.2** **Prise en charge de l'hypertension artérielle : Homme**
- **Tableau 17.2.1** **Niveaux d'hypertension : Femme**
- **Tableau 17.2.2** **Niveaux d'hypertension : Homme**
- **Tableau 17.3** **Type de maladies non transmissibles**
- **Tableau 17.4** **Cancer du col de l'utérus**
- **Tableau 17.5.1** **Glycémie mesurée et traitée : Femme**
- **Tableau 17.5.2** **Glycémie mesurée et traitée : Homme**

Tableau 17.1.1 Prise en charge de l'hypertension artérielle : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans pour qui la pression artérielle a été mesurée et qui ont été informées par un prestataire de soins de santé qu'elles souffraient d'hypertension artérielle ; parmi les femmes ayant appris qu'elles souffraient d'hypertension, le pourcentage qui ont reçu cette information dans les 12 mois précédant l'enquête, pourcentage à qui l'on a prescrit des médicaments antihypertenseurs et pourcentage qui prennent des antihypertenseurs, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

| Caractéristique sociodémographique | A eu la pression artérielle mesurée par un médecin ou un prestataire de soins de santé | | Effectif de femmes | Parmi les femmes qui ont appris d'un prestataire qu'elles souffraient d'hypertension, pourcentage qui : | | | Effectif de femmes |
|--|--|--|--------------------|---|--|-------------|--------------------|
| | Informée par un prestataire qu'elle souffrait d'hypertension artérielle | Ont été informées dans les 12 mois précédant l'enquête | | A qui l'on a prescrit des médicaments pour contrôler la pression artérielle | Prennent des médicaments pour contrôler la pression artérielle | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | |
| 15-29 | 52,0 | 6,2 | 4 542 | 53,0 | 65,5 | 7,0 | 279 |
| 15-19 | 28,0 | 2,7 | 1 617 | (47,2) | (63,4) | (4,1) | 44 |
| 20-24 | 59,9 | 6,8 | 1 423 | 49,7 | 62,5 | 5,5 | 97 |
| 25-29 | 70,4 | 9,3 | 1 502 | 57,1 | 68,3 | 8,9 | 139 |
| 30-39 | 75,2 | 13,1 | 1 961 | 54,0 | 69,5 | 17,4 | 257 |
| 30-34 | 74,8 | 12,0 | 1 028 | 49,5 | 70,1 | 15,1 | 124 |
| 35-39 | 75,7 | 14,3 | 933 | 58,2 | 68,8 | 19,6 | 134 |
| 40-49 | 74,7 | 19,1 | 1 203 | 53,6 | 70,1 | 21,9 | 229 |
| 40-44 | 75,5 | 19,0 | 607 | 51,6 | 73,8 | 20,6 | 115 |
| 45-49 | 73,9 | 19,2 | 595 | 55,6 | 66,4 | 23,3 | 114 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 75,3 | 16,8 | 460 | 47,4 | 54,1 | 10,4 | 77 |
| Autres villes | 63,7 | 10,6 | 2 843 | 57,1 | 74,7 | 16,9 | 302 |
| Ensemble urbain | 65,3 | 11,5 | 3 303 | 55,1 | 70,5 | 15,6 | 379 |
| Rural | 58,6 | 8,8 | 4 403 | 51,9 | 66,0 | 14,4 | 387 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 45,3 | 5,9 | 1 424 | 54,3 | 66,8 | 13,3 | 84 |
| Second | 58,1 | 7,4 | 1 551 | 43,2 | 66,8 | 13,7 | 114 |
| Moyen | 65,0 | 8,7 | 1 422 | 52,3 | 68,1 | 11,5 | 124 |
| Quatrième | 66,1 | 12,0 | 1 574 | 58,4 | 70,5 | 14,9 | 189 |
| Le plus élevé | 70,7 | 14,7 | 1 734 | 54,8 | 67,7 | 17,9 | 254 |
| Ensemble | 61,5 | 9,9 | 7 706 | 53,5 | 68,2 | 15,0 | 766 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

Tableau 17.1.2 Prise en charge de l'hypertension artérielle : Homme

Pourcentage d'hommes de 30-64 ans dont la pression artérielle a été mesurée et qui ont été informés par un prestataire de soins de santé qu'ils souffraient d'hypertension artérielle ; parmi les hommes ayant appris qu'ils souffraient d'hypertension, pourcentage ayant reçu cette information dans les 12 mois précédant l'enquête, pourcentage à qui l'on a prescrit des médicaments antihypertenseurs, et pourcentage qui prennent des antihypertenseurs ; selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

| Caractéristique sociodémographique | A eu la pression artérielle mesurée par un médecin ou un prestataire de soins de santé | | Effectif d'hommes | Parmi les hommes qui ont appris d'un prestataire qu'ils souffraient d'hypertension, pourcentage : | | | Effectif d'hommes |
|--|--|---|-------------------|---|---|-------------|-------------------|
| | Informée par un prestataire qu'il souffrait d'hypertension artérielle | Ayant été informés dans les 12 mois précédant l'enquête | | À qui l'on a prescrit des médicaments pour contrôler la pression artérielle | Prenant des médicaments pour contrôler la pression artérielle | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | |
| 30-39 | 40,5 | 5,3 | 1 682 | 48,1 | 54,3 | 24,7 | 90 |
| 30-34 | 40,4 | 5,0 | 875 | (39,4) | (62,2) | (22,4) | 44 |
| 35-39 | 40,7 | 5,6 | 807 | (56,6) | (46,6) | (27,0) | 46 |
| 40-49 | 46,4 | 7,6 | 1 203 | 63,0 | 71,1 | 27,8 | 92 |
| 40-44 | 48,5 | 6,1 | 613 | (57,3) | (55,3) | (28,5) | 37 |
| 45-49 | 44,2 | 9,2 | 589 | 67,0 | 82,0 | 27,3 | 54 |
| 50-64 | 50,6 | 13,5 | 864 | 67,8 | 74,8 | 50,4 | 116 |
| 50-55 | 54,7 | 14,0 | 369 | 69,6 | 67,6 | 37,0 | 52 |
| 55-59 | 48,4 | 13,0 | 297 | (69,1) | (81,5) | (67,0) | 39 |
| 60-64 | 46,2 | 13,1 | 198 | (62,3) | (79,1) | (52,0) | 26 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 63,0 | 7,8 | 214 | (82,8) | (67,8) | (12,5) | 17 |
| Autres villes | 49,5 | 8,7 | 1 425 | 60,7 | 69,4 | 34,6 | 123 |
| Ensemble urbain | 51,3 | 8,5 | 1 639 | 63,4 | 69,2 | 32,0 | 140 |
| Rural | 39,7 | 7,5 | 2 110 | 57,8 | 66,0 | 39,0 | 157 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 27,7 | 4,1 | 729 | (67,2) | (75,6) | (29,3) | 30 |
| Second | 36,4 | 6,4 | 705 | (43,9) | (75,5) | (43,3) | 45 |
| Moyen | 46,3 | 8,4 | 717 | 52,3 | 63,2 | 23,8 | 60 |
| Quatrième | 49,1 | 8,7 | 718 | 57,4 | 61,9 | 34,6 | 62 |
| Le plus élevé | 60,7 | 11,4 | 880 | 72,7 | 67,5 | 42,0 | 100 |
| Ensemble | 44,7 | 7,9 | 3 749 | 60,4 | 67,5 | 35,7 | 297 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

Tableau 17.2.1 Niveaux d'hypertension : Femme

Prévalence de la tension artérielle élevée parmi les femmes de 30-49 ans et distribution (en %) des femmes d'après le niveau de tension artérielle, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

| Caractéristique sociodémographique | Prévalence de la pression artérielle élevée | Classification de la pression artérielle | | | | | | Tension normale et prend des médicaments | Total | Effectif de femmes |
|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|--------------|--------------------|
| | | Optimale <120/<80 mmHg | Normale 120-129/80-84 mmHg | Normale supérieure 130-139/85-89 mmHg | Légèrement élevée 140-159/90-99 mmHg (Niveau 1) | Modérément élevée 160-179/100-109 mmHg (Niveau 2) | Sévèrement élevée 180+ /110+ mmHg (Niveau 3) | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | |
| 30-39 | 8,9 | 68,7 | 13,2 | 8,0 | 6,4 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 100,0 | 1 907 |
| 30-34 | 6,7 | 72,1 | 12,9 | 7,2 | 5,5 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 100,0 | 995 |
| 35-39 | 11,3 | 64,9 | 13,5 | 8,9 | 7,4 | 3,2 | 0,7 | 1,4 | 100,0 | 912 |
| 40-49 | 19,4 | 55,2 | 14,3 | 8,9 | 11,7 | 5,2 | 2,4 | 2,2 | 100,0 | 1 170 |
| 40-44 | 18,8 | 56,2 | 14,5 | 8,4 | 12,1 | 5,1 | 1,6 | 2,1 | 100,0 | 588 |
| 45-49 | 19,9 | 54,2 | 14,2 | 9,5 | 11,3 | 5,3 | 3,2 | 2,3 | 100,0 | 582 |
| Résidence | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 18,4 | 53,6 | 15,0 | 10,3 | 12,7 | 3,7 | 2,1 | 2,7 | 100,0 | 192 |
| Autres villes | 15,6 | 59,7 | 14,1 | 8,6 | 10,0 | 3,8 | 1,8 | 2,1 | 100,0 | 1 139 |
| Ensemble urbain | 16,0 | 58,8 | 14,2 | 8,8 | 10,4 | 3,8 | 1,8 | 2,2 | 100,0 | 1 331 |
| Rural | 10,5 | 67,2 | 13,1 | 8,0 | 7,0 | 2,8 | 0,8 | 1,2 | 100,0 | 1 746 |
| Consommation de tabac à fumer | | | | | | | | | | |
| Oui | (15,4) | (53,5) | (16,6) | (14,5) | (15,4) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (100,0) | 37 |
| Non | 12,9 | 63,7 | 13,6 | 8,3 | 8,4 | 3,3 | 1,2 | 1,6 | 100,0 | 3 039 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 9,3 | 66,6 | 15,4 | 8,0 | 6,2 | 2,1 | 1,0 | 0,7 | 100,0 | 597 |
| Second | 9,2 | 68,9 | 12,4 | 8,7 | 5,9 | 2,9 | 0,3 | 0,8 | 100,0 | 623 |
| Moyen | 11,7 | 66,0 | 14,1 | 7,2 | 8,0 | 2,9 | 0,8 | 1,0 | 100,0 | 553 |
| Quatrième | 14,7 | 63,6 | 11,3 | 8,0 | 9,3 | 3,8 | 1,6 | 2,3 | 100,0 | 628 |
| Le plus élevé | 18,7 | 53,9 | 14,9 | 9,6 | 12,3 | 4,1 | 2,3 | 2,9 | 100,0 | 676 |
| Ensemble | 12,9 | 63,5 | 13,6 | 8,4 | 8,4 | 3,2 | 1,2 | 1,6 | 100,0 | 3 077 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

Tableau 17.2.2 Niveaux d'hypertension : Homme

Prévalence de la tension artérielle élevée parmi les hommes de 30-64 ans et distribution (en %) des hommes d'après le niveau de tension artérielle, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

| Caractéristique sociodémographique | Prévalence de la pression artérielle élevée | Classification de la pression artérielle | | | | | | | Tension normale et prend des médicaments | Total | Effectif d'hommes |
|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------|--|--------------|-------------------|
| | | Optimale <120/<80 mmHg | Normale 120-129/80-84 mmHg | Normale supérieure 130-139/85-89 mmHg | Légèrement élevée 140-159/90-99 mmHg (Niveau 1) | Modérément élevée 160-179/100-109 mmHg (Niveau 2) | Sévérement élevée 180+/110+ mmHg (Niveau 3) | | | | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | | | |
| 30-39 | 9,5 | 48,5 | 29,3 | 11,6 | 7,1 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 100,0 | 1 635 | |
| 30-34 | 8,4 | 48,5 | 30,3 | 11,9 | 6,9 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 100,0 | 848 | |
| 35-39 | 10,7 | 48,5 | 28,2 | 11,4 | 7,3 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 100,0 | 787 | |
| 40-49 | 16,9 | 40,5 | 26,6 | 14,9 | 11,7 | 3,4 | 1,7 | 1,1 | 100,0 | 1 162 | |
| 40-44 | 15,6 | 40,7 | 26,6 | 15,9 | 11,2 | 3,1 | 1,3 | 1,4 | 100,0 | 594 | |
| 45-49 | 18,2 | 40,4 | 26,6 | 13,9 | 12,1 | 3,8 | 2,3 | 0,9 | 100,0 | 568 | |
| 50-64 | 28,4 | 33,8 | 20,6 | 13,5 | 17,9 | 6,0 | 4,6 | 3,7 | 100,0 | 836 | |
| 50-54 | 29,1 | 35,2 | 19,0 | 13,5 | 17,6 | 6,5 | 5,1 | 3,1 | 100,0 | 356 | |
| 55-59 | 26,4 | 30,6 | 23,4 | 14,6 | 16,4 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 100,0 | 288 | |
| 60-64 | 30,3 | 35,8 | 19,1 | 11,9 | 20,6 | 6,2 | 3,4 | 3,0 | 100,0 | 193 | |
| Résidence | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 21,0 | 34,6 | 25,7 | 17,9 | 14,7 | 5,5 | 0,7 | 0,8 | 100,0 | 189 | |
| Autres villes | 17,6 | 39,7 | 27,1 | 14,1 | 11,9 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 100,0 | 1 372 | |
| Ensemble urbain | 18,0 | 39,1 | 27,0 | 14,5 | 12,2 | 3,8 | 2,0 | 1,4 | 100,0 | 1 561 | |
| Rural | 14,9 | 45,2 | 26,0 | 12,1 | 10,2 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 100,0 | 2 072 | |
| Consommation de tabac à fumer | | | | | | | | | | | |
| Oui | 19,3 | 41,8 | 23,6 | 13,8 | 12,2 | 4,3 | 2,8 | 1,6 | 100,0 | 382 | |
| Non | 15,9 | 42,7 | 26,7 | 13,0 | 10,9 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 100,0 | 3 251 | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 12,0 | 46,2 | 28,6 | 12,4 | 8,6 | 2,7 | 0,7 | 0,8 | 100,0 | 718 | |
| Second | 13,8 | 45,0 | 26,1 | 12,9 | 9,6 | 2,9 | 1,3 | 2,2 | 100,0 | 697 | |
| Moyen | 14,0 | 45,8 | 26,9 | 11,8 | 9,9 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 100,0 | 704 | |
| Quatrième | 19,0 | 37,4 | 29,0 | 12,8 | 12,6 | 3,8 | 2,6 | 1,8 | 100,0 | 692 | |
| Le plus élevé | 21,5 | 39,0 | 22,1 | 15,3 | 14,1 | 4,7 | 2,8 | 2,1 | 100,0 | 822 | |
| Ensemble | 16,2 | 42,6 | 26,4 | 13,1 | 11,1 | 3,3 | 1,9 | 1,7 | 100,0 | 3 633 | |

Tableau 17.3 Type de maladies non transmissibles

Prévalence de maladies non transmissibles parmi les femmes de 15-49 ans et les hommes de 30-64 ans, EDSB-V Bénin 2017-2018.

| Type de maladies non transmissibles | Femmes 15-49 ans | Hommes 30-64 ans |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Maladies cardiovasculaires | 1,3 | 1,4 |
| Maladies pulmonaires | 1,5 | 1,0 |
| Tumeurs | 0,2 | 0,2 |
| Dépression | 0,8 | 0,2 |
| Arthrite | 1,4 | 0,5 |
| Autres maladies chroniques | 1,1 | 0,7 |
| Effectif | 7 706 | 3 749 |

Tableau 17.4 Cancer du col de l'utérus

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus, pourcentage ayant entendu parler d'un test pour le cancer du col de l'utérus et pourcentage qui ont effectué un test pour le cancer du col de l'utérus, distribution (en %) des femmes de 15-49 ans ayant effectué le test selon la date du dernier test, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus | Pourcentage ayant entendu parler d'un test de dépistage du cancer du col de l'utérus | Pourcentage ayant effectué le test de dépistage du cancer du col de l'utérus | Effectif de femmes | Parmi les femmes ayant effectué le test du col de l'utérus | | | | Effectif des femmes ayant effectué le test |
|--|---|--|--|--------------------|--|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | <1 an | 1-3 ans | >3 ans | Total | |
| Groupe d'âges | | | | | | | | | |
| 15-29 | 9,1 | 4,5 | 0,2 | 4 542 | 19,5 | 21,5 | 59,0 | 100,0 | 11 |
| 15-19 | 5,9 | 2,2 | 0,0 | 1 618 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 20-24 | 10,4 | 5,0 | 0,2 | 1 423 | 36,2 | 0,0 | 63,8 | 100,0 | 3 |
| 25-29 | 11,4 | 6,7 | 0,5 | 1 502 | 13,4 | 29,4 | 57,2 | 100,0 | 8 |
| 30-39 | 9,7 | 5,4 | 1,0 | 1 961 | 12,3 | 52,8 | 34,9 | 100,0 | 19 |
| 30-34 | 9,5 | 5,5 | 0,9 | 1 028 | 21,4 | 55,5 | 23,1 | 100,0 | 9 |
| 35-39 | 9,9 | 5,3 | 1,1 | 933 | 3,9 | 50,3 | 45,8 | 100,0 | 10 |
| 40-49 | 10,4 | 5,2 | 0,7 | 1 203 | 0,0 | 21,9 | 78,1 | 100,0 | 9 |
| 40-44 | 10,9 | 5,4 | 0,7 | 607 | 0,0 | 30,1 | 69,9 | 100,0 | 4 |
| 45-49 | 9,8 | 5,0 | 0,8 | 595 | 0,0 | 14,1 | 85,9 | 100,0 | 5 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 31,0 | 18,2 | 3,5 | 460 | 11,6 | 44,2 | 44,1 | 100,0 | 16 |
| Autres villes | 11,3 | 6,0 | 0,4 | 2 843 | 22,0 | 44,8 | 33,2 | 100,0 | 12 |
| Ensemble urbain | 14,0 | 7,7 | 0,8 | 3 303 | 16,0 | 44,5 | 39,5 | 100,0 | 28 |
| Rural | 6,0 | 2,8 | 0,2 | 4 403 | 0,0 | 18,9 | 81,1 | 100,0 | 11 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucun | 4,8 | 2,0 | 0,2 | 4 245 | 6,6 | 33,0 | 60,4 | 100,0 | 9 |
| Primaire | 8,5 | 4,1 | 0,3 | 1 547 | 0,0 | 45,4 | 54,6 | 100,0 | 5 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 13,2 | 6,6 | 0,5 | 1 356 | 0,0 | 8,6 | 91,4 | 100,0 | 7 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 38,7 | 24,8 | 3,2 | 558 | 21,6 | 48,6 | 29,7 | 100,0 | 18 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 3,6 | 1,5 | 0,1 | 1 424 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 |
| Second | 4,3 | 2,2 | 0,1 | 1 551 | 30,8 | 0,0 | 69,2 | 100,0 | 2 |
| Moyen | 7,1 | 2,7 | 0,3 | 1 422 | 0,0 | 23,9 | 76,1 | 100,0 | 4 |
| Quatrième | 9,4 | 4,8 | 0,1 | 1 574 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 2 |
| Le plus élevé | 20,8 | 11,8 | 1,7 | 1 734 | 12,7 | 44,4 | 42,9 | 100,0 | 30 |
| Ensemble | 9,5 | 4,9 | 0,5 | 7 706 | 11,5 | 37,2 | 51,3 | 100,0 | 39 |

Tableau 17.5.1 Glycémie mesurée et traitée : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la glycémie a été mesurée et qui ont été informées par un prestataire de soins de santé qu'elles souffraient d'hyperglycémie ou du diabète selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

| Caractéristique sociodémographique | A eu la glycémie mesurée par un médecin ou un fournisseur de soins de santé | Informée par un prestataire qu'elle souffrait d'hyperglycémie ou du diabète | Effectif des femmes |
|--|---|---|---------------------|
| Groupe d'âges | | | |
| 15-29 | 6,2 | 0,8 | 4 542 |
| 15-19 | 2,6 | 0,3 | 1 617 |
| 20-24 | 8,0 | 1,0 | 1 423 |
| 25-29 | 8,2 | 1,0 | 1 502 |
| 30-39 | 10,5 | 1,4 | 1 961 |
| 30-34 | 10,8 | 1,1 | 1 028 |
| 35-39 | 10,3 | 1,7 | 933 |
| 40-49 | 11,3 | 1,8 | 1 203 |
| 40-44 | 11,1 | 1,2 | 607 |
| 45-49 | 11,6 | 2,3 | 595 |
| Résidence | | | |
| Cotonou | 19,4 | 2,6 | 460 |
| Autres villes | 8,4 | 1,3 | 2 843 |
| Ensemble urbain | 9,9 | 1,5 | 3 303 |
| Rural | 6,7 | 0,8 | 4 403 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 4,2 | 0,7 | 1 424 |
| Second | 6,9 | 0,9 | 1 551 |
| Moyen | 6,0 | 0,6 | 1 422 |
| Quatrième | 7,3 | 0,9 | 1 574 |
| Le plus élevé | 14,8 | 2,2 | 1 734 |
| Ensemble | 8,1 | 1,1 | 7 706 |

Tableau 17.5.2 Glycémie mesurée et traitée : Homme

Pourcentage d'hommes de 30-64 ans dont la glycémie a été mesurée et qui ont été informés par un prestataire de soins de santé qu'ils souffraient d'hyperglycémie ou de diabète, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

| Caractéristique sociodémographique | A eu la glycémie mesurée par un médecin ou un fournisseur de soins de santé | Informée par un prestataire qu'il souffrait d'hyperglycémie ou du diabète | Effectif d'hommes |
|--|---|---|-------------------|
| Groupe d'âges | | | |
| 30-39 | 5,0 | 0,9 | 1 682 |
| 30-34 | 4,3 | 0,7 | 875 |
| 35-39 | 5,7 | 1,1 | 807 |
| 40-49 | 5,5 | 1,4 | 1 203 |
| 40-44 | 5,8 | 1,3 | 613 |
| 45-49 | 5,3 | 1,4 | 589 |
| 50-64 | 10,0 | 2,1 | 864 |
| 50-54 | 9,1 | 1,7 | 369 |
| 55-59 | 11,8 | 2,7 | 297 |
| 60-64 | 9,0 | 2,1 | 198 |
| Résidence | | | |
| Cotonou | 18,3 | 1,3 | 214 |
| Autres villes | 7,4 | 1,6 | 1 425 |
| Ensemble urbain | 8,8 | 1,5 | 1 639 |
| Rural | 4,4 | 1,2 | 2 110 |
| Quintiles de bien-être économique | | | |
| Le plus bas | 2,9 | 1,2 | 729 |
| Second | 4,3 | 0,3 | 705 |
| Moyen | 4,0 | 1,4 | 717 |
| Quatrième | 4,8 | 0,3 | 718 |
| Le plus élevé | 13,9 | 3,0 | 880 |
| Ensemble | 6,3 | 1,3 | 3 749 |

Résultats clés

- **Enregistrement des naissances** : Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée est de 86 % : 64 % ont un certificat de naissance et 22 % n'en disposent pas.
- **Enfant orphelin et résidence des enfants avec les parents** : Le pourcentage d'enfant de moins de 18 ans ne vivant avec aucun parent biologique est de 15 % et le pourcentage d'enfant de moins de 18 ans vivant avec un ou les deux parents décédés est de 7 %.
- **Discipline des enfants** : Parmi les enfants de 1-14 ans, 91 % ont subi n'importe quelle forme de discipline violente au cours du mois ayant précédé l'interview.
- **Travail des enfants** : Au cours de la semaine avant l'interview, un tiers des enfants de 5-17 ans ont travaillé, à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges (33 %), que ce soit en participant à des activités économiques, en accomplissant des tâches domestiques ou en travaillant dans des conditions dangereuses.
- **Encadrement inapproprié des enfants** : Au cours de la semaine avant l'interview, 30 % des enfants de moins de 5 ans ont été laissés sans soins appropriés pendant au moins une heure.

La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989, relative aux Droits de l'Enfant (CDE) stipule dans l'une de ses dispositions que : « tous les États parties s'engagent à assurer à l'enfant, la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ». Le Bénin, en ratifiant la CDE, s'est engagé au même titre que d'autres parties prenantes, à veiller à ce que tout enfant ait le droit d'être enregistré à l'état-civil, d'être nourri, soigné et éduqué. La manifestation de la volonté politique du gouvernement a été traduite dans la Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin qui, dans ses dispositions générales garantit à tout être humain, les droits universellement reconnus et les libertés fondamentales. Particulièrement, les articles 12 à 14 et 26 prévoient des mesures spécifiques de protection des enfants, notamment en matière d'éducation et d'attention due à la mère et à l'enfant. Et, dans le contexte du principe de non-discrimination, l'article 26 établit que « l'État protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant ».

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des informations ont été collectées qui ont permis de calculer différents indicateurs permettant d'évaluer la situation des enfants au Bénin. Ces indicateurs concernent plus précisément : la déclaration à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans, l'état de survie des parents biologiques, le travail des enfants de 5-17 ans, les méthodes de discipline des enfants et le développement du jeune enfant.

18.1 ENREGISTREMENT DES NAISSANCES À L'ÉTAT CIVIL

Enregistrement des naissances à l'état civil

Enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée à l'état civil.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans (population de droit)

L'État civil est défini comme l'ensemble des dispositions légales et réglementaires dont l'objet est de situer dans le temps et dans l'espace, des événements de la vie d'un individu, que sont entre autres la naissance, le mariage et le décès. L'enregistrement des naissances consiste à faire constater par des autorités administratives compétentes, la naissance des enfants. Il s'agit d'une preuve matérielle, permanente et officielle de l'existence de l'enfant, condition essentielle, garantissant ainsi à chacun un certain nombre de droits (nationalité, éducation, vote, emploi, héritage, etc.).

Au plan national, le code des personnes et de la famille en vigueur au Bénin stipule en son article 60 que « Toute naissance doit être déclarée au centre d'état civil le plus proche du lieu dans un délai de 10 jours, le jour de l'accouchement non compté. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Toutefois, ce délai est de 3 mois jusqu'à l'installation effective des organes décentralisés » et l'article 61 complète en ces termes « L'acte énonce le jour et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère ou l'un des deux ne sont pas désignés à l'officier d'état civil, il ne fait sur le registre aucune mention à ce sujet. L'acte est rédigé immédiatement et est signé du déclarant et de l'officier d'état civil conformément aux dispositions de l'article 42 du présent code ».

Les résultats du **Tableau 18.1** montrent que plus de huit enfants de moins de 5 ans sur dix (86 %) ont été enregistrés à l'état civil. Près des deux-tiers (64 %) ont un certificat de naissance mais, 22 % n'en possèdent pas.


Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, la proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée a augmenté passant de 53 % en 2006 à 80 % en 2011-2012 puis à 86 % en 2017-2018 (**Graphique 18.1**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil est plus élevé en milieu urbain (91 %) qu'en milieu rural (82 %).

Graphique 18.1 Enregistrement des naissances d'enfants à l'état civil : Tendances


Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans



- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'état civil varie de 65 % dans le département du Borgou à 96 % dans le Zou (Graphique 18.2).
- Le pourcentage d'enfants dont la naissance a été enregistrée à l'état civil augmente, de manière importante, du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, passant de 69 % à 97 % (Graphique 18.3).


Graphique 18.2 Enregistrement des naissances à l'état civil par département

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans



Graphique 18.3 Enregistrement des naissances à l'état civil par bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans



18.2 ENFANTS ORPHELINS ET RÉSIDENCE AVEC LES PARENTS

Enfants orphelins d'un ou des deux parents

Comprend les enfants dont le père seul est décédé, ceux dont la mère seule est décédée, ceux dont les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre est manquante.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans (population de droit)

Le Comité des Droits de l'Enfant (CDE) reconnaît que « l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ». La famille constituant le soutien principal des enfants, toute stratégie visant à protéger les enfants doit donc, en priorité, renforcer les capacités des familles à les prendre en charge. Or des millions d'enfants dans le monde grandissent loin de leurs parents biologiques pour plusieurs raisons, dont notamment le décès prématuré de ces derniers ou la migration pour le travail. Dans la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge par des membres de leurs familles élargies, alors que dans d'autres cas, les enfants peuvent vivre dans des familles autres que les leurs et travaillent comme domestiques résidents par exemple. Il est donc essentiel d'identifier les enfants qui sont orphelins, et de savoir si les enfants dont l'un ou les deux parents sont en vie vivent ou non avec leurs parents ou avec le parent survivant.

Le **Tableau 18.2** présente ces informations pour les enfants de moins de 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Globalement, 15 % des enfants de moins de 18 ans ne vivent pas avec leurs parents biologiques que ceux-ci soient en vie ou décédés et 7 % sont orphelins de père et/ou de mère.

Tendances : Les proportions d'enfants de moins de 18 ans ne vivant avec aucun parent biologique ou les proportions de ceux qui sont orphelins n'ont pratiquement pas varié entre 2011-2012 et 2017-2018.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique augmente avec l'âge, passant de 5 % chez les 0-4 ans à 29 % chez les 15-17 ans.
- Le pourcentage d'enfants orphelins d'au moins un des parents biologiques au moins augmente avec l'âge, passant de 2 % chez les 0-4 ans à 16 % chez les 15-17 ans.
- Le pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique varie selon le sexe de l'enfant. IL est plus élevé chez les filles que chez les garçons (17 % contre 13 %)
- Le pourcentage d'enfants orphelins d'un des parents ou des deux varie d'un maximum de 11 % dans le Couffo à un minimum dans le Borgou et les Collines (5 % pour chacun).

18.3 DISCIPLINE DES ENFANTS

L'éducation de l'enfant commence d'abord en famille par l'acquisition de certaines valeurs. Ces valeurs peuvent englober la maîtrise de soi et des règles de bonne conduite, etc. Les pratiques parentales positives consistent à éduquer l'enfant sur la façon de gérer leurs émotions ou les conflits en préservant leur intégrité physique et psychologique, leur dignité et en les encourageant à utiliser leur jugement et à être responsables. Cependant, les enfants sont souvent élevés avec des méthodes punitives qui reposent sur l'usage de la force physique ou l'intimidation verbale pour obtenir les comportements désirés. Des études ont montré que l'exposition des enfants à la discipline violente à des conséquences néfastes, qui ont des répercussions immédiates et à long terme à l'âge adulte.

Méthodes non violentes

Sont considérées comme méthodes de discipline non violentes les mesures suivantes :

- Retirer des privilèges à l'enfant, lui interdire de faire quelque chose qu'il aime ou ne pas permettre à l'enfant de quitter la maison ;
- Expliquer à l'enfant pourquoi son comportement n'est pas acceptable ;
- Lui donner quelque chose d'autre à faire.

Échantillon : Enfants de 1-14 ans (population de droit)

Agression psychologique

Entrent dans cette catégorie, un ou plusieurs comportements suivants :

- Crier ou hurler sur l'enfant ;
- Traiter l'enfant d'idiot, de paresseux ou d'un terme similaire.

Échantillon : Enfants de 1-14 ans (population de droit)

Châtiments corporels

Entrent dans cette catégorie, un ou plusieurs comportements suivants :

- Secouer l'enfant ;
- Frapper l'enfant, le taper sur les fesses à mains nues ;
- Frapper l'enfant sur les fesses ou sur d'autres endroits du corps avec quelque chose comme une ceinture, une brosse à cheveux, un bâton ou un objet similaire dur ;
- Frapper ou gifler l'enfant sur le visage, la tête ou les oreilles ;
- Frapper ou taper sur les mains, les bras ou les jambes ;
- Frapper encore et encore aussi fort que possible.

Échantillon : Enfants de 1-14 ans (population de droit)

Châtiments corporels violents

Entrent dans cette catégorie, l'un ou l'autre des comportements suivants :

- Frapper ou gifler l'enfant sur le visage, la tête ou les oreilles ;
- Battre l'enfant encore et encore aussi fort que possible.

Échantillon : Enfants de 1-14 ans (population de droit)

La violence entrave le développement de l'enfant, sa capacité d'apprentissage et sa performance scolaire. Elle inhibe les relations positives, provoque une faible estime de soi, la détresse et la dépression émotionnelles. Au cours de l'enquête, une série de questions a été posée aux ménages sur les méthodes utilisées par les adultes pour discipliner les enfants de 1-14 ans. Les résultats obtenus sont présentés dans le **Tableau 18.3**.

Les résultats montrent qu'au Bénin neuf enfants de 1-14 ans sur dix (91 %) ont subi n'importe quelle forme de discipline violente. Parmi les enfants de 1-14 ans, environ neuf sur dix (87 %) ont subi une agression psychologique ; huit sur dix (80 %) n'importe quelle forme de châtement corporel et près du quart (23 %) un châtement corporel très violent.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants de 1-14 ans ayant subi n'importe quelle forme de discipline violente augmente globalement avec l'âge, de 83 % à 1-2 ans à 94 % à 5-9 ans.
- L'utilisation de sanctions non violentes à l'égard des enfants de 1 à 14 ans est très élevée dans le département de l'Alibori (17 %) et très faible dans l'Atlantique (1 %), l'Ouémé et le Plateau (2 % pour chacun); dans ces 3 départements, la quasi-totalité des enfants de 1-14 ans ont subi n'importe quelle forme de discipline violente (respectivement 98 %, 94 % et 97 %)

- Une personne adulte sur trois (33 %) ayant répondu au module sur la discipline des enfants pense que l'enfant a besoin de punition physique. On constate que cette opinion est plus fréquemment partagée à Cotonou (38 % contre 33 % en milieu rural) et dans les départements de l'Ouémé et de l'Atlantique (respectivement 46 % et 48 % contre 17 % dans la Donga) qu'ailleurs. De même, le pourcentage d'enquêtés approuvant l'utilisation de méthodes de discipline violentes à l'égard des enfants tend à diminuer légèrement avec le niveau d'instruction, passant de 34 % parmi les enquêtés sans niveau d'instruction à 29 % parmi les plus instruits (**Tableau 18.4**).
- Le recours à des méthodes de discipline violente à l'égard des enfants de 1-14 ans tend à être plus fréquent des ménages du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 88 % à 94 %.

18.4 TRAVAIL DES ENFANTS

Selon l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'Enfant, « L'enfant a le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social » (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 1989). Toutes les dispositions doivent être prises pour que les enfants ne soient pas exposés à des risques, qu'ils ne soient pas exploités et qu'ils ne tombent pas dans un cycle de pauvreté et de privation. En outre, l'alinéa 2 du même article précise les conditions dans lesquelles l'activité de l'enfant est considérée comme du travail en :

- Fixant l'âge minimum ou des âges minimal d'admission à l'emploi ;
- Prévoyant la réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
- Prévoyant des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Or les enfants, dans le monde sont régulièrement engagés dans des formes rémunérées et non rémunérées de travail. Au cours de l'EDSB-V, une série de questions a été posée pour collecter les informations sur l'implication des enfants dans les activités domestiques et économiques. Le module développé par l'UNICEF dans les enquêtes MICS a été intégré dans cette enquête.

Participation à des activités économiques

Pour classer les enfants selon leur implication dans des activités économiques, l'UNICEF définit trois seuils basés sur l'âge des enfants et sur le nombre d'heures pendant lesquelles ils ont travaillé dans la semaine avant l'enquête :

- Pour les enfants de 5-11 ans : 1 heure ou plus
- Pour les enfants de 12-14 ans : 14 heures ou plus
- Pour les enfants de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Un enfant qui a participé à des activités économiques durant la semaine ayant précédé l'interview pendant un nombre d'heures égal ou supérieur à celui qui a été défini pour son âge, tel que présenté ci-dessus, est considéré comme « engagé dans le travail des enfants ».

Échantillon : Enfants de 5 -17 ans (population de droit)

Participation à des activités domestiques

Pour classer les enfants selon leur implication dans des travaux domestiques, l'UNICEF définit deux seuils basés sur l'âge des enfants et sur le nombre d'heures pendant lesquelles ils ont travaillé dans la semaine :

- Pour les enfants de 5-11 ans et de 12-14 ans : 28 heures ou plus
- Pour les enfants de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Un enfant qui a participé à des travaux domestiques durant la semaine ayant précédé l'interview pendant un nombre d'heures égal ou supérieur à celui qui a été défini pour son âge, tel que présenté ci-dessus, est considéré comme « engagé dans le travail des enfants ».

Échantillon : Enfants de 5-17 ans (population de droit)

Exposition à des travaux dangereux

Selon la définition de l'UNICEF, les enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses sont ceux qui : a) portent des charges lourdes ; b) travaillent avec des outils dangereux ou font fonctionner de grosses machines ; c) sont exposés à la poussière, à la fumée ou au gaz ; d) sont exposés au froid, à la chaleur ou à l'humidité extrême ; e) sont exposés à des bruits intenses ou à des vibrations ; f) sont exposés à un travail en hauteur ; g) sont exposés à des produits chimiques (pesticides, colle) ou à des explosifs ; h) sont exposés à d'autres choses, procédés ou conditions délétères pour leur santé ou leur sécurité.

Échantillon : Enfants de 5-17 ans (population de droit)

Au Bénin, un tiers des enfants de 5 à 17 ans (33 %) ont été impliqués dans le travail des enfants au cours de la semaine ayant précédé l'interview, c'est-à-dire qu'ils ont participé à des activités économiques ou à des travaux domestiques à la limite ou au-dessus du nombre d'heures fixé pour leur groupe d'âges ou les conditions dans lesquelles ils ont travaillé sont considérées comme étant dangereuses pour leur santé ou leur sécurité (**Tableau 18.7**).

Pour des informations plus détaillées sur l'implication des enfants dans des activités économiques et des travaux domestiques, consulter les **Tableaux 18.5 et 18.6**.


Près de deux enfants de 5 à 17 ans sur dix (17 %) ont été impliqués dans des activités économiques pour un nombre total d'heure à la limite ou au-dessus du seuil spécifique pour l'âge et 9 % d'entre eux ont été impliqués dans des tâches domestiques pour un nombre total d'heures à la limite ou au-dessus du seuil spécifique (**Tableau 18.7 et Graphique 18.4**). Pour plus de deux enfants de 5 à 17 ans sur dix (23 %) le travail a été effectué dans des conditions dangereuses.

Variations par caractéristique

- La participation des enfants dans le travail est plus élevée en milieu rural (40 %) qu'en milieu urbain (23 %).
- Les enfants des départements de l'Alibori (55 %) sont plus impliqués dans le travail des enfants que ceux du Littoral (11 %) ou de l'Ouémé (12 %).
- La participation des enfants dans le travail varie en fonction de la fréquentation scolaire : 44 % des enfants qui ne vont pas à l'école travaillent contre 30 % de ceux qui fréquentent l'école.

Graphique 18.4 Travail des enfants


Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant été impliqués, au cours de la semaine avant l'interview, dans des activités économiques ou des travaux domestiques à la limite ou au dessus du nombre d'heures fixé



- Le niveau de bien-être économique du ménage influence la participation des enfants dans le travail, celle-ci ayant tendance à diminuer avec l'amélioration du niveau de bien-être : dans le quintile le plus bas, pratiquement un enfant sur deux travaille (49 %) contre 13 % dans le quintile le plus élevé (Graphique 18.5).

Graphique 18.5 Ensemble du travail des enfants par bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans



18.4.1 Activités économiques des enfants de 5-17 ans

- Deux enfants de 5-11 ans sur dix (21 %) ont été impliqués dans une activité économique pendant au moins une heure au cours de la semaine avant l'interview avec un fort pourcentage en milieu rural (25 %), dans l'Alibori (35 %), et dans les ménages classés dans le quintile le plus bas (31 %) (Tableau 18.5).
- Parmi les enfants de 12-14 ans, 12 % ont été impliqués dans une activité économique pendant quatorze heures ou plus. Cependant, en milieu rural (15 %), dans l'Alibori (29 %), parmi les enfants qui ne fréquentent pas l'école (29 %) et parmi ceux des ménages des deux premiers quintiles de bien-être économique (20 % dans chaque quintile), ce pourcentage est plus élevé.
- Parmi les enfants de 15-17 ans, 7 % ont été impliqués dans une activité économique pendant 43 heures ou plus pendant la semaine avant l'interview avec un fort pourcentage parmi les enfants qui ne fréquentent pas l'école (15 %), ceux qui vivent dans les ménages du quintile le plus bas (13 %) et ceux des départements de l'Alibori et du Borgou (15 % dans chaque cas).

18.5 DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Certaines questions du module de l'UNICEF concernant le développement du jeune enfant ont été posées dans les ménages qui comprenaient au moins un enfant de 0-4 ans avec sa mère. Précisons que ces questions ont été posées pour l'enfant le plus jeune. En outre, en fonction des indicateurs recherchés, les questions ont été posées pour des enfants de groupe d'âges différents. Certaines questions ont été posées à propos des plus jeunes enfants de 0-4 ans alors que celles concernant la fréquentation d'un programme préscolaire ou le soutien à l'apprentissage s'adressaient aux enfants de 3-4 ans. En outre, à la différence des modules précédents qui ont été posés au cours de l'enquête auprès des ménages, celui concernant le développement du jeune enfant a été posé au cours de l'enquête auprès des femmes.

Compte tenu des indicateurs recherchés, les questions ont été posées sur des enfants de groupes d'âges différents. Certaines questions, telles que celles relatives à la fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire ou le soutien à l'apprentissage, ont été posées au sujet des enfants de 36-59 mois alors que celles concernant le matériel d'apprentissage et l'encadrement inapproprié des enfants s'adressaient aux parents d'enfants de moins de 5 ans. En outre, à la différence du module sur le travail et la discipline, celui portant sur le développement du jeune enfant a été posé au cours de l'enquête auprès des femmes.

18.5.1 Éducation de la petite enfance


Au cours de l'enquête, on a demandé si les enfants de 36-59 mois suivaient un programme d'apprentissage éducatif ou s'ils fréquentaient une classe d'éveil, un jardin d'enfants ou une garderie communautaire. Au Bénin, 19 % des enfants de 36-59 mois fréquentent un programme d'éducation préscolaire (Tableau 18.8).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants qui suivent un programme d'éducation préscolaire varie en fonction de l'âge, passant de 12 % parmi ceux de 36-47 mois à 28 % parmi ceux de 48-59 mois.
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire est plus courante en milieu urbain (31 %), surtout à Cotonou (55 %), qu'en milieu rural (12 %).
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire varie de manière importante entre les départements, d'un minimum de 6 % dans le Couffo à 55 % dans le Littoral.
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 12 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 77 % parmi ceux dont la mère a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Graphique 18.6**).
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire est influencée par le niveau de bien-être économique du ménage, seulement 5 % des enfants dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas suivent un programme d'apprentissage préscolaire contre 49 % parmi ceux dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé.

Graphique 18.6 Enfants qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire par niveau d'instruction de la mère

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois



18.5.2 Soutien à l'apprentissage

Soutien à l'apprentissage

Pourcentage d'enfants qui ont participé, au cours des trois derniers jours, avec un membre adulte du ménage (âgé de 15 ans ou +) à l'une des activités suivantes :

- Lire des livres ou regarder des livres illustrés ;
- Raconter des histoires à l'enfant ;
- Chanter des chansons à l'enfant ou avec l'enfant (y compris des berceuses) ;
- Emmener l'enfant en promenade en dehors de la maison, de la cour ou de l'enceinte ;
- Jouer avec l'enfant ;
- Nommer, compter et/ou dessiner des choses pour ou avec l'enfant.

Échantillon : Enfants de 3-4 ans (36-59 mois)

Le **Tableau 18.9** présente les pourcentages d'enfants de 36-59 mois qui ont participé, au cours des trois jours avant l'interview, avec un membre adulte du ménage à des activités qui favorisent l'apprentissage et la préparation à l'école.

Les résultats révèlent que 41 % des enfants avaient participé à, au moins, quatre activités d'apprentissage avec un membre adulte du ménage en 2017-2018.

De plus, ces résultats montrent que la mère biologique prend davantage part à des activités d'éveil et d'apprentissage avec l'enfant que le père biologique (18 % contre 4 %).

Le nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage est de 3. Quand cet adulte est le père biologique, le nombre moyen d'activités est de 0,6 et de 1,7 quand cet adulte est la mère biologique.

Variations par caractéristique

- Le soutien à l'apprentissage des enfants est plus fréquent dans le Littoral (69 %) que dans le Couffo (21 %).
- Le niveau d'instruction de la mère influence le soutien à l'apprentissage de l'enfant : 36 % des enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction contre 81 % parmi ceux dont la mère a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. En outre, seulement 15 % des enfants ont effectué au moins 4 activités avec leur mère biologique quand celle-ci n'a aucun niveau d'instruction contre 50 % quand elle a un niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Tableau 18.9**).
- Le soutien à l'apprentissage de l'enfant est plus fréquent dans les ménages du quintile de bien-être le plus élevé (59 %) que dans ceux du quintile le plus bas (37 %) (**Graphique 18.7**).


18.5.3 Matériel d'apprentissage

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des questions ont été posées sur la disponibilité de livres pour enfants ou de livres d'images ainsi que sur les objets utilisés par l'enfant pour jouer, que ces jouets soient fabriqués à la maison, qu'ils proviennent d'un magasin ou d'un fabricant ou qu'ils soient des objets du ménage. Les résultats sont présentés au **Tableau 18.10** pour les enfants de moins de 5 ans.

Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont le ménage dispose d'au moins trois livres pour enfants est très faible (2 %). S'agissant des jouets, on constate que 69 % des enfants jouent avec des objets du ménage ou trouvés dehors, 43 % s'amuse avec des jouets de magasin et 51 % avec des jouets fabriqués à la maison. Globalement, plus de la moitié des enfants (55 %) jouent avec au moins 2 types de jouets.

Graphique 18.7 Soutien à l'apprentissage par bien-être économique

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois ayant participé au cours des 3 derniers jours à 4 ou plus activités d'apprentissage avec un membre adulte du ménage



Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans disposant de deux types de jouets ou plus augmente avec l'âge, de 41 % à 0-23 mois à 61 % à 24-59 mois.
- Le pourcentage d'enfants jouant avec deux types de jouets ou plus varie sensiblement selon la résidence et le département. Il est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (62 % contre 50 %) et dans le Littoral (69 %) que dans l'Alibori (34 %).
- La disponibilité d'au moins trois livres et de jouets de magasin augmente sensiblement avec le niveau d'instruction de la mère, passant pour les livres, de moins d'un pour cent quand elle n'a aucun niveau d'instruction à 11 % lorsqu'elle a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, pour les jouets de magasin, de respectivement 36 % à 76 %.

18.6 ENCADREMENT INAPPROPRIÉ DES JEUNES ENFANTS

Encadrement inapproprié des jeunes enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou à la garde d'un enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure une fois au cours de la semaine ayant précédé l'interview.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Un enfant livré à lui-même ou confié à un autre enfant est exposé à un risque accru d'accident, de négligence et de mauvais traitement. Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, on a demandé à la mère combien de jours l'enfant avait été laissé seul ou à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure au cours de la semaine avant l'enquête.

Au Bénin, 24 % des enfants de moins de cinq ans ont été laissés seuls pendant plus d'une heure au cours de la semaine avant l'enquête et 18 % ont été laissés à la garde d'un autre enfant de moins de dix ans pendant plus d'une heure. Globalement, 29 % des enfants sont restés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure au cours de la dernière semaine avant l'enquête (**Tableau 18.11**).

Variations par caractéristique

- Il est plus fréquent de laisser les enfants de 24-59 mois sans soins appropriés que ceux de 0-23 mois (34 % contre 18 %).
- Le pourcentage d'enfants laissés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (31 % contre 26 %).
- Le pourcentage d'enfants laissés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure varie selon le département : dans les départements des Collines, la Donga et de l'Ouémé (20 % pour chacun) contre 43 % dans celui du Mono.
- Le pourcentage d'enfants laissés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure diminue avec le niveau d'instruction de la mère et le niveau de bien-être économique, passant de 32 % quand elle n'a aucun niveau d'instruction à 21 % quand elle a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, de 36 % dans le quintile le plus bas à 22 % dans le plus élevé.

18.7 INDICE DE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Indice de développement du jeune enfant

L'indice de développement du jeune enfant correspond au pourcentage d'enfants qui sont en bonne voie de développement dans, au moins, 2 des 4 domaines suivants :

Alphabétisation et calcul

L'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins 2 des conditions suivantes :

- L'enfant peut citer au moins 10 lettres de l'alphabet ;
- L'enfant peut lire au moins 4 mots simples, courants ;
- L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10.

Physique

L'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins une des conditions suivantes :

- L'enfant peut attraper par terre avec 2 doigts un petit objet comme un bâton ou un caillou ;
- L'enfant n'est pas parfois trop malade pour jouer.

Social/émotionnel

L'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins deux des conditions suivantes :

- L'enfant s'entend bien avec les autres enfants ;
- L'enfant ne donne pas de coup de pied, ne mord pas ou ne frappe pas les autres enfants ;
- L'enfant n'est pas facilement distrait.

Apprentissage

L'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins une des conditions suivantes :

- L'enfant est capable de suivre de simples instructions pour faire quelque chose correctement ;
- Quand on donne quelque chose à faire à l'enfant, il est capable de le faire de manière indépendante.

Échantillon : Enfants de 36-59 mois

Au Bénin, 57 % des enfants de 36-59 mois sont considérés comme étant en bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : alphabétisation/calcul, développement physique, social-émotionnel et apprentissage (**Tableau 18.12**). Globalement, on note que le pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont en bonne voie de développement est plus faible (10 %) dans le domaine de l'alphabétisation/calcul que dans les autres domaines où il est plus élevé (plus de 70 %).

Variations par caractéristique

- Le score de l'indice de développement du jeune enfant est plus élevé chez les enfants de 48-59 mois que chez ceux de 36-47 mois (61 % contre 53 %).
- Le score de l'indice de développement du jeune enfant est légèrement plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (59 % contre 55 %).
- Le pourcentage d'enfants de 36-59 mois considérés comme en bonne voie de développement augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 51 % quand celle-ci n'a aucun niveau d'instruction à 82 % quand elle a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.

- L'indice de développement du jeune enfant varie avec le niveau de bien-être économique du ménage : 48 % des enfants des ménages classés dans le quintile le plus bas sont en bonne voie de développement contre 70 % de ceux dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur le statut de l'enfant, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 18.1** Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans
- **Tableau 18.2** Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents
- **Tableau 18.3** Discipline des enfants
- **Tableau 18.4** Opinion concernant les châtimets corporels
- **Tableau 18.5** Implication des enfants de 5-17 ans dans l'activité économique
- **Tableau 18.6** Implication des enfants de 5-17 ans dans les travaux domestiques
- **Tableau 18.7** Travail des enfants
- **Tableau 18.8** Éducation de la petite enfance
- **Tableau 18.9** Soutien à l'apprentissage
- **Tableau 18.10** Matériel d'apprentissage
- **Tableau 18.11** Encadrement inapproprié des enfants
- **Tableau 18.12** Index de développement du jeune enfant

Tableau 18.1 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) enregistré à la naissance à l'état civil, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristiques sociodémographiques | Pourcentage d'enfants enregistré à la naissance à l'état civil et qui : | | | Effectif d'enfants |
|--|---|--------------------------------------|--|--------------------|
| | Ont un certificat de naissance | N'ont pas un certificat de naissance | Pourcentage total dont la naissance a été enregistré | |
| Âge de l'enfant | | | | |
| <2 | 60,2 | 27,6 | 87,7 | 5 576 |
| 2-4 | 66,3 | 17,8 | 84,1 | 7 892 |
| Sexe de l'enfant | | | | |
| Masculin | 64,2 | 21,2 | 85,4 | 6 817 |
| Féminin | 63,3 | 22,5 | 85,9 | 6 651 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 82,7 | 11,7 | 94,4 | 575 |
| Autres villes | 69,8 | 21,0 | 90,7 | 4 603 |
| Ensemble urbain | 71,2 | 19,9 | 91,2 | 5 178 |
| Rural | 59,1 | 23,0 | 82,1 | 8 290 |
| Département | | | | |
| Alibori | 52,8 | 30,6 | 83,3 | 1 789 |
| Atacora | 65,6 | 15,5 | 81,1 | 1 184 |
| Atlantique | 72,8 | 19,9 | 92,7 | 1 479 |
| Borgou | 45,2 | 20,1 | 65,3 | 1 823 |
| Collines | 68,8 | 20,9 | 89,7 | 857 |
| Couffo | 64,2 | 19,3 | 83,6 | 957 |
| Donga | 78,3 | 10,0 | 88,2 | 904 |
| Littoral | 82,7 | 11,7 | 94,4 | 575 |
| Mono | 64,4 | 30,8 | 95,3 | 611 |
| Ouémé | 61,6 | 28,5 | 90,1 | 1 216 |
| Plateau | 62,6 | 25,8 | 88,3 | 793 |
| Zou | 73,4 | 22,7 | 96,1 | 1 279 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 43,3 | 25,5 | 68,8 | 2 905 |
| Second | 57,2 | 25,8 | 83,0 | 2 771 |
| Moyen | 68,2 | 21,2 | 89,4 | 2 742 |
| Quatrième | 72,0 | 20,9 | 92,9 | 2 650 |
| Le plus élevé | 81,9 | 14,7 | 96,5 | 2 399 |
| Ensemble | 63,8 | 21,8 | 85,6 | 13 468 |

Tableau 18.2 Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents

Répartition (en %) des enfants (population de droit) de moins de 18 ans par état de survie des parents et résidence avec les parents, pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique et pourcentage d'enfants dont l'un ou les deux parents est/sont décédé(s), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Vit avec les deux parents | Vit avec la mère mais pas avec le père | | Vit avec le père mais pas avec la mère | | Ne vit avec aucun des deux parents | | | | | Total | Pourcentage ne vivant avec aucun parent biologique | Pourcentage avec un ou les deux parent(s) décédé(s) ¹ | Effectif d'enfants | |
|--|---------------------------|--|-------------|--|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--|--|--------------------|--|
| | | Père en vie | Père décédé | Mère en vie | Mère décédée | Les deux sont vivants | Seul le père est vivant | Seule la mère est vivante | Les deux décédés | Information manquante sur père/mère | | | | | |
| Âge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-4 | 74,5 | 16,7 | 1,5 | 2,1 | 0,2 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 5,1 | 2,2 | 13 468 | |
| <2 | 78,2 | 19,1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1,1 | 1,2 | 5 576 | |
| 2-4 | 71,9 | 15,0 | 1,8 | 3,1 | 0,3 | 7,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 7,8 | 3,0 | 7 892 | |
| 5-9 | 61,7 | 11,7 | 2,6 | 6,1 | 1,1 | 13,7 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 16,6 | 6,5 | 12 290 | |
| 10-14 | 54,5 | 9,7 | 5,1 | 7,9 | 1,8 | 16,2 | 1,1 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 21,0 | 11,7 | 9 578 | |
| 15-17 | 45,5 | 9,2 | 6,4 | 7,4 | 2,0 | 21,6 | 2,1 | 4,0 | 1,6 | 0,1 | 100,0 | 29,3 | 16,0 | 4 189 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 63,6 | 12,4 | 3,4 | 6,4 | 1,2 | 10,0 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 13,0 | 7,6 | 20 077 | |
| Féminin | 61,6 | 12,9 | 3,0 | 4,2 | 0,9 | 14,1 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 17,3 | 7,1 | 19 448 | |
| Résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotonou | 57,2 | 19,0 | 3,1 | 3,5 | 0,7 | 12,1 | 1,6 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 100,0 | 16,3 | 8,1 | 1 746 | |
| Autres villes | 62,4 | 12,5 | 3,2 | 5,0 | 1,0 | 12,7 | 0,8 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 15,9 | 7,3 | 13 527 | |
| Ensemble urbain | 61,8 | 13,3 | 3,2 | 4,8 | 1,0 | 12,7 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 15,9 | 7,4 | 15 273 | |
| Rural | 63,1 | 12,3 | 3,3 | 5,6 | 1,1 | 11,6 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 14,5 | 7,3 | 24 252 | |
| Département | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alibori | 73,4 | 7,2 | 2,7 | 4,2 | 1,3 | 8,5 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 11,1 | 6,6 | 5 157 | |
| Atacora | 63,9 | 9,9 | 3,9 | 6,1 | 1,1 | 12,8 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 14,9 | 7,2 | 3 534 | |
| Atlantique | 60,4 | 15,3 | 4,1 | 4,0 | 1,4 | 11,2 | 1,3 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 14,6 | 9,0 | 4 506 | |
| Borgou | 70,8 | 6,5 | 1,8 | 5,9 | 1,1 | 11,5 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 13,9 | 5,3 | 5 236 | |
| Collines | 57,5 | 17,3 | 2,2 | 6,5 | 0,2 | 14,0 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 16,3 | 4,8 | 2 549 | |
| Couffo | 52,7 | 16,4 | 6,0 | 6,4 | 0,9 | 13,3 | 0,9 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 100,0 | 17,6 | 11,2 | 2 880 | |
| Donga | 62,4 | 5,5 | 2,1 | 10,3 | 1,7 | 14,9 | 0,8 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 17,9 | 6,9 | 2 634 | |
| Littoral | 57,2 | 19,0 | 3,1 | 3,5 | 0,7 | 12,1 | 1,6 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 100,0 | 16,3 | 8,1 | 1 746 | |
| Mono | 51,2 | 23,9 | 2,5 | 3,4 | 0,7 | 14,4 | 1,1 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | 100,0 | 18,1 | 7,0 | 1 770 | |
| Ouémé | 62,9 | 13,5 | 4,5 | 4,4 | 0,8 | 10,8 | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 100,0 | 13,8 | 8,3 | 3 515 | |
| Plateau | 62,4 | 13,3 | 2,0 | 5,1 | 1,6 | 12,2 | 0,5 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | 15,6 | 7,0 | 2 395 | |
| Zou | 56,4 | 18,0 | 3,5 | 4,4 | 0,7 | 13,6 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 17,0 | 7,5 | 3 603 | |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 68,9 | 10,0 | 3,8 | 5,2 | 0,9 | 8,7 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 11,2 | 7,2 | 8 418 | |
| Second | 61,7 | 12,7 | 3,6 | 5,7 | 1,2 | 12,0 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 15,2 | 7,9 | 8 162 | |
| Moyen | 60,6 | 13,2 | 2,9 | 5,7 | 1,5 | 13,2 | 0,7 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 16,1 | 7,3 | 7 990 | |
| Quatrième | 60,1 | 14,3 | 3,4 | 5,5 | 0,8 | 12,6 | 0,9 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 100,0 | 15,8 | 7,4 | 7 810 | |
| Le plus élevé | 61,4 | 13,2 | 2,3 | 4,5 | 0,9 | 14,0 | 1,2 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 17,6 | 6,8 | 7 144 | |
| Ensemble <15 | 64,6 | 13,1 | 2,9 | 5,1 | 0,9 | 10,9 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 13,4 | 6,3 | 35 335 | |
| Ensemble <18 | 62,6 | 12,7 | 3,2 | 5,3 | 1,1 | 12,0 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 100,0 | 15,1 | 7,3 | 39 524 | |

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

¹ Comprend les enfants dont le père est décédé ou la mère est décédée ou les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre parent est manquante.

Tableau 18.3 Discipline des enfants

Pourcentage d'enfants de 1-14 ans (population de droit) qui, au cours du mois ayant précédé l'interview, ont subi des sanctions disciplinaires quelle qu'en soit la forme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants de 1-14 ans qui ont subi : | | | | | Effectif d'enfants de 1-14 ans |
|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | Seulement des sanctions non violentes ¹ | Agression psychologique ² | Châtiment corporel : n'importe quelle forme ³ | Châtiment corporel : très violent ⁴ | N'importe quelle forme de recours à la violence | |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 5,1 | 86,9 | 81,0 | 23,4 | 91,1 | 4 863 |
| Féminin | 5,5 | 87,5 | 78,6 | 22,0 | 91,2 | 4 737 |
| Âge | | | | | | |
| 1-2 | 7,0 | 75,4 | 73,8 | 12,7 | 82,8 | 1 659 |
| 3-4 | 4,7 | 86,2 | 85,4 | 21,3 | 91,4 | 1 580 |
| 5-9 | 4,8 | 90,4 | 84,2 | 25,4 | 93,7 | 3 601 |
| 10-14 | 5,4 | 90,7 | 74,6 | 26,0 | 92,7 | 2 761 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 3,7 | 89,5 | 84,1 | 19,4 | 93,8 | 514 |
| Autres villes | 4,7 | 87,2 | 81,0 | 21,9 | 91,0 | 3 471 |
| Ensemble urbain | 4,6 | 87,5 | 81,4 | 21,5 | 91,3 | 3 985 |
| Rural | 5,8 | 87,0 | 78,7 | 23,5 | 91,0 | 5 615 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 17,3 | 70,8 | 72,4 | 24,9 | 78,5 | 943 |
| Atacora | 4,2 | 87,6 | 76,8 | 35,7 | 91,8 | 696 |
| Atlantique | 1,3 | 94,9 | 88,5 | 29,8 | 97,6 | 1 241 |
| Borgou | 7,9 | 85,2 | 72,0 | 15,1 | 88,6 | 1 100 |
| Collines | 3,4 | 90,9 | 83,0 | 18,5 | 94,6 | 624 |
| Couffo | 7,8 | 88,2 | 73,0 | 13,0 | 91,6 | 759 |
| Donga | 4,8 | 75,0 | 66,3 | 22,8 | 80,7 | 554 |
| Littoral | 3,7 | 89,5 | 84,1 | 19,4 | 93,8 | 514 |
| Mono | 3,1 | 91,3 | 82,4 | 33,3 | 93,6 | 524 |
| Ouémé | 1,9 | 90,5 | 86,7 | 21,8 | 94,3 | 1 044 |
| Plateau | 1,8 | 94,0 | 86,8 | 19,0 | 97,4 | 674 |
| Zou | 4,5 | 87,4 | 82,1 | 20,6 | 90,6 | 928 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucun | 6,1 | 86,3 | 80,1 | 24,8 | 90,3 | 4 856 |
| Primaire | 3,0 | 88,9 | 85,5 | 24,0 | 92,9 | 1 450 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,5 | 86,3 | 82,5 | 18,0 | 90,7 | 788 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 2,9 | 85,7 | 84,5 | 14,1 | 93,4 | 285 |
| Mère ne vit pas dans le ménage | 5,9 | 88,5 | 74,0 | 20,0 | 91,6 | 2 207 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 8,5 | 83,2 | 74,8 | 24,5 | 87,5 | 1 832 |
| Second | 6,4 | 86,4 | 77,8 | 24,1 | 90,6 | 1 892 |
| Moyen | 4,4 | 87,9 | 80,1 | 24,2 | 91,9 | 1 906 |
| Quatrième | 4,5 | 88,5 | 82,0 | 22,0 | 91,7 | 1 970 |
| Le plus élevé | 3,2 | 89,6 | 83,9 | 18,9 | 93,8 | 2 000 |
| Ensemble ⁵ | 5,3 | 87,2 | 79,8 | 22,7 | 91,2 | 9 600 |

¹ Les « sanctions non violentes » comprennent seulement une ou plusieurs des catégories suivantes : a) on lui a retiré des privilèges ; b) on a expliqué à l'enfant pourquoi son comportement n'est pas acceptable ; c) on a donné à l'enfant autre chose à faire.

² Les « agressions psychologiques » comprennent seulement une ou plusieurs des catégories suivantes : a) On a crié ou hurlé sur l'enfant, b) on a traité l'enfant d'idiot, de paresseux, ou d'un autre nom.

³ Les « châtements corporels » comprennent une ou plusieurs des catégories suivantes : a) On a secoué l'enfant, b) on l'a frappé ou tapé sur les fesses avec les mains nues, c) on l'a frappé sur les fesses ou ailleurs sur le corps avec quelque chose tel qu'une ceinture, une brosse à cheveux, un bâton ou autre objet dur, d) on l'a frappé ou giflé sur le visage, la tête ou les oreilles, e) on l'a frappé ou tapé sur les mains, les bras ou les jambes, f) on l'a frappé encore et encore aussi fort que possible.

⁴ Les formes très violentes de « châtements corporels » comprennent uniquement l'une ou les deux catégories suivantes : a) on a frappé ou giflé l'enfant sur le visage, la tête ou les oreilles, b) on l'a frappé aussi fort que possible.

⁵ Y compris 14 enfants de 1-14 ans qui travaillent pour lesquelles l'information sur le niveau d'instruction de la mère est manquante.

Tableau 18.4 Opinion concernant les châtiments corporels

Pourcentage d'enquêtés ayant participé au module sur la discipline de l'enfant de 1-14 ans qui pensent que le recours à des châtiments corporels est justifié pour élever, et éduquer correctement un enfant, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enquêtés qui pensent que l'enfant a besoin de punition physique | Effectif d'enquêtés ayant répondu au module sur la discipline des enfants |
|--|---|---|
| Sexe de l'enquêté | | |
| Masculin | 32,2 | 5 031 |
| Féminin | 34,6 | 4 569 |
| Âge de l'enquêté | | |
| <25 | 30,6 | 849 |
| 25-39 | 33,6 | 4 379 |
| 40-59 | 34,2 | 3 184 |
| 60 et plus | 31,8 | 1 188 |
| Résidence | | |
| Cotonou | 38,2 | 514 |
| Autres villes | 33,6 | 3 471 |
| Ensemble urbain | 34,2 | 3 985 |
| Rural | 32,7 | 5 615 |
| Département | | |
| Alibori | 38,6 | 943 |
| Atacora | 39,2 | 696 |
| Atlantique | 47,8 | 1 241 |
| Borgou | 28,7 | 1 100 |
| Collines | 33,6 | 624 |
| Couffo | 22,0 | 759 |
| Donga | 16,6 | 554 |
| Littoral | 38,2 | 514 |
| Mono | 22,8 | 524 |
| Ouémé | 46,1 | 1 044 |
| Plateau | 25,3 | 674 |
| Zou | 23,6 | 928 |
| Niveau d'instruction de l'enquêté | | |
| Aucun | 33,5 | 5 337 |
| Primaire | 34,3 | 2 234 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 31,9 | 1 207 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 29,4 | 492 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 32,8 | 1 832 |
| Second | 33,7 | 1 892 |
| Moyen | 31,7 | 1 906 |
| Quatrième | 32,1 | 1 970 |
| Le plus élevé | 36,1 | 2 000 |
| Ensemble ¹ | 33,3 | 9 600 |

¹ Y compris 13 enquêtés qui ont répondu au module sur la discipline des enfants pour lesquels l'information sur le niveau d'instruction de l'enquêté est manquant

Tableau 18.5 Implication des enfants de 5-17 ans dans l'activité économique

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans impliqués dans l'activité économique au cours de la semaine avant l'interview, en fonction du groupe d'âges, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans l'activité économique | | Pourcentage d'enfants de 12-14 ans impliqués dans : | | | Pourcentage d'enfants de 15-17 ans impliqués dans : | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | pour au moins 1 heure | Effectif d'enfants de 5-11 ans | Activité économique pour moins de 14 heures | Activité économique pour 14 heures ou plus | Effectif d'enfants de 12-14 ans | Activité économique pour moins de 43 heures | Activité économique pour 43 heures ou plus | Effectif d'enfants de 15-17 ans |
| Sexe de l'enfant | | | | | | | | |
| Masculin | 21,9 | 2 370 | 28,1 | 11,2 | 776 | 34,6 | 8,9 | 636 |
| Féminin | 20,1 | 2 395 | 25,9 | 12,0 | 820 | 36,4 | 4,9 | 627 |
| Résidence | | | | | | | | |
| Cotonou | 4,0 | 243 | 10,3 | 4,1 | 97 | 18,8 | 2,7 | 83 |
| Autres villes | 16,4 | 1 691 | 20,9 | 7,3 | 587 | 29,5 | 5,0 | 468 |
| Ensemble urbain | 14,8 | 1 933 | 19,4 | 6,8 | 683 | 27,9 | 4,6 | 552 |
| Rural | 25,2 | 2 832 | 32,6 | 15,1 | 913 | 41,4 | 8,7 | 711 |
| Département | | | | | | | | |
| Alibori | 34,8 | 504 | 26,4 | 28,9 | 126 | 53,1 | 14,5 | 100 |
| Atacora | 22,5 | 358 | 31,2 | 22,4 | 111 | 36,3 | 11,0 | 101 |
| Atlantique | 11,6 | 628 | 21,8 | 7,1 | 211 | 27,6 | 1,4 | 174 |
| Borgou | 28,5 | 543 | 34,3 | 14,0 | 173 | 47,6 | 15,0 | 125 |
| Collines | 29,9 | 308 | 41,4 | 14,3 | 104 | 49,0 | 1,5 | 126 |
| Couffo | 34,1 | 412 | 34,6 | 17,4 | 132 | 44,8 | 12,4 | 104 |
| Donga | 16,7 | 281 | 30,7 | 9,1 | 87 | 27,1 | 7,6 | 50 |
| Littoral | 4,0 | 243 | 10,3 | 4,1 | 97 | 18,8 | 2,7 | 83 |
| Mono | 25,5 | 273 | 39,3 | 3,3 | 80 | 39,6 | 4,0 | 68 |
| Ouémé | 6,7 | 447 | 12,0 | 5,4 | 195 | 13,7 | 6,8 | 125 |
| Plateau | 18,2 | 326 | 31,2 | 6,7 | 112 | 37,5 | 6,2 | 61 |
| Zou | 15,3 | 443 | 24,6 | 8,2 | 167 | 32,2 | 3,2 | 145 |
| Fréquentation scolaire | | | | | | | | |
| Oui | 18,9 | 3 315 | 26,2 | 7,7 | 1 304 | 33,4 | 4,9 | 1 017 |
| Non | 25,8 | 1 450 | 30,3 | 28,6 | 292 | 44,5 | 15,2 | 244 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | |
| Le plus bas | 31,4 | 960 | 39,9 | 19,5 | 267 | 41,6 | 13,1 | 210 |
| Second | 28,3 | 974 | 32,3 | 20,4 | 312 | 49,9 | 7,9 | 239 |
| Moyen | 22,7 | 970 | 35,3 | 12,9 | 286 | 42,7 | 6,5 | 257 |
| Quatrième | 14,9 | 920 | 23,8 | 4,1 | 360 | 30,9 | 7,0 | 268 |
| Le plus élevé | 7,1 | 941 | 9,6 | 4,6 | 370 | 17,2 | 1,8 | 290 |
| Ensemble ¹ | 21,0 | 4 765 | 27,0 | 11,6 | 1 596 | 35,5 | 6,9 | 1 263 |

¹ Y compris un enfant de 15-17 ans pour lequel l'information sur la fréquentation scolaire est manquante.

Tableau 18.6 Implication des enfants de 5-17 ans dans les travaux domestiques

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans impliqués dans les travaux domestiques au cours de la semaine avant l'interview, en fonction du groupe d'âges, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans : | | | Pourcentage d'enfants de 12-14 ans impliqués dans : | | | Pourcentage d'enfants de 15-17 ans impliqués dans : | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | Travaux domestiques pour moins de 28 heures | Travaux domestiques pour 28 heures ou plus | Effectif d'enfants de 5-11 ans | Travaux domestiques pour moins de 28 heures | Travaux domestiques pour 28 heures ou plus | Effectif d'enfants de 12-14 ans | Travaux domestiques pour moins de 43 heures | Travaux domestiques pour 43 heures ou plus | Effectif d'enfants de 15-17 ans |
| | | | | | | | | | |
| Sexe de l'enfant | | | | | | | | | |
| Masculin | 60,3 | 7,5 | 2 370 | 75,3 | 11,3 | 776 | 79,4 | 7,2 | 636 |
| Féminin | 68,5 | 12,6 | 2 395 | 76,0 | 18,5 | 820 | 80,2 | 14,9 | 627 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 70,1 | 2,3 | 243 | 86,8 | 4,9 | 97 | 84,2 | 7,3 | 83 |
| Autres villes | 66,1 | 7,4 | 1 691 | 81,0 | 9,8 | 587 | 80,4 | 9,5 | 468 |
| Ensemble urbain | 66,6 | 6,8 | 1 933 | 81,9 | 9,1 | 683 | 80,9 | 9,2 | 552 |
| Rural | 62,9 | 12,3 | 2 832 | 71,1 | 19,4 | 913 | 78,9 | 12,5 | 711 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 42,4 | 24,2 | 504 | 45,4 | 34,3 | 126 | 59,6 | 20,0 | 100 |
| Atacora | 53,3 | 16,5 | 358 | 57,3 | 26,7 | 111 | 57,3 | 27,8 | 101 |
| Atlantique | 79,6 | 2,3 | 628 | 89,3 | 7,5 | 211 | 92,8 | 0,0 | 174 |
| Borgou | 47,3 | 18,4 | 543 | 58,3 | 24,7 | 173 | 61,2 | 21,1 | 125 |
| Collines | 75,5 | 5,7 | 308 | 83,5 | 9,9 | 104 | 93,3 | 5,3 | 126 |
| Couffo | 74,3 | 9,8 | 412 | 75,6 | 18,3 | 132 | 88,9 | 8,6 | 104 |
| Donga | 44,4 | 14,2 | 281 | 67,4 | 20,2 | 87 | 63,6 | 17,4 | 50 |
| Littoral | 70,1 | 2,3 | 243 | 86,8 | 4,9 | 97 | 84,2 | 7,3 | 83 |
| Mono | 81,5 | 1,8 | 273 | 91,1 | 6,7 | 80 | 85,8 | 8,8 | 68 |
| Ouémé | 69,2 | 1,2 | 447 | 86,3 | 1,9 | 195 | 80,2 | 8,2 | 125 |
| Plateau | 73,2 | 6,8 | 326 | 91,1 | 5,2 | 112 | 86,7 | 12,3 | 61 |
| Zou | 68,9 | 10,8 | 443 | 74,7 | 21,6 | 167 | 88,8 | 7,5 | 145 |
| Fréquentation scolaire | | | | | | | | | |
| Oui | 70,0 | 7,9 | 3 315 | 79,5 | 12,3 | 1 304 | 81,8 | 9,7 | 1 017 |
| Non | 51,7 | 14,9 | 1 450 | 58,8 | 26,9 | 292 | 71,3 | 16,9 | 244 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 56,0 | 17,3 | 960 | 64,3 | 22,6 | 267 | 67,9 | 18,7 | 210 |
| Second | 62,2 | 13,0 | 974 | 68,4 | 20,7 | 312 | 76,5 | 14,1 | 239 |
| Moyen | 65,4 | 10,4 | 970 | 74,3 | 17,6 | 286 | 80,4 | 11,8 | 257 |
| Quatrième | 69,4 | 5,6 | 920 | 81,6 | 9,0 | 360 | 84,1 | 7,5 | 268 |
| Le plus élevé | 69,4 | 3,6 | 941 | 85,4 | 8,6 | 370 | 86,7 | 5,7 | 290 |
| Ensemble ¹ | 64,4 | 10,1 | 4 765 | 75,7 | 15,0 | 1 596 | 79,8 | 11,1 | 1 263 |

¹ Y compris un enfant de 15-17 ans pour lequel l'information sur la fréquentation scolaire est manquante.

Tableau 18.7 Travail des enfants

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans (population de droit) impliqués dans l'activité économique ou les travaux domestiques au cours de la semaine avant l'interview, pourcentage d'enfants exposés aux travaux dangereux au cours de la semaine avant l'interview et pourcentage d'enfants de 5-17 ans (population de droit) impliqués dans le travail des enfants au cours de la semaine avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants impliqués dans l'activité économique pour un total d'heures : | | Pourcentage d'enfants impliqués dans les travaux domestiques pour un total d'heures : | | Pourcentage d'enfants exposés à du travail dangereux ³ | Ensemble du travail des enfants ⁴ | Effectif d'enfants de 5-17 ans |
|--|---|--|---|--|---|--|--------------------------------|
| | En dessous du seuil spécifique à l'âge ¹ | Au-dessus du seuil d'âge spécifique ¹ | En dessous du seuil d'âge spécifique ² | Au-dessus du seuil d'âge spécifique ² | | | |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 14,8 | 17,9 | 70,0 | 7,0 | 23,7 | 32,6 | 3 782 |
| Féminin | 14,5 | 16,1 | 75,3 | 11,8 | 22,5 | 33,2 | 3 842 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 8,5 | 4,0 | 79,8 | 2,5 | 7,3 | 10,9 | 423 |
| Autres villes | 12,0 | 12,7 | 75,1 | 6,7 | 16,4 | 24,9 | 2 746 |
| Ensemble urbain | 11,5 | 11,6 | 75,7 | 6,1 | 15,2 | 23,1 | 3 168 |
| Rural | 16,8 | 20,9 | 70,5 | 11,8 | 28,7 | 39,9 | 4 456 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | 19,3 | 31,4 | 50,8 | 22,6 | 32,8 | 54,9 | 730 |
| Atacora | 14,2 | 21,6 | 62,4 | 15,5 | 27,5 | 42,2 | 570 |
| Atlantique | 10,8 | 9,0 | 85,1 | 3,0 | 14,1 | 19,2 | 1 013 |
| Borgou | 19,4 | 24,2 | 57,4 | 17,0 | 32,6 | 46,3 | 841 |
| Collines | 21,2 | 20,2 | 82,8 | 5,2 | 34,9 | 39,0 | 538 |
| Couffo | 14,7 | 27,7 | 78,6 | 10,0 | 30,7 | 41,3 | 648 |
| Donga | 10,6 | 14,2 | 55,9 | 13,7 | 13,6 | 32,8 | 418 |
| Littoral | 8,5 | 4,0 | 79,8 | 2,5 | 7,3 | 10,9 | 423 |
| Mono | 18,5 | 18,3 | 86,3 | 2,4 | 24,5 | 31,5 | 421 |
| Ouémé | 7,1 | 6,5 | 78,6 | 1,2 | 9,5 | 11,7 | 768 |
| Plateau | 14,2 | 14,2 | 80,4 | 5,6 | 22,0 | 29,4 | 498 |
| Zou | 16,9 | 11,4 | 76,1 | 11,1 | 24,8 | 33,6 | 755 |
| Fréquentation scolaire | | | | | | | |
| Oui | 14,5 | 14,0 | 77,6 | 7,5 | 20,1 | 28,9 | 5 636 |
| Non | 15,0 | 25,6 | 58,7 | 14,9 | 31,6 | 44,4 | 1 986 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 17,0 | 27,2 | 64,0 | 15,8 | 34,1 | 49,1 | 1 437 |
| Second | 18,1 | 24,0 | 69,4 | 12,5 | 30,8 | 43,0 | 1 525 |
| Moyen | 17,6 | 18,2 | 73,0 | 10,0 | 27,7 | 37,3 | 1 512 |
| Quatrième | 13,6 | 11,2 | 77,5 | 5,4 | 17,0 | 24,2 | 1 548 |
| Le plus élevé | 7,4 | 5,7 | 78,6 | 4,1 | 7,4 | 13,1 | 1 601 |
| Ensemble ⁵ | 14,6 | 17,0 | 72,7 | 9,4 | 23,1 | 32,9 | 7 624 |

¹ Selon la définition de l'UNICEF, le seuil se situe à 1 heure d'activité économique pour les enfants de 5-11 ans, 14 heures d'activité économique pour les enfants de 12-14 ans, et 43 heures d'activité économique pour les enfants de 15-17 ans.

² Selon la définition de l'UNICEF, le seuil se situe à 28 heures de tâches domestiques pour les enfants de 5-11 ans et 12-14 ans, et 43 heures de tâches domestiques pour les enfants de 15-17 ans.

³ Selon la définition de l'UNICEF, les enfants travaillant dans des conditions dangereuses sont ceux qui, dans le cadre de leur travail : a) portent des charges lourdes ; ou b) travaillent avec des outils dangereux ou font fonctionner de grosses machines ; ou c) sont exposés à la poussière, à la fumée ou au gaz ; ou d) sont exposés au froid, à la chaleur ou à de l'humidité extrême ; e) sont exposés à des bruits intenses ou des vibrations ; f) sont exposés à un travail en hauteur ; g) sont exposés à des produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou à des explosifs ; h) sont exposés à d'autres choses, procédés ou conditions mauvaises pour sa santé ou sa sécurité.

⁴ Selon la définition de l'UNICEF, sont inclus dans cette catégorie les enfants qui a) participent à des activités économiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ; ou b) participent à des tâches domestiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ; ou c) qui travaillent dans des conditions dangereuses.

⁵ Y compris 2 enfants de 15-17 ans qui travaillent pour lesquels l'information sur la fréquentation scolaire est manquante.

Tableau 18.8 Éducation de la petite enfance

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire, une classe d'éveil, un jardin d'enfants ou une garderie communautaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire | Effectif d'enfants de 36-59 mois |
|--|--|----------------------------------|
| Sexe | | |
| Masculin | 18,4 | 1 041 |
| Féminin | 20,0 | 972 |
| Âge en mois | | |
| 36-47 mois | 11,5 | 1 081 |
| 48-59 mois | 28,1 | 931 |
| Résidence | | |
| Cotonou | 54,9 | 88 |
| Autres villes | 28,0 | 706 |
| Ensemble urbain | 31,0 | 794 |
| Rural | 11,5 | 1 218 |
| Département | | |
| Alibori | 6,9 | 281 |
| Atacora | 7,8 | 193 |
| Atlantique | 22,7 | 240 |
| Borgou | 11,5 | 276 |
| Collines | 21,9 | 139 |
| Couffo | 5,7 | 124 |
| Donga | 27,7 | 119 |
| Littoral | 54,9 | 88 |
| Mono | 16,8 | 87 |
| Ouémé | 36,5 | 185 |
| Plateau | 16,6 | 115 |
| Zou | 27,7 | 166 |
| Niveau d'instruction de la mère | | |
| Aucun | 12,0 | 1 390 |
| Primaire | 24,0 | 345 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 38,4 | 200 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 77,1 | 78 |
| Quintiles de bien-être économique | | |
| Le plus bas | 5,1 | 480 |
| Second | 6,7 | 418 |
| Moyen | 15,0 | 384 |
| Quatrième | 26,8 | 372 |
| Le plus élevé | 49,4 | 358 |
| Ensemble | 19,2 | 2 013 |

Tableau 18.9 Soutien à l'apprentissage

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois avec qui un membre adulte du ménage a effectué des activités qui favorisent l'apprentissage et la préparation à l'école au cours des trois derniers jours, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans 4 ou plus activités ¹ | | | Pourcentage d'enfants avec qui le père biologique s'est engagé dans 4 ou plus activités ² | | | Pourcentage d'enfants avec qui la mère biologique s'est engagée dans 4 ou plus activités ³ | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|-------|
| | Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage | Nombre d'enfants de 36-59 mois | Nombre d'activités avec le père biologique | Nombre moyen d'activités avec le père biologique | Nombre d'enfants de 36-59 mois vivant avec leur père biologique | Nombre d'activités avec la mère biologique | Nombre moyen d'activités avec la mère biologique | Nombre d'enfants de 36-59 mois vivant avec leur mère biologique | |
| Sexe | | | | | | | | | |
| Masculin | 41,1 | 3,0 | 1 041 | 4,3 | 0,6 | 842 | 16,8 | 1,6 | 1 041 |
| Féminin | 41,7 | 3,0 | 972 | 4,2 | 0,6 | 788 | 19,1 | 1,7 | 968 |
| Âge en mois | | | | | | | | | |
| 36-47 mois | 40,6 | 3,0 | 1 081 | 4,7 | 0,6 | 887 | 18,8 | 1,8 | 1 080 |
| 48-59 mois | 42,3 | 3,0 | 931 | 3,6 | 0,6 | 743 | 16,9 | 1,5 | 928 |
| Résidence | | | | | | | | | |
| Cotonou | 69,3 | 4,0 | 88 | 18,1 | 1,4 | 66 | 31,0 | 2,2 | 88 |
| Autres villes | 47,5 | 3,3 | 706 | 6,1 | 0,8 | 566 | 19,6 | 1,7 | 706 |
| Ensemble urbain | 49,9 | 3,4 | 794 | 7,3 | 0,8 | 632 | 20,9 | 1,8 | 794 |
| Rural | 35,9 | 2,7 | 1 218 | 2,2 | 0,5 | 998 | 15,9 | 1,6 | 1 214 |
| Département | | | | | | | | | |
| Alibori | 45,2 | 3,2 | 281 | 2,0 | 0,3 | 252 | 37,9 | 2,4 | 281 |
| Atacora | 27,2 | 2,0 | 193 | 2,0 | 0,4 | 157 | 11,9 | 1,2 | 190 |
| Atlantique | 37,1 | 2,9 | 240 | 10,5 | 0,9 | 177 | 16,2 | 1,6 | 240 |
| Borgou | 47,0 | 3,2 | 276 | 3,1 | 0,5 | 243 | 12,7 | 1,4 | 276 |
| Collines | 44,1 | 2,7 | 139 | 1,5 | 0,4 | 110 | 10,0 | 1,0 | 139 |
| Couffo | 21,1 | 1,9 | 124 | 0,0 | 0,2 | 90 | 3,6 | 0,9 | 124 |
| Donga | 44,5 | 3,6 | 119 | 0,0 | 0,4 | 113 | 8,7 | 1,4 | 119 |
| Littoral | 69,3 | 4,0 | 88 | 18,1 | 1,4 | 66 | 31,0 | 2,2 | 88 |
| Mono | 46,7 | 3,6 | 87 | 6,5 | 0,8 | 57 | 8,9 | 1,3 | 87 |
| Ouémé | 40,2 | 2,9 | 185 | 2,9 | 0,7 | 142 | 12,0 | 1,3 | 185 |
| Plateau | 56,1 | 3,7 | 115 | 5,4 | 1,1 | 95 | 28,3 | 2,5 | 115 |
| Zou | 32,6 | 2,9 | 166 | 6,2 | 1,1 | 127 | 22,7 | 2,3 | 165 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | |
| Aucun | 35,5 | 2,7 | 1 390 | 1,8 | 0,5 | 1 178 | 14,9 | 1,5 | 1 388 |
| Primaire | 44,9 | 3,2 | 345 | 6,6 | 0,8 | 258 | 16,0 | 1,6 | 342 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 61,3 | 3,8 | 200 | 13,4 | 1,3 | 138 | 29,1 | 2,3 | 200 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 80,7 | 4,7 | 78 | 21,7 | 1,9 | 56 | 49,7 | 3,1 | 78 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Le plus bas | 37,0 | 2,7 | 480 | 1,7 | 0,4 | 406 | 19,4 | 1,7 | 480 |
| Second | 30,1 | 2,5 | 418 | 2,0 | 0,4 | 337 | 14,4 | 1,4 | 416 |
| Moyen | 36,2 | 2,8 | 384 | 2,1 | 0,5 | 303 | 13,5 | 1,4 | 383 |
| Quatrième | 48,1 | 3,3 | 372 | 6,3 | 0,8 | 295 | 15,8 | 1,6 | 372 |
| Le plus élevé | 59,4 | 3,8 | 358 | 10,4 | 1,2 | 291 | 26,7 | 2,2 | 358 |
| Ensemble | 41,4 | 3,0 | 2 013 | 4,2 | 0,6 | 1 630 | 17,9 | 1,7 | 2 009 |

¹ Indicateur MICS 6.2 - support à l'apprentissage

² Indicateur MICS 6.3 - support du père à l'apprentissage

³ Indicateur MICS 6.4 - support de la mère à l'apprentissage

Tableau 18.10 Matériel d'apprentissage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livres d'enfants disponibles dans le ménage et selon les objets avec lesquels l'enfant joue, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants vivant dans un ménage qui a : | | Pourcentage d'enfants qui jouent avec : | | | | Effectif d'enfants de moins de 5 ans |
|--|---|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | 3 livres d'enfants ou plus ¹ | 10 livres d'enfants ou plus | Jouets fabriqués à la maison | Jouets de magasin | Objets du ménage ou trouvés dehors | Deux types de jouets ou plus ² | |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 1,7 | 0,1 | 52,6 | 42,3 | 69,1 | 55,1 | 2 110 |
| Féminin | 1,4 | 0,2 | 50,2 | 44,5 | 68,8 | 54,2 | 2 045 |
| Âge | | | | | | | |
| 0-23 mois | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 35,2 | 50,9 | 41,2 | 1 261 |
| 24-59 mois | 2,2 | 0,2 | 56,4 | 46,9 | 76,8 | 60,6 | 2 895 |
| Résidence | | | | | | | |
| Cotonou | 8,5 | 0,8 | 62,5 | 73,9 | 62,8 | 68,9 | 176 |
| Autres villes | 2,6 | 0,2 | 57,1 | 52,8 | 67,4 | 61,3 | 1 461 |
| Ensemble urbain | 3,3 | 0,3 | 57,6 | 55,1 | 66,9 | 62,1 | 1 637 |
| Rural | 0,4 | 0,0 | 47,3 | 35,7 | 70,3 | 49,8 | 2 519 |
| Département | | | | | | | |
| Alibori | 0,5 | 0,0 | 33,8 | 26,2 | 56,5 | 33,8 | 583 |
| Atacora | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 36,9 | 86,6 | 52,5 | 378 |
| Atlantique | 3,3 | 0,7 | 53,0 | 55,3 | 71,6 | 58,4 | 478 |
| Borgou | 0,7 | 0,0 | 59,9 | 42,3 | 76,8 | 62,8 | 559 |
| Collines | 0,9 | 0,0 | 70,6 | 48,0 | 53,8 | 64,6 | 283 |
| Couffo | 0,5 | 0,0 | 45,0 | 23,3 | 64,9 | 46,5 | 267 |
| Donga | 1,8 | 0,0 | 49,2 | 46,9 | 78,9 | 50,3 | 270 |
| Littoral | 8,5 | 0,8 | 62,5 | 73,9 | 62,8 | 68,9 | 176 |
| Mono | 0,5 | 0,0 | 45,7 | 39,3 | 57,4 | 49,2 | 176 |
| Ouémé | 2,0 | 0,0 | 56,4 | 51,4 | 73,9 | 65,7 | 369 |
| Plateau | 2,0 | 0,0 | 45,0 | 33,9 | 59,4 | 45,4 | 256 |
| Zou | 1,0 | 0,0 | 57,0 | 57,6 | 72,7 | 65,8 | 362 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucun | 0,4 | 0,0 | 48,6 | 36,0 | 70,9 | 50,8 | 2 656 |
| Primaire | 0,9 | 0,0 | 55,4 | 49,9 | 70,9 | 60,2 | 778 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,5 | 0,0 | 57,7 | 58,4 | 63,3 | 62,4 | 515 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 10,9 | 2,2 | 57,4 | 76,2 | 51,3 | 64,0 | 206 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | | |
| Le plus bas | 0,1 | 0,0 | 38,7 | 23,8 | 69,2 | 39,0 | 933 |
| Second | 0,1 | 0,0 | 50,3 | 32,2 | 70,7 | 51,7 | 862 |
| Moyen | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 39,9 | 73,6 | 57,4 | 798 |
| Quatrième | 1,3 | 0,0 | 55,0 | 53,4 | 66,9 | 58,8 | 816 |
| Le plus élevé | 6,8 | 0,6 | 60,2 | 73,3 | 63,9 | 70,2 | 747 |
| Ensemble | 1,5 | 0,1 | 51,4 | 43,4 | 68,9 | 54,7 | 4 156 |

¹ Indicateur MICS 6.5

² Indicateur MICS 6.6

Tableau 18.11 Encadrement inapproprié des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure au moins une fois au cours de la semaine avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans : | | | Effectif d'enfants de moins de 5 ans |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| | Laissés seuls au cours de la semaine avant l'interview | Laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans au cours de la semaine avant l'interview | Laissés sans soins appropriés au cours de la semaine avant l'interview ¹ | |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 24,2 | 18,3 | 28,2 | 2 110 |
| Féminin | 24,4 | 18,3 | 29,6 | 2 045 |
| Âge | | | | |
| 0-23 mois | 13,9 | 11,1 | 17,5 | 1 261 |
| 24-59 mois | 28,8 | 21,4 | 33,8 | 2 895 |
| Résidence | | | | |
| Cotonou | 25,6 | 14,5 | 29,9 | 176 |
| Autres villes | 22,9 | 15,8 | 25,4 | 1 461 |
| Ensemble urbain | 23,2 | 15,7 | 25,9 | 1 637 |
| Rural | 25,0 | 20,0 | 30,8 | 2 519 |
| Département | | | | |
| Alibori | 27,5 | 28,6 | 34,7 | 583 |
| Atacora | 17,8 | 19,0 | 25,0 | 378 |
| Atlantique | 16,5 | 11,4 | 21,9 | 478 |
| Borgou | 32,5 | 29,1 | 36,9 | 559 |
| Collines | 16,3 | 6,8 | 19,6 | 283 |
| Couffo | 33,4 | 13,8 | 35,1 | 267 |
| Donga | 12,1 | 17,7 | 20,4 | 270 |
| Littoral | 25,6 | 14,5 | 29,9 | 176 |
| Mono | 39,6 | 23,4 | 43,4 | 176 |
| Ouémé | 17,5 | 9,9 | 19,5 | 369 |
| Plateau | 38,4 | 20,3 | 40,4 | 256 |
| Zou | 21,3 | 12,7 | 23,1 | 362 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucun | 26,4 | 21,1 | 31,7 | 2 656 |
| Primaire | 21,3 | 15,4 | 25,8 | 778 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 20,1 | 10,6 | 22,0 | 515 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 18,9 | 12,5 | 21,2 | 206 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 29,2 | 26,0 | 36,2 | 933 |
| Second | 27,8 | 20,9 | 32,4 | 862 |
| Moyen | 23,4 | 16,6 | 27,2 | 798 |
| Quatrième | 20,2 | 15,1 | 25,1 | 816 |
| Le plus élevé | 19,7 | 11,0 | 21,6 | 747 |
| Ensemble | 24,3 | 18,3 | 28,9 | 4 156 |

¹ l'encadrement inapproprié des enfants signifie que l'enfant a été laissé seul ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans plus d'une heure au moins une fois la semaine dernière.

Tableau 18.12 Index de développement du jeune enfant

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont en bonne voie de développement dans les domaines de l'alphabétisation/calcul, physique, social/émotionnel, et dans le domaine de l'apprentissage, et score de l'indice de développement des jeunes enfants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage d'enfants de 36-59 mois en bonne voie de développement dans les domaines de : | | | | Score de l'indice de développement des jeunes enfants ⁵ | Effectif d'enfants de 36-59 mois |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| | Alphabétisation/calcul ¹ | Physique ² | Social-émotionnel ³ | Apprentissage ⁴ | | |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 9,9 | 91,8 | 68,8 | 77,5 | 55,3 | 1 041 |
| Féminin | 9,5 | 91,3 | 74,7 | 76,2 | 57,7 | 972 |
| Âge en mois | | | | | | |
| 36-47 mois | 5,3 | 90,1 | 73,6 | 74,5 | 52,8 | 1 081 |
| 48-59 mois | 14,9 | 93,2 | 69,4 | 79,6 | 60,7 | 931 |
| Résidence | | | | | | |
| Cotonou | 37,6 | 92,7 | 59,9 | 84,1 | 67,9 | 88 |
| Autres villes | 14,4 | 91,5 | 71,2 | 78,2 | 57,9 | 706 |
| Ensemble urbain | 17,0 | 91,6 | 69,9 | 78,9 | 59,0 | 794 |
| Rural | 5,0 | 91,5 | 72,8 | 75,6 | 54,8 | 1 218 |
| Département | | | | | | |
| Alibori | 1,7 | 92,9 | 81,6 | 56,0 | 48,0 | 281 |
| Atacora | 4,5 | 91,4 | 52,0 | 87,5 | 42,6 | 193 |
| Atlantique | 13,4 | 89,9 | 70,4 | 87,4 | 63,9 | 240 |
| Borgou | 4,8 | 90,1 | 69,8 | 63,7 | 45,1 | 276 |
| Collines | 8,5 | 88,5 | 70,5 | 76,1 | 52,2 | 139 |
| Couffo | 2,7 | 83,1 | 73,0 | 69,8 | 45,4 | 124 |
| Donga | 7,9 | 98,0 | 74,2 | 88,3 | 71,2 | 119 |
| Littoral | 37,6 | 92,7 | 59,9 | 84,1 | 67,9 | 88 |
| Mono | 10,5 | 89,2 | 81,2 | 73,3 | 57,7 | 87 |
| Ouémé | 17,1 | 92,7 | 77,4 | 93,9 | 75,1 | 185 |
| Plateau | 10,0 | 94,7 | 80,5 | 76,8 | 62,4 | 115 |
| Zou | 16,3 | 95,4 | 69,3 | 83,4 | 64,8 | 166 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucun | 4,6 | 90,9 | 70,8 | 73,4 | 51,3 | 1 390 |
| Primaire | 13,2 | 90,4 | 74,1 | 82,7 | 61,9 | 345 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 24,2 | 95,5 | 72,9 | 85,7 | 72,8 | 200 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 47,9 | 97,7 | 73,3 | 91,1 | 82,1 | 78 |
| Quintiles de bien-être économique | | | | | | |
| Le plus bas | 1,9 | 90,5 | 73,2 | 68,9 | 48,3 | 480 |
| Second | 1,7 | 88,5 | 72,4 | 76,0 | 52,2 | 418 |
| Moyen | 5,9 | 93,2 | 69,6 | 74,8 | 52,5 | 384 |
| Quatrième | 13,2 | 90,6 | 73,6 | 81,2 | 62,6 | 372 |
| Le plus élevé | 30,2 | 95,6 | 68,7 | 86,4 | 70,2 | 358 |
| Ensemble | 9,7 | 91,5 | 71,6 | 76,9 | 56,5 | 2 013 |

¹ La bonne voie de développement en alphabétisation/calcul comprend au moins deux de ces conditions : a) l'enfant peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ; b) l'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants ; c) l'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10.

² La bonne voie de développement physique comprend au moins une de ces conditions : a) l'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un bâton ou un caillou ; et b) l'enfant n'est pas parfois trop malade pour jouer.

³ La bonne voie de développement social/émotionnel comprend au moins deux de ces conditions : a) l'enfant s'entend bien avec les autres enfants ; b) l'enfant ne donne pas de coups de pieds, ne mord pas, et ne frappe pas les autres enfants ; c) l'enfant n'est pas facilement distrait.

⁴ La bonne voie de développement en matière d'apprentissage comprend au moins une de ces conditions : a) l'enfant est capable de suivre de simples instructions pour faire quelque chose correctement ; b) quand on donne quelque chose à faire à l'enfant, il est capable de le faire de manière indépendante.

⁵ l'Indicateur MICS 6.6 (indice de développement des jeunes enfants) est le pourcentage d'enfants qui sont en bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines (alphabétisation/calcul, physique, social/émotionnel, et apprentissage)

RÉFÉRENCES

Direction de la Santé de la Mère et l'Enfant (DSME), Ministère de la Santé. 2013. *Plan d'Action National Budgetisé pour le Repositionnement de la Planification Familiale 2014-2018*. Cotonou, Bénin

Direction de la Programmation et de la Prospective, Ministère de la Santé. *Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018*. Cotonou, Bénin

Graham, W., W. Brass, and R. W. Snow. 1989. *Indirect Estimation of Maternal Mortality: The Sisterhood Method*. *Studies in Family Planning* 20(3):125-135.

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) et ICF International. 2013. *Enquête Démographique et de Santé du Bénin, 2011-2012*. Calverton, Maryland, USA : INSAE et ICF International.

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE), Bénin et Macro International Inc. 2007 : *Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-III) Benin 2006*. Calverton, Maryland, USA : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique et Macro International Inc.

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) et ORC Macro. 2002. *Enquête Démographique et de Santé au Bénin, 2001*. Calverton, Maryland, USA : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique et ORC Macro.

Kodjogbé, Nicaise, Gora Mboup, Justin Tossou, Léopoldine de Souza, Timothée Gandaho, Alphonse Guédémé, Thomas Houedokoho, Rafatou Houndékon, Thomas Tohouegnon, Suzanne Zomahoun, Virgile Capo-Chichi, et Andrée Cossi. 1997. *Enquête Démographique et de Santé au Bénin, République de Bénin 1996*. Calverton, Maryland USA : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique et Macro International Inc.

Roll Back Malaria Partnership. 2003. *Monitoring and Evaluation Reference Group Anemia Task Force Meeting Minutes*. Presented at WHO Headquarters. Geneva: 2003 Oct 27-28.

Rutenberg, N., and J. Sullivan. August 5-7, 1991. *Direct and Indirect Estimates of Maternal Mortality from the Sisterhood Method*. Paper presented at the Demographic and Health Surveys World Conference, Washington, DC.

World Health Organization. 2004. *A Strategic Framework for Malaria Prevention and Control during Pregnancy in the African Region*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). 2008. *Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices*. Part I: Definitions. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). 2011. *Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity*. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

A.1 INTRODUCTION

Cette section présente une description des objectifs de l'enquête, de la taille globale de l'échantillon, des domaines d'études ainsi qu'une description des sous-échantillons utilisés. La cinquième enquête démographique et de santé du Bénin en 2017-2018 (EDSB-V 2017-2018) fait suite à celles réalisées en 1996, 2001, 2006 et 2011-2012. Comme les dernières enquêtes, elle a pour objectif principal de recueillir des informations sur les taux de fécondité, de mortalité infantile et infanto-juvénile, sur la connaissance et l'utilisation des méthodes contraceptives et sur la connaissance et les attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Elle visait un échantillon national représentatif d'environ 14 430 ménages sélectionnés avec une procédure de tirage aléatoire à deux degrés. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans vivant de façon permanente dans les ménages sélectionnés, ou présentes la nuit précédant l'enquête étaient éligibles pour être enquêtées, avec un nombre attendu d'environ 13 417 femmes enquêtées avec succès. Les résultats de l'enquête sont présentés pour le Bénin, pour la ville de Cotonou, pour les autres villes, pour le milieu urbain et le milieu rural séparément, et pour chacun des 12 départements administratifs.

Une enquête auprès des hommes était également menée au moment de l'enquête auprès des femmes. Parmi les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des femmes, un ménage sur deux était sélectionné pour l'enquête auprès des hommes. Tous les hommes âgés de 15 à 64 ans vivant de façon permanente dans les ménages sélectionnés, ou présents la nuit précédant l'enquête étaient éligibles pour être enquêtés, avec un nombre attendu d'environ 6 227 hommes enquêtés avec succès. Elle a pour objectif principal de recueillir des informations sur leur connaissance et utilisation des méthodes contraceptives, sur leur connaissance et attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Dans ce sous échantillon de ménages, un module sur des maladies non transmissibles était appliqué à tous les hommes et toutes les femmes éligibles pour l'enquête individuelle. De plus, dans ce sous échantillon, un module sur la violence domestique contre les femmes était appliqué pour une femme par ménage tirée aléatoirement parmi toutes les femmes éligibles dans les ménages.

Dans tous les ménages tirés, tous les enfants de moins de cinq ans étaient pesés et mesurés de façon à déterminer leur état nutritionnel. Dans le sous échantillon de ménages où il n'y a pas de l'enquête auprès des hommes, après obtention d'un consentement éclairé, tous les enfants de 6-59 mois étaient testés pour l'anémie et pour le paludisme. Nous attendons de tester environ 4 500 enfants 6-59 mois.

A.2 BASE DE SONDAGE

L'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) dispose d'un fichier des Zones de Dénombrement (ZD) qui avaient été créé pour les besoins du Recensement Général de la Population et de l'Habitation effectué au Bénin en 2013 (RGPH4 2013). Ce fichier avait été retenu comme base de sondage pour l'EDSB-V 2017-2018. Au Bénin, il y a 12 départements administratifs, chaque département est subdivisé en communes, et chaque commune est subdivisée en arrondissements et chaque arrondissement en villages. Au total, il y a 77 communes et 546 arrondissements. En général, dans le milieu rural, une ZD est un village ou une partie d'un grand village ; dans le milieu urbain, une ZD est un quartier ou une partie de grand quartier. Le type de résidence d'une ZD est défini en fonction de l'effectif de population par le recensement. Au total, le fichier compte 12 633 ZD dont 4 417 se trouvent dans le milieu urbain et 8 216 dans le milieu rural. Chaque ZD a une carte qui délimite sa location et ses limites. Au Bénin en 2013, 44,6 % de la population habitait dans le milieu urbain, elle représentait 49,4 % de ménages. Le **Tableau A.1** ci-dessous présente la répartition de la population par département et selon milieu de résidence. Le **Tableau A.2** ci-dessous présente la répartition de ménages par département et selon milieu de résidence. Le **Tableau A.3** ci-dessous donne la répartition de ZD et de leur taille moyenne en ménages par département et selon

milieu de résidence. La taille moyenne de ZD est de 201 ménages dans le milieu urbain et de 111 dans le milieu rural, avec une taille moyenne globale de 143 ménages par grappe.

Tableau A.1 Répartition de la population par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)

| Département | Population par département et selon milieu | | | Proportion département | Proportion urbaine |
|-------------|--|-----------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Urbain | Rural | Total département | | |
| Alibori | 210 842 | 656 621 | 867 463 | 8,7 | 24,3 |
| Atacora | 287 152 | 485 110 | 772 262 | 7,7 | 37,2 |
| Atlantique | 621 817 | 776 412 | 1 398 229 | 14,0 | 44,5 |
| Borgou | 528 987 | 685 262 | 1 214 249 | 12,1 | 43,6 |
| Collines | 197 122 | 520 355 | 717 477 | 7,2 | 27,5 |
| Couffo | 206 862 | 538 466 | 745 328 | 7,4 | 27,8 |
| Donga | 228 575 | 314 555 | 543 130 | 5,4 | 42,1 |
| Littoral | 679 012 | 0 | 679 012 | 6,8 | 100,0 |
| Mono | 247 239 | 250 004 | 497 243 | 5,0 | 49,7 |
| Oueme | 690 921 | 409 483 | 1 100 404 | 11,0 | 62,8 |
| Plateau | 281 046 | 341 326 | 622 372 | 6,2 | 45,2 |
| Zou | 280 928 | 570 652 | 851 580 | 8,5 | 33,0 |
| Bénin | 4 460 503 | 5 548 246 | 10 008 749 | 100,0 | 44,6 |

Tableau A.2 Répartition de ménages par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)

| Département | Ménages par département et selon milieu | | | Proportion département | Proportion urbaine |
|-------------|---|---------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Urbain | Rural | Total département | | |
| Alibori | 30 462 | 77 889 | 108 351 | 6,0 | 28,1 |
| Atacora | 42 141 | 65 458 | 107 599 | 6,0 | 39,2 |
| Atlantique | 139 111 | 159 658 | 298 769 | 16,6 | 46,6 |
| Borgou | 80 862 | 77 237 | 158 099 | 8,8 | 51,1 |
| Collines | 39 889 | 89 270 | 129 159 | 7,2 | 30,9 |
| Couffo | 43 054 | 97 390 | 140 444 | 7,8 | 30,7 |
| Donga | 28 477 | 37 956 | 66 433 | 3,7 | 42,9 |
| Littoral | 166 433 | 0 | 166 433 | 9,2 | 100,0 |
| Mono | 55 032 | 50 954 | 105 986 | 5,9 | 51,9 |
| Oueme | 149 958 | 82 662 | 232 620 | 12,9 | 64,5 |
| Plateau | 52 933 | 57 599 | 110 532 | 6,1 | 47,9 |
| Zou | 61 638 | 117 060 | 178 698 | 9,9 | 34,5 |
| Bénin | 889 990 | 913 133 | 1 803 123 | 100,0 | 49,4 |

Tableau A.3 Répartition de ZD et de leur taille moyenne en ménages par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)

| Département | Nombre de ZD | | | Taille moyenne de ZD en ménages | | |
|-------------|--------------|-------|----------|---------------------------------|-------|----------|
| | Urbain | Rural | Ensemble | Urbain | Rural | Ensemble |
| Alibori | 187 | 912 | 1 099 | 163 | 85 | 99 |
| Atacora | 261 | 729 | 990 | 161 | 90 | 109 |
| Atlantique | 613 | 1 045 | 1 658 | 227 | 153 | 180 |
| Borgou | 469 | 988 | 1 457 | 172 | 78 | 109 |
| Collines | 200 | 832 | 1 032 | 199 | 107 | 125 |
| Couffo | 208 | 807 | 1 015 | 207 | 121 | 138 |
| Donga | 225 | 475 | 700 | 127 | 80 | 95 |
| Littoral | 637 | 0 | 637 | 261 | 0 | 261 |
| Mono | 324 | 397 | 721 | 170 | 128 | 147 |
| Ouémé | 728 | 625 | 1 353 | 206 | 132 | 172 |
| Plateau | 293 | 527 | 820 | 181 | 109 | 135 |
| Zou | 272 | 879 | 1 151 | 227 | 133 | 155 |
| Bénin | 4 417 | 8 216 | 12 633 | 201 | 111 | 143 |

A.3 PLAN DE SONDAGE ET MISE EN ŒUVRE

La procédure retenue pour le tirage de l'échantillon de l'EDSB-V 2017-2018 est un tirage aléatoire, stratifié et à deux degrés. L'unité primaire de sondage, appelée aussi Grappe, est la ZD. La partie urbaine et la partie rurale de chaque département correspondent chacune à une strate d'échantillonnage. Au total, 23 strates d'échantillonnage ont été créées comme le département Littoral n'a que de milieu urbain. L'échantillon de premier degré avec 555 grappes avait été tiré indépendamment dans chaque strate selon la répartition donnée dans le **Tableau A.4** suivant. Avant le tirage de unités primaires, la base de sondage avait été triée selon le département, le milieu de résidence et ensuite selon la commune, l'arrondissement, le village et le numéro d'ordre de la ZD. La procédure de tirage de l'unité primaire est un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille ; la taille d'une ZD étant le nombre d'habitants résidants dans la ZD. Cette procédure de tirage dans une base triée avait introduit une stratification implicite au niveau de toutes les unités administratives en dessous de département.

Après le tirage au premier degré, une opération de dénombrement et la mise à jour de la carte avait été effectuée dans chacune des 555 ZD tirées dans le premier degré. Elle a pour objectifs d'obtenir le nombre exact de ménages ordinaires résidant dans la ZD ; d'établir un plan de situation et un croquis détaillé de la ZD en marquant ses limites et les localisations de chaque structure trouvée ; et d'enregistrer sur une fiche d'enregistrement la liste complète de ménages à partir de laquelle l'échantillon de ménages avait été tiré au second degré avec un tirage systématique à probabilité égale. En décidant d'enquêter 26 ménages par grappe, le **Tableau A.4** ci-dessous présente la répartition de l'échantillon grappe, les nombres de ménages par département et selon milieu de résidence. Parmi les 555 ZD sélectionnées, 251 sont situées dans le milieu urbain et 304 dans le milieu rural, avec un nombre total de 14 430 ménages à sélectionner dont 6 526 dans le milieu urbain et 7 904 dans le milieu rural.

Tableau A.4 Allocation de l'échantillon grappes et ménages par département et selon milieu de résidence (EDSB-V Bénin 2017-2018)

| Département | Allocation des ZD | | | Nombre de ménages à tirer | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | Urbain | Rural | Région | Urbain | Rural | Région |
| Alibori | 11 | 31 | 42 | 286 | 806 | 1 092 |
| Atacora | 15 | 24 | 39 | 390 | 624 | 1 014 |
| Atlantique | 27 | 38 | 65 | 702 | 988 | 1 690 |
| Borgou | 24 | 32 | 56 | 624 | 832 | 1 456 |
| Collines | 13 | 33 | 46 | 338 | 858 | 1 196 |
| Couffo | 12 | 30 | 42 | 312 | 780 | 1 092 |
| Donga | 13 | 19 | 32 | 338 | 494 | 832 |
| Littoral | 52 | 0 | 52 | 1 352 | 0 | 1 352 |
| Mono | 17 | 20 | 37 | 442 | 520 | 962 |
| Oueme | 34 | 20 | 54 | 884 | 520 | 1 404 |
| Plateau | 17 | 21 | 38 | 442 | 546 | 988 |
| Zou | 16 | 36 | 52 | 416 | 936 | 1 352 |
| Bénin | 251 | 304 | 555 | 6 526 | 7 904 | 14 430 |

Tableau A.5 ci-dessous donne les nombres attendus de femmes de 15-49 ans et hommes 15-64 ans enquêtés avec succès par département et selon milieu de résidence. Au total, le nombre attendu de femmes enquêtées avec succès était 13 417, dont 6 181 dans le milieu urbain et 7 236 dans le milieu rural ; le nombre attendu d'hommes enquêtés avec succès est de 6 227 dont 2 809 dans le milieu urbain et 3 418 dans le milieu rural, tenant compte que l'enquête auprès des hommes était effectué dans un sous échantillon consisté d'un ménage sur deux tirés pour l'enquête auprès des femmes.

Tableau A.5 Allocation de nombres attendus de femmes et hommes enquêtés avec succès par département et selon milieu de résidence (EDSB-V Bénin 2017-2018)

| Département | Nombre attendu de femmes 15-49 ans enquêtées avec succès | | | Nombre attendu d'hommes 15-64 ans enquêtés avec succès | | |
|-------------|---|-------|--------|---|-------|--------|
| | Urbain | Rural | Région | Urbain | Rural | Région |
| Alibori | 269 | 842 | 1 111 | 123 | 348 | 471 |
| Atacora | 385 | 658 | 1 043 | 168 | 270 | 438 |
| Atlantique | 640 | 787 | 1 427 | 302 | 427 | 729 |
| Borgou | 583 | 758 | 1 341 | 269 | 360 | 629 |
| Collines | 278 | 731 | 1 009 | 145 | 371 | 516 |
| Couffo | 289 | 747 | 1 036 | 134 | 338 | 472 |
| Donga | 360 | 533 | 893 | 145 | 213 | 358 |
| Littoral | 1 354 | 0 | 1 354 | 582 | 0 | 582 |
| Mono | 413 | 432 | 845 | 191 | 225 | 416 |
| Oueme | 795 | 474 | 1 269 | 380 | 225 | 605 |
| Plateau | 436 | 529 | 965 | 191 | 236 | 427 |
| Zou | 379 | 745 | 1 124 | 179 | 405 | 584 |
| Bénin | 6 181 | 7 236 | 13 417 | 2 809 | 3 418 | 6 227 |

* Enquête auprès des hommes dans un sous échantillon

Les calculs de l'échantillon étaient basés sur les résultats de l'EDSB-IV en 2011-2012 : le nombre moyen de femmes de 15-49 ans par ménage était 1,05 par ménage dans le milieu urbain et 0,96 par ménage dans le milieu rural ; les taux de réponse des femmes étaient 94,7 % et 96,6 % dans le milieu urbain et le milieu rural, respectivement ; les taux de réponse des ménages étaient 95,6 % et 97,7 % dans le milieu urbain et le milieu rural, respectivement. Pour l'enquête auprès des hommes, le nombre moyen d'hommes 15-64 ans par ménage était 0,99 par ménage dans le milieu urbain, et 0,93 par ménage dans le milieu rural ; les taux de réponse pour les hommes étaient de 92 % et 96,2 % dans le milieu urbain et le milieu rural, respectivement.

A.4 PROBABILITÉS DE SONDAGE ET POIDS DE SONDAGE

À cause de la répartition non proportionnelle de l'échantillon dans les départements et les taux de réponse différentiels, des poids de sondage doivent être utilisés dans toutes les analyses des résultats de l'EDSB-V 2017-2018 pour assurer la représentativité des résultats de l'enquête aussi bien au niveau national qu'au niveau des domaines d'études. Étant donné que l'échantillon de l'EDSB-V 2017-2018 est un échantillon par grappe, stratifié à deux degrés, les poids de sondage sont basés sur les probabilités de sondage calculées séparément pour chaque degré de tirage et pour chaque grappe où :

- P_{1hi} : probabilité de sondage au premier degré de la $i^{ème}$ grappe dans la strate h
- P_{2hi} : probabilité de sondage au deuxième degré dans la $i^{ème}$ grappe (ménages)

Ce qui suit décrit les calculs de ces probabilités.

Soit a_h le nombre de grappes tirées dans la strate h , M_{hi} la taille de mesure (nombre d'habitants) selon la base de sondage dans la $i^{ème}$ grappe et $\sum M_{hi}$ la taille de mesure totale dans la strate. La probabilité de sélectionner la $i^{ème}$ grappe dans la strate h dans l'échantillon de l'EDSB-V 2017-2018 est calculé comme suit :

$$\frac{a_h \times M_{hi}}{\sum M_{hi}}$$

Soit b_{hi} la proportion de ménages dans le segment sélectionné par rapport au nombre total de ménages dans la grappe i de la strate h si la grappe est segmentée, sans quoi $b_{hi} = 1$. Par conséquent, la probabilité de tirer une grappe i dans l'échantillon est :

$$P_{1hi} = \frac{a_h \times M_{hi}}{\sum M_{hi}} \times b_{hi}$$

Soit L_{hi} le nombre de ménages listés lors de l'opération de dénombrement des ménages dans la grappe i de la strate h , et soit g_{hi} le nombre de ménages sélectionnés dans la grappe. La probabilité de tirage au deuxième degré pour chaque ménage dans la grappe est calculée comme suit :

$$P_{2hi} = \frac{g_{hi}}{L_{hi}}$$

La probabilité globale de tirage de chaque ménage dans la grappe i de la strate h dans l'EDSB-V 2017-2018 est donc le produit des probabilités de tirage des deux degrés, soit :

$$P_{hi} = P_{1hi} \times P_{2hi}$$

Le poids de sondage pour chaque ménage dans la grappe i de la strate h est l'inverse de sa probabilité globale de tirage :

$$W_{hi} = 1 / P_{hi}$$

Une feuille de calcul contenant tous les paramètres de sondage et les probabilités de tirage avait été préparée pour faciliter les calculs des poids de sondage. Plusieurs ensembles de poids étaient calculés et cela comme suit :

- Pour l'enquête femmes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les femmes enquêtées ;
- Pour l'enquête hommes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les hommes enquêtés ;
- Pour le module sur la violence domestique contre les femmes, un ensemble de poids selon le nombre de femmes éligibles dans le ménage ;
- Pour le module de travail et de discipline des enfants, un ensemble de poids selon le nombre d'enfants éligibles dans le ménage.

Les poids de sondage avaient été ajustés pour tenir compte des non réponses au niveau du ménage et au niveau d'individu pour les ménages ainsi que pour les femmes et les hommes. Toutes les corrections de non réponses avaient été réalisées au niveau de la strate d'échantillonnage. Les poids de ménages étaient obtenus à partir des poids de sondage multipliés par l'inverse du taux de réponse du ménage par strate. Les poids pour les femmes étaient obtenus à partir des poids de ménages multipliés par l'inverse du taux de réponse individuel de femmes par strate. Les poids pour les hommes étaient obtenus à partir des poids de ménage pour le sous-échantillon pour l'enquête auprès des hommes multipliés par l'inverse du taux de réponse individuel des hommes par strate. Après ajustement pour les non réponses, les poids étaient normalisés pour obtenir les poids standard qui apparaissent dans les fichiers de données. La procédure de normalisation a pour objectif d'obtenir le nombre total de cas pondérés en utilisant des poids normalisés égal au nombre total de cas non pondérés au niveau national, pour le nombre total de ménages, de femmes et d'hommes respectivement. La normalisation consiste à multiplier les poids par le taux de sondage total estimé à partir de l'enquête, pour les poids des ménages, des femmes, et des hommes, respectivement. Les poids normalisés sont des poids relatifs qui sont valides pour l'estimation des moyennes, des proportions, des ratios et des

taux, mais qui ne sont pas valides pour estimer des totaux ou des tailles de populations cibles, ou pour fusionner des données issues des enquêtes différentes.

Des poids spécifiques avaient été calculés pour les modules « violence domestique » et « travail et discipline des enfants » car les modules n'étaient appliqués qu'à un seul individu tiré au hasard parmi tous les individus éligibles du ménage. Ces poids spécifiques étaient basés sur les poids de ménages en prenant compte le nombre d'individus éligibles par ménages et avec la correction de non réponse, et finalement la normalisation. Les procédures de la correction de la non réponse et celle de la normalisation sont les même comme expliquées ci-dessus.

Les erreurs de sondage étaient calculées pour des indicateurs sélectionnés, et pour chacun des domaines d'étude, comme présentées dans l'annexe B.

A.5 RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les **Tableaux A.6** et **A.7** présentent les résultats détaillés des interviews auprès des ménages, des femmes et des hommes. À la suite du classement des ménages selon les différents codes résultat, le taux de réponse pour l'enquête ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{R + MP + D + REF + LNT}$$

Le taux de réponse des femmes et des hommes éligibles est équivalent au pourcentage d'interviews complétées. Le taux de réponse global des femmes est le produit du taux de réponse des ménages et du taux de réponse des femmes. Le taux de réponse global des hommes est le produit du taux de réponse des ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes et du taux de réponse des hommes.

Tableau A.6 Résultats de l'enquête : Femme

Répartition (en %) des ménages et des femmes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des femmes éligibles et taux de réponse global des femmes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Résultat | Résidence | | | | Département | | | | | | | | | | | Ensemble |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Urbain | Rural | Alibori | Atacora | Atlant-ique | Borgou | Col-lines | Couffo | Donga | Littoral | Mono | Ouémé | Plateau | Zou | | |
| Selection des ménages | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rempli (R) | 97,5 | 98,5 | 99,7 | 97,9 | 96,6 | 98,6 | 98,9 | 98,0 | 98,1 | 95,6 | 99,0 | 98,3 | 97,8 | 99,2 | 98,1 | |
| Pas d'enquête compétent à la maison, au moment de la visite (MP) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| Différé (D) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Refusé (REF) | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,6 | 0,1 | 0,5 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | |
| Logement non trouvé (LNT) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| Ménage absent (MA) | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | |
| Logement vacant/ adresse non un logement (LV) | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | |
| Logement détruit (LD) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| Autre (A) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Nombre de ménages échantillonnés | 6 528 | 7 907 | 1 092 | 1 014 | 1 693 | 1 456 | 1 196 | 1 092 | 832 | 1 353 | 962 | 1 405 | 988 | 1 352 | 14 435 | |
| Taux de réponse des ménages ¹ | 98,7 | 99,3 | 99,8 | 100,0 | 98,0 | 99,0 | 99,8 | 99,4 | 100,0 | 97,0 | 99,6 | 99,2 | 98,0 | 99,8 | 99,0 | |
| Femmes éligibles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rempli (FER) | 97,7 | 98,4 | 98,0 | 98,9 | 97,5 | 98,8 | 99,2 | 98,6 | 98,2 | 95,7 | 97,3 | 97,8 | 97,7 | 99,6 | 98,1 | |
| Pas à la maison (FPM) | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | |
| Différé (D) | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Refusé (FR) | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 2,5 | 0,4 | 1,0 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | |
| Incapacité (FI) | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| Autre (FA) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Effectif de femmes | 7 208 | 9 025 | 1 732 | 1 407 | 1 746 | 1 787 | 1 415 | 1 026 | 982 | 1 479 | 839 | 1 289 | 974 | 1 557 | 16 233 | |
| Taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) ² | 97,7 | 98,4 | 98,0 | 98,9 | 97,5 | 98,8 | 99,2 | 98,6 | 98,2 | 95,7 | 97,3 | 97,8 | 97,7 | 99,6 | 98,1 | |
| Taux de réponse global des femmes (TRGF) ³ | 96,5 | 97,7 | 97,8 | 98,9 | 95,6 | 97,7 | 99,0 | 98,0 | 98,2 | 92,8 | 96,9 | 97,0 | 95,8 | 99,3 | 97,2 | |

¹ En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{R + MP + D + REF + LNT}$$

² Le taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (FER).

³ Le taux de réponse global des femmes est calculé comme suit (TRGF) :

$$TRGF = TRM * TRFE/100$$

Tableau A.7 Résultats de l'enquête: Homme

Répartition (en %) des ménages et des hommes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des hommes éligibles et taux de réponse global des hommes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Résultat des interviews | Résidence | | | | | Département | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|--------|-------|----------|-------|-------|---------|-------|----------|
| | Urbain | Rural | Alibori | Atacora | Atlant-ique | Borgou | Col-lines | Couffo | Donga | Littoral | Mono | Ouémé | Plateau | Zou | Ensemble |
| Sélection des ménages | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rempli (R) | 97,5 | 98,2 | 99,8 | 97,6 | 95,6 | 98,1 | 99,0 | 98,2 | 97,6 | 94,8 | 98,8 | 98,9 | 98,2 | 99,0 | 97,9 |
| Pas d'enquête compétent à la maison, au moment de la visite (MP) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Refusé (REF) | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | 0,8 |
| Logement non trouvé (LNT) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Ménage absent (MA) | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Logement vacant/ adresse non un logement (LV) | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,7 |
| Logement détruit (LD) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nombre de ménages échantillonnés | 3 264 | 3 954 | 546 | 507 | 847 | 728 | 598 | 546 | 416 | 676 | 481 | 703 | 494 | 676 | 7 218 |
| Taux de réponse des ménages (TRM) ¹ | 98,7 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 97,6 | 98,8 | 99,8 | 99,3 | 100,0 | 96,7 | 99,4 | 99,3 | 98,4 | 99,6 | 98,9 |
| Hommes éligibles | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rempli (HER) | 96,9 | 98,2 | 97,1 | 99,4 | 96,7 | 98,4 | 98,1 | 98,3 | 99,1 | 96,2 | 98,0 | 95,3 | 95,7 | 98,6 | 97,6 |
| Pas à la maison (HPM) | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| Différé (HD) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Refusé (HR) | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 3,3 | 0,5 | 1,0 |
| Incapacité (HI) | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Autre (HA) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif d'hommes | 3 491 | 4 291 | 932 | 686 | 797 | 894 | 647 | 469 | 540 | 685 | 440 | 635 | 395 | 662 | 7 782 |
| Taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) ² | 96,9 | 98,2 | 97,1 | 99,4 | 96,7 | 98,4 | 98,1 | 98,3 | 99,1 | 96,2 | 98,0 | 95,3 | 95,7 | 98,6 | 97,6 |
| Taux de réponse global des hommes (TRGH) ³ | 95,7 | 97,3 | 97,1 | 99,4 | 94,4 | 97,2 | 98,0 | 97,6 | 99,1 | 93,0 | 97,3 | 94,6 | 94,1 | 98,2 | 96,6 |

¹ En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$100 * R$$

$$R + MP + D + REF + LNT$$

² Le taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées(HER).

³ Le taux de réponse global des hommes est calculé comme suit (TRGH) :

$$TRGH = TRM * TRHE/100$$

Les estimations de paramètres à partir d'une enquête par sondage sont sujettes à deux types d'erreurs : les erreurs de mesure et l'erreur d'échantillonnage. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en oeuvre de la collecte et à l'exploitation des données, telles que l'omission des ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de la part soit de l'enquêteur, soit de l'enquêté et les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait durant la réalisation de l'EDS Bénin 2017-2018 (EDSB-V 2017-2018) pour minimiser ce type d'erreur, il est difficile d'éviter et d'évaluer statistiquement les erreurs de mesure.

Par contre, l'erreur d'échantillonnage peut être évaluée statistiquement. L'échantillon sélectionné pour EDSB-V 2017-2018 n'est qu'un parmi un grand nombre d'échantillons qui peuvent être sélectionnés, à partir de la même population, en utilisant le même plan de sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents de ceux obtenus avec l'échantillon actuellement sélectionné. L'erreur d'échantillonnage est une mesure de la variabilité parmi tous les échantillons possibles. Bien que le niveau de variabilité ne puisse pas être connu exactement, il peut être estimé à partir des données collectées.

L'*erreur-type (ET)* est un indice particulièrement utile pour mesurer l'erreur d'échantillonnage d'un paramètre estimé (moyenne, proportion, etc.) ; elle est la racine carrée de la variance du paramètre estimé. L'erreur-type peut être utilisée pour calculer des intervalles de confiance dans lesquels on considère que se trouve la vraie valeur du paramètre avec un certain niveau de confiance. Par exemple, pour un paramètre donné calculé à partir d'un échantillon, la vraie valeur du paramètre se trouvera dans les limites de sa valeur estimée plus ou moins deux fois son erreur-type, avec un niveau de confiance de 95 %.

Si l'échantillon avait été tiré d'après un plan de sondage aléatoire simple, il aurait été possible d'utiliser des formules simples pour calculer l'erreur d'échantillonnage. Cependant, l'échantillon de l'EDSB-V 2017-2018 étant un échantillon stratifié et tiré à deux degrés, il s'est avéré nécessaire d'utiliser des formules plus complexes. Un programme SAS, développé par ICF International, a été utilisé pour calculer les erreurs d'échantillonnage. Ce programme utilise la méthode de linéarisation de Taylor pour les estimations comme des moyennes, proportions ou ratios. La méthode de replication de Jackknife est utilisée pour les estimations des indicateurs plus complexes comme l'indice synthétique de fécondité et les quotients de mortalité.

La méthode de linéarisation de Taylor traite chaque proportion ou moyenne comme étant une estimation de ratio, $r = y/x$, avec y la somme pondérée de la variable d'intérêt et x le nombre total de cas pondérés, calcul basé sur les mêmes unités enquêtées. La variance de r est calculée en utilisant la formule ci-dessous, avec l'erreur-type qui est la racine carrée de la variance :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[\frac{m_h}{m_h-1} \left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

Dans laquelle

$$z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi}, \text{ et } z_h = y_h - rx_h$$

- où
- h représente la strate variant de 1 à H ,
 - m_h est le nombre total de grappes sélectionnées dans la strate h ,
 - y_{hi} est la somme des valeurs pondérées de la variable y dans la grappe i de la strate h ,
 - x_{hi} est la somme des nombres de cas pondérés dans la grappe i de la strate h , et
 - f est le taux global de sondage, qui est négligeable et donc ignoré.

La méthode de replication de Jackknife dérive les estimations de taux complexes à partir de chacun des sous-échantillons de l'échantillon principal et calcule les erreur-type de ces estimations en utilisant des formules simples. Chaque sous-échantillon exclut *une* grappe dans le calcul des estimations. Des estimations pseudo-indépendantes sont donc créées. Dans EDSB-V 2017-2018, il y a 555 grappes non-vides et par conséquent, 555 sous-échantillons ont été créés. La variance d'un taux r est calculée comme suit :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

Dans laquelle

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

où r est l'estimation calculée à partir de l'échantillon complet de 555 grappes,
 $r_{(i)}$ est l'estimation calculée à partir de l'échantillon réduit de 554 grappes ($i^{\text{ème}}$ grappe exclue), et
 k est le nombre total de grappes.

En plus de l'erreur-type, on calcule pour chaque estimation l'effet du plan de sondage (DEFT). L'effet du plan de sondage est le rapport de l'erreur-type observée sur l'erreur-type qu'on aurait obtenue si un sondage aléatoire simple avait été utilisé. Une valeur du DEFT de 1,0 indique que le plan de sondage est aussi efficace qu'un plan aléatoire simple, alors qu'une valeur supérieure à 1,0 indique un accroissement de l'erreur d'échantillonnage due à un plan de sondage plus complexe et moins efficace par rapport à un plan aléatoire simple. Pour chaque estimation, l'erreur relative et les intervalles de confiance sont aussi calculés.

Les erreurs d'échantillonnage pour EDSB-V 2017-2018 ont été calculées pour certaines variables considérées comme essentielles. Les résultats sont présentés dans cette annexe pour le pays entier, pour la capitale Cotonou, pour les autres villes urbaines, pour le milieu urbain ensemble et le milieu rural, et pour les 12 départements administratifs. Pour chaque variable, le type de statistique (moyenne, proportion, ou taux) et la population de base sont présentés au **Tableau B.1**. Les **Tableaux B.2 à B.18** présentent la valeur de la statistique (M), l'erreur-type (ET), le nombre de cas non pondérés (N) et pondérés (WN), l'effet de plan de sondage (DEFT), l'erreur relative (ET/M), et l'intervalle de confiance à 95 % ($M \pm 2ET$), pour chaque variable. Les erreurs d'échantillonnage pour les taux de mortalité sont présentées pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête pour l'échantillon national et pour la période des 10 années avant l'enquête au niveau des domaines d'étude. Le DEFT est considéré comme non défini quand l'écart type sous l'échantillon aléatoire simple est zéro (quand l'estimation est proche de 0 ou 1).

L'intervalle de confiance (calculé par ex. pour le *Nombre idéal d'enfants*) peut être interprété comme suit : le nombre moyen sur le *nombre idéal d'enfants* calculé pour toutes les femmes de 15-49 ans enquêtées est de 5,150 auquel correspond une erreur-type de 0,045. Par conséquent, pour obtenir un intervalle de confiance de 95 %, on doit ajouter et soustraire deux fois l'erreur-type de l'estimation, c'est-à-dire, $5,150 \pm 2 \times 0,045$. Il y a une probabilité élevée (95 %) que la valeur *réelle* du nombre idéal d'enfants pour toutes les femmes de 15-49 ans se trouve entre 5,059 et 5,240.

Pour l'échantillon total, la moyenne du DEFT, calculée pour l'ensemble des variables issues de l'enquête auprès des femmes est de 1,457. Cela veut dire que, par rapport à un échantillon aléatoire simple, l'erreur d'échantillonnage est multipliée par un facteur de 1,457 parce qu'on utilise un plan de sondage complexe (par grappe et à plusieurs degrés) et moins efficace.

Tableau B.1 Variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage : EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Estimation | Population de base |
|--|------------|--|
| MÉNAGE | | |
| Possession d'au moins une MII | Proportion | Toute la population de fait des ménages |
| Ayant accès à une MII | Proportion | Toute la population de fait des ménages |
| Dormi sous une MII la nuit précédente l'enquête | Proportion | Toute la population de fait des ménages |
| FEMME | | |
| Milieu urbain | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Alphabétisée | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Aucune instruction | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Niveau secondaire ou plus | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Jamais mariée/jamais en union | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Actuellement mariée/en union | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | Proportion | Femmes 20-49 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | Proportion | Femmes 20-49 |
| Actuellement enceinte | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Connait une méthode contraceptive | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Connait une méthode moderne | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement une méthode | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement la pilule | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement le DIU | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement des injectables | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement le retrait | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| A utilisé une source du secteur public | Proportion | Utilisatrices de méthodes modernes |
| Ne veut plus d'enfant | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | Proportion | Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 |
| Nombre idéal d'enfants | Moyenne | Toutes les femmes 15-49 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | Proportion | Dernière naissances dans les 5 dernières années |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | Proportion | Naissances dans les 5 dernières années |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | Proportion | Enfants de moins de 5 ans |
| Traités avec des SRO | Proportion | Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines |
| Traitement médical recherché | Proportion | Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines |
| Carnet de vaccination montré | Proportion | Enfants âgés 12-23 mois |
| A reçu le vaccin du BCG | Proportion | Enfants âgés 12-23 mois |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | Proportion | Enfants âgés 12-23 mois |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | Proportion | Enfants âgés 12-23 mois |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | Proportion | Enfants âgés 12-23 mois |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | Proportion | Enfants âgés 12-23 mois |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | Proportion | Enfants âgés 12-23 mois |
| A reçu tous les vaccins de base | Proportion | Enfants âgés 12-23 mois |
| Taille-pour-âge (-2ET) | Proportion | Enfants de moins de 5 ans mesurés |
| Poids-pour-taille (-2ET) | Proportion | Enfants de moins de 5 ans mesurés |
| Poids-pour-âge (-2ET) | Proportion | Enfants de moins de 5 ans mesurés |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | Proportion | Enfants de 6-59 mois testés |
| Prévalence du paludisme (TDR) | Proportion | Enfants de 6-59 mois testés |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | Proportion | Enfants de 6-59 mois testés |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | Proportion | Toutes les femmes 15-49 mesurées |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | Proportion | Toutes les femmes 15-49 mesurées |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | Proportion | Toutes les femmes 15-49 testées |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | Proportion | Femmes célibataires de 15-24 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | Proportion | Femmes 15-49 ayant entendu parler du VIH/sida |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | Proportion | Toutes les femmes 15-49 |
| A subi des violences physiques ou sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire | Proportion | Femmes actuellement en union ou en rupture d'union 15-49 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | Proportion | Femmes actuellement en union ou en rupture d'union 15-49 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | Proportion | Femmes actuellement en union ou en rupture d'union 15-49 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | Taux | Femmes-années d'exposition au risque de grossesse |
| Quotient de mortalité néonatale ¹ | Taux | Nombre d'enfants exposés au décès |
| Quotient de mortalité post-néonatale ¹ | Taux | Nombre d'enfants exposés au décès |
| Quotient de mortalité infantile ¹ | Taux | Nombre d'enfants exposés au décès |
| Quotient de mortalité juvénile ¹ | Taux | Nombre d'enfants exposés au décès |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile ¹ | Taux | Nombre d'enfants exposés au décès |

À suivre...

Tableau B.1—Suite

| Variable | Estimation | Population de base |
|--|------------|---|
| HOMME | | |
| Milieu urbain | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| Alphabétisé | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| Aucune instruction | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| Niveau secondaire ou plus | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| Jamais marié/jamais en union | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| Actuellement marié/en union | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | Proportion | Hommes 20-49 |
| Connaît une méthode contraceptive | Proportion | Hommes actuellement mariés (en union) 15-49 |
| Connaît une méthode moderne | Proportion | Hommes actuellement mariés (en union) 15-49 |
| Ne veut plus d'enfants | Proportion | Hommes actuellement mariés (en union) 15-49 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | Proportion | Hommes actuellement mariés (en union) 15-49 |
| Nombre idéal d'enfants | Moyenne | Tous les hommes 15-49 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | Proportion | Hommes célibataires de 15-24 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | Proportion | Tous les hommes 15-49 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | Proportion | Hommes 15-49 ayant entendu parler du VIH/sida |

¹ Les quotients de mortalité sont calculés pour la période de 5 années avant l'enquête au niveau national et pour la période des 10 années avant l'enquête au niveau régional.

Tableau B.2 Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,915 | 0,004 | 14 156 | 14 156 | 1,515 | 0,004 | 0,908 | 0,922 |
| Ayant accès à une MII | 0,772 | 0,006 | 73 336 | 73 098 | 1,758 | 0,007 | 0,761 | 0,783 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,711 | 0,006 | 73 336 | 73 098 | 1,583 | 0,008 | 0,699 | 0,723 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,424 | 0,010 | 15 928 | 15 928 | 2,493 | 0,023 | 0,405 | 0,444 |
| Alphabétisée | 0,341 | 0,008 | 15 928 | 15 928 | 2,225 | 0,025 | 0,324 | 0,358 |
| Aucune instruction | 0,552 | 0,009 | 15 928 | 15 928 | 2,247 | 0,016 | 0,534 | 0,569 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,251 | 0,007 | 15 928 | 15 928 | 2,159 | 0,030 | 0,236 | 0,266 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,244 | 0,006 | 15 928 | 15 928 | 1,625 | 0,023 | 0,233 | 0,255 |
| Actuellement mariée/en union | 0,701 | 0,006 | 15 928 | 15 928 | 1,699 | 0,009 | 0,689 | 0,713 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,355 | 0,006 | 12 593 | 12 578 | 1,522 | 0,018 | 0,342 | 0,368 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,595 | 0,007 | 12 593 | 12 578 | 1,562 | 0,011 | 0,581 | 0,609 |
| Actuellement enceinte | 0,107 | 0,003 | 15 928 | 15 928 | 1,073 | 0,025 | 0,102 | 0,112 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,965 | 0,003 | 11 170 | 11 168 | 1,809 | 0,003 | 0,959 | 0,971 |
| Connait une méthode moderne | 0,963 | 0,003 | 11 170 | 11 168 | 1,817 | 0,003 | 0,956 | 0,969 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,155 | 0,005 | 11 170 | 11 168 | 1,428 | 0,032 | 0,145 | 0,165 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,124 | 0,004 | 11 170 | 11 168 | 1,402 | 0,035 | 0,115 | 0,133 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,015 | 0,001 | 11 170 | 11 168 | 1,134 | 0,087 | 0,012 | 0,018 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,016 | 0,001 | 11 170 | 11 168 | 1,226 | 0,090 | 0,013 | 0,019 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,009 | 0,001 | 11 170 | 11 168 | 1,222 | 0,119 | 0,007 | 0,012 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,022 | 0,002 | 11 170 | 11 168 | 1,137 | 0,072 | 0,019 | 0,025 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,002 | 0,000 | 11 170 | 11 168 | 1,068 | 0,244 | 0,001 | 0,003 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,013 | 0,001 | 11 170 | 11 168 | 1,201 | 0,100 | 0,010 | 0,015 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,016 | 0,002 | 11 170 | 11 168 | 1,366 | 0,102 | 0,013 | 0,019 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,624 | 0,015 | 1 864 | 1 842 | 1,346 | 0,024 | 0,593 | 0,654 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,245 | 0,006 | 11 170 | 11 168 | 1,377 | 0,023 | 0,234 | 0,256 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,344 | 0,007 | 11 170 | 11 168 | 1,518 | 0,020 | 0,331 | 0,358 |
| Nombre idéal d'enfants | 5,150 | 0,045 | 14 982 | 14 971 | 2,254 | 0,009 | 5,059 | 5,240 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,707 | 0,009 | 8 994 | 9 031 | 1,896 | 0,013 | 0,689 | 0,725 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,781 | 0,011 | 13 589 | 13 643 | 2,564 | 0,015 | 0,758 | 0,804 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,104 | 0,004 | 12 651 | 12 686 | 1,345 | 0,036 | 0,097 | 0,111 |
| Traités avec des SRO | 0,222 | 0,014 | 1 342 | 1 320 | 1,174 | 0,062 | 0,194 | 0,249 |
| Traitement médical recherché | 0,427 | 0,018 | 1 342 | 1 320 | 1,277 | 0,042 | 0,391 | 0,463 |
| Carnet de vaccination montré | 0,715 | 0,011 | 2 522 | 2 515 | 1,234 | 0,016 | 0,692 | 0,737 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,882 | 0,009 | 2 522 | 2 515 | 1,440 | 0,011 | 0,863 | 0,901 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,730 | 0,012 | 2 522 | 2 515 | 1,345 | 0,017 | 0,706 | 0,754 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,865 | 0,009 | 2 522 | 2 515 | 1,372 | 0,011 | 0,846 | 0,883 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,655 | 0,013 | 2 522 | 2 515 | 1,310 | 0,019 | 0,630 | 0,681 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,708 | 0,013 | 2 522 | 2 515 | 1,400 | 0,018 | 0,682 | 0,734 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,679 | 0,013 | 2 522 | 2 515 | 1,338 | 0,019 | 0,654 | 0,705 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,566 | 0,013 | 2 522 | 2 515 | 1,311 | 0,023 | 0,540 | 0,593 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,322 | 0,006 | 12 743 | 12 777 | 1,383 | 0,020 | 0,309 | 0,334 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,050 | 0,002 | 13 243 | 13 260 | 1,177 | 0,047 | 0,045 | 0,054 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,168 | 0,005 | 12 800 | 12 832 | 1,286 | 0,028 | 0,159 | 0,178 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,715 | 0,008 | 6 207 | 6 171 | 1,311 | 0,011 | 0,699 | 0,731 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,364 | 0,012 | 6 192 | 6 155 | 1,599 | 0,032 | 0,341 | 0,387 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,391 | 0,011 | 5 916 | 5 879 | 1,575 | 0,029 | 0,368 | 0,414 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,111 | 0,004 | 6 933 | 6 946 | 1,153 | 0,039 | 0,102 | 0,119 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,258 | 0,007 | 6 933 | 6 946 | 1,361 | 0,028 | 0,244 | 0,273 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,577 | 0,008 | 8 011 | 8 018 | 1,414 | 0,014 | 0,562 | 0,593 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,016 | 0,001 | 15 928 | 15 928 | 1,452 | 0,090 | 0,013 | 0,019 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,216 | 0,010 | 2 123 | 2 118 | 1,149 | 0,048 | 0,195 | 0,236 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,538 | 0,011 | 3 592 | 3 598 | 1,329 | 0,021 | 0,516 | 0,560 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,141 | 0,006 | 7 712 | 7 706 | 1,394 | 0,039 | 0,130 | 0,152 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,755 | 0,009 | 7 072 | 7 053 | 1,686 | 0,011 | 0,737 | 0,772 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,273 | 0,008 | 5 408 | 5 408 | 1,375 | 0,031 | 0,256 | 0,289 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,101 | 0,006 | 5 408 | 5 408 | 1,344 | 0,055 | 0,090 | 0,112 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,224 | 0,009 | 4 488 | 4 150 | 1,429 | 0,040 | 0,207 | 0,242 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,428 | 0,010 | 4 488 | 4 150 | 1,366 | 0,024 | 0,408 | 0,448 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,319 | 0,010 | 4 488 | 4 150 | 1,464 | 0,032 | 0,298 | 0,339 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,685 | 0,083 | 44 500 | 44 488 | 1,541 | 0,015 | 5,519 | 5,852 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans) | 30,030 | 1,905 | 13 516 | 13 571 | 1,184 | 0,063 | 26,221 | 33,840 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans) | 24,928 | 1,576 | 13 487 | 13 534 | 1,070 | 0,063 | 21,776 | 28,080 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans) | 54,959 | 2,536 | 13 547 | 13 599 | 1,155 | 0,046 | 49,887 | 60,030 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans) | 43,661 | 2,126 | 13 136 | 13 171 | 1,106 | 0,049 | 39,408 | 47,913 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans) | 96,220 | 3,317 | 13 766 | 13 820 | 1,169 | 0,034 | 89,585 | 102,854 |

À suivre...

Tableau B.2—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,428 | 0,010 | 6 731 | 6 727 | 1,722 | 0,024 | 0,407 | 0,449 |
| Alphabétisé | 0,542 | 0,011 | 6 731 | 6 727 | 1,854 | 0,021 | 0,520 | 0,565 |
| Aucune instruction | 0,361 | 0,011 | 6 731 | 6 727 | 1,843 | 0,030 | 0,339 | 0,382 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,407 | 0,010 | 6 731 | 6 727 | 1,713 | 0,025 | 0,387 | 0,428 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,425 | 0,008 | 6 731 | 6 727 | 1,298 | 0,018 | 0,410 | 0,441 |
| Actuellement marié/en union | 0,546 | 0,008 | 6 731 | 6 727 | 1,296 | 0,014 | 0,531 | 0,562 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,392 | 0,010 | 5 172 | 5 179 | 1,472 | 0,026 | 0,372 | 0,412 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,969 | 0,005 | 3 644 | 3 675 | 1,841 | 0,005 | 0,959 | 0,980 |
| Connaît une méthode moderne | 0,968 | 0,005 | 3 644 | 3 675 | 1,822 | 0,005 | 0,957 | 0,979 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,186 | 0,007 | 3 644 | 3 675 | 1,141 | 0,040 | 0,171 | 0,201 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,367 | 0,012 | 3 644 | 3 675 | 1,460 | 0,032 | 0,344 | 0,391 |
| Nombre idéal d'enfants | 6,982 | 0,112 | 6 373 | 6 347 | 1,714 | 0,016 | 6,757 | 7,206 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,216 | 0,007 | 6 731 | 6 727 | 1,401 | 0,033 | 0,202 | 0,230 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,037 | 0,003 | 6 731 | 6 727 | 1,398 | 0,087 | 0,030 | 0,043 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,551 | 0,013 | 2 390 | 2 357 | 1,281 | 0,024 | 0,525 | 0,577 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,315 | 0,014 | 2 069 | 2 064 | 1,343 | 0,044 | 0,288 | 0,343 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,071 | 0,005 | 6 731 | 6 727 | 1,478 | 0,065 | 0,061 | 0,080 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,702 | 0,010 | 6 190 | 6 140 | 1,728 | 0,014 | 0,682 | 0,722 |

Tableau B.3 Erreurs de sondage : Echantillon Cotonou, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,917 | 0,011 | 1 294 | 852 | 1,377 | 0,012 | 0,896 | 0,938 |
| Ayant accès à une MII | 0,833 | 0,014 | 5 596 | 3 687 | 1,627 | 0,017 | 0,805 | 0,861 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,807 | 0,014 | 5 596 | 3 687 | 1,443 | 0,018 | 0,778 | 0,836 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 1,000 | 0,000 | 1 415 | 958 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Alphabétisée | 0,670 | 0,021 | 1 415 | 958 | 1,643 | 0,031 | 0,629 | 0,711 |
| Aucune instruction | 0,228 | 0,015 | 1 415 | 958 | 1,344 | 0,066 | 0,198 | 0,258 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,499 | 0,018 | 1 415 | 958 | 1,374 | 0,037 | 0,463 | 0,536 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,338 | 0,015 | 1 415 | 958 | 1,215 | 0,045 | 0,307 | 0,368 |
| Actuellement mariée/en union | 0,575 | 0,015 | 1 415 | 958 | 1,153 | 0,026 | 0,545 | 0,605 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,168 | 0,013 | 1 128 | 766 | 1,191 | 0,079 | 0,142 | 0,195 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,431 | 0,025 | 1 128 | 766 | 1,717 | 0,059 | 0,380 | 0,481 |
| Actuellement enceinte | 0,068 | 0,009 | 1 415 | 958 | 1,282 | 0,126 | 0,051 | 0,085 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,996 | 0,002 | 803 | 551 | 1,085 | 0,002 | 0,991 | 1,001 |
| Connait une méthode moderne | 0,996 | 0,002 | 803 | 551 | 1,085 | 0,002 | 0,991 | 1,001 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,272 | 0,021 | 803 | 551 | 1,361 | 0,079 | 0,229 | 0,314 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,192 | 0,016 | 803 | 551 | 1,152 | 0,083 | 0,160 | 0,224 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,034 | 0,006 | 803 | 551 | 1,010 | 0,189 | 0,021 | 0,047 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,047 | 0,007 | 803 | 551 | 0,973 | 0,154 | 0,033 | 0,062 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,015 | 0,004 | 803 | 551 | 0,966 | 0,277 | 0,007 | 0,023 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,029 | 0,006 | 803 | 551 | 1,080 | 0,220 | 0,016 | 0,042 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,005 | 0,003 | 803 | 551 | 1,137 | 0,571 | 0,000 | 0,011 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,031 | 0,010 | 803 | 551 | 1,597 | 0,316 | 0,011 | 0,050 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,041 | 0,009 | 803 | 551 | 1,333 | 0,227 | 0,023 | 0,060 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,349 | 0,031 | 245 | 166 | 1,018 | 0,089 | 0,287 | 0,411 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,349 | 0,018 | 803 | 551 | 1,046 | 0,050 | 0,314 | 0,384 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,278 | 0,022 | 803 | 551 | 1,410 | 0,080 | 0,233 | 0,323 |
| Nombre idéal d'enfants | 3,926 | 0,066 | 1 350 | 915 | 1,505 | 0,017 | 3,795 | 4,057 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,802 | 0,027 | 605 | 408 | 1,655 | 0,034 | 0,748 | 0,856 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,932 | 0,021 | 848 | 579 | 1,944 | 0,023 | 0,889 | 0,975 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,086 | 0,011 | 813 | 558 | 1,062 | 0,124 | 0,065 | 0,107 |
| Traités avec des SRO | 0,214 | 0,062 | 72 | 48 | 1,161 | 0,290 | 0,090 | 0,338 |
| Traitement médical recherché | 0,419 | 0,091 | 72 | 48 | 1,490 | 0,218 | 0,237 | 0,602 |
| Carnet de vaccination montré | 0,759 | 0,045 | 184 | 127 | 1,412 | 0,059 | 0,670 | 0,848 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,971 | 0,016 | 184 | 127 | 1,253 | 0,016 | 0,940 | 1,002 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,870 | 0,035 | 184 | 127 | 1,395 | 0,040 | 0,801 | 0,939 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,960 | 0,017 | 184 | 127 | 1,188 | 0,018 | 0,926 | 0,994 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,763 | 0,038 | 184 | 127 | 1,211 | 0,050 | 0,687 | 0,839 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,859 | 0,035 | 184 | 127 | 1,366 | 0,041 | 0,790 | 0,929 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,781 | 0,046 | 184 | 127 | 1,501 | 0,059 | 0,688 | 0,874 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,667 | 0,047 | 184 | 127 | 1,348 | 0,071 | 0,572 | 0,761 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,191 | 0,021 | 826 | 554 | 1,441 | 0,108 | 0,150 | 0,233 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,056 | 0,012 | 831 | 558 | 1,421 | 0,217 | 0,031 | 0,080 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,125 | 0,013 | 829 | 556 | 1,105 | 0,107 | 0,099 | 0,152 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,611 | 0,036 | 433 | 275 | 1,416 | 0,060 | 0,538 | 0,684 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,042 | 0,012 | 432 | 274 | 1,041 | 0,280 | 0,019 | 0,066 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,167 | 0,025 | 413 | 263 | 1,243 | 0,149 | 0,117 | 0,217 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,061 | 0,010 | 658 | 439 | 1,095 | 0,169 | 0,040 | 0,082 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,477 | 0,022 | 658 | 439 | 1,107 | 0,046 | 0,434 | 0,521 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,607 | 0,021 | 705 | 463 | 1,130 | 0,035 | 0,564 | 0,649 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,030 | 0,007 | 1 415 | 958 | 1,542 | 0,235 | 0,016 | 0,044 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,226 | 0,026 | 286 | 195 | 1,055 | 0,116 | 0,174 | 0,278 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,515 | 0,034 | 408 | 271 | 1,362 | 0,066 | 0,447 | 0,582 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,259 | 0,022 | 661 | 460 | 1,282 | 0,084 | 0,216 | 0,303 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,568 | 0,024 | 648 | 453 | 1,239 | 0,042 | 0,520 | 0,617 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,309 | 0,019 | 494 | 318 | 0,914 | 0,061 | 0,271 | 0,347 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,101 | 0,015 | 494 | 318 | 1,079 | 0,145 | 0,071 | 0,130 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,176 | 0,023 | 377 | 223 | 1,176 | 0,131 | 0,130 | 0,223 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,381 | 0,027 | 377 | 223 | 1,079 | 0,071 | 0,327 | 0,435 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,258 | 0,023 | 377 | 223 | 1,041 | 0,091 | 0,211 | 0,305 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 3,997 | 0,169 | 3 975 | 2 690 | 1,226 | 0,042 | 3,659 | 4,335 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans) | 14,673 | 4,012 | 847 | 580 | 0,906 | 0,273 | 6,649 | 22,697 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans) | 15,456 | 3,973 | 852 | 584 | 0,964 | 0,257 | 7,510 | 23,401 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans) | 30,129 | 5,819 | 849 | 582 | 0,968 | 0,193 | 18,492 | 41,766 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans) | 14,667 | 4,427 | 829 | 565 | 0,957 | 0,302 | 5,813 | 23,522 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans) | 44,354 | 8,379 | 853 | 583 | 1,072 | 0,189 | 27,596 | 61,111 |

À suivre...

Tableau B.3—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 1,000 | 0,000 | 592 | 390 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Alphabétisé | 0,883 | 0,017 | 592 | 390 | 1,282 | 0,019 | 0,849 | 0,917 |
| Aucune instruction | 0,067 | 0,014 | 592 | 390 | 1,324 | 0,203 | 0,040 | 0,094 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,776 | 0,025 | 592 | 390 | 1,446 | 0,032 | 0,726 | 0,826 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,487 | 0,029 | 592 | 390 | 1,424 | 0,060 | 0,429 | 0,546 |
| Actuellement marié/en union | 0,467 | 0,030 | 592 | 390 | 1,473 | 0,065 | 0,407 | 0,528 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,436 | 0,038 | 473 | 315 | 1,668 | 0,088 | 0,359 | 0,512 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,985 | 0,009 | 264 | 182 | 1,143 | 0,009 | 0,968 | 1,002 |
| Connaît une méthode moderne | 0,984 | 0,009 | 264 | 182 | 1,104 | 0,009 | 0,966 | 1,001 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,353 | 0,028 | 264 | 182 | 0,966 | 0,081 | 0,296 | 0,410 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,258 | 0,037 | 264 | 182 | 1,350 | 0,141 | 0,185 | 0,331 |
| Nombre idéal d'enfants | 3,942 | 0,100 | 576 | 378 | 1,275 | 0,025 | 3,742 | 4,142 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,229 | 0,020 | 592 | 390 | 1,176 | 0,089 | 0,189 | 0,270 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,074 | 0,016 | 592 | 390 | 1,521 | 0,221 | 0,041 | 0,107 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,442 | 0,030 | 227 | 145 | 0,916 | 0,068 | 0,381 | 0,502 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,480 | 0,040 | 247 | 156 | 1,257 | 0,083 | 0,400 | 0,560 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,163 | 0,022 | 592 | 390 | 1,424 | 0,133 | 0,119 | 0,206 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,641 | 0,043 | 584 | 385 | 2,156 | 0,067 | 0,555 | 0,727 |

Tableau B.4 Erreurs de sondage : Echantillon Autres villes, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,900 | 0,006 | 5 070 | 5 252 | 1,399 | 0,007 | 0,888 | 0,912 |
| Ayant accès à une MII | 0,771 | 0,008 | 25 132 | 25 689 | 1,501 | 0,010 | 0,756 | 0,787 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,714 | 0,009 | 25 132 | 25 689 | 1,446 | 0,012 | 0,696 | 0,731 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 1,000 | 0,000 | 5 630 | 5 803 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Alphabétisée | 0,428 | 0,017 | 5 630 | 5 803 | 2,549 | 0,039 | 0,395 | 0,462 |
| Aucune instruction | 0,460 | 0,018 | 5 630 | 5 803 | 2,645 | 0,038 | 0,425 | 0,495 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,329 | 0,015 | 5 630 | 5 803 | 2,437 | 0,046 | 0,298 | 0,359 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,271 | 0,010 | 5 630 | 5 803 | 1,675 | 0,037 | 0,251 | 0,290 |
| Actuellement mariée/en union | 0,669 | 0,011 | 5 630 | 5 803 | 1,751 | 0,016 | 0,647 | 0,691 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,306 | 0,012 | 4 449 | 4 581 | 1,674 | 0,038 | 0,283 | 0,330 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,544 | 0,013 | 4 449 | 4 581 | 1,727 | 0,024 | 0,518 | 0,569 |
| Actuellement enceinte | 0,097 | 0,004 | 5 630 | 5 803 | 1,069 | 0,043 | 0,089 | 0,106 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,970 | 0,004 | 3 806 | 3 881 | 1,633 | 0,005 | 0,961 | 0,979 |
| Connait une méthode moderne | 0,968 | 0,005 | 3 806 | 3 881 | 1,676 | 0,005 | 0,959 | 0,978 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,168 | 0,009 | 3 806 | 3 881 | 1,485 | 0,054 | 0,150 | 0,186 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,139 | 0,009 | 3 806 | 3 881 | 1,546 | 0,062 | 0,121 | 0,156 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,016 | 0,002 | 3 806 | 3 881 | 1,044 | 0,134 | 0,011 | 0,020 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,022 | 0,003 | 3 806 | 3 881 | 1,321 | 0,143 | 0,016 | 0,028 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,012 | 0,002 | 3 806 | 3 881 | 1,386 | 0,201 | 0,007 | 0,017 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,024 | 0,003 | 3 806 | 3 881 | 1,160 | 0,121 | 0,018 | 0,029 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,003 | 0,001 | 3 806 | 3 881 | 1,115 | 0,345 | 0,001 | 0,005 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,009 | 0,002 | 3 806 | 3 881 | 1,000 | 0,169 | 0,006 | 0,012 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,017 | 0,003 | 3 806 | 3 881 | 1,471 | 0,179 | 0,011 | 0,024 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,546 | 0,026 | 716 | 748 | 1,399 | 0,048 | 0,494 | 0,598 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,257 | 0,010 | 3 806 | 3 881 | 1,443 | 0,040 | 0,237 | 0,278 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,335 | 0,012 | 3 806 | 3 881 | 1,512 | 0,035 | 0,312 | 0,358 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,784 | 0,081 | 5 245 | 5 393 | 2,642 | 0,017 | 4,623 | 4,946 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,766 | 0,013 | 3 031 | 3 115 | 1,698 | 0,017 | 0,740 | 0,792 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,840 | 0,020 | 4 553 | 4 677 | 2,844 | 0,024 | 0,800 | 0,880 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,096 | 0,006 | 4 276 | 4 382 | 1,324 | 0,063 | 0,084 | 0,108 |
| Traités avec des SRO | 0,276 | 0,026 | 415 | 421 | 1,138 | 0,094 | 0,224 | 0,328 |
| Traitement médical recherché | 0,480 | 0,028 | 415 | 421 | 1,109 | 0,059 | 0,424 | 0,537 |
| Carnet de vaccination montré | 0,734 | 0,018 | 807 | 817 | 1,130 | 0,024 | 0,698 | 0,770 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,917 | 0,014 | 807 | 817 | 1,421 | 0,015 | 0,889 | 0,945 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,764 | 0,021 | 807 | 817 | 1,362 | 0,027 | 0,722 | 0,805 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,902 | 0,014 | 807 | 817 | 1,319 | 0,016 | 0,874 | 0,930 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,688 | 0,021 | 807 | 817 | 1,278 | 0,031 | 0,645 | 0,731 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,745 | 0,021 | 807 | 817 | 1,366 | 0,029 | 0,703 | 0,788 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,706 | 0,021 | 807 | 817 | 1,250 | 0,029 | 0,665 | 0,747 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,594 | 0,022 | 807 | 817 | 1,239 | 0,037 | 0,550 | 0,638 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,285 | 0,011 | 4 338 | 4 436 | 1,428 | 0,038 | 0,263 | 0,307 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,051 | 0,005 | 4 438 | 4 537 | 1,289 | 0,091 | 0,041 | 0,060 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,151 | 0,009 | 4 357 | 4 455 | 1,420 | 0,056 | 0,134 | 0,168 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,668 | 0,014 | 2 024 | 2 050 | 1,289 | 0,021 | 0,640 | 0,696 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,274 | 0,021 | 2 018 | 2 045 | 1,791 | 0,077 | 0,232 | 0,316 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,343 | 0,019 | 1 934 | 1 958 | 1 526 | 0,054 | 0,306 | 0,38 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,100 | 0,007 | 2 433 | 2 524 | 1,169 | 0,071 | 0,086 | 0,114 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,326 | 0,013 | 2 433 | 2 524 | 1,335 | 0,039 | 0,301 | 0,352 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,570 | 0,012 | 2 780 | 2 871 | 1,315 | 0,022 | 0,546 | 0,595 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,015 | 0,003 | 5 630 | 5 803 | 1,718 | 0,187 | 0,009 | 0,020 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,269 | 0,018 | 803 | 835 | 1,159 | 0,067 | 0,233 | 0,306 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,533 | 0,019 | 1 384 | 1 446 | 1,451 | 0,037 | 0,494 | 0,572 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,167 | 0,011 | 2 770 | 2 843 | 1,505 | 0,064 | 0,145 | 0,188 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,741 | 0,015 | 2 580 | 2 641 | 1,701 | 0,020 | 0,711 | 0,770 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,259 | 0,015 | 1 924 | 1 962 | 1,534 | 0,059 | 0,229 | 0,290 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,084 | 0,008 | 1 924 | 1 962 | 1,313 | 0,099 | 0,067 | 0,101 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,211 | 0,015 | 1 553 | 1 428 | 1,492 | 0,073 | 0,180 | 0,241 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,399 | 0,017 | 1 553 | 1 428 | 1,342 | 0,042 | 0,365 | 0,432 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,286 | 0,017 | 1 553 | 1 428 | 1,470 | 0,059 | 0,252 | 0,320 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,373 | 0,155 | 15 764 | 16 248 | 1,709 | 0,029 | 5,063 | 5,682 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans) | 29,444 | 3,447 | 4 553 | 4 679 | 1,256 | 0,117 | 22,549 | 36,338 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans) | 21,807 | 2,459 | 4 542 | 4 665 | 1,032 | 0,113 | 16,889 | 26,724 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans) | 51,250 | 4,117 | 4 558 | 4 682 | 1,176 | 0,080 | 43,017 | 59,484 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans) | 35,820 | 3,293 | 4 310 | 4 424 | 1,089 | 0,092 | 29,234 | 42,406 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans) | 85,235 | 5,524 | 4 623 | 4 750 | 1,231 | 0,065 | 74,187 | 96,283 |

À suivre...

Tableau B.4—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 1,000 | 0,000 | 2 413 | 2 487 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Alphabétisé | 0,615 | 0,020 | 2 413 | 2 487 | 2,015 | 0,032 | 0,575 | 0,655 |
| Aucune instruction | 0,284 | 0,018 | 2 413 | 2 487 | 1,933 | 0,063 | 0,248 | 0,319 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,481 | 0,019 | 2 413 | 2 487 | 1,829 | 0,039 | 0,443 | 0,518 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,438 | 0,014 | 2 413 | 2 487 | 1,363 | 0,031 | 0,410 | 0,466 |
| Actuellement marié/en union | 0,533 | 0,014 | 2 413 | 2 487 | 1,332 | 0,025 | 0,506 | 0,560 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,376 | 0,016 | 1 859 | 1 934 | 1,400 | 0,042 | 0,345 | 0,408 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,960 | 0,011 | 1 278 | 1 326 | 1,957 | 0,011 | 0,939 | 0,982 |
| Connaît une méthode moderne | 0,960 | 0,011 | 1 278 | 1 326 | 1,957 | 0,011 | 0,939 | 0,982 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,216 | 0,013 | 1 278 | 1 326 | 1,143 | 0,061 | 0,190 | 0,243 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,339 | 0,017 | 1 278 | 1 326 | 1,291 | 0,050 | 0,305 | 0,373 |
| Nombre idéal d'enfants | 6,299 | 0,168 | 2 269 | 2 327 | 1,672 | 0,027 | 5,963 | 6,634 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,224 | 0,013 | 2 413 | 2 487 | 1,567 | 0,059 | 0,198 | 0,251 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,031 | 0,005 | 2 413 | 2 487 | 1,432 | 0,163 | 0,021 | 0,041 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,560 | 0,019 | 850 | 850 | 1,120 | 0,034 | 0,522 | 0,598 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,405 | 0,025 | 794 | 825 | 1,427 | 0,062 | 0,355 | 0,454 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,092 | 0,010 | 2 413 | 2 487 | 1,668 | 0,107 | 0,073 | 0,112 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,629 | 0,018 | 2 283 | 2 335 | 1,814 | 0,029 | 0,593 | 0,666 |

Tableau B.5 Erreurs de sondage : Echantillon Ensemble Urbain, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon-déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,902 | 0,005 | 6 364 | 6 104 | 1,423 | 0,006 | 0,892 | 0,913 |
| Ayant accès à une MII | 0,779 | 0,007 | 30 728 | 29 376 | 1,549 | 0,009 | 0,765 | 0,793 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,725 | 0,008 | 30 728 | 29 376 | 1,487 | 0,011 | 0,709 | 0,741 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 1,000 | 0,000 | 7 045 | 6 761 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Alphabétisée | 0,463 | 0,015 | 7 045 | 6 761 | 2,535 | 0,033 | 0,433 | 0,493 |
| Aucune instruction | 0,427 | 0,016 | 7 045 | 6 761 | 2,637 | 0,036 | 0,396 | 0,458 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,353 | 0,014 | 7 045 | 6 761 | 2,381 | 0,038 | 0,326 | 0,380 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,280 | 0,009 | 7 045 | 6 761 | 1,650 | 0,032 | 0,262 | 0,298 |
| Actuellement mariée/en union | 0,655 | 0,010 | 7 045 | 6 761 | 1,711 | 0,015 | 0,636 | 0,675 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,287 | 0,010 | 5 577 | 5 347 | 1,705 | 0,036 | 0,266 | 0,307 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,527 | 0,012 | 5 577 | 5 347 | 1,749 | 0,022 | 0,504 | 0,551 |
| Actuellement enceinte | 0,093 | 0,004 | 7 045 | 6 761 | 1,105 | 0,041 | 0,085 | 0,101 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,973 | 0,004 | 4 609 | 4 431 | 1,668 | 0,004 | 0,966 | 0,981 |
| Connait une méthode moderne | 0,972 | 0,004 | 4 609 | 4 431 | 1,714 | 0,004 | 0,963 | 0,980 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,181 | 0,008 | 4 609 | 4 431 | 1,467 | 0,046 | 0,164 | 0,197 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,145 | 0,008 | 4 609 | 4 431 | 1,508 | 0,054 | 0,130 | 0,161 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,018 | 0,002 | 4 609 | 4 431 | 1,047 | 0,114 | 0,014 | 0,022 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,025 | 0,003 | 4 609 | 4 431 | 1,260 | 0,116 | 0,019 | 0,031 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,013 | 0,002 | 4 609 | 4 431 | 1,354 | 0,176 | 0,008 | 0,017 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,024 | 0,003 | 4 609 | 4 431 | 1,156 | 0,108 | 0,019 | 0,030 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,003 | 0,001 | 4 609 | 4 431 | 1,113 | 0,299 | 0,001 | 0,005 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,012 | 0,002 | 4 609 | 4 431 | 1,146 | 0,154 | 0,008 | 0,015 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,020 | 0,003 | 4 609 | 4 431 | 1,429 | 0,146 | 0,014 | 0,026 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,510 | 0,022 | 961 | 914 | 1,384 | 0,044 | 0,465 | 0,555 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,269 | 0,009 | 4 609 | 4 431 | 1,427 | 0,035 | 0,250 | 0,287 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,328 | 0,011 | 4 609 | 4 431 | 1,529 | 0,032 | 0,307 | 0,349 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,660 | 0,069 | 6 595 | 6 308 | 2,617 | 0,015 | 4,521 | 4,799 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,770 | 0,012 | 3 636 | 3 523 | 1,721 | 0,016 | 0,746 | 0,794 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,850 | 0,018 | 5 401 | 5 256 | 2,893 | 0,021 | 0,814 | 0,886 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,095 | 0,006 | 5 089 | 4 940 | 1,326 | 0,058 | 0,084 | 0,106 |
| Traités avec des SRO | 0,270 | 0,024 | 487 | 469 | 1,156 | 0,089 | 0,221 | 0,318 |
| Traitement médical recherché | 0,474 | 0,027 | 487 | 469 | 1,153 | 0,057 | 0,421 | 0,528 |
| Carnet de vaccination montré | 0,737 | 0,017 | 991 | 944 | 1,171 | 0,023 | 0,704 | 0,770 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,924 | 0,012 | 991 | 944 | 1,444 | 0,013 | 0,899 | 0,949 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,778 | 0,019 | 991 | 944 | 1,392 | 0,024 | 0,740 | 0,815 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,910 | 0,012 | 991 | 944 | 1,341 | 0,014 | 0,885 | 0,935 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,698 | 0,019 | 991 | 944 | 1,290 | 0,027 | 0,660 | 0,736 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,761 | 0,019 | 991 | 944 | 1,396 | 0,025 | 0,722 | 0,799 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,716 | 0,019 | 991 | 944 | 1,292 | 0,026 | 0,678 | 0,754 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,604 | 0,020 | 991 | 944 | 1,266 | 0,033 | 0,564 | 0,644 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,275 | 0,010 | 5 164 | 4 990 | 1,474 | 0,037 | 0,254 | 0,295 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,051 | 0,004 | 5 269 | 5 095 | 1,324 | 0,084 | 0,043 | 0,060 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,148 | 0,008 | 5 186 | 5 011 | 1,433 | 0,052 | 0,133 | 0,164 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,661 | 0,013 | 2 457 | 2 325 | 1,321 | 0,020 | 0,635 | 0,688 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,247 | 0,019 | 2 450 | 2 319 | 1,815 | 0,077 | 0,209 | 0,284 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,322 | 0,017 | 2 347 | 2 220 | 1,547 | 0,052 | 0,289 | 0,356 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,094 | 0,006 | 3 091 | 2 963 | 1,184 | 0,066 | 0,082 | 0,106 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,349 | 0,011 | 3 091 | 2 963 | 1,323 | 0,033 | 0,326 | 0,371 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,575 | 0,011 | 3 485 | 3 334 | 1,310 | 0,019 | 0,553 | 0,597 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,017 | 0,003 | 7 045 | 6 761 | 1,679 | 0,152 | 0,012 | 0,022 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,261 | 0,016 | 1 089 | 1 029 | 1,173 | 0,060 | 0,230 | 0,292 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,530 | 0,017 | 1 792 | 1 717 | 1,465 | 0,033 | 0,495 | 0,565 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,180 | 0,010 | 3 431 | 3 303 | 1,497 | 0,055 | 0,160 | 0,199 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,715 | 0,013 | 3 228 | 3 093 | 1,683 | 0,019 | 0,689 | 0,742 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,266 | 0,013 | 2 418 | 2 280 | 1,495 | 0,050 | 0,239 | 0,293 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,086 | 0,007 | 2 418 | 2 280 | 1,299 | 0,086 | 0,071 | 0,101 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,206 | 0,014 | 1 930 | 1 651 | 1,494 | 0,067 | 0,178 | 0,233 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,396 | 0,015 | 1 930 | 1 651 | 1,338 | 0,038 | 0,367 | 0,426 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,282 | 0,015 | 1 930 | 1 651 | 1,458 | 0,053 | 0,253 | 0,312 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,176 | 0,138 | 19 739 | 18 938 | 1,715 | 0,027 | 4,900 | 5,451 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans) | 27,810 | 3,126 | 5 400 | 5 259 | 1,285 | 0,112 | 21,558 | 34,062 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans) | 21,087 | 2,228 | 5 394 | 5 249 | 1,053 | 0,106 | 16,632 | 25,542 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans) | 48,897 | 3,757 | 5 407 | 5 264 | 1,203 | 0,077 | 41,383 | 56,411 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans) | 33,423 | 3,018 | 5 139 | 4 988 | 1,130 | 0,090 | 27,387 | 39,459 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans) | 80,686 | 5,118 | 5 476 | 5 333 | 1,271 | 0,063 | 70,450 | 90,921 |

À suivre...

Tableau B.5—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 1,000 | 0,000 | 3 005 | 2 877 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Alphabétisé | 0,651 | 0,018 | 3 005 | 2 877 | 2,038 | 0,027 | 0,616 | 0,687 |
| Aucune instruction | 0,254 | 0,016 | 3 005 | 2 877 | 1,965 | 0,061 | 0,223 | 0,286 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,521 | 0,017 | 3 005 | 2 877 | 1,847 | 0,032 | 0,487 | 0,554 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,445 | 0,013 | 3 005 | 2 877 | 1,382 | 0,028 | 0,420 | 0,470 |
| Actuellement marié/en union | 0,524 | 0,012 | 3 005 | 2 877 | 1,359 | 0,024 | 0,500 | 0,549 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,385 | 0,015 | 2 332 | 2 249 | 1,443 | 0,038 | 0,356 | 0,414 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,963 | 0,009 | 1 542 | 1 509 | 1,975 | 0,010 | 0,944 | 0,982 |
| Connaît une méthode moderne | 0,963 | 0,009 | 1 542 | 1 509 | 1,971 | 0,010 | 0,944 | 0,982 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,233 | 0,012 | 1 542 | 1 509 | 1,153 | 0,053 | 0,208 | 0,258 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,329 | 0,016 | 1 542 | 1 509 | 1,312 | 0,048 | 0,298 | 0,361 |
| Nombre idéal d'enfants | 5,970 | 0,147 | 2 845 | 2 705 | 1,715 | 0,025 | 5,676 | 6,263 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,225 | 0,012 | 3 005 | 2 877 | 1,552 | 0,053 | 0,201 | 0,249 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,037 | 0,005 | 3 005 | 2 877 | 1,444 | 0,135 | 0,027 | 0,047 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,543 | 0,017 | 1 077 | 996 | 1,115 | 0,031 | 0,509 | 0,577 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,417 | 0,022 | 1 041 | 981 | 1,436 | 0,053 | 0,373 | 0,461 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,102 | 0,009 | 3 005 | 2 877 | 1,628 | 0,088 | 0,084 | 0,120 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,631 | 0,017 | 2 867 | 2 720 | 1,874 | 0,027 | 0,597 | 0,665 |

Tableau B.6 Erreurs de sondage : Echantillon Rural, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon-déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,924 | 0,005 | 7 792 | 8 052 | 1,594 | 0,005 | 0,915 | 0,934 |
| Ayant accès à une MII | 0,767 | 0,008 | 42 608 | 43 722 | 1,840 | 0,011 | 0,751 | 0,784 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,702 | 0,008 | 42 608 | 43 722 | 1,616 | 0,012 | 0,685 | 0,718 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,000 | 0,000 | 8 883 | 9 167 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Alphabétisée | 0,251 | 0,009 | 8 883 | 9 167 | 1,947 | 0,036 | 0,233 | 0,269 |
| Aucune instruction | 0,643 | 0,010 | 8 883 | 9 167 | 1,931 | 0,015 | 0,624 | 0,663 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,175 | 0,008 | 8 883 | 9 167 | 1,947 | 0,045 | 0,160 | 0,191 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,218 | 0,007 | 8 883 | 9 167 | 1,616 | 0,033 | 0,204 | 0,232 |
| Actuellement mariée/en union | 0,735 | 0,008 | 8 883 | 9 167 | 1,699 | 0,011 | 0,719 | 0,751 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,405 | 0,008 | 7 016 | 7 232 | 1,408 | 0,020 | 0,389 | 0,422 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,645 | 0,008 | 7 016 | 7 232 | 1,390 | 0,012 | 0,629 | 0,661 |
| Actuellement enceinte | 0,117 | 0,004 | 8 883 | 9 167 | 1,043 | 0,030 | 0,110 | 0,124 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,959 | 0,005 | 6 561 | 6 737 | 1,856 | 0,005 | 0,950 | 0,968 |
| Connait une méthode moderne | 0,957 | 0,005 | 6 561 | 6 737 | 1,852 | 0,005 | 0,948 | 0,966 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,138 | 0,006 | 6 561 | 6 737 | 1,387 | 0,043 | 0,126 | 0,150 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,110 | 0,005 | 6 561 | 6 737 | 1,304 | 0,046 | 0,100 | 0,120 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,013 | 0,002 | 6 561 | 6 737 | 1,214 | 0,130 | 0,010 | 0,016 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,010 | 0,002 | 6 561 | 6 737 | 1,196 | 0,144 | 0,007 | 0,013 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,007 | 0,001 | 6 561 | 6 737 | 1,070 | 0,155 | 0,005 | 0,009 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,020 | 0,002 | 6 561 | 6 737 | 1,124 | 0,096 | 0,016 | 0,024 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,001 | 0,000 | 6 561 | 6 737 | 0,994 | 0,415 | 0,000 | 0,002 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,013 | 0,002 | 6 561 | 6 737 | 1,228 | 0,130 | 0,010 | 0,017 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,013 | 0,002 | 6 561 | 6 737 | 1,313 | 0,143 | 0,009 | 0,016 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,735 | 0,019 | 903 | 927 | 1324 | 0,026 | 0,696 | 0,774 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,229 | 0,007 | 6 561 | 6 737 | 1,337 | 0,030 | 0,216 | 0,243 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,355 | 0,009 | 6 561 | 6 737 | 1,523 | 0,025 | 0,337 | 0,373 |
| Nombre idéal d'enfants | 5,506 | 0,059 | 8 387 | 8 663 | 2,078 | 0,011 | 5,389 | 5,624 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,666 | 0,013 | 5 358 | 5 508 | 1,958 | 0,019 | 0,641 | 0,692 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,737 | 0,015 | 8 188 | 8 387 | 2,428 | 0,020 | 0,707 | 0,767 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,110 | 0,005 | 7 562 | 7 746 | 1,351 | 0,045 | 0,100 | 0,120 |
| Traités avec des SRO | 0,195 | 0,016 | 855 | 850 | 1,162 | 0,083 | 0,163 | 0,228 |
| Traitement médical recherché | 0,401 | 0,023 | 855 | 850 | 1,320 | 0,058 | 0,355 | 0,447 |
| Carnet de vaccination montré | 0,701 | 0,015 | 1 531 | 1 571 | 1,259 | 0,021 | 0,671 | 0,731 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,857 | 0,013 | 1 531 | 1 571 | 1,415 | 0,015 | 0,831 | 0,882 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,702 | 0,016 | 1 531 | 1 571 | 1,306 | 0,022 | 0,671 | 0,733 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,837 | 0,013 | 1 531 | 1 571 | 1,363 | 0,015 | 0,811 | 0,863 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,630 | 0,016 | 1 531 | 1 571 | 1,299 | 0,026 | 0,597 | 0,663 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,676 | 0,017 | 1 531 | 1 571 | 1,385 | 0,025 | 0,643 | 0,710 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,657 | 0,017 | 1 531 | 1 571 | 1,347 | 0,025 | 0,624 | 0,690 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,543 | 0,017 | 1 531 | 1 571 | 1,320 | 0,032 | 0,509 | 0,578 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,352 | 0,008 | 7 579 | 7 787 | 1,307 | 0,022 | 0,336 | 0,368 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,049 | 0,003 | 7 974 | 8 165 | 1,071 | 0,056 | 0,043 | 0,054 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,181 | 0,006 | 7 614 | 7 821 | 1,192 | 0,032 | 0,169 | 0,193 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,748 | 0,010 | 3 750 | 3 846 | 1,300 | 0,013 | 0,728 | 0,768 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,435 | 0,014 | 3 742 | 3 837 | 1,511 | 0,033 | 0,406 | 0,464 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,433 | 0,015 | 3 569 | 3 659 | 1,586 | 0,035 | 0,402 | 0,463 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,123 | 0,006 | 3 842 | 3 983 | 1,130 | 0,049 | 0,111 | 0,135 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,191 | 0,009 | 3 842 | 3 983 | 1,346 | 0,045 | 0,174 | 0,208 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,579 | 0,011 | 4 526 | 4 685 | 1,475 | 0,019 | 0,557 | 0,600 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,015 | 0,002 | 8 883 | 9 167 | 1,252 | 0,107 | 0,012 | 0,018 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,173 | 0,013 | 1 034 | 1 089 | 1,095 | 0,075 | 0,147 | 0,198 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,545 | 0,014 | 1 800 | 1 881 | 1,206 | 0,026 | 0,516 | 0,573 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,112 | 0,006 | 4 281 | 4 403 | 1,286 | 0,055 | 0,100 | 0,125 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,785 | 0,011 | 3 844 | 3 960 | 1,719 | 0,015 | 0,762 | 0,808 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,277 | 0,011 | 2 990 | 3 128 | 1,291 | 0,038 | 0,256 | 0,298 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,112 | 0,008 | 2 990 | 3 128 | 1,357 | 0,070 | 0,096 | 0,127 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,237 | 0,012 | 2 558 | 2 499 | 1,383 | 0,049 | 0,213 | 0,260 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,448 | 0,014 | 2 558 | 2 499 | 1,377 | 0,030 | 0,421 | 0,475 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,342 | 0,014 | 2 558 | 2 499 | 1,452 | 0,040 | 0,315 | 0,370 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 6,062 | 0,098 | 24 761 | 25 549 | 1,415 | 0,016 | 5,865 | 6,259 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans) | 31,438 | 2,419 | 8 116 | 8 313 | 1,124 | 0,077 | 26,600 | 36,275 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans) | 27,327 | 2,150 | 8 093 | 8 285 | 1,076 | 0,079 | 23,026 | 31,628 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans) | 58,765 | 3,412 | 8 140 | 8 336 | 1,133 | 0,058 | 51,941 | 65,588 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans) | 49,969 | 2,893 | 7 997 | 8 183 | 1,104 | 0,058 | 44,182 | 55,755 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans) | 105,797 | 4,367 | 8 290 | 8 487 | 1,134 | 0,041 | 97,062 | 114,531 |

À suivre...

Tableau B.6—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,000 | 0,000 | 3 726 | 3 849 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Alphabétisé | 0,461 | 0,015 | 3 726 | 3 849 | 1,783 | 0,032 | 0,431 | 0,490 |
| Aucune instruction | 0,440 | 0,014 | 3 726 | 3 849 | 1,764 | 0,033 | 0,412 | 0,469 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,322 | 0,013 | 3 726 | 3 849 | 1,637 | 0,039 | 0,297 | 0,347 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,411 | 0,010 | 3 726 | 3 849 | 1,243 | 0,024 | 0,391 | 0,431 |
| Actuellement marié/en union | 0,563 | 0,010 | 3 726 | 3 849 | 1,261 | 0,018 | 0,542 | 0,583 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,397 | 0,014 | 2 840 | 2 930 | 1,492 | 0,035 | 0,370 | 0,425 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,974 | 0,006 | 2 102 | 2 167 | 1,717 | 0,006 | 0,962 | 0,986 |
| Connaît une méthode moderne | 0,972 | 0,006 | 2 102 | 2 167 | 1,689 | 0,006 | 0,959 | 0,984 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,153 | 0,009 | 2 102 | 2 167 | 1,168 | 0,060 | 0,135 | 0,172 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,394 | 0,017 | 2 102 | 2 167 | 1,553 | 0,042 | 0,361 | 0,427 |
| Nombre idéal d'enfants | 7,733 | 0,161 | 3 528 | 3 642 | 1,711 | 0,021 | 7,412 | 8,054 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,209 | 0,009 | 3 726 | 3 849 | 1,276 | 0,041 | 0,192 | 0,226 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,036 | 0,004 | 3 726 | 3 849 | 1,362 | 0,115 | 0,028 | 0,045 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,556 | 0,019 | 1 313 | 1 361 | 1,375 | 0,034 | 0,519 | 0,594 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,223 | 0,017 | 1 028 | 1 083 | 1,289 | 0,075 | 0,190 | 0,257 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,047 | 0,004 | 3 726 | 3 849 | 1,262 | 0,093 | 0,039 | 0,056 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,758 | 0,012 | 3 323 | 3 420 | 1,585 | 0,016 | 0,735 | 0,782 |

Tableau B.7 Erreurs de sondage : Echantillon Alibori, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,871 | 0,017 | 1 089 | 1 192 | 1,676 | 0,020 | 0,837 | 0,905 |
| Ayant accès à une MII | 0,644 | 0,026 | 8 195 | 9 013 | 1,909 | 0,040 | 0,592 | 0,695 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,637 | 0,023 | 8 195 | 9 013 | 1,611 | 0,036 | 0,592 | 0,683 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,232 | 0,034 | 1 697 | 1 878 | 3,270 | 0,145 | 0,165 | 0,299 |
| Alphabétisée | 0,136 | 0,021 | 1 697 | 1 878 | 2,558 | 0,157 | 0,093 | 0,178 |
| Aucune instruction | 0,849 | 0,022 | 1 697 | 1 878 | 2,501 | 0,026 | 0,806 | 0,893 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,097 | 0,017 | 1 697 | 1 878 | 2,391 | 0,177 | 0,063 | 0,131 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,155 | 0,012 | 1 697 | 1 878 | 1,322 | 0,075 | 0,132 | 0,179 |
| Actuellement mariée/en union | 0,825 | 0,013 | 1 697 | 1 878 | 1,442 | 0,016 | 0,799 | 0,852 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,524 | 0,017 | 1 353 | 1 499 | 1,221 | 0,032 | 0,491 | 0,557 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,718 | 0,017 | 1 353 | 1 499 | 1,420 | 0,024 | 0,684 | 0,753 |
| Actuellement enceinte | 0,113 | 0,007 | 1 697 | 1 878 | 0,934 | 0,064 | 0,099 | 0,127 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,971 | 0,007 | 1 398 | 1 550 | 1,623 | 0,008 | 0,956 | 0,986 |
| Connait une méthode moderne | 0,970 | 0,007 | 1 398 | 1 550 | 1,602 | 0,008 | 0,956 | 0,985 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,157 | 0,013 | 1 398 | 1 550 | 1,365 | 0,085 | 0,130 | 0,183 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,135 | 0,013 | 1 398 | 1 550 | 1,425 | 0,096 | 0,109 | 0,161 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,011 | 0,003 | 1 398 | 1 550 | 1,247 | 0,317 | 0,004 | 0,018 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,013 | 0,004 | 1 398 | 1 550 | 1,481 | 0,347 | 0,004 | 0,022 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,001 | 0,001 | 1 398 | 1 550 | 0,785 | 0,732 | 0,000 | 0,002 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,033 | 0,006 | 1 398 | 1 550 | 1,247 | 0,180 | 0,021 | 0,045 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,000 | 0,000 | 1 398 | 1 550 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,000 | 0,000 | 1 398 | 1 550 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,019 | 0,005 | 1 398 | 1 550 | 1,266 | 0,244 | 0,010 | 0,028 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,841 | 0,026 | 225 | 244 | 1,069 | 0,031 | 0,789 | 0,893 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,067 | 0,010 | 1 398 | 1 550 | 1,428 | 0,143 | 0,048 | 0,086 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,238 | 0,023 | 1 398 | 1 550 | 1,994 | 0,096 | 0,193 | 0,284 |
| Nombre idéal d'enfants | 5,153 | 0,219 | 1 597 | 1 761 | 2,273 | 0,043 | 4,715 | 5,591 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,564 | 0,031 | 1 099 | 1 226 | 2,067 | 0,055 | 0,502 | 0,625 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,477 | 0,036 | 1 637 | 1 831 | 2,364 | 0,076 | 0,405 | 0,550 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,123 | 0,012 | 1 534 | 1 718 | 1,399 | 0,097 | 0,099 | 0,147 |
| Traités avec des SRO | 0,186 | 0,042 | 192 | 212 | 1,476 | 0,228 | 0,101 | 0,271 |
| Traitement médical recherché | 0,173 | 0,036 | 192 | 212 | 1,329 | 0,210 | 0,100 | 0,246 |
| Carnet de vaccination montré | 0,706 | 0,034 | 285 | 320 | 1,237 | 0,048 | 0,638 | 0,774 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,831 | 0,033 | 285 | 320 | 1,487 | 0,040 | 0,765 | 0,897 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,659 | 0,040 | 285 | 320 | 1,407 | 0,061 | 0,579 | 0,738 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,820 | 0,034 | 285 | 320 | 1,473 | 0,041 | 0,752 | 0,887 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,578 | 0,037 | 285 | 320 | 1,251 | 0,064 | 0,504 | 0,653 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,552 | 0,048 | 285 | 320 | 1,612 | 0,087 | 0,456 | 0,649 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,584 | 0,047 | 285 | 320 | 1,601 | 0,081 | 0,489 | 0,678 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,472 | 0,044 | 285 | 320 | 1,454 | 0,093 | 0,384 | 0,560 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,359 | 0,020 | 1 488 | 1 661 | 1,439 | 0,055 | 0,319 | 0,399 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,069 | 0,009 | 1 551 | 1 728 | 1,277 | 0,132 | 0,051 | 0,087 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,194 | 0,018 | 1 499 | 1 674 | 1,518 | 0,092 | 0,158 | 0,230 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,750 | 0,025 | 709 | 787 | 1,496 | 0,034 | 0,700 | 0,801 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,360 | 0,039 | 707 | 785 | 1,814 | 0,108 | 0,282 | 0,438 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,370 | 0,036 | 661 | 737 | 1,674 | 0,097 | 0,298 | 0,442 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,100 | 0,016 | 686 | 770 | 1,386 | 0,158 | 0,068 | 0,131 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,251 | 0,030 | 686 | 770 | 1,802 | 0,118 | 0,192 | 0,311 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,575 | 0,033 | 825 | 919 | 1,940 | 0,058 | 0,509 | 0,642 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,024 | 0,006 | 1 697 | 1 878 | 1,501 | 0,230 | 0,013 | 0,036 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,319 | 0,034 | 171 | 183 | 0,959 | 0,107 | 0,250 | 0,387 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,503 | 0,042 | 251 | 275 | 1,330 | 0,084 | 0,418 | 0,587 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,082 | 0,018 | 861 | 947 | 1,963 | 0,224 | 0,046 | 0,119 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,666 | 0,037 | 760 | 841 | 2,138 | 0,055 | 0,592 | 0,739 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,332 | 0,036 | 450 | 600 | 1,612 | 0,108 | 0,260 | 0,404 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,089 | 0,019 | 450 | 600 | 1,448 | 0,219 | 0,050 | 0,128 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,307 | 0,036 | 411 | 514 | 1,583 | 0,118 | 0,235 | 0,380 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,375 | 0,032 | 411 | 514 | 1,344 | 0,086 | 0,311 | 0,440 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,320 | 0,034 | 411 | 514 | 1,462 | 0,105 | 0,252 | 0,387 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 6,162 | 0,204 | 4 775 | 5 298 | 1,456 | 0,033 | 5,754 | 6,570 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 27,569 | 3,814 | 3 043 | 3 375 | 1,233 | 0,138 | 19,942 | 35,197 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 25,751 | 3,578 | 3 041 | 3 372 | 1,125 | 0,139 | 18,595 | 32,906 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 53,320 | 5,741 | 3 046 | 3 378 | 1,355 | 0,108 | 41,838 | 64,802 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 46,784 | 6,146 | 2 962 | 3 274 | 1,258 | 0,131 | 34,491 | 59,077 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 97,609 | 9,770 | 3 070 | 3 405 | 1,609 | 0,100 | 78,069 | 117,150 |

À suivre...

Tableau B.7—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N) ^a | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,221 | 0,030 | 826 | 917 | 2,086 | 0,137 | 0,161 | 0,282 |
| Alphabétisé | 0,390 | 0,044 | 826 | 917 | 2,597 | 0,114 | 0,301 | 0,478 |
| Aucune instruction | 0,694 | 0,038 | 826 | 917 | 2,353 | 0,055 | 0,618 | 0,769 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,199 | 0,031 | 826 | 917 | 2,239 | 0,157 | 0,137 | 0,262 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,443 | 0,021 | 826 | 917 | 1,207 | 0,047 | 0,401 | 0,485 |
| Actuellement marié/en union | 0,539 | 0,020 | 826 | 917 | 1,164 | 0,037 | 0,498 | 0,579 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,163 | 0,024 | 613 | 682 | 1,579 | 0,145 | 0,115 | 0,210 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,994 | 0,005 | 441 | 494 | 1,227 | 0,005 | 0,985 | 1,003 |
| Connaît une méthode moderne | 0,994 | 0,005 | 441 | 494 | 1,227 | 0,005 | 0,985 | 1,003 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,031 | 0,009 | 441 | 494 | 1,074 | 0,284 | 0,014 | 0,049 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,161 | 0,046 | 441 | 494 | 2,620 | 0,287 | 0,068 | 0,253 |
| Nombre idéal d'enfants | 10,676 | 0,450 | 803 | 890 | 1,841 | 0,042 | 9,777 | 11,575 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,187 | 0,020 | 826 | 917 | 1,445 | 0,105 | 0,147 | 0,226 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,036 | 0,011 | 826 | 917 | 1,691 | 0,307 | 0,014 | 0,057 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,649 | 0,039 | 310 | 342 | 1,415 | 0,059 | 0,572 | 0,726 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,242 | 0,050 | 209 | 230 | 1,665 | 0,205 | 0,142 | 0,341 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,035 | 0,010 | 826 | 917 | 1,598 | 0,291 | 0,015 | 0,056 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,857 | 0,018 | 590 | 649 | 1,264 | 0,021 | 0,821 | 0,894 |

Tableau B.8 Erreurs de sondage : Echantillon Atacora, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,940 | 0,016 | 993 | 923 | 2,176 | 0,018 | 0,907 | 0,973 |
| Ayant accès à une MII | 0,817 | 0,019 | 6 883 | 6 371 | 1,998 | 0,023 | 0,780 | 0,854 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,676 | 0,027 | 6 883 | 6 371 | 2,050 | 0,039 | 0,623 | 0,730 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,338 | 0,037 | 1 392 | 1 302 | 2,943 | 0,111 | 0,263 | 0,412 |
| Alphabétisée | 0,250 | 0,033 | 1 392 | 1 302 | 2,824 | 0,132 | 0,184 | 0,316 |
| Aucune instruction | 0,667 | 0,035 | 1 392 | 1 302 | 2,730 | 0,052 | 0,598 | 0,736 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,185 | 0,027 | 1 392 | 1 302 | 2,543 | 0,143 | 0,132 | 0,238 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,240 | 0,025 | 1 392 | 1 302 | 2,156 | 0,103 | 0,190 | 0,289 |
| Actuellement mariée/en union | 0,685 | 0,025 | 1 392 | 1 302 | 2,027 | 0,037 | 0,635 | 0,736 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,436 | 0,022 | 1 066 | 990 | 1,448 | 0,050 | 0,392 | 0,480 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,754 | 0,021 | 1 066 | 990 | 1,555 | 0,027 | 0,713 | 0,795 |
| Actuellement enceinte | 0,104 | 0,011 | 1 392 | 1 302 | 1,363 | 0,108 | 0,081 | 0,126 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,967 | 0,011 | 973 | 892 | 1,857 | 0,011 | 0,946 | 0,989 |
| Connait une méthode moderne | 0,963 | 0,011 | 973 | 892 | 1,859 | 0,012 | 0,941 | 0,986 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,108 | 0,017 | 973 | 892 | 1,694 | 0,157 | 0,074 | 0,141 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,100 | 0,016 | 973 | 892 | 1,713 | 0,165 | 0,067 | 0,133 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,004 | 0,002 | 973 | 892 | 0,959 | 0,486 | 0,000 | 0,008 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,005 | 0,003 | 973 | 892 | 1,192 | 0,554 | 0,000 | 0,010 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,011 | 0,004 | 973 | 892 | 1,315 | 0,404 | 0,002 | 0,019 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,009 | 0,004 | 973 | 892 | 1,157 | 0,379 | 0,002 | 0,017 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,001 | 0,001 | 973 | 892 | 0,866 | 1,011 | 0,000 | 0,002 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,002 | 0,001 | 973 | 892 | 1,004 | 0,718 | 0,000 | 0,005 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,002 | 0,002 | 973 | 892 | 1,058 | 0,719 | 0,000 | 0,005 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,747 | 0,063 | 147 | 157 | 1,751 | 0,085 | 0,621 | 0,874 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,183 | 0,014 | 973 | 892 | 1,167 | 0,079 | 0,154 | 0,212 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,478 | 0,024 | 973 | 892 | 1,466 | 0,049 | 0,431 | 0,525 |
| Nombre idéal d'enfants | 6,429 | 0,143 | 1 370 | 1 282 | 2,064 | 0,022 | 6,144 | 6,715 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,534 | 0,030 | 866 | 800 | 1,774 | 0,056 | 0,473 | 0,594 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,648 | 0,041 | 1 318 | 1 216 | 2,558 | 0,064 | 0,565 | 0,730 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,202 | 0,015 | 1 227 | 1 127 | 1,273 | 0,074 | 0,172 | 0,231 |
| Traités avec des SRO | 0,182 | 0,026 | 253 | 227 | 1,047 | 0,144 | 0,130 | 0,235 |
| Traitement médical recherché | 0,443 | 0,037 | 253 | 227 | 1,135 | 0,084 | 0,369 | 0,518 |
| Carnet de vaccination montré | 0,734 | 0,033 | 248 | 227 | 1,181 | 0,045 | 0,667 | 0,801 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,834 | 0,036 | 248 | 227 | 1,502 | 0,043 | 0,762 | 0,905 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,784 | 0,042 | 248 | 227 | 1,577 | 0,053 | 0,701 | 0,868 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,813 | 0,034 | 248 | 227 | 1,356 | 0,042 | 0,745 | 0,881 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,784 | 0,042 | 248 | 227 | 1,577 | 0,053 | 0,701 | 0,868 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,784 | 0,042 | 248 | 227 | 1,577 | 0,053 | 0,701 | 0,868 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,719 | 0,040 | 248 | 227 | 1,375 | 0,055 | 0,639 | 0,798 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,705 | 0,040 | 248 | 227 | 1,377 | 0,057 | 0,624 | 0,786 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,364 | 0,023 | 1 242 | 1 149 | 1,495 | 0,062 | 0,319 | 0,409 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,047 | 0,008 | 1 294 | 1 194 | 1,209 | 0,166 | 0,031 | 0,062 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,188 | 0,017 | 1 248 | 1 154 | 1,358 | 0,088 | 0,155 | 0,222 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,847 | 0,021 | 596 | 555 | 1,330 | 0,025 | 0,805 | 0,889 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,539 | 0,044 | 596 | 555 | 1,845 | 0,081 | 0,452 | 0,626 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,497 | 0,043 | 570 | 534 | 1,786 | 0,086 | 0,412 | 0,582 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,154 | 0,015 | 616 | 585 | 1,007 | 0,094 | 0,125 | 0,183 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,123 | 0,020 | 616 | 585 | 1,534 | 0,164 | 0,083 | 0,164 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,674 | 0,020 | 718 | 681 | 1,127 | 0,029 | 0,635 | 0,714 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,053 | 0,010 | 1 392 | 1 302 | 1,710 | 0,194 | 0,032 | 0,073 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,165 | 0,033 | 247 | 250 | 1,394 | 0,200 | 0,099 | 0,231 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,408 | 0,045 | 286 | 287 | 1,527 | 0,109 | 0,319 | 0,497 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,100 | 0,018 | 666 | 614 | 1,551 | 0,181 | 0,063 | 0,136 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,666 | 0,036 | 621 | 577 | 1,896 | 0,054 | 0,594 | 0,738 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,296 | 0,025 | 419 | 455 | 1,142 | 0,086 | 0,245 | 0,347 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,106 | 0,022 | 419 | 455 | 1,478 | 0,210 | 0,061 | 0,151 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,273 | 0,027 | 344 | 346 | 1,116 | 0,098 | 0,219 | 0,327 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,528 | 0,041 | 344 | 346 | 1,526 | 0,078 | 0,445 | 0,610 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,428 | 0,041 | 344 | 346 | 1,547 | 0,097 | 0,345 | 0,511 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 6,711 | 0,326 | 3 860 | 3 602 | 1,825 | 0,049 | 6,058 | 7,364 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 27,118 | 3,490 | 2 451 | 2 252 | 1,002 | 0,129 | 20,138 | 34,098 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 36,226 | 3,926 | 2 438 | 2 238 | 0,966 | 0,108 | 28,374 | 44,079 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 63,344 | 6,066 | 2 457 | 2 258 | 1,090 | 0,096 | 51,212 | 75,476 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 62,681 | 5,270 | 2 394 | 2 199 | 0,924 | 0,084 | 52,142 | 73,221 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 122,055 | 6,962 | 2 481 | 2 280 | 0,898 | 0,057 | 108,131 | 135,979 |

À suivre...

Tableau B.8—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,340 | 0,038 | 604 | 560 | 1,951 | 0,111 | 0,265 | 0,416 |
| Alphabétisé | 0,423 | 0,045 | 604 | 560 | 2,229 | 0,106 | 0,333 | 0,513 |
| Aucune instruction | 0,474 | 0,048 | 604 | 560 | 2,342 | 0,101 | 0,378 | 0,569 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,337 | 0,042 | 604 | 560 | 2,187 | 0,125 | 0,253 | 0,422 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,430 | 0,032 | 604 | 560 | 1,593 | 0,075 | 0,366 | 0,495 |
| Actuellement marié/en union | 0,536 | 0,031 | 604 | 560 | 1,538 | 0,058 | 0,473 | 0,598 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,328 | 0,036 | 478 | 444 | 1,649 | 0,108 | 0,257 | 0,399 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,993 | 0,005 | 335 | 300 | 1,153 | 0,005 | 0,982 | 1,003 |
| Connaît une méthode moderne | 0,993 | 0,005 | 335 | 300 | 1,153 | 0,005 | 0,982 | 1,003 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,122 | 0,018 | 335 | 300 | 1,001 | 0,147 | 0,086 | 0,158 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,491 | 0,030 | 335 | 300 | 1,103 | 0,061 | 0,431 | 0,552 |
| Nombre idéal d'enfants | 7,188 | 0,320 | 566 | 521 | 1,849 | 0,045 | 6,548 | 7,828 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,217 | 0,032 | 604 | 560 | 1,925 | 0,149 | 0,152 | 0,282 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,023 | 0,008 | 604 | 560 | 1,248 | 0,334 | 0,007 | 0,038 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,552 | 0,051 | 205 | 196 | 1,460 | 0,092 | 0,450 | 0,654 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,105 | 0,029 | 216 | 219 | 1,365 | 0,273 | 0,048 | 0,162 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,089 | 0,023 | 604 | 560 | 1,982 | 0,259 | 0,043 | 0,135 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,727 | 0,031 | 592 | 550 | 1,708 | 0,043 | 0,665 | 0,790 |

Tableau B.9 Erreurs de sondage : Echantillon Atlantique, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,946 | 0,007 | 1 636 | 1 969 | 1,247 | 0,007 | 0,932 | 0,960 |
| Ayant accès à une MII | 0,851 | 0,009 | 7 282 | 8 655 | 1,326 | 0,011 | 0,833 | 0,870 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,787 | 0,014 | 7 282 | 8 655 | 1,522 | 0,018 | 0,758 | 0,816 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,451 | 0,030 | 1 702 | 2 037 | 2,504 | 0,067 | 0,391 | 0,512 |
| Alphabétisée | 0,440 | 0,026 | 1 702 | 2 037 | 2,135 | 0,058 | 0,389 | 0,492 |
| Aucune instruction | 0,407 | 0,022 | 1 702 | 2 037 | 1,860 | 0,054 | 0,363 | 0,451 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,315 | 0,024 | 1 702 | 2 037 | 2,096 | 0,075 | 0,268 | 0,362 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,277 | 0,018 | 1 702 | 2 037 | 1,665 | 0,065 | 0,241 | 0,314 |
| Actuellement mariée/en union | 0,644 | 0,019 | 1 702 | 2 037 | 1,655 | 0,030 | 0,605 | 0,682 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,308 | 0,018 | 1 349 | 1 624 | 1,433 | 0,058 | 0,272 | 0,345 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,539 | 0,025 | 1 349 | 1 624 | 1,863 | 0,047 | 0,488 | 0,589 |
| Actuellement enceinte | 0,096 | 0,008 | 1 702 | 2 037 | 1,153 | 0,086 | 0,080 | 0,113 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,988 | 0,005 | 1 100 | 1 311 | 1,401 | 0,005 | 0,979 | 0,997 |
| Connait une méthode moderne | 0,988 | 0,005 | 1 100 | 1 311 | 1,401 | 0,005 | 0,979 | 0,997 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,214 | 0,021 | 1 100 | 1 311 | 1,664 | 0,096 | 0,172 | 0,255 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,137 | 0,017 | 1 100 | 1 311 | 1,640 | 0,124 | 0,103 | 0,172 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,016 | 0,004 | 1 100 | 1 311 | 1,138 | 0,266 | 0,008 | 0,025 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,026 | 0,006 | 1 100 | 1 311 | 1,191 | 0,219 | 0,015 | 0,038 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,022 | 0,006 | 1 100 | 1 311 | 1,428 | 0,290 | 0,009 | 0,034 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,022 | 0,005 | 1 100 | 1 311 | 1,070 | 0,215 | 0,013 | 0,032 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,004 | 0,002 | 1 100 | 1 311 | 1,183 | 0,582 | 0,000 | 0,008 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,036 | 0,007 | 1 100 | 1 311 | 1,186 | 0,186 | 0,022 | 0,049 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,038 | 0,008 | 1 100 | 1 311 | 1,432 | 0,217 | 0,022 | 0,055 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,411 | 0,038 | 214 | 250 | 1,115 | 0,091 | 0,336 | 0,486 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,360 | 0,018 | 1 100 | 1 311 | 1,224 | 0,049 | 0,325 | 0,396 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,303 | 0,017 | 1 100 | 1 311 | 1,219 | 0,056 | 0,269 | 0,337 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,465 | 0,086 | 1 588 | 1 904 | 1,813 | 0,019 | 4,292 | 4,637 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,796 | 0,021 | 855 | 1 043 | 1,556 | 0,027 | 0,753 | 0,839 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,940 | 0,012 | 1 291 | 1 568 | 1,416 | 0,012 | 0,917 | 0,964 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,092 | 0,010 | 1 198 | 1 448 | 1,198 | 0,108 | 0,072 | 0,112 |
| Traités avec des SRO | 0,201 | 0,043 | 114 | 133 | 1,127 | 0,213 | 0,115 | 0,286 |
| Traitement médical recherché | 0,355 | 0,059 | 114 | 133 | 1,286 | 0,166 | 0,237 | 0,473 |
| Carnet de vaccination montré | 0,720 | 0,035 | 259 | 308 | 1,215 | 0,049 | 0,649 | 0,791 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,957 | 0,015 | 259 | 308 | 1,165 | 0,015 | 0,928 | 0,987 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,793 | 0,033 | 259 | 308 | 1,273 | 0,042 | 0,726 | 0,859 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,954 | 0,016 | 259 | 308 | 1,188 | 0,016 | 0,923 | 0,985 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,684 | 0,041 | 259 | 308 | 1,375 | 0,060 | 0,601 | 0,766 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,795 | 0,033 | 259 | 308 | 1,285 | 0,042 | 0,728 | 0,862 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,737 | 0,032 | 259 | 308 | 1,117 | 0,043 | 0,673 | 0,800 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,599 | 0,041 | 259 | 308 | 1,310 | 0,069 | 0,516 | 0,681 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,301 | 0,019 | 1 187 | 1 426 | 1,292 | 0,062 | 0,263 | 0,338 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,041 | 0,006 | 1 227 | 1 473 | 1,048 | 0,150 | 0,029 | 0,054 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,168 | 0,012 | 1 188 | 1 427 | 1,010 | 0,070 | 0,144 | 0,191 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,675 | 0,025 | 565 | 675 | 1,190 | 0,037 | 0,626 | 0,725 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,237 | 0,032 | 565 | 675 | 1,494 | 0,133 | 0,174 | 0,300 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,342 | 0,033 | 530 | 625 | 1,463 | 0,097 | 0,276 | 0,408 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,098 | 0,011 | 763 | 910 | 1,011 | 0,111 | 0,076 | 0,120 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,314 | 0,021 | 763 | 910 | 1,222 | 0,066 | 0,273 | 0,355 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,602 | 0,022 | 865 | 1 030 | 1,314 | 0,036 | 0,558 | 0,646 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,011 | 0,003 | 1 702 | 2 037 | 1,117 | 0,253 | 0,006 | 0,017 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,254 | 0,031 | 240 | 296 | 1,115 | 0,124 | 0,191 | 0,316 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,550 | 0,031 | 434 | 512 | 1,293 | 0,056 | 0,488 | 0,612 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,190 | 0,019 | 808 | 971 | 1,396 | 0,102 | 0,151 | 0,229 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,752 | 0,020 | 769 | 931 | 1,291 | 0,027 | 0,711 | 0,792 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,307 | 0,023 | 627 | 694 | 1,259 | 0,076 | 0,260 | 0,353 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,113 | 0,014 | 627 | 694 | 1,133 | 0,127 | 0,084 | 0,142 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,231 | 0,023 | 514 | 517 | 1,244 | 0,100 | 0,185 | 0,277 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,442 | 0,026 | 514 | 517 | 1,182 | 0,059 | 0,390 | 0,494 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,288 | 0,025 | 514 | 517 | 1,256 | 0,087 | 0,238 | 0,338 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 4,919 | 0,227 | 4 766 | 5 710 | 1,419 | 0,046 | 4,465 | 5,373 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 42,529 | 5,859 | 2 493 | 3 021 | 1,309 | 0,138 | 30,811 | 54,248 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 23,223 | 3,082 | 2 486 | 3 018 | 0,945 | 0,133 | 17,059 | 29,386 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 65,752 | 6,429 | 2 495 | 3 026 | 1,183 | 0,098 | 52,894 | 78,610 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 45,565 | 4,386 | 2 455 | 2 975 | 0,926 | 0,096 | 36,793 | 54,337 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 108,321 | 7,609 | 2 510 | 3 046 | 1,105 | 0,070 | 93,102 | 123,540 |

À suivre...

Tableau B.9—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N) ^a | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,477 | 0,033 | 681 | 822 | 1,742 | 0,070 | 0,410 | 0,544 |
| Alphabétisé | 0,655 | 0,034 | 681 | 822 | 1,847 | 0,052 | 0,587 | 0,722 |
| Aucune instruction | 0,157 | 0,019 | 681 | 822 | 1,350 | 0,120 | 0,119 | 0,195 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,522 | 0,031 | 681 | 822 | 1,596 | 0,059 | 0,460 | 0,583 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,429 | 0,024 | 681 | 822 | 1,273 | 0,056 | 0,380 | 0,477 |
| Actuellement marié/en union | 0,543 | 0,024 | 681 | 822 | 1,239 | 0,044 | 0,495 | 0,590 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,526 | 0,025 | 523 | 638 | 1,126 | 0,047 | 0,477 | 0,575 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,989 | 0,006 | 363 | 446 | 1,149 | 0,006 | 0,977 | 1,002 |
| Connaît une méthode moderne | 0,987 | 0,007 | 363 | 446 | 1,098 | 0,007 | 0,973 | 1,000 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,302 | 0,028 | 363 | 446 | 1,180 | 0,094 | 0,245 | 0,359 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,294 | 0,029 | 363 | 446 | 1,225 | 0,100 | 0,235 | 0,353 |
| Nombre idéal d'enfants | 5,624 | 0,217 | 663 | 803 | 1,265 | 0,039 | 5,190 | 6,059 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,285 | 0,023 | 681 | 822 | 1,330 | 0,081 | 0,239 | 0,331 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,017 | 0,005 | 681 | 822 | 1,040 | 0,302 | 0,007 | 0,028 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,550 | 0,033 | 244 | 280 | 1,036 | 0,060 | 0,484 | 0,616 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,366 | 0,035 | 257 | 312 | 1,167 | 0,096 | 0,296 | 0,437 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,076 | 0,012 | 681 | 822 | 1,140 | 0,153 | 0,053 | 0,099 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,653 | 0,030 | 642 | 779 | 1,575 | 0,045 | 0,594 | 0,712 |

Tableau B.10 Erreurs de sondage : Echantillon Borgou, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon-déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,880 | 0,012 | 1 435 | 1 498 | 1,393 | 0,014 | 0,856 | 0,904 |
| Ayant accès à une MII | 0,685 | 0,016 | 8 862 | 9 195 | 1,604 | 0,023 | 0,654 | 0,717 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,677 | 0,015 | 8 862 | 9 195 | 1,380 | 0,022 | 0,647 | 0,707 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,450 | 0,025 | 1 765 | 1 839 | 2,125 | 0,056 | 0,400 | 0,500 |
| Alphabétisée | 0,308 | 0,030 | 1 765 | 1 839 | 2,687 | 0,096 | 0,248 | 0,367 |
| Aucune instruction | 0,654 | 0,032 | 1 765 | 1 839 | 2,816 | 0,049 | 0,590 | 0,718 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,217 | 0,026 | 1 765 | 1 839 | 2,678 | 0,121 | 0,164 | 0,270 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,219 | 0,018 | 1 765 | 1 839 | 1,860 | 0,084 | 0,182 | 0,255 |
| Actuellement mariée/en union | 0,751 | 0,021 | 1 765 | 1 839 | 2,022 | 0,028 | 0,709 | 0,793 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,457 | 0,024 | 1 400 | 1 448 | 1,814 | 0,053 | 0,408 | 0,505 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,705 | 0,017 | 1 400 | 1 448 | 1,376 | 0,024 | 0,671 | 0,738 |
| Actuellement enceinte | 0,134 | 0,008 | 1 765 | 1 839 | 0,928 | 0,056 | 0,119 | 0,149 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,884 | 0,018 | 1 348 | 1 381 | 2,013 | 0,020 | 0,849 | 0,919 |
| Connait une méthode moderne | 0,877 | 0,018 | 1 348 | 1 381 | 2,037 | 0,021 | 0,841 | 0,913 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,128 | 0,011 | 1 348 | 1 381 | 1,181 | 0,084 | 0,107 | 0,150 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,120 | 0,010 | 1 348 | 1 381 | 1,096 | 0,081 | 0,101 | 0,140 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,011 | 0,003 | 1 348 | 1 381 | 1,213 | 0,317 | 0,004 | 0,018 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,009 | 0,003 | 1 348 | 1 381 | 1,164 | 0,329 | 0,003 | 0,015 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,002 | 0,001 | 1 348 | 1 381 | 1,010 | 0,571 | 0,000 | 0,005 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,029 | 0,005 | 1 348 | 1 381 | 1,119 | 0,176 | 0,019 | 0,040 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,000 | 0,000 | 1 348 | 1 381 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,000 | 0,000 | 1 348 | 1 381 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,005 | 0,002 | 1 348 | 1 381 | 1,007 | 0,380 | 0,001 | 0,009 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,732 | 0,048 | 201 | 222 | 1514 | 0,065 | 0,637 | 0,827 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,189 | 0,014 | 1 348 | 1 381 | 1,271 | 0,072 | 0,162 | 0,216 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,368 | 0,021 | 1 348 | 1 381 | 1,623 | 0,058 | 0,325 | 0,410 |
| Nombre idéal d'enfants | 6,266 | 0,212 | 1 627 | 1 698 | 3,213 | 0,034 | 5,842 | 6,689 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,549 | 0,033 | 1 133 | 1 164 | 2,223 | 0,060 | 0,483 | 0,615 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,599 | 0,040 | 1 752 | 1 784 | 2,701 | 0,066 | 0,519 | 0,679 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,067 | 0,008 | 1 643 | 1 678 | 1,225 | 0,115 | 0,052 | 0,083 |
| Traités avec des SRO | 0,263 | 0,040 | 110 | 113 | 0,916 | 0,151 | 0,183 | 0,342 |
| Traitement médical recherché | 0,566 | 0,056 | 110 | 113 | 1,162 | 0,099 | 0,454 | 0,678 |
| Carnet de vaccination montré | 0,586 | 0,040 | 348 | 346 | 1,481 | 0,069 | 0,506 | 0,667 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,730 | 0,038 | 348 | 346 | 1,572 | 0,052 | 0,654 | 0,807 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,540 | 0,036 | 348 | 346 | 1,309 | 0,067 | 0,468 | 0,612 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,718 | 0,036 | 348 | 346 | 1,451 | 0,050 | 0,647 | 0,790 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,501 | 0,036 | 348 | 346 | 1,293 | 0,071 | 0,429 | 0,572 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,535 | 0,036 | 348 | 346 | 1,302 | 0,067 | 0,463 | 0,607 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,542 | 0,038 | 348 | 346 | 1,372 | 0,070 | 0,467 | 0,618 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,407 | 0,033 | 348 | 346 | 1,229 | 0,082 | 0,340 | 0,474 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,342 | 0,019 | 1 558 | 1 618 | 1,432 | 0,055 | 0,304 | 0,379 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,051 | 0,006 | 1 765 | 1 811 | 1,224 | 0,125 | 0,038 | 0,064 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,183 | 0,017 | 1 562 | 1 621 | 1,558 | 0,091 | 0,150 | 0,217 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,744 | 0,022 | 803 | 818 | 1,357 | 0,029 | 0,700 | 0,788 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,513 | 0,037 | 801 | 817 | 1,712 | 0,072 | 0,440 | 0,587 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,449 | 0,039 | 771 | 785 | 1,815 | 0,088 | 0,371 | 0,528 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,119 | 0,015 | 740 | 783 | 1,273 | 0,126 | 0,089 | 0,149 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,199 | 0,023 | 740 | 783 | 1,607 | 0,118 | 0,153 | 0,246 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,511 | 0,023 | 882 | 924 | 1,378 | 0,045 | 0,465 | 0,558 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,012 | 0,003 | 1 765 | 1 839 | 1,042 | 0,226 | 0,007 | 0,017 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,202 | 0,033 | 209 | 228 | 1,191 | 0,164 | 0,135 | 0,268 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,474 | 0,035 | 344 | 374 | 1,288 | 0,073 | 0,404 | 0,543 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,101 | 0,014 | 858 | 890 | 1,397 | 0,143 | 0,072 | 0,130 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,845 | 0,022 | 618 | 639 | 1,526 | 0,026 | 0,801 | 0,890 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,211 | 0,024 | 538 | 631 | 1,341 | 0,112 | 0,164 | 0,259 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,111 | 0,019 | 538 | 631 | 1,378 | 0,168 | 0,074 | 0,149 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,209 | 0,025 | 441 | 465 | 1,310 | 0,121 | 0,158 | 0,260 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,419 | 0,034 | 441 | 465 | 1,427 | 0,080 | 0,352 | 0,486 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,294 | 0,030 | 441 | 465 | 1,359 | 0,100 | 0,235 | 0,353 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 6,232 | 0,305 | 4 946 | 5 144 | 1,892 | 0,049 | 5,623 | 6,842 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 30,624 | 3,497 | 3 226 | 3 255 | 0,975 | 0,114 | 23,629 | 37,619 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 20,886 | 3,201 | 3 219 | 3 246 | 1,046 | 0,153 | 14,484 | 27,287 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 51,510 | 3,921 | 3 231 | 3 260 | 0,841 | 0,076 | 43,667 | 59,352 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 37,113 | 4,740 | 3 127 | 3 145 | 1,087 | 0,128 | 27,634 | 46,592 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 86,711 | 7,185 | 3 249 | 3 280 | 1,132 | 0,083 | 72,341 | 101,081 |

À suivre...

Tableau B.10—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N) ^a | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,465 | 0,025 | 798 | 823 | 1,419 | 0,054 | 0,415 | 0,515 |
| Alphabétisé | 0,418 | 0,035 | 798 | 823 | 2,025 | 0,085 | 0,347 | 0,489 |
| Aucune instruction | 0,489 | 0,039 | 798 | 823 | 2,182 | 0,079 | 0,411 | 0,566 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,333 | 0,032 | 798 | 823 | 1,940 | 0,097 | 0,268 | 0,398 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,382 | 0,023 | 798 | 823 | 1,342 | 0,060 | 0,336 | 0,429 |
| Actuellement marié/en union | 0,599 | 0,024 | 798 | 823 | 1,390 | 0,040 | 0,550 | 0,647 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,299 | 0,032 | 642 | 659 | 1,759 | 0,107 | 0,235 | 0,362 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,996 | 0,003 | 483 | 493 | 0,917 | 0,003 | 0,991 | 1,001 |
| Connaît une méthode moderne | 0,990 | 0,005 | 483 | 493 | 1,212 | 0,005 | 0,979 | 1,001 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,124 | 0,018 | 483 | 493 | 1,201 | 0,146 | 0,088 | 0,160 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,518 | 0,027 | 483 | 493 | 1,202 | 0,053 | 0,463 | 0,573 |
| Nombre idéal d'enfants | 8,487 | 0,458 | 745 | 770 | 1,985 | 0,054 | 7,571 | 9,402 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,137 | 0,017 | 798 | 823 | 1,395 | 0,124 | 0,103 | 0,171 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,048 | 0,012 | 798 | 823 | 1,560 | 0,247 | 0,024 | 0,071 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,559 | 0,038 | 244 | 253 | 1,203 | 0,069 | 0,483 | 0,636 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,441 | 0,066 | 162 | 171 | 1,679 | 0,150 | 0,309 | 0,574 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,038 | 0,008 | 798 | 823 | 1,171 | 0,208 | 0,022 | 0,054 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,741 | 0,028 | 782 | 810 | 1,755 | 0,037 | 0,686 | 0,796 |

Tableau B.11 Erreurs de sondage : Echantillon Collines, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,963 | 0,005 | 1 183 | 981 | 0,941 | 0,005 | 0,953 | 0,973 |
| Ayant accès à une MII | 0,830 | 0,011 | 5 793 | 4 758 | 1,211 | 0,014 | 0,807 | 0,853 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,681 | 0,020 | 5 793 | 4 758 | 1,579 | 0,030 | 0,641 | 0,721 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,228 | 0,023 | 1 403 | 1 151 | 2,039 | 0,100 | 0,182 | 0,274 |
| Alphabétisée | 0,375 | 0,025 | 1 403 | 1 151 | 1,931 | 0,067 | 0,325 | 0,425 |
| Aucune instruction | 0,489 | 0,027 | 1 403 | 1 151 | 2,034 | 0,056 | 0,434 | 0,543 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,279 | 0,022 | 1 403 | 1 151 | 1,829 | 0,079 | 0,235 | 0,322 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,289 | 0,023 | 1 403 | 1 151 | 1,897 | 0,080 | 0,243 | 0,335 |
| Actuellement mariée/en union | 0,641 | 0,026 | 1 403 | 1 151 | 2,025 | 0,041 | 0,589 | 0,693 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,397 | 0,024 | 1 034 | 846 | 1,558 | 0,060 | 0,349 | 0,444 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,730 | 0,016 | 1 034 | 846 | 1,122 | 0,021 | 0,699 | 0,761 |
| Actuellement enceinte | 0,113 | 0,010 | 1 403 | 1 151 | 1,153 | 0,086 | 0,094 | 0,133 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,976 | 0,008 | 900 | 738 | 1,571 | 0,008 | 0,960 | 0,992 |
| Connait une méthode moderne | 0,971 | 0,008 | 900 | 738 | 1,429 | 0,008 | 0,955 | 0,987 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,207 | 0,021 | 900 | 738 | 1,574 | 0,103 | 0,164 | 0,250 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,181 | 0,021 | 900 | 738 | 1,604 | 0,114 | 0,140 | 0,223 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,029 | 0,008 | 900 | 738 | 1,432 | 0,276 | 0,013 | 0,045 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,007 | 0,004 | 900 | 738 | 1,295 | 0,527 | 0,000 | 0,014 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,016 | 0,005 | 900 | 738 | 1,106 | 0,291 | 0,007 | 0,025 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,036 | 0,007 | 900 | 738 | 1,166 | 0,202 | 0,021 | 0,050 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,002 | 0,001 | 900 | 738 | 0,812 | 0,542 | 0,000 | 0,005 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,025 | 0,006 | 900 | 738 | 1,141 | 0,238 | 0,013 | 0,037 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,000 | 0,000 | 900 | 738 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,656 | 0,044 | 221 | 174 | 1,384 | 0,068 | 0,568 | 0,745 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,370 | 0,021 | 900 | 738 | 1,276 | 0,056 | 0,329 | 0,411 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,393 | 0,024 | 900 | 738 | 1,454 | 0,060 | 0,345 | 0,440 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,750 | 0,070 | 1 358 | 1 114 | 1,471 | 0,015 | 4,610 | 4,889 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,722 | 0,028 | 731 | 604 | 1,698 | 0,039 | 0,666 | 0,778 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,935 | 0,021 | 1 059 | 869 | 2,258 | 0,022 | 0,894 | 0,977 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,089 | 0,010 | 993 | 814 | 1,070 | 0,111 | 0,069 | 0,109 |
| Traités avec des SRO | 0,333 | 0,053 | 85 | 72 | 1,025 | 0,159 | 0,227 | 0,439 |
| Traitement médical recherché | 0,621 | 0,058 | 85 | 72 | 1,087 | 0,094 | 0,504 | 0,738 |
| Carnet de vaccination montré | 0,786 | 0,032 | 186 | 156 | 1,070 | 0,041 | 0,721 | 0,851 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,981 | 0,015 | 186 | 156 | 1,501 | 0,015 | 0,951 | 1,011 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,869 | 0,041 | 186 | 156 | 1,700 | 0,048 | 0,786 | 0,952 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,887 | 0,029 | 186 | 156 | 1,260 | 0,033 | 0,829 | 0,945 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,796 | 0,039 | 186 | 156 | 1,353 | 0,050 | 0,717 | 0,875 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,876 | 0,038 | 186 | 156 | 1,592 | 0,043 | 0,800 | 0,952 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,814 | 0,036 | 186 | 156 | 1,284 | 0,044 | 0,742 | 0,886 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,682 | 0,047 | 186 | 156 | 1,399 | 0,069 | 0,587 | 0,776 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,237 | 0,018 | 1 012 | 835 | 1,235 | 0,076 | 0,201 | 0,273 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,036 | 0,008 | 1 030 | 849 | 1,230 | 0,225 | 0,020 | 0,053 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,100 | 0,011 | 1 015 | 837 | 1,040 | 0,107 | 0,079 | 0,122 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,662 | 0,029 | 472 | 385 | 1,218 | 0,044 | 0,603 | 0,720 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,416 | 0,033 | 469 | 383 | 1,382 | 0,080 | 0,349 | 0,483 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,423 | 0,037 | 450 | 366 | 1,417 | 0,088 | 0,349 | 0,498 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,083 | 0,015 | 589 | 482 | 1,332 | 0,183 | 0,053 | 0,114 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,241 | 0,025 | 589 | 482 | 1,416 | 0,104 | 0,191 | 0,291 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,395 | 0,025 | 683 | 560 | 1,353 | 0,064 | 0,345 | 0,446 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,011 | 0,004 | 1 403 | 1 151 | 1,513 | 0,388 | 0,002 | 0,019 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,153 | 0,021 | 272 | 219 | 0,937 | 0,134 | 0,112 | 0,194 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,410 | 0,027 | 388 | 317 | 1,095 | 0,067 | 0,356 | 0,465 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,152 | 0,018 | 716 | 588 | 1,326 | 0,117 | 0,116 | 0,187 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,800 | 0,024 | 701 | 576 | 1,590 | 0,030 | 0,751 | 0,848 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,292 | 0,029 | 452 | 375 | 1,369 | 0,100 | 0,233 | 0,351 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,134 | 0,020 | 452 | 375 | 1,266 | 0,152 | 0,093 | 0,174 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,253 | 0,025 | 370 | 289 | 1,105 | 0,099 | 0,203 | 0,303 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,435 | 0,035 | 370 | 289 | 1,371 | 0,081 | 0,364 | 0,505 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,357 | 0,036 | 370 | 289 | 1,446 | 0,101 | 0,285 | 0,429 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,355 | 0,283 | 3 792 | 3 104 | 1,508 | 0,053 | 4,788 | 5,922 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 37,269 | 6,434 | 1 968 | 1 599 | 1,361 | 0,173 | 24,400 | 50,137 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 28,313 | 4,566 | 1 965 | 1 593 | 1,067 | 0,161 | 19,180 | 37,446 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 65,582 | 7,874 | 1 970 | 1 601 | 1,192 | 0,120 | 49,834 | 81,329 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 40,366 | 5,191 | 1 903 | 1 539 | 0,970 | 0,129 | 29,985 | 50,747 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 103,300 | 7,970 | 1 991 | 1 616 | 0,996 | 0,077 | 87,359 | 119,241 |

À suivre...

Tableau B.11—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N) ^a | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,224 | 0,017 | 554 | 448 | 0,932 | 0,074 | 0,191 | 0,257 |
| Alphabétisé | 0,555 | 0,032 | 554 | 448 | 1,506 | 0,057 | 0,491 | 0,619 |
| Aucune instruction | 0,297 | 0,029 | 554 | 448 | 1,465 | 0,096 | 0,240 | 0,354 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,452 | 0,030 | 554 | 448 | 1,419 | 0,066 | 0,392 | 0,512 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,437 | 0,028 | 554 | 448 | 1,309 | 0,063 | 0,382 | 0,492 |
| Actuellement marié/en union | 0,534 | 0,026 | 554 | 448 | 1,247 | 0,050 | 0,481 | 0,587 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,337 | 0,030 | 403 | 332 | 1,289 | 0,090 | 0,276 | 0,398 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,967 | 0,013 | 288 | 239 | 1,268 | 0,014 | 0,940 | 0,994 |
| Connaît une méthode moderne | 0,967 | 0,013 | 288 | 239 | 1,268 | 0,014 | 0,940 | 0,994 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,211 | 0,027 | 288 | 239 | 1,140 | 0,130 | 0,156 | 0,266 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,650 | 0,029 | 288 | 239 | 1,017 | 0,044 | 0,593 | 0,708 |
| Nombre idéal d'enfants | 5,956 | 0,218 | 554 | 448 | 1,399 | 0,037 | 5,520 | 6,392 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,233 | 0,028 | 554 | 448 | 1,560 | 0,121 | 0,177 | 0,289 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,040 | 0,014 | 554 | 448 | 1,707 | 0,357 | 0,011 | 0,068 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,509 | 0,036 | 213 | 164 | 1,047 | 0,071 | 0,437 | 0,581 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,252 | 0,035 | 198 | 159 | 1,140 | 0,140 | 0,181 | 0,322 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,036 | 0,010 | 554 | 448 | 1,308 | 0,289 | 0,015 | 0,056 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,802 | 0,029 | 499 | 402 | 1,621 | 0,036 | 0,744 | 0,860 |

Tableau B.12 Erreurs de sondage : Echantillon Couffo, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon-déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,954 | 0,009 | 1 070 | 1 108 | 1,432 | 0,010 | 0,936 | 0,973 |
| Ayant accès à une MII | 0,804 | 0,014 | 4 970 | 5 071 | 1,339 | 0,017 | 0,777 | 0,831 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,708 | 0,017 | 4 970 | 5 071 | 1,337 | 0,024 | 0,674 | 0,743 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,290 | 0,025 | 1 012 | 1 041 | 1,746 | 0,086 | 0,240 | 0,340 |
| Alphabétisée | 0,301 | 0,028 | 1 012 | 1 041 | 1,921 | 0,092 | 0,245 | 0,356 |
| Aucune instruction | 0,538 | 0,028 | 1 012 | 1 041 | 1,810 | 0,053 | 0,481 | 0,595 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,222 | 0,028 | 1 012 | 1 041 | 2,124 | 0,125 | 0,167 | 0,278 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,249 | 0,022 | 1 012 | 1 041 | 1,613 | 0,088 | 0,205 | 0,293 |
| Actuellement mariée/en union | 0,713 | 0,022 | 1 012 | 1 041 | 1,529 | 0,030 | 0,670 | 0,757 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,290 | 0,020 | 802 | 821 | 1,277 | 0,071 | 0,249 | 0,331 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,406 | 0,022 | 802 | 821 | 1,286 | 0,055 | 0,362 | 0,451 |
| Actuellement enceinte | 0,117 | 0,010 | 1 012 | 1 041 | 1,032 | 0,089 | 0,096 | 0,138 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,983 | 0,006 | 728 | 743 | 1,230 | 0,006 | 0,972 | 0,995 |
| Connait une méthode moderne | 0,983 | 0,006 | 728 | 743 | 1,230 | 0,006 | 0,972 | 0,995 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,062 | 0,011 | 728 | 743 | 1,278 | 0,184 | 0,039 | 0,085 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,045 | 0,009 | 728 | 743 | 1,190 | 0,205 | 0,026 | 0,063 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,010 | 0,004 | 728 | 743 | 1,215 | 0,459 | 0,001 | 0,018 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,000 | 0,000 | 728 | 743 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,007 | 0,003 | 728 | 743 | 1,043 | 0,449 | 0,001 | 0,014 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,012 | 0,004 | 728 | 743 | 0,991 | 0,331 | 0,004 | 0,020 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,002 | 0,002 | 728 | 743 | 1,135 | 0,998 | 0,000 | 0,005 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,006 | 0,003 | 728 | 743 | 0,969 | 0,447 | 0,001 | 0,012 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,011 | 0,004 | 728 | 743 | 0,960 | 0,336 | 0,004 | 0,019 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,583 | 0,075 | 40 | 43 | 0,949 | 0,128 | 0,433 | 0,733 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,202 | 0,017 | 728 | 743 | 1,124 | 0,083 | 0,168 | 0,235 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,452 | 0,020 | 728 | 743 | 1,069 | 0,044 | 0,412 | 0,491 |
| Nombre idéal d'enfants | 6,164 | 0,123 | 964 | 992 | 1,732 | 0,020 | 5,919 | 6,410 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,796 | 0,023 | 572 | 583 | 1,383 | 0,029 | 0,749 | 0,843 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,800 | 0,027 | 888 | 902 | 1,707 | 0,034 | 0,746 | 0,854 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,093 | 0,012 | 831 | 844 | 1,184 | 0,129 | 0,069 | 0,116 |
| Traités avec des SRO | 0,170 | 0,035 | 77 | 78 | 0,823 | 0,208 | 0,099 | 0,241 |
| Traitement médical recherché | 0,345 | 0,068 | 77 | 78 | 1,242 | 0,197 | 0,209 | 0,481 |
| Carnet de vaccination montré | 0,660 | 0,039 | 162 | 171 | 1,059 | 0,059 | 0,582 | 0,738 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,857 | 0,035 | 162 | 171 | 1,281 | 0,040 | 0,788 | 0,927 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,592 | 0,052 | 162 | 171 | 1,350 | 0,088 | 0,488 | 0,696 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,807 | 0,037 | 162 | 171 | 1,204 | 0,046 | 0,733 | 0,881 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,507 | 0,040 | 162 | 171 | 1,020 | 0,079 | 0,427 | 0,587 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,541 | 0,051 | 162 | 171 | 1,313 | 0,095 | 0,439 | 0,644 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,564 | 0,050 | 162 | 171 | 1,299 | 0,089 | 0,464 | 0,665 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,401 | 0,039 | 162 | 171 | 1,013 | 0,098 | 0,322 | 0,479 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,380 | 0,020 | 876 | 893 | 1,135 | 0,054 | 0,339 | 0,420 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,034 | 0,007 | 916 | 935 | 1,105 | 0,207 | 0,020 | 0,048 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,147 | 0,014 | 884 | 901 | 1,063 | 0,092 | 0,120 | 0,174 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,768 | 0,023 | 441 | 445 | 1,110 | 0,030 | 0,721 | 0,814 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,543 | 0,037 | 441 | 445 | 1,378 | 0,067 | 0,470 | 0,617 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,513 | 0,039 | 420 | 425 | 1,357 | 0,077 | 0,435 | 0,592 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,093 | 0,014 | 431 | 433 | 1,002 | 0,153 | 0,064 | 0,121 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,178 | 0,025 | 431 | 433 | 1,344 | 0,141 | 0,128 | 0,228 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,613 | 0,024 | 507 | 514 | 1,087 | 0,039 | 0,566 | 0,661 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,001 | 0,001 | 1 012 | 1 041 | 0,875 | 1,002 | 0,000 | 0,002 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,307 | 0,053 | 62 | 67 | 0,893 | 0,171 | 0,202 | 0,413 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,722 | 0,035 | 237 | 250 | 1,200 | 0,048 | 0,652 | 0,792 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,140 | 0,021 | 493 | 515 | 1,335 | 0,149 | 0,098 | 0,181 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,846 | 0,024 | 483 | 505 | 1,436 | 0,028 | 0,799 | 0,894 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,280 | 0,028 | 398 | 349 | 1,253 | 0,101 | 0,224 | 0,337 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,125 | 0,021 | 398 | 349 | 1,280 | 0,170 | 0,082 | 0,167 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,204 | 0,027 | 332 | 265 | 1,205 | 0,131 | 0,151 | 0,258 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,370 | 0,025 | 332 | 265 | 0,938 | 0,067 | 0,320 | 0,419 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,327 | 0,027 | 332 | 265 | 1,046 | 0,082 | 0,273 | 0,381 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,871 | 0,232 | 2 802 | 2 883 | 1,203 | 0,040 | 5,407 | 6,335 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 30,075 | 4,205 | 1 685 | 1 706 | 0,832 | 0,140 | 21,665 | 38,485 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 32,009 | 3,612 | 1 687 | 1 708 | 0,770 | 0,113 | 24,785 | 39,233 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 62,084 | 6,302 | 1 688 | 1 709 | 0,947 | 0,102 | 49,481 | 74,688 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 53,660 | 6,744 | 1 633 | 1 650 | 1,043 | 0,126 | 40,173 | 67,148 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 112,413 | 9,096 | 1 710 | 1 732 | 1,044 | 0,081 | 94,221 | 130,605 |

À suivre...

Tableau B.12—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)* | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,327 | 0,038 | 398 | 409 | 1,606 | 0,116 | 0,251 | 0,403 |
| Alphabétisé | 0,627 | 0,029 | 398 | 409 | 1,195 | 0,046 | 0,569 | 0,685 |
| Aucune instruction | 0,268 | 0,022 | 398 | 409 | 0,997 | 0,083 | 0,224 | 0,312 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,415 | 0,028 | 398 | 409 | 1,115 | 0,066 | 0,360 | 0,471 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,440 | 0,028 | 398 | 409 | 1,134 | 0,064 | 0,383 | 0,497 |
| Actuellement marié/en union | 0,543 | 0,031 | 398 | 409 | 1,232 | 0,057 | 0,482 | 0,605 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,560 | 0,032 | 286 | 301 | 1,089 | 0,057 | 0,496 | 0,624 |
| Connaît une méthode contraceptive | 1,000 | 0,000 | 213 | 222 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Connaît une méthode moderne | 1,000 | 0,000 | 213 | 222 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,152 | 0,025 | 213 | 222 | 1,024 | 0,166 | 0,102 | 0,203 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,426 | 0,041 | 213 | 222 | 1,197 | 0,096 | 0,345 | 0,507 |
| Nombre idéal d'enfants | 8,780 | 0,478 | 377 | 385 | 1,411 | 0,054 | 7,823 | 9,736 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,284 | 0,021 | 398 | 409 | 0,921 | 0,073 | 0,242 | 0,326 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,034 | 0,011 | 398 | 409 | 1,171 | 0,312 | 0,013 | 0,056 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,445 | 0,044 | 159 | 159 | 1,107 | 0,098 | 0,358 | 0,533 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,326 | 0,043 | 106 | 113 | 0,944 | 0,132 | 0,240 | 0,412 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,076 | 0,017 | 398 | 409 | 1,239 | 0,217 | 0,043 | 0,109 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,719 | 0,033 | 395 | 406 | 1,459 | 0,046 | 0,653 | 0,785 |

Tableau B.13 Erreurs de sondage : Echantillon Donga, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,949 | 0,009 | 816 | 740 | 1,185 | 0,010 | 0,930 | 0,967 |
| Ayant accès à une MII | 0,827 | 0,017 | 5 314 | 4 840 | 1,509 | 0,020 | 0,794 | 0,860 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,633 | 0,026 | 5 314 | 4 840 | 1,597 | 0,041 | 0,581 | 0,685 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,440 | 0,037 | 964 | 881 | 2,322 | 0,085 | 0,366 | 0,514 |
| Alphabétisée | 0,267 | 0,029 | 964 | 881 | 2,019 | 0,108 | 0,209 | 0,325 |
| Aucune instruction | 0,605 | 0,035 | 964 | 881 | 2,199 | 0,057 | 0,536 | 0,674 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,186 | 0,028 | 964 | 881 | 2,232 | 0,151 | 0,130 | 0,242 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,171 | 0,019 | 964 | 881 | 1,566 | 0,111 | 0,133 | 0,209 |
| Actuellement mariée/en union | 0,813 | 0,020 | 964 | 881 | 1,556 | 0,024 | 0,773 | 0,852 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,309 | 0,024 | 807 | 733 | 1,501 | 0,079 | 0,260 | 0,358 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,567 | 0,027 | 807 | 733 | 1,544 | 0,048 | 0,513 | 0,621 |
| Actuellement enceinte | 0,137 | 0,010 | 964 | 881 | 0,878 | 0,071 | 0,117 | 0,156 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,927 | 0,015 | 792 | 716 | 1,628 | 0,016 | 0,897 | 0,957 |
| Connait une méthode moderne | 0,926 | 0,015 | 792 | 716 | 1,634 | 0,016 | 0,895 | 0,956 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,062 | 0,014 | 792 | 716 | 1,613 | 0,224 | 0,034 | 0,089 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,059 | 0,013 | 792 | 716 | 1,574 | 0,224 | 0,033 | 0,085 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,006 | 0,002 | 792 | 716 | 0,878 | 0,416 | 0,001 | 0,010 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,004 | 0,002 | 792 | 716 | 0,939 | 0,498 | 0,000 | 0,009 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,005 | 0,003 | 792 | 716 | 1,143 | 0,583 | 0,000 | 0,010 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,015 | 0,006 | 792 | 716 | 1,347 | 0,385 | 0,003 | 0,027 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,000 | 0,000 | 792 | 716 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,001 | 0,001 | 792 | 716 | 0,699 | 1,020 | 0,000 | 0,002 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,001 | 0,001 | 792 | 716 | 0,920 | 1,015 | 0,000 | 0,003 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,844 | 0,065 | 59 | 46 | 1,359 | 0,077 | 0,714 | 0,975 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,127 | 0,015 | 792 | 716 | 1,294 | 0,121 | 0,096 | 0,157 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,412 | 0,017 | 792 | 716 | 0,956 | 0,041 | 0,379 | 0,445 |
| Nombre idéal d'enfants | 5,955 | 0,142 | 795 | 731 | 1,701 | 0,024 | 5,672 | 6,238 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,741 | 0,034 | 660 | 599 | 2,017 | 0,046 | 0,672 | 0,810 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,785 | 0,045 | 1 021 | 926 | 2,823 | 0,058 | 0,695 | 0,876 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,141 | 0,018 | 917 | 831 | 1,562 | 0,127 | 0,105 | 0,176 |
| Traités avec des SRO | 0,284 | 0,053 | 122 | 117 | 1,248 | 0,185 | 0,179 | 0,389 |
| Traitement médical recherché | 0,680 | 0,055 | 122 | 117 | 1,324 | 0,081 | 0,570 | 0,789 |
| Carnet de vaccination montré | 0,687 | 0,042 | 184 | 160 | 1,185 | 0,061 | 0,604 | 0,771 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,896 | 0,040 | 184 | 160 | 1,675 | 0,045 | 0,816 | 0,976 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,775 | 0,049 | 184 | 160 | 1,527 | 0,063 | 0,678 | 0,873 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,884 | 0,040 | 184 | 160 | 1,590 | 0,045 | 0,805 | 0,964 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,703 | 0,050 | 184 | 160 | 1,433 | 0,071 | 0,603 | 0,803 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,775 | 0,049 | 184 | 160 | 1,527 | 0,063 | 0,678 | 0,873 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,708 | 0,055 | 184 | 160 | 1,598 | 0,078 | 0,597 | 0,819 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,619 | 0,055 | 184 | 160 | 1,486 | 0,089 | 0,509 | 0,729 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,272 | 0,026 | 963 | 871 | 1,541 | 0,094 | 0,221 | 0,323 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,064 | 0,010 | 986 | 889 | 1,230 | 0,153 | 0,045 | 0,084 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,143 | 0,015 | 967 | 875 | 1,111 | 0,102 | 0,114 | 0,172 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,758 | 0,026 | 452 | 403 | 1,273 | 0,034 | 0,707 | 0,809 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,402 | 0,052 | 452 | 403 | 1,824 | 0,128 | 0,299 | 0,505 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,469 | 0,047 | 431 | 383 | 1,703 | 0,101 | 0,375 | 0,564 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,056 | 0,011 | 411 | 375 | 0,947 | 0,192 | 0,035 | 0,078 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,299 | 0,026 | 411 | 375 | 1,154 | 0,087 | 0,247 | 0,352 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,500 | 0,027 | 507 | 462 | 1,232 | 0,055 | 0,445 | 0,555 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,005 | 0,002 | 964 | 881 | 1,049 | 0,486 | 0,000 | 0,010 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,226 | 0,070 | 73 | 69 | 1,415 | 0,311 | 0,086 | 0,367 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,533 | 0,059 | 147 | 143 | 1,416 | 0,110 | 0,415 | 0,650 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,202 | 0,027 | 451 | 413 | 1,400 | 0,131 | 0,149 | 0,255 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,693 | 0,044 | 408 | 374 | 1,912 | 0,063 | 0,606 | 0,781 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,199 | 0,025 | 312 | 310 | 1,124 | 0,128 | 0,148 | 0,249 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,039 | 0,012 | 312 | 310 | 1,115 | 0,315 | 0,014 | 0,063 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,201 | 0,033 | 280 | 262 | 1,363 | 0,163 | 0,136 | 0,267 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,424 | 0,048 | 280 | 262 | 1,630 | 0,114 | 0,328 | 0,521 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,294 | 0,046 | 280 | 262 | 1,689 | 0,157 | 0,202 | 0,387 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 6,806 | 0,292 | 2 758 | 2 514 | 1,333 | 0,043 | 6,222 | 7,391 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 44,714 | 7,646 | 1 788 | 1 609 | 1,313 | 0,171 | 29,421 | 60,007 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 40,297 | 6,847 | 1 778 | 1 596 | 1,305 | 0,170 | 26,602 | 53,991 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 85,010 | 12,357 | 1 789 | 1 610 | 1,581 | 0,145 | 60,296 | 109,725 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 48,304 | 6,674 | 1 678 | 1 496 | 0,968 | 0,138 | 34,956 | 61,653 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 129,208 | 13,520 | 1 803 | 1 622 | 1,377 | 0,105 | 102,168 | 156,248 |

À suivre...

Tableau B.13—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N) ^a | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,443 | 0,046 | 480 | 445 | 2,027 | 0,104 | 0,350 | 0,535 |
| Alphabétisé | 0,472 | 0,042 | 480 | 445 | 1,857 | 0,090 | 0,387 | 0,557 |
| Aucune instruction | 0,391 | 0,033 | 480 | 445 | 1,467 | 0,084 | 0,326 | 0,457 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,322 | 0,040 | 480 | 445 | 1,874 | 0,125 | 0,242 | 0,402 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,434 | 0,036 | 480 | 445 | 1,577 | 0,082 | 0,363 | 0,506 |
| Actuellement marié/en union | 0,552 | 0,034 | 480 | 445 | 1,515 | 0,062 | 0,484 | 0,621 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,167 | 0,028 | 360 | 331 | 1,404 | 0,166 | 0,112 | 0,223 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,989 | 0,006 | 271 | 246 | 0,966 | 0,006 | 0,977 | 1,001 |
| Connaît une méthode moderne | 0,989 | 0,006 | 271 | 246 | 0,966 | 0,006 | 0,977 | 1,001 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,091 | 0,018 | 271 | 246 | 1,030 | 0,198 | 0,055 | 0,127 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,406 | 0,053 | 271 | 246 | 1,754 | 0,130 | 0,300 | 0,511 |
| Nombre idéal d'enfants | 7,042 | 0,244 | 468 | 434 | 1,377 | 0,035 | 6,553 | 7,531 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,091 | 0,016 | 480 | 445 | 1,206 | 0,175 | 0,059 | 0,122 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,023 | 0,007 | 480 | 445 | 1,042 | 0,314 | 0,008 | 0,037 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,666 | 0,031 | 165 | 158 | 0,837 | 0,046 | 0,604 | 0,727 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,146 | 0,038 | 104 | 99 | 1,085 | 0,258 | 0,071 | 0,222 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,128 | 0,029 | 480 | 445 | 1,898 | 0,227 | 0,070 | 0,186 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,644 | 0,031 | 457 | 424 | 1,360 | 0,047 | 0,583 | 0,705 |

Tableau B.14 Erreurs de sondage : Echantillon Littoral, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,917 | 0,011 | 1 294 | 852 | 1,377 | 0,012 | 0,896 | 0,938 |
| Ayant accès à une MII | 0,833 | 0,014 | 5 596 | 3 687 | 1,627 | 0,017 | 0,805 | 0,861 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,807 | 0,014 | 5 596 | 3 687 | 1,443 | 0,018 | 0,778 | 0,836 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 1,000 | 0,000 | 1 415 | 958 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Alphabétisée | 0,670 | 0,021 | 1 415 | 958 | 1,643 | 0,031 | 0,629 | 0,711 |
| Aucune instruction | 0,228 | 0,015 | 1 415 | 958 | 1,344 | 0,066 | 0,198 | 0,258 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,499 | 0,018 | 1 415 | 958 | 1,374 | 0,037 | 0,463 | 0,536 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,338 | 0,015 | 1 415 | 958 | 1,215 | 0,045 | 0,307 | 0,368 |
| Actuellement mariée/en union | 0,575 | 0,015 | 1 415 | 958 | 1,153 | 0,026 | 0,545 | 0,605 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,168 | 0,013 | 1 128 | 766 | 1,191 | 0,079 | 0,142 | 0,195 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,431 | 0,025 | 1 128 | 766 | 1,717 | 0,059 | 0,380 | 0,481 |
| Actuellement enceinte | 0,068 | 0,009 | 1 415 | 958 | 1,282 | 0,126 | 0,051 | 0,085 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,996 | 0,002 | 803 | 551 | 1,085 | 0,002 | 0,991 | 1,001 |
| Connait une méthode moderne | 0,996 | 0,002 | 803 | 551 | 1,085 | 0,002 | 0,991 | 1,001 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,272 | 0,021 | 803 | 551 | 1,361 | 0,079 | 0,229 | 0,314 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,192 | 0,016 | 803 | 551 | 1,152 | 0,083 | 0,160 | 0,224 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,034 | 0,006 | 803 | 551 | 1,010 | 0,189 | 0,021 | 0,047 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,047 | 0,007 | 803 | 551 | 0,973 | 0,154 | 0,033 | 0,062 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,015 | 0,004 | 803 | 551 | 0,966 | 0,277 | 0,007 | 0,023 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,029 | 0,006 | 803 | 551 | 1,080 | 0,220 | 0,016 | 0,042 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,005 | 0,003 | 803 | 551 | 1,137 | 0,571 | 0,000 | 0,011 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,031 | 0,010 | 803 | 551 | 1,597 | 0,316 | 0,011 | 0,050 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,041 | 0,009 | 803 | 551 | 1,333 | 0,227 | 0,023 | 0,060 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,349 | 0,031 | 245 | 166 | 1018 | 0,089 | 0,287 | 0,411 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,349 | 0,018 | 803 | 551 | 1,046 | 0,050 | 0,314 | 0,384 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,278 | 0,022 | 803 | 551 | 1,410 | 0,080 | 0,233 | 0,323 |
| Nombre idéal d'enfants | 3,926 | 0,066 | 1 350 | 915 | 1,505 | 0,017 | 3,795 | 4,057 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,802 | 0,027 | 605 | 408 | 1,655 | 0,034 | 0,748 | 0,856 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,932 | 0,021 | 848 | 579 | 1,944 | 0,023 | 0,889 | 0,975 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,086 | 0,011 | 813 | 558 | 1,062 | 0,124 | 0,065 | 0,107 |
| Traités avec des SRO | 0,214 | 0,062 | 72 | 48 | 1,161 | 0,290 | 0,090 | 0,338 |
| Traitement médical recherché | 0,419 | 0,091 | 72 | 48 | 1,490 | 0,218 | 0,237 | 0,602 |
| Carnet de vaccination montré | 0,759 | 0,045 | 184 | 127 | 1,412 | 0,059 | 0,670 | 0,848 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,971 | 0,016 | 184 | 127 | 1,253 | 0,016 | 0,940 | 1,002 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,870 | 0,035 | 184 | 127 | 1,395 | 0,040 | 0,801 | 0,939 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,960 | 0,017 | 184 | 127 | 1,188 | 0,018 | 0,926 | 0,994 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,763 | 0,038 | 184 | 127 | 1,211 | 0,050 | 0,687 | 0,839 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,859 | 0,035 | 184 | 127 | 1,366 | 0,041 | 0,790 | 0,929 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,781 | 0,046 | 184 | 127 | 1,501 | 0,059 | 0,688 | 0,874 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,667 | 0,047 | 184 | 127 | 1,348 | 0,071 | 0,572 | 0,761 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,191 | 0,021 | 826 | 554 | 1,441 | 0,108 | 0,150 | 0,233 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,056 | 0,012 | 831 | 558 | 1,421 | 0,217 | 0,031 | 0,080 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,125 | 0,013 | 829 | 556 | 1,105 | 0,107 | 0,099 | 0,152 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,611 | 0,036 | 433 | 275 | 1,416 | 0,060 | 0,538 | 0,684 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,042 | 0,012 | 432 | 274 | 1,041 | 0,280 | 0,019 | 0,066 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,167 | 0,025 | 413 | 263 | 1,243 | 0,149 | 0,117 | 0,217 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,061 | 0,010 | 658 | 439 | 1,095 | 0,169 | 0,040 | 0,082 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,477 | 0,022 | 658 | 439 | 1,107 | 0,046 | 0,434 | 0,521 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,607 | 0,021 | 705 | 463 | 1,130 | 0,035 | 0,564 | 0,649 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,030 | 0,007 | 1 415 | 958 | 1,542 | 0,235 | 0,016 | 0,044 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,226 | 0,026 | 286 | 195 | 1,055 | 0,116 | 0,174 | 0,278 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,515 | 0,034 | 408 | 271 | 1,362 | 0,066 | 0,447 | 0,582 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,259 | 0,022 | 661 | 460 | 1,282 | 0,084 | 0,216 | 0,303 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,568 | 0,024 | 648 | 453 | 1,239 | 0,042 | 0,520 | 0,617 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,309 | 0,019 | 494 | 318 | 0,914 | 0,061 | 0,271 | 0,347 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,101 | 0,015 | 494 | 318 | 1,079 | 0,145 | 0,071 | 0,130 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,176 | 0,023 | 377 | 223 | 1,176 | 0,131 | 0,130 | 0,223 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,381 | 0,027 | 377 | 223 | 1,079 | 0,071 | 0,327 | 0,435 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,258 | 0,023 | 377 | 223 | 1,041 | 0,091 | 0,211 | 0,305 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 3,997 | 0,169 | 3 975 | 2 690 | 1,226 | 0,042 | 3,659 | 4,335 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 23,605 | 4,618 | 1 598 | 1 095 | 1,062 | 0,196 | 14,368 | 32,841 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 20,935 | 4,418 | 1 596 | 1 094 | 1,151 | 0,211 | 12,098 | 29,771 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 44,539 | 6,353 | 1 598 | 1 095 | 1,102 | 0,143 | 31,834 | 57,244 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 20,096 | 3,816 | 1 547 | 1 064 | 0,973 | 0,190 | 12,463 | 27,728 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 63,740 | 7,659 | 1 606 | 1 100 | 1,107 | 0,120 | 48,422 | 79,058 |

À suivre...

Tableau B.14—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 1,000 | 0,000 | 592 | 390 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Alphabétisé | 0,883 | 0,017 | 592 | 390 | 1,282 | 0,019 | 0,849 | 0,917 |
| Aucune instruction | 0,067 | 0,014 | 592 | 390 | 1,324 | 0,203 | 0,040 | 0,094 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,776 | 0,025 | 592 | 390 | 1,446 | 0,032 | 0,726 | 0,826 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,487 | 0,029 | 592 | 390 | 1,424 | 0,060 | 0,429 | 0,546 |
| Actuellement marié/en union | 0,467 | 0,030 | 592 | 390 | 1,473 | 0,065 | 0,407 | 0,528 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,436 | 0,038 | 473 | 315 | 1,668 | 0,088 | 0,359 | 0,512 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,985 | 0,009 | 264 | 182 | 1,143 | 0,009 | 0,968 | 1,002 |
| Connaît une méthode moderne | 0,984 | 0,009 | 264 | 182 | 1,104 | 0,009 | 0,966 | 1,001 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,353 | 0,028 | 264 | 182 | 0,966 | 0,081 | 0,296 | 0,410 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,258 | 0,037 | 264 | 182 | 1,350 | 0,141 | 0,185 | 0,331 |
| Nombre idéal d'enfants | 3,942 | 0,100 | 576 | 378 | 1,275 | 0,025 | 3,742 | 4,142 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,229 | 0,020 | 592 | 390 | 1,176 | 0,089 | 0,189 | 0,270 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,074 | 0,016 | 592 | 390 | 1,521 | 0,221 | 0,041 | 0,107 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,442 | 0,030 | 227 | 145 | 0,916 | 0,068 | 0,381 | 0,502 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,480 | 0,040 | 247 | 156 | 1,257 | 0,083 | 0,400 | 0,560 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,163 | 0,022 | 592 | 390 | 1,424 | 0,133 | 0,119 | 0,206 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,641 | 0,043 | 584 | 385 | 2,156 | 0,067 | 0,555 | 0,727 |

Tableau B.15 Erreurs de sondage : Echantillon Mono, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon-déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,936 | 0,011 | 952 | 879 | 1,375 | 0,012 | 0,915 | 0,958 |
| Ayant accès à une MII | 0,857 | 0,013 | 3 792 | 3 468 | 1,296 | 0,015 | 0,831 | 0,883 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,833 | 0,013 | 3 792 | 3 468 | 1,094 | 0,016 | 0,806 | 0,860 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,485 | 0,035 | 816 | 759 | 1,972 | 0,071 | 0,416 | 0,554 |
| Alphabétisée | 0,423 | 0,030 | 816 | 759 | 1,710 | 0,070 | 0,363 | 0,482 |
| Aucune instruction | 0,442 | 0,025 | 816 | 759 | 1,448 | 0,057 | 0,392 | 0,492 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,303 | 0,032 | 816 | 759 | 1,957 | 0,104 | 0,240 | 0,366 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,272 | 0,019 | 816 | 759 | 1,240 | 0,071 | 0,233 | 0,310 |
| Actuellement mariée/en union | 0,677 | 0,021 | 816 | 759 | 1,266 | 0,031 | 0,635 | 0,718 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,288 | 0,023 | 649 | 599 | 1,288 | 0,080 | 0,242 | 0,333 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,500 | 0,028 | 649 | 599 | 1,445 | 0,057 | 0,444 | 0,557 |
| Actuellement enceinte | 0,096 | 0,011 | 816 | 759 | 1,032 | 0,111 | 0,075 | 0,118 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,978 | 0,006 | 561 | 514 | 1,028 | 0,007 | 0,965 | 0,991 |
| Connaît une méthode moderne | 0,976 | 0,007 | 561 | 514 | 1,041 | 0,007 | 0,963 | 0,990 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,232 | 0,028 | 561 | 514 | 1,585 | 0,122 | 0,175 | 0,288 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,180 | 0,024 | 561 | 514 | 1,488 | 0,134 | 0,132 | 0,228 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,027 | 0,006 | 561 | 514 | 0,928 | 0,233 | 0,015 | 0,040 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,012 | 0,005 | 561 | 514 | 1,010 | 0,383 | 0,003 | 0,022 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,027 | 0,007 | 561 | 514 | 1,013 | 0,256 | 0,013 | 0,041 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,022 | 0,007 | 561 | 514 | 1,194 | 0,333 | 0,007 | 0,037 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,000 | 0,000 | 561 | 514 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,018 | 0,006 | 561 | 514 | 1,141 | 0,352 | 0,005 | 0,031 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,028 | 0,010 | 561 | 514 | 1,381 | 0,342 | 0,009 | 0,048 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,552 | 0,064 | 140 | 131 | 1518 | 0,117 | 0,423 | 0,681 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,351 | 0,025 | 561 | 514 | 1,248 | 0,072 | 0,301 | 0,401 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,325 | 0,023 | 561 | 514 | 1,138 | 0,069 | 0,280 | 0,370 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,499 | 0,109 | 803 | 747 | 1,865 | 0,024 | 4,282 | 4,716 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,896 | 0,016 | 436 | 393 | 1,074 | 0,018 | 0,864 | 0,928 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,845 | 0,035 | 672 | 613 | 1,988 | 0,041 | 0,776 | 0,914 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,119 | 0,012 | 622 | 565 | 0,898 | 0,104 | 0,094 | 0,144 |
| Traités avec des SRO | 0,258 | 0,065 | 76 | 67 | 1,232 | 0,250 | 0,129 | 0,388 |
| Traitement médical recherché | 0,222 | 0,042 | 76 | 67 | 0,859 | 0,190 | 0,138 | 0,306 |
| Carnet de vaccination montré | 0,748 | 0,039 | 106 | 97 | 0,888 | 0,052 | 0,671 | 0,826 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,970 | 0,017 | 106 | 97 | 1,028 | 0,017 | 0,936 | 1,004 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,879 | 0,036 | 106 | 97 | 1,118 | 0,040 | 0,808 | 0,950 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,950 | 0,021 | 106 | 97 | 0,981 | 0,022 | 0,908 | 0,991 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,742 | 0,052 | 106 | 97 | 1,174 | 0,070 | 0,639 | 0,845 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,889 | 0,035 | 106 | 97 | 1,151 | 0,040 | 0,818 | 0,960 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,865 | 0,039 | 106 | 97 | 1,172 | 0,045 | 0,787 | 0,944 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,706 | 0,051 | 106 | 97 | 1,122 | 0,073 | 0,604 | 0,809 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,285 | 0,025 | 650 | 583 | 1,232 | 0,088 | 0,234 | 0,335 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,053 | 0,010 | 658 | 592 | 1,066 | 0,191 | 0,033 | 0,073 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,183 | 0,017 | 656 | 589 | 1,025 | 0,094 | 0,148 | 0,217 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,675 | 0,021 | 325 | 293 | 0,750 | 0,031 | 0,633 | 0,717 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,259 | 0,032 | 324 | 292 | 1,211 | 0,125 | 0,194 | 0,324 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,380 | 0,042 | 302 | 274 | 1,438 | 0,111 | 0,296 | 0,464 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,135 | 0,022 | 355 | 326 | 1,192 | 0,161 | 0,092 | 0,179 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,261 | 0,028 | 355 | 326 | 1,184 | 0,107 | 0,205 | 0,316 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,589 | 0,030 | 405 | 372 | 1,204 | 0,050 | 0,529 | 0,648 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,011 | 0,003 | 816 | 759 | 0,898 | 0,296 | 0,005 | 0,018 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,384 | 0,054 | 92 | 89 | 1,052 | 0,140 | 0,276 | 0,491 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,583 | 0,044 | 201 | 192 | 1,266 | 0,076 | 0,494 | 0,671 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,157 | 0,018 | 398 | 375 | 1,012 | 0,117 | 0,120 | 0,194 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,771 | 0,022 | 379 | 358 | 1,010 | 0,028 | 0,728 | 0,815 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,246 | 0,034 | 333 | 253 | 1,431 | 0,138 | 0,178 | 0,314 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,082 | 0,019 | 333 | 253 | 1,290 | 0,238 | 0,043 | 0,120 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,235 | 0,040 | 281 | 199 | 1,558 | 0,168 | 0,156 | 0,315 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,459 | 0,046 | 281 | 199 | 1,552 | 0,101 | 0,367 | 0,552 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,347 | 0,041 | 281 | 199 | 1,442 | 0,119 | 0,264 | 0,429 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,746 | 0,396 | 2 268 | 2 107 | 1,395 | 0,069 | 4,954 | 6,538 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 36,481 | 6,583 | 1 260 | 1 148 | 1,003 | 0,180 | 23,315 | 49,646 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 25,581 | 6,687 | 1 262 | 1 148 | 1,370 | 0,261 | 12,208 | 38,955 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 62,062 | 10,267 | 1 262 | 1 149 | 1,270 | 0,165 | 41,527 | 82,597 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 44,902 | 10,125 | 1 237 | 1 129 | 1,353 | 0,225 | 24,652 | 65,152 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 104,177 | 16,530 | 1 269 | 1 155 | 1,420 | 0,159 | 71,118 | 137,236 |

À suivre...

Tableau B.15—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N) ^a | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,473 | 0,046 | 372 | 354 | 1,762 | 0,097 | 0,381 | 0,565 |
| Alphabétisé | 0,726 | 0,032 | 372 | 354 | 1,387 | 0,044 | 0,662 | 0,791 |
| Aucune instruction | 0,179 | 0,031 | 372 | 354 | 1,572 | 0,175 | 0,116 | 0,241 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,549 | 0,039 | 372 | 354 | 1,501 | 0,071 | 0,471 | 0,627 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,504 | 0,026 | 372 | 354 | 1,002 | 0,052 | 0,452 | 0,556 |
| Actuellement marié/en union | 0,444 | 0,027 | 372 | 354 | 1,028 | 0,060 | 0,391 | 0,497 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,344 | 0,035 | 282 | 265 | 1,237 | 0,102 | 0,274 | 0,415 |
| Connaît une méthode contraceptive | 1,000 | 0,000 | 170 | 158 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Connaît une méthode moderne | 1,000 | 0,000 | 170 | 158 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,218 | 0,032 | 170 | 158 | 0,996 | 0,145 | 0,155 | 0,281 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,376 | 0,039 | 170 | 158 | 1,036 | 0,103 | 0,299 | 0,453 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,903 | 0,163 | 362 | 346 | 1,192 | 0,033 | 4,577 | 5,229 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,211 | 0,026 | 372 | 354 | 1,212 | 0,122 | 0,159 | 0,262 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,013 | 0,006 | 372 | 354 | 0,966 | 0,440 | 0,002 | 0,024 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,558 | 0,041 | 142 | 140 | 0,989 | 0,074 | 0,475 | 0,641 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,412 | 0,039 | 108 | 107 | 0,828 | 0,095 | 0,334 | 0,491 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,058 | 0,012 | 372 | 354 | 0,952 | 0,200 | 0,035 | 0,081 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,604 | 0,045 | 367 | 348 | 1,773 | 0,075 | 0,513 | 0,695 |

Tableau B.16 Erreurs de sondage : Echantillon Ouémé, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,780 | 0,015 | 1 381 | 1 633 | 1,337 | 0,019 | 0,750 | 0,810 |
| Ayant accès à une MII | 0,684 | 0,012 | 5 702 | 6 744 | 1,092 | 0,018 | 0,660 | 0,708 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,644 | 0,010 | 5 702 | 6 744 | 0,815 | 0,016 | 0,624 | 0,665 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,647 | 0,030 | 1 260 | 1 507 | 2,211 | 0,046 | 0,588 | 0,707 |
| Alphabétisée | 0,419 | 0,025 | 1 260 | 1 507 | 1,766 | 0,059 | 0,370 | 0,468 |
| Aucune instruction | 0,433 | 0,025 | 1 260 | 1 507 | 1,789 | 0,058 | 0,383 | 0,483 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,315 | 0,025 | 1 260 | 1 507 | 1,900 | 0,079 | 0,265 | 0,365 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,265 | 0,011 | 1 260 | 1 507 | 0,915 | 0,043 | 0,242 | 0,288 |
| Actuellement mariée/en union | 0,653 | 0,017 | 1 260 | 1 507 | 1,244 | 0,026 | 0,620 | 0,687 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,275 | 0,023 | 1 019 | 1 218 | 1,636 | 0,083 | 0,230 | 0,321 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,418 | 0,019 | 1 019 | 1 218 | 1,200 | 0,044 | 0,381 | 0,455 |
| Actuellement enceinte | 0,072 | 0,007 | 1 260 | 1 507 | 0,981 | 0,099 | 0,058 | 0,087 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,981 | 0,005 | 830 | 985 | 1,030 | 0,005 | 0,972 | 0,991 |
| Connait une méthode moderne | 0,980 | 0,006 | 830 | 985 | 1,140 | 0,006 | 0,968 | 0,991 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,211 | 0,016 | 830 | 985 | 1,109 | 0,074 | 0,180 | 0,243 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,152 | 0,015 | 830 | 985 | 1,199 | 0,099 | 0,122 | 0,181 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,018 | 0,005 | 830 | 985 | 0,975 | 0,249 | 0,009 | 0,027 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,056 | 0,010 | 830 | 985 | 1,189 | 0,169 | 0,037 | 0,075 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,009 | 0,003 | 830 | 985 | 0,985 | 0,360 | 0,003 | 0,015 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,011 | 0,003 | 830 | 985 | 0,961 | 0,324 | 0,004 | 0,017 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,004 | 0,002 | 830 | 985 | 1,014 | 0,578 | 0,000 | 0,008 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,024 | 0,006 | 830 | 985 | 1,034 | 0,228 | 0,013 | 0,035 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,033 | 0,008 | 830 | 985 | 1,269 | 0,237 | 0,018 | 0,049 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,543 | 0,044 | 155 | 185 | 1,097 | 0,081 | 0,455 | 0,631 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,325 | 0,021 | 830 | 985 | 1,315 | 0,066 | 0,282 | 0,368 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,297 | 0,017 | 830 | 985 | 1,086 | 0,058 | 0,263 | 0,332 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,497 | 0,084 | 1 132 | 1 350 | 1,909 | 0,019 | 4,329 | 4,665 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,793 | 0,032 | 671 | 798 | 2,014 | 0,040 | 0,730 | 0,857 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,978 | 0,005 | 1 028 | 1 197 | 0,961 | 0,005 | 0,967 | 0,988 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,077 | 0,012 | 968 | 1 131 | 1,310 | 0,153 | 0,053 | 0,100 |
| Traités avec des SRO | 0,107 | 0,045 | 79 | 87 | 1,229 | 0,421 | 0,017 | 0,197 |
| Traitement médical recherché | 0,602 | 0,066 | 79 | 87 | 1,128 | 0,110 | 0,469 | 0,734 |
| Carnet de vaccination montré | 0,824 | 0,032 | 186 | 221 | 1,152 | 0,039 | 0,759 | 0,889 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,966 | 0,016 | 186 | 221 | 1,171 | 0,016 | 0,935 | 0,997 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,834 | 0,031 | 186 | 221 | 1,091 | 0,037 | 0,772 | 0,896 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,960 | 0,016 | 186 | 221 | 1,131 | 0,017 | 0,927 | 0,992 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,756 | 0,037 | 186 | 221 | 1,133 | 0,049 | 0,683 | 0,830 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,827 | 0,032 | 186 | 221 | 1,101 | 0,038 | 0,764 | 0,891 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,807 | 0,028 | 186 | 221 | 0,932 | 0,035 | 0,751 | 0,863 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,710 | 0,036 | 186 | 221 | 1,057 | 0,051 | 0,638 | 0,782 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,297 | 0,018 | 992 | 1 155 | 1,138 | 0,061 | 0,261 | 0,333 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,044 | 0,006 | 1 018 | 1 184 | 0,840 | 0,138 | 0,032 | 0,056 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,171 | 0,014 | 997 | 1 161 | 1,111 | 0,083 | 0,143 | 0,199 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,727 | 0,024 | 472 | 552 | 1,149 | 0,033 | 0,679 | 0,776 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,145 | 0,024 | 472 | 552 | 1,383 | 0,168 | 0,097 | 0,194 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,262 | 0,033 | 459 | 533 | 1,423 | 0,127 | 0,195 | 0,329 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,131 | 0,014 | 560 | 682 | 0,999 | 0,108 | 0,103 | 0,160 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,338 | 0,021 | 560 | 682 | 1,059 | 0,062 | 0,296 | 0,380 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,695 | 0,018 | 614 | 746 | 0,984 | 0,026 | 0,659 | 0,731 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,003 | 0,001 | 1 260 | 1 507 | 1,037 | 0,580 | 0,000 | 0,005 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,152 | 0,034 | 146 | 183 | 1,130 | 0,222 | 0,085 | 0,220 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,644 | 0,035 | 305 | 366 | 1,264 | 0,054 | 0,575 | 0,714 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,115 | 0,016 | 616 | 724 | 1,231 | 0,138 | 0,083 | 0,147 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,791 | 0,025 | 554 | 644 | 1,445 | 0,032 | 0,741 | 0,841 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,204 | 0,025 | 498 | 520 | 1,405 | 0,124 | 0,154 | 0,255 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,090 | 0,017 | 498 | 520 | 1,301 | 0,186 | 0,057 | 0,123 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,207 | 0,026 | 412 | 393 | 1,323 | 0,128 | 0,154 | 0,260 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,389 | 0,032 | 412 | 393 | 1,323 | 0,082 | 0,325 | 0,453 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,264 | 0,036 | 412 | 393 | 1,633 | 0,135 | 0,193 | 0,336 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,116 | 0,249 | 3 538 | 4 226 | 1,381 | 0,049 | 4,618 | 5,614 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 16,133 | 2,962 | 1 891 | 2 238 | 0,929 | 0,184 | 10,208 | 22,058 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 11,971 | 3,198 | 1 884 | 2 232 | 1,276 | 0,267 | 5,576 | 18,367 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 28,104 | 4,606 | 1 891 | 2 238 | 1,111 | 0,164 | 18,892 | 37,317 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 46,932 | 5,493 | 1 805 | 2 149 | 0,968 | 0,117 | 35,945 | 57,918 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 73,717 | 7,072 | 1 901 | 2 253 | 1,060 | 0,096 | 59,573 | 87,861 |

À suivre...

Tableau B.16—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N) ^a | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,640 | 0,033 | 519 | 618 | 1,545 | 0,051 | 0,575 | 0,705 |
| Alphabétisé | 0,594 | 0,035 | 519 | 618 | 1,617 | 0,059 | 0,524 | 0,664 |
| Aucune instruction | 0,309 | 0,033 | 519 | 618 | 1,645 | 0,108 | 0,242 | 0,375 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,439 | 0,031 | 519 | 618 | 1,442 | 0,072 | 0,376 | 0,502 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,401 | 0,024 | 519 | 618 | 1,107 | 0,059 | 0,353 | 0,449 |
| Actuellement marié/en union | 0,568 | 0,022 | 519 | 618 | 1,014 | 0,039 | 0,524 | 0,612 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,571 | 0,032 | 416 | 495 | 1,297 | 0,055 | 0,508 | 0,634 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,756 | 0,048 | 291 | 351 | 1,876 | 0,063 | 0,661 | 0,851 |
| Connaît une méthode moderne | 0,756 | 0,048 | 291 | 351 | 1,876 | 0,063 | 0,661 | 0,851 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,387 | 0,030 | 291 | 351 | 1,040 | 0,077 | 0,327 | 0,446 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,067 | 0,020 | 291 | 351 | 1,398 | 0,308 | 0,026 | 0,108 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,319 | 0,195 | 412 | 494 | 1,411 | 0,045 | 3,930 | 4,709 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,162 | 0,023 | 519 | 618 | 1,436 | 0,144 | 0,115 | 0,208 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,012 | 0,005 | 519 | 618 | 1,089 | 0,440 | 0,001 | 0,022 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,691 | 0,058 | 168 | 196 | 1,620 | 0,084 | 0,574 | 0,807 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,450 | 0,046 | 131 | 152 | 1,046 | 0,102 | 0,358 | 0,541 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,084 | 0,017 | 519 | 618 | 1,408 | 0,204 | 0,050 | 0,119 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,470 | 0,049 | 403 | 478 | 1,945 | 0,103 | 0,373 | 0,567 |

Tableau B.17 Erreurs de sondage : Echantillon Plateau, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,942 | 0,014 | 966 | 984 | 1,789 | 0,014 | 0,915 | 0,969 |
| Ayant accès à une MII | 0,798 | 0,016 | 4 475 | 4 521 | 1,558 | 0,020 | 0,767 | 0,830 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,745 | 0,019 | 4 475 | 4 521 | 1,588 | 0,026 | 0,707 | 0,784 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,435 | 0,042 | 952 | 970 | 2,621 | 0,097 | 0,350 | 0,519 |
| Alphabétisée | 0,242 | 0,025 | 952 | 970 | 1,829 | 0,105 | 0,191 | 0,293 |
| Aucune instruction | 0,622 | 0,029 | 952 | 970 | 1,852 | 0,047 | 0,563 | 0,680 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,186 | 0,023 | 952 | 970 | 1,854 | 0,126 | 0,140 | 0,233 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,225 | 0,018 | 952 | 970 | 1,363 | 0,082 | 0,188 | 0,262 |
| Actuellement mariée/en union | 0,731 | 0,019 | 952 | 970 | 1,344 | 0,026 | 0,692 | 0,770 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,307 | 0,020 | 788 | 797 | 1,205 | 0,065 | 0,267 | 0,346 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,532 | 0,024 | 788 | 797 | 1,369 | 0,046 | 0,483 | 0,581 |
| Actuellement enceinte | 0,126 | 0,012 | 952 | 970 | 1,136 | 0,097 | 0,102 | 0,151 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,976 | 0,007 | 697 | 709 | 1,277 | 0,008 | 0,961 | 0,991 |
| Connait une méthode moderne | 0,976 | 0,007 | 697 | 709 | 1,276 | 0,008 | 0,961 | 0,990 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,065 | 0,010 | 697 | 709 | 1,089 | 0,157 | 0,045 | 0,085 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,057 | 0,010 | 697 | 709 | 1,114 | 0,172 | 0,037 | 0,077 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,012 | 0,004 | 697 | 709 | 1,047 | 0,366 | 0,003 | 0,020 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,009 | 0,004 | 697 | 709 | 1,083 | 0,422 | 0,001 | 0,017 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,006 | 0,004 | 697 | 709 | 1,227 | 0,604 | 0,000 | 0,013 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,009 | 0,004 | 697 | 709 | 1,042 | 0,409 | 0,002 | 0,017 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,000 | 0,000 | 697 | 709 | na | na | 0,000 | 0,000 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,007 | 0,003 | 697 | 709 | 1,027 | 0,449 | 0,001 | 0,014 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,001 | 0,001 | 697 | 709 | 0,612 | 1,023 | 0,000 | 0,002 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,635 | 0,076 | 48 | 47 | 1,085 | 0,120 | 0,483 | 0,788 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,274 | 0,019 | 697 | 709 | 1,142 | 0,071 | 0,235 | 0,312 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,336 | 0,025 | 697 | 709 | 1,406 | 0,075 | 0,286 | 0,387 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,714 | 0,081 | 891 | 920 | 1,397 | 0,017 | 4,552 | 4,875 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,735 | 0,025 | 537 | 550 | 1,330 | 0,034 | 0,684 | 0,785 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,922 | 0,018 | 832 | 860 | 1,492 | 0,019 | 0,886 | 0,958 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,141 | 0,019 | 746 | 766 | 1,552 | 0,138 | 0,102 | 0,180 |
| Traités avec des SRO | 0,219 | 0,047 | 106 | 108 | 1,137 | 0,214 | 0,125 | 0,313 |
| Traitement médical recherché | 0,414 | 0,057 | 106 | 108 | 1,164 | 0,138 | 0,300 | 0,527 |
| Carnet de vaccination montré | 0,663 | 0,034 | 146 | 145 | 0,843 | 0,051 | 0,595 | 0,731 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,813 | 0,037 | 146 | 145 | 1,084 | 0,045 | 0,740 | 0,886 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,496 | 0,043 | 146 | 145 | 0,999 | 0,086 | 0,411 | 0,582 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,810 | 0,040 | 146 | 145 | 1,181 | 0,049 | 0,730 | 0,891 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,450 | 0,043 | 146 | 145 | 1,004 | 0,095 | 0,365 | 0,535 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,427 | 0,051 | 146 | 145 | 1,203 | 0,119 | 0,326 | 0,528 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,370 | 0,052 | 146 | 145 | 1,272 | 0,142 | 0,265 | 0,475 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,290 | 0,051 | 146 | 145 | 1,333 | 0,176 | 0,188 | 0,393 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,362 | 0,027 | 766 | 782 | 1,444 | 0,074 | 0,309 | 0,415 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,061 | 0,010 | 778 | 792 | 1,181 | 0,169 | 0,040 | 0,082 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,193 | 0,017 | 767 | 783 | 1,132 | 0,088 | 0,159 | 0,227 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,711 | 0,032 | 331 | 338 | 1,278 | 0,045 | 0,646 | 0,775 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,339 | 0,053 | 331 | 338 | 1,732 | 0,155 | 0,234 | 0,445 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,372 | 0,041 | 320 | 330 | 1,388 | 0,110 | 0,290 | 0,453 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,155 | 0,019 | 409 | 416 | 1,056 | 0,122 | 0,117 | 0,193 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,200 | 0,023 | 409 | 416 | 1,138 | 0,113 | 0,155 | 0,245 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,705 | 0,031 | 481 | 491 | 1,502 | 0,044 | 0,642 | 0,767 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,017 | 0,004 | 952 | 970 | 1,011 | 0,247 | 0,009 | 0,026 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,124 | 0,029 | 102 | 110 | 0,898 | 0,237 | 0,065 | 0,183 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,590 | 0,040 | 204 | 211 | 1,164 | 0,068 | 0,510 | 0,671 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,101 | 0,015 | 465 | 474 | 1,064 | 0,147 | 0,071 | 0,131 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,921 | 0,018 | 437 | 446 | 1,372 | 0,019 | 0,885 | 0,956 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,294 | 0,038 | 350 | 329 | 1,538 | 0,128 | 0,219 | 0,369 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,131 | 0,027 | 350 | 329 | 1,505 | 0,207 | 0,077 | 0,186 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,216 | 0,041 | 292 | 253 | 1,681 | 0,188 | 0,135 | 0,298 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,574 | 0,032 | 292 | 253 | 1,113 | 0,056 | 0,510 | 0,639 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,442 | 0,040 | 292 | 253 | 1,365 | 0,090 | 0,362 | 0,521 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,688 | 0,296 | 2 695 | 2 742 | 1,553 | 0,052 | 5,096 | 6,280 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 42,995 | 5,707 | 1 581 | 1 604 | 1,083 | 0,133 | 31,581 | 54,409 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 34,984 | 6,024 | 1 584 | 1 605 | 1,089 | 0,172 | 22,936 | 47,032 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 77,979 | 7,847 | 1 583 | 1 605 | 1,023 | 0,101 | 62,285 | 93,674 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 44,912 | 7,227 | 1 537 | 1 549 | 1,234 | 0,161 | 30,458 | 59,365 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 119,389 | 10,601 | 1 594 | 1 617 | 1,077 | 0,089 | 98,187 | 140,591 |

À suivre...

Tableau B.17—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,421 | 0,045 | 329 | 340 | 1,636 | 0,106 | 0,331 | 0,510 |
| Alphabétisé | 0,361 | 0,042 | 329 | 340 | 1,581 | 0,116 | 0,277 | 0,445 |
| Aucune instruction | 0,433 | 0,035 | 329 | 340 | 1,278 | 0,081 | 0,363 | 0,503 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,260 | 0,036 | 329 | 340 | 1,480 | 0,138 | 0,188 | 0,332 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,320 | 0,032 | 329 | 340 | 1,230 | 0,099 | 0,256 | 0,383 |
| Actuellement marié/en union | 0,644 | 0,033 | 329 | 340 | 1,233 | 0,051 | 0,579 | 0,710 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,412 | 0,036 | 277 | 285 | 1,208 | 0,087 | 0,341 | 0,484 |
| Connaît une méthode contraceptive | 1,000 | 0,000 | 210 | 219 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Connaît une méthode moderne | 1,000 | 0,000 | 210 | 219 | na | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,157 | 0,026 | 210 | 219 | 1,052 | 0,169 | 0,104 | 0,210 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,483 | 0,037 | 210 | 219 | 1,061 | 0,076 | 0,409 | 0,556 |
| Nombre idéal d'enfants | 6,746 | 0,311 | 271 | 280 | 1,155 | 0,046 | 6,125 | 7,368 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,218 | 0,029 | 329 | 340 | 1,274 | 0,133 | 0,160 | 0,277 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,028 | 0,010 | 329 | 340 | 1,152 | 0,377 | 0,007 | 0,049 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,394 | 0,063 | 91 | 90 | 1,216 | 0,159 | 0,269 | 0,520 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,227 | 0,053 | 103 | 109 | 1,282 | 0,235 | 0,120 | 0,333 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,057 | 0,024 | 329 | 340 | 1,834 | 0,412 | 0,010 | 0,105 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,818 | 0,034 | 320 | 330 | 1,552 | 0,041 | 0,751 | 0,885 |

Tableau B.18 Erreurs de sondage : Echantillon Zou, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Variable | Valeur (M) | Erreur-type (ET) | Effectif | | Effet de plan de sondage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Non pondéré (N) | Pondéré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| MÉNAGE | | | | | | | | |
| Possession d'au moins une MII | 0,970 | 0,005 | 1 341 | 1 399 | 1,110 | 0,005 | 0,959 | 0,980 |
| Ayant accès à une MII | 0,806 | 0,011 | 6 472 | 6 776 | 1,303 | 0,014 | 0,784 | 0,828 |
| Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête | 0,800 | 0,011 | 6 472 | 6 776 | 1,252 | 0,014 | 0,778 | 0,823 |
| FEMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,289 | 0,025 | 1 550 | 1 606 | 2,162 | 0,086 | 0,239 | 0,339 |
| Alphabétisée | 0,359 | 0,022 | 1 550 | 1 606 | 1,831 | 0,062 | 0,315 | 0,404 |
| Aucune instruction | 0,514 | 0,023 | 1 550 | 1 606 | 1,807 | 0,045 | 0,468 | 0,560 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,282 | 0,021 | 1 550 | 1 606 | 1,817 | 0,074 | 0,240 | 0,323 |
| Jamais mariée/jamais en union | 0,267 | 0,018 | 1 550 | 1 606 | 1,579 | 0,066 | 0,232 | 0,303 |
| Actuellement mariée/en union | 0,673 | 0,019 | 1 550 | 1 606 | 1,612 | 0,029 | 0,634 | 0,711 |
| Mariée/en union avant l'âge de 18 ans | 0,325 | 0,020 | 1 198 | 1 237 | 1,455 | 0,061 | 0,285 | 0,364 |
| A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans | 0,677 | 0,016 | 1 198 | 1 237 | 1,184 | 0,024 | 0,645 | 0,709 |
| Actuellement enceinte | 0,106 | 0,007 | 1 550 | 1 606 | 0,911 | 0,067 | 0,092 | 0,120 |
| Connait une méthode contraceptive | 0,990 | 0,004 | 1 040 | 1 080 | 1,245 | 0,004 | 0,982 | 0,998 |
| Connait une méthode moderne | 0,989 | 0,004 | 1 040 | 1 080 | 1,217 | 0,004 | 0,981 | 0,997 |
| Utilise actuellement une méthode | 0,158 | 0,012 | 1 040 | 1 080 | 1,086 | 0,078 | 0,133 | 0,182 |
| Utilise actuellement une méthode moderne | 0,133 | 0,011 | 1 040 | 1 080 | 1,091 | 0,086 | 0,110 | 0,156 |
| Utilise actuellement la pilule | 0,018 | 0,004 | 1 040 | 1 080 | 0,965 | 0,224 | 0,010 | 0,025 |
| Utilise actuellement le DIU | 0,007 | 0,003 | 1 040 | 1 080 | 1,002 | 0,365 | 0,002 | 0,012 |
| Utilise actuellement des condoms masculins | 0,006 | 0,002 | 1 040 | 1 080 | 1,000 | 0,403 | 0,001 | 0,011 |
| Utilise actuellement des injectables | 0,022 | 0,004 | 1 040 | 1 080 | 0,925 | 0,189 | 0,014 | 0,031 |
| Utilise actuellement la stérilisation féminine | 0,004 | 0,002 | 1 040 | 1 080 | 0,909 | 0,457 | 0,000 | 0,007 |
| Utilise actuellement le retrait | 0,014 | 0,004 | 1 040 | 1 080 | 1,079 | 0,280 | 0,006 | 0,022 |
| Utilise actuellement la méthode du rythme | 0,007 | 0,003 | 1 040 | 1 080 | 1,177 | 0,439 | 0,001 | 0,013 |
| A utilisé une source du secteur public | 0,689 | 0,045 | 169 | 175 | 1,264 | 0,066 | 0,599 | 0,780 |
| Ne veut plus d'enfant | 0,313 | 0,016 | 1 040 | 1 080 | 1,083 | 0,050 | 0,282 | 0,344 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,347 | 0,016 | 1 040 | 1 080 | 1,075 | 0,046 | 0,315 | 0,379 |
| Nombre idéal d'enfants | 4,829 | 0,085 | 1 507 | 1 556 | 1,818 | 0,018 | 4,659 | 5,000 |
| Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance | 0,854 | 0,015 | 829 | 863 | 1,232 | 0,018 | 0,823 | 0,884 |
| Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié | 0,896 | 0,023 | 1 243 | 1 299 | 2,126 | 0,025 | 0,850 | 0,941 |
| A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines | 0,048 | 0,010 | 1 159 | 1 206 | 1,626 | 0,218 | 0,027 | 0,069 |
| Traités avec des SRO | 0,417 | 0,067 | 56 | 58 | 1,017 | 0,160 | 0,283 | 0,550 |
| Traitement médical recherché | 0,555 | 0,073 | 56 | 58 | 1,085 | 0,131 | 0,410 | 0,700 |
| Carnet de vaccination montré | 0,792 | 0,032 | 228 | 235 | 1,168 | 0,041 | 0,728 | 0,857 |
| A reçu le vaccin du BCG | 0,944 | 0,018 | 228 | 235 | 1,195 | 0,019 | 0,907 | 0,981 |
| A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses) | 0,862 | 0,021 | 228 | 235 | 0,919 | 0,025 | 0,819 | 0,904 |
| A reçu le vaccin contre le polio à la naissance | 0,945 | 0,018 | 228 | 235 | 1,194 | 0,019 | 0,909 | 0,981 |
| A reçu le vaccin contre le polio (3 doses) | 0,748 | 0,041 | 228 | 235 | 1,397 | 0,055 | 0,665 | 0,830 |
| A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses) | 0,854 | 0,021 | 228 | 235 | 0,900 | 0,025 | 0,812 | 0,897 |
| A reçu le vaccin anti-rougeoleux | 0,811 | 0,026 | 228 | 235 | 0,989 | 0,032 | 0,760 | 0,863 |
| A reçu tous les vaccins de base | 0,680 | 0,041 | 228 | 235 | 1,285 | 0,060 | 0,599 | 0,762 |
| Taille-pour-âge (-2ET) | 0,354 | 0,019 | 1 183 | 1 249 | 1,341 | 0,055 | 0,316 | 0,393 |
| Poids-pour-taille (-2ET) | 0,038 | 0,005 | 1 189 | 1 255 | 0,962 | 0,139 | 0,028 | 0,049 |
| Poids-pour-âge (-2ET) | 0,169 | 0,013 | 1 188 | 1 256 | 1,146 | 0,080 | 0,142 | 0,196 |
| Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois) | 0,591 | 0,029 | 608 | 645 | 1,354 | 0,050 | 0,532 | 0,650 |
| Prévalence du paludisme (TDR) | 0,368 | 0,030 | 602 | 638 | 1,403 | 0,081 | 0,309 | 0,428 |
| Prévalence du paludisme (Microscopie) | 0,369 | 0,033 | 589 | 625 | 1,469 | 0,089 | 0,303 | 0,435 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5 | 0,124 | 0,014 | 715 | 745 | 1,125 | 0,112 | 0,096 | 0,152 |
| Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0 | 0,233 | 0,016 | 715 | 745 | 1,022 | 0,069 | 0,201 | 0,266 |
| Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans) | 0,487 | 0,023 | 819 | 857 | 1,319 | 0,047 | 0,441 | 0,532 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,012 | 0,003 | 1 550 | 1 606 | 1,227 | 0,282 | 0,005 | 0,019 |
| Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient | 0,203 | 0,030 | 223 | 229 | 1,113 | 0,148 | 0,143 | 0,263 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,554 | 0,027 | 387 | 400 | 1,074 | 0,049 | 0,500 | 0,609 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,163 | 0,017 | 719 | 736 | 1,206 | 0,102 | 0,130 | 0,196 |
| Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH | 0,757 | 0,026 | 694 | 711 | 1,611 | 0,035 | 0,705 | 0,810 |
| A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans | 0,281 | 0,021 | 537 | 573 | 1,092 | 0,075 | 0,239 | 0,324 |
| A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment | 0,082 | 0,015 | 537 | 573 | 1,265 | 0,183 | 0,052 | 0,112 |
| A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire | 0,142 | 0,024 | 434 | 425 | 1,452 | 0,172 | 0,093 | 0,191 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire | 0,393 | 0,027 | 434 | 425 | 1,142 | 0,068 | 0,340 | 0,447 |
| A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois | 0,270 | 0,028 | 434 | 425 | 1,298 | 0,103 | 0,214 | 0,325 |
| Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans) | 5,635 | 0,196 | 4 326 | 4 468 | 1,274 | 0,035 | 5,244 | 6,027 |
| Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans) | 35,664 | 5,571 | 2 291 | 2 393 | 1,240 | 0,156 | 24,523 | 46,806 |
| Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans) | 31,791 | 4,597 | 2 286 | 2 389 | 1,131 | 0,145 | 22,598 | 40,984 |
| Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans) | 67,455 | 6,595 | 2 294 | 2 396 | 1,070 | 0,098 | 54,266 | 80,645 |
| Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans) | 43,127 | 5,101 | 2 210 | 2 311 | 1,111 | 0,118 | 32,926 | 53,329 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans) | 107,673 | 7,699 | 2 309 | 2 412 | 1,112 | 0,072 | 92,275 | 123,071 |

À suivre...

Tableau B.18—Suite

| Variable | Valeur (M) | Erreur- type (ET) | Effectif | | Effet de plan de son- dage (DEFT) | Erreur relative (ET/M) | Intervalle de confiance | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|
| | | | Non pondéré (N) | Pon- déré (N)' | | | M-2ET | M+2ET |
| HOMME | | | | | | | | |
| Milieu urbain | 0,301 | 0,023 | 578 | 600 | 1,215 | 0,077 | 0,255 | 0,347 |
| Alphabétisé | 0,607 | 0,030 | 578 | 600 | 1,475 | 0,049 | 0,547 | 0,667 |
| Aucune instruction | 0,249 | 0,024 | 578 | 600 | 1,320 | 0,095 | 0,202 | 0,297 |
| Niveau secondaire ou plus | 0,485 | 0,028 | 578 | 600 | 1,349 | 0,058 | 0,429 | 0,541 |
| Jamais marié/jamais en union | 0,419 | 0,022 | 578 | 600 | 1,075 | 0,053 | 0,375 | 0,463 |
| Actuellement marié/en union | 0,541 | 0,027 | 578 | 600 | 1,283 | 0,049 | 0,488 | 0,595 |
| A eu des rapports sexuels avant 18 ans | 0,638 | 0,040 | 419 | 431 | 1,698 | 0,063 | 0,558 | 0,718 |
| Connaît une méthode contraceptive | 0,994 | 0,004 | 315 | 325 | 1,019 | 0,005 | 0,985 | 1,003 |
| Connaît une méthode moderne | 0,994 | 0,004 | 315 | 325 | 1,019 | 0,005 | 0,985 | 1,003 |
| Ne veut plus d'enfants | 0,184 | 0,023 | 315 | 325 | 1,042 | 0,124 | 0,139 | 0,230 |
| Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus | 0,466 | 0,032 | 315 | 325 | 1,133 | 0,068 | 0,402 | 0,530 |
| Nombre idéal d'enfants | 6,184 | 0,265 | 576 | 598 | 1,648 | 0,043 | 5,654 | 6,714 |
| A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois | 0,356 | 0,024 | 578 | 600 | 1,180 | 0,066 | 0,309 | 0,403 |
| A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | 0,092 | 0,015 | 578 | 600 | 1,232 | 0,161 | 0,062 | 0,122 |
| Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels) | 0,427 | 0,044 | 222 | 233 | 1,325 | 0,103 | 0,339 | 0,515 |
| Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient | 0,332 | 0,038 | 228 | 237 | 1,200 | 0,113 | 0,257 | 0,407 |
| A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois | 0,066 | 0,011 | 578 | 600 | 1,072 | 0,169 | 0,043 | 0,088 |
| Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH | 0,702 | 0,037 | 559 | 580 | 1,886 | 0,052 | 0,628 | 0,775 |

TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Tableau C.1 Répartition par âge de la population des ménages

Répartition de la population (de fait) des ménages par année d'âge selon le sexe (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge | Femme | | Homme | | Âge | Femme | | Homme | |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|-------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Effectif | Pourcentage | Effectif | Pourcentage | | Effectif | Pourcentage | Effectif | Pourcentage |
| 0 | 1 500 | 4,0 | 1 497 | 4,2 | 36 | 288 | 0,8 | 226 | 0,6 |
| 1 | 1 302 | 3,4 | 1 325 | 3,8 | 37 | 415 | 1,1 | 340 | 1,0 |
| 2 | 1 281 | 3,4 | 1 242 | 3,5 | 38 | 363 | 1,0 | 322 | 0,9 |
| 3 | 1 325 | 3,5 | 1 401 | 4,0 | 39 | 280 | 0,7 | 216 | 0,6 |
| 4 | 1 290 | 3,4 | 1 383 | 3,9 | 40 | 443 | 1,2 | 459 | 1,3 |
| 5 | 1 218 | 3,2 | 1 323 | 3,7 | 41 | 162 | 0,4 | 201 | 0,6 |
| 6 | 1 158 | 3,1 | 1 181 | 3,3 | 42 | 352 | 0,9 | 315 | 0,9 |
| 7 | 1 402 | 3,7 | 1 373 | 3,9 | 43 | 252 | 0,7 | 208 | 0,6 |
| 8 | 1 251 | 3,3 | 1 227 | 3,5 | 44 | 117 | 0,3 | 124 | 0,4 |
| 9 | 1 041 | 2,8 | 1 078 | 3,1 | 45 | 385 | 1,0 | 411 | 1,2 |
| 10 | 1 125 | 3,0 | 1 213 | 3,4 | 46 | 145 | 0,4 | 157 | 0,4 |
| 11 | 865 | 2,3 | 969 | 2,7 | 47 | 266 | 0,7 | 268 | 0,8 |
| 12 | 1 062 | 2,8 | 1 090 | 3,1 | 48 | 207 | 0,5 | 193 | 0,5 |
| 13 | 867 | 2,3 | 936 | 2,7 | 49 | 222 | 0,6 | 129 | 0,4 |
| 14 | 643 | 1,7 | 731 | 2,1 | 50 | 204 | 0,5 | 283 | 0,8 |
| 15 | 841 | 2,2 | 856 | 2,4 | 51 | 176 | 0,5 | 110 | 0,3 |
| 16 | 614 | 1,6 | 594 | 1,7 | 52 | 372 | 1,0 | 189 | 0,5 |
| 17 | 688 | 1,8 | 630 | 1,8 | 53 | 235 | 0,6 | 137 | 0,4 |
| 18 | 744 | 2,0 | 649 | 1,8 | 54 | 158 | 0,4 | 115 | 0,3 |
| 19 | 542 | 1,4 | 462 | 1,3 | 55 | 307 | 0,8 | 194 | 0,5 |
| 20 | 807 | 2,1 | 585 | 1,7 | 56 | 175 | 0,5 | 110 | 0,3 |
| 21 | 485 | 1,3 | 389 | 1,1 | 57 | 236 | 0,6 | 142 | 0,4 |
| 22 | 679 | 1,8 | 529 | 1,5 | 58 | 151 | 0,4 | 137 | 0,4 |
| 23 | 515 | 1,4 | 447 | 1,3 | 59 | 84 | 0,2 | 64 | 0,2 |
| 24 | 488 | 1,3 | 335 | 0,9 | 60 | 262 | 0,7 | 198 | 0,6 |
| 25 | 876 | 2,3 | 678 | 1,9 | 61 | 78 | 0,2 | 74 | 0,2 |
| 26 | 485 | 1,3 | 387 | 1,1 | 62 | 166 | 0,4 | 101 | 0,3 |
| 27 | 595 | 1,6 | 445 | 1,3 | 63 | 113 | 0,3 | 79 | 0,2 |
| 28 | 661 | 1,8 | 486 | 1,4 | 64 | 61 | 0,2 | 63 | 0,2 |
| 29 | 423 | 1,1 | 316 | 0,9 | 65 | 220 | 0,6 | 137 | 0,4 |
| 30 | 755 | 2,0 | 639 | 1,8 | 66 | 38 | 0,1 | 104 | 0,3 |
| 31 | 277 | 0,7 | 294 | 0,8 | 67 | 116 | 0,3 | 148 | 0,4 |
| 32 | 535 | 1,4 | 432 | 1,2 | 68 | 106 | 0,3 | 123 | 0,3 |
| 33 | 424 | 1,1 | 314 | 0,9 | 69 | 45 | 0,1 | 66 | 0,2 |
| 34 | 288 | 0,8 | 286 | 0,8 | 70+ | 958 | 2,5 | 839 | 2,4 |
| 35 | 582 | 1,5 | 606 | 1,7 | | | | | |
| | | | | | Total | 37 793 | 100,0 | 35 306 | 100,0 |

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview.

Tableau C.2.1 Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées

Population (de fait) des femmes de 10-54 ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des femmes interviewées de 15-49 ans et pourcentage des femmes éligibles qui ont été interviewées (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Population de ménage des femmes d'âge 10-54 ans | Femmes enquêtées âge 15-49 | | Pourcentage de femmes éligibles interviewées |
|---------------|---|----------------------------|-------------|--|
| | | Effectif | Pourcentage | |
| 10-14 | 4 562 | na | na | na |
| 15-19 | 3 429 | 3 377 | 21,2 | 98,5 |
| 20-24 | 2 974 | 2 908 | 18,3 | 97,8 |
| 25-29 | 3 039 | 2 987 | 18,8 | 98,3 |
| 30-34 | 2 279 | 2 233 | 14,0 | 98,0 |
| 35-39 | 1 929 | 1 896 | 11,9 | 98,3 |
| 40-44 | 1 327 | 1 303 | 8,2 | 98,2 |
| 45-49 | 1 223 | 1 200 | 7,5 | 98,1 |
| 50-54 | 1 145 | na | na | na |
| 15-49 | 16 200 | 15 905 | 100,0 | 98,2 |

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Les pondérations utilisées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Tableau de Ménage.
na = Non applicable.

Tableau C.2.2 Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés

Population (de fait) des hommes de 10-64 ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des hommes interviewés de 15-64 ans et pourcentage d'hommes éligibles qui ont été interviewés (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Groupe d'âges | Population des ménage d'âge 10-64 ans | Hommes enquêtés âge 15-64 | | Pourcentage d'hommes éligibles interviewés |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| | | Effectif | Pourcentage | |
| 10-14 | 2 549 | na | na | na |
| 15-19 | 1 561 | 1 537 | 20,4 | 98,4 |
| 20-24 | 1 143 | 1 119 | 14,8 | 97,9 |
| 25-29 | 1 155 | 1 129 | 15,0 | 97,7 |
| 30-34 | 933 | 900 | 11,9 | 96,5 |
| 35-39 | 820 | 800 | 10,6 | 97,6 |
| 40-44 | 659 | 639 | 8,5 | 97,0 |
| 45-49 | 576 | 555 | 7,4 | 96,3 |
| 50-54 | 386 | 375 | 5,0 | 97,1 |
| 55-59 | 297 | 291 | 3,9 | 98,0 |
| 60-64 | 207 | 200 | 2,7 | 96,6 |
| 15-64 | 7 738 | 7 546 | 100,0 | 97,5 |

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Les pondérations utilisées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Tableau de Ménage
na = Non applicable

Tableau C.3 Complétude de l'enregistrement

Pourcentage d'observations manquantes pour certaines questions démographiques et de santé (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Type d'information | Population de référence | Pourcentage avec information manquante | Nombre de cas |
|---|---|--|---------------|
| Date de naissance | Naissances dans les 15 années avant l'enquête | | |
| Jour seulement | | 7,42 | 34 203 |
| Mois seulement | | 11,16 | 34 203 |
| Mois et année | | 0,23 | 34 203 |
| Âge au décès | Décès d'enfants nés dans les 15 années avant l'enquête | 0,00 | 3 413 |
| Âge/date à la première union¹ | Femmes 15-49 actuellement en union ou en rupture d'union | 0,00 | 12 039 |
| | Hommes 15-64 actuellement en union ou en rupture d'union | 0,00 | 4 720 |
| Niveau d'instruction de l'enquêté | Toutes les femmes de 15-49 ans | 0,00 | 15 928 |
| | Tous les hommes de 15-64 ans | 0,00 | 7 595 |
| Diarrhée dans les 2 dernières semaines | Enfants vivants de 0-59 mois | 1,13 | 12 686 |
| Anthropométrie des enfants | Enfants vivants de 0-59 mois (du questionnaire biomarqueur) | | |
| Taille | | 1,72 | 13 551 |
| Poids | | 1,58 | 13 551 |
| Taille ou poids | | 1,72 | 13 551 |
| Anthropométrie des femmes | Femmes de 15-49 ans (du questionnaire biomarqueur) | | |
| Taille | | 2,72 | 8 339 |
| Poids | | 2,67 | 8 339 |
| Taille ou poids | | 2,72 | 8 339 |
| Anémie | | | |
| Enfants | Enfants vivants de 6-59 mois du questionnaire biomarqueur | 2,81 | 6 348 |
| Femmes | Femmes de 15-49 ans du questionnaire biomarqueur | 3,32 | 8 339 |

¹ L'année et l'âge sont manquants**Tableau C.4 Naissances par année de naissance**

Nombre de naissances, pourcentage de naissances avec une date de naissance complète, rapport de masculinité à la naissance et rapport de naissances annuelles pour les enfants survivants, les enfants décédés et le total des enfants (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Années | Effectif de naissances | | | Pourcentage avec une année et mois de naissance | | | Rapport de masculinité à la naissance ¹ | | | Rapport de naissances annuelles ² | | |
|-------------|------------------------|---------|--------|---|---------|-------|--|---------|-------|--|---------|-------|
| | Survivants | Décédés | Total | Survivants | Décédés | Total | Survivants | Décédés | Total | Survivants | Décédés | Total |
| 2018 | 125 | 3 | 128 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,6 | 29,4 | 99,1 | na | na | na |
| 2017 | 2 830 | 127 | 2 957 | 99,5 | 93,0 | 99,3 | 98,9 | 131,7 | 100,1 | na | na | na |
| 2016 | 2 525 | 155 | 2 680 | 98,3 | 85,1 | 97,6 | 104,3 | 123,2 | 105,3 | 97,2 | 88,3 | 96,7 |
| 2015 | 2 364 | 223 | 2 587 | 96,3 | 76,4 | 94,6 | 97,3 | 144,6 | 100,6 | 94,9 | 119,5 | 96,7 |
| 2014 | 2 455 | 219 | 2 674 | 95,3 | 84,3 | 94,4 | 105,3 | 141,0 | 107,8 | 103,1 | 97,5 | 102,6 |
| 2013 | 2 397 | 226 | 2 623 | 93,7 | 81,3 | 92,6 | 107,0 | 114,8 | 107,7 | 102,3 | 100,0 | 102,1 |
| 2012 | 2 233 | 234 | 2 467 | 93,1 | 76,4 | 91,5 | 105,3 | 105,4 | 105,3 | 98,9 | 88,8 | 97,9 |
| 2011 | 2 118 | 300 | 2 418 | 87,8 | 72,2 | 85,9 | 97,0 | 126,6 | 100,3 | 95,0 | 119,9 | 97,5 |
| 2010 | 2 226 | 266 | 2 493 | 85,6 | 72,9 | 84,3 | 99,5 | 114,5 | 101,0 | 107,7 | 93,1 | 105,9 |
| 2009 | 2 017 | 273 | 2 289 | 84,1 | 67,7 | 82,2 | 92,4 | 112,5 | 94,6 | 100,1 | 101,8 | 100,3 |
| 2014 - 2018 | 10 299 | 727 | 11 026 | 97,5 | 83,6 | 96,6 | 101,3 | 135,6 | 103,3 | na | na | na |
| 2009 - 2013 | 10 991 | 1 299 | 12 290 | 89,0 | 73,7 | 87,4 | 100,4 | 115,0 | 101,9 | na | na | na |
| 2004 - 2008 | 8 346 | 1 181 | 9 527 | 84,1 | 70,5 | 82,4 | 105,6 | 107,9 | 105,9 | na | na | na |
| 1999 - 2004 | 5 586 | 956 | 6 542 | 82,6 | 72,3 | 81,1 | 99,3 | 135,1 | 103,8 | na | na | na |
| <1999 | 5 280 | 1 191 | 6 471 | 80,5 | 69,9 | 78,5 | 106,8 | 104,0 | 106,3 | na | na | na |
| Ensemble | 40 502 | 5 354 | 45 856 | 88,2 | 73,2 | 86,4 | 102,4 | 116,7 | 103,9 | na | na | na |

na = Non applicable

¹ $(N_m/N_f) \times 100$, où N_m est le nombre de naissances masculines et N_f le nombre de naissances féminines² $[2N_x / (N_{x-1} + N_{x+1})] \times 100$, où N_x est le nombre de naissance de l'année x

Tableau C.5 Enregistrement de l'âge au décès en jours

Répartition des décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 1 mois selon l'âge au décès en jours et pourcentage de décès néonataux survenus, d'après les déclarations, aux âges de 0-6 jours, par période de 5 ans précédant l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge au décès en jours | Nombre d'années ayant précédé l'enquête | | | | Total 0-19 |
|---|---|------|-------|-------|------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | |
| <1 | 147 | 149 | 106 | 78 | 479 |
| 1 | 91 | 90 | 63 | 42 | 286 |
| 2 | 32 | 36 | 18 | 22 | 108 |
| 3 | 45 | 36 | 24 | 22 | 128 |
| 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 33 |
| 5 | 12 | 14 | 11 | 9 | 47 |
| 6 | 8 | 13 | 4 | 7 | 32 |
| 7 | 22 | 16 | 11 | 15 | 63 |
| 8 | 6 | 18 | 7 | 3 | 35 |
| 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 22 |
| 10 | 6 | 6 | 9 | 1 | 21 |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 14 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
| 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total 0-30 | 406 | 418 | 296 | 236 | 1,355 |
| Pourcentage néonatal précoce ¹ | 84,3 | 83,0 | 78,9 | 80,1 | 82,0 |

¹ 0-6 jours / 0-30 jours

Tableau C.6 Enregistrement de l'âge au décès en mois

Répartition des décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 2 ans, selon l'âge au décès en mois, et pourcentage de décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 1 mois, par période de 5 ans précédant l'enquête (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Age au décès en mois | Nombre d'années ayant précédé l'enquête | | | | Total 0-19 |
|-----------------------------------|---|------|-------|-------|------------|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | |
| <1 | 406 | 418 | 296 | 236 | 1 355 |
| 1 | 40 | 42 | 41 | 12 | 135 |
| 2 | 34 | 42 | 26 | 29 | 131 |
| 3 | 29 | 34 | 28 | 22 | 113 |
| 4 | 18 | 15 | 14 | 7 | 54 |
| 5 | 24 | 28 | 21 | 14 | 87 |
| 6 | 24 | 32 | 28 | 20 | 104 |
| 7 | 28 | 26 | 31 | 13 | 99 |
| 8 | 24 | 22 | 22 | 17 | 85 |
| 9 | 33 | 41 | 39 | 22 | 136 |
| 10 | 24 | 29 | 24 | 16 | 92 |
| 11 | 18 | 26 | 30 | 16 | 89 |
| 12 | 32 | 40 | 34 | 27 | 133 |
| 13 | 12 | 23 | 18 | 18 | 72 |
| 14 | 15 | 21 | 14 | 18 | 68 |
| 15 | 9 | 21 | 15 | 13 | 58 |
| 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 25 |
| 17 | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 18 | 31 | 30 | 22 | 30 | 113 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 20 | 2 | 7 | 7 | 4 | 20 |
| 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 23 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 |
| Total 0-11 | 702 | 756 | 600 | 423 | 2 480 |
| Pourcentage néonatal ¹ | 57,8 | 55,4 | 49,2 | 55,8 | 54,6 |

^a Y compris les décès survenus à mois d'un mois, déclarés en jours

¹ Moins d'un mois / moins d'un an

Tableau C.7 Complétude et données de qualité concernant le poids et la taille des enfants

Parmi les enfants de moins de 5 ans (0-59 mois) éligibles pour l'anthropométrie, pourcentage avec des mesures de la taille et/ou du poids et/ou des dates de naissances incomplètes ou manquantes; pourcentage avec des données hors limites pour la taille-pour-âge et/ou le poids-pour-taille et/ou le poids-pour-âge; et pourcentage avec des données valides, selon certaines caractéristiques sociodémographiques (non pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| Caractéristique sociodémographique | Pourcentage avec données manquantes ou incomplètes | | | Pourcentage avec données hors-porté pour : ⁴ | | | Pourcentage avec données valides pour : ⁸ | | | Effectif d'enfants |
|---|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|
| | Taille ¹ | Poids ² | Age en mois ³ | Taille-pour-âge ⁵ | Poids-pour-taille ⁶ | Poids-pour-âge ⁷ | Taille-pour-poids | Poids-pour-taille | Poids-pour-âge | |
| Âge en mois | | | | | | | | | | |
| <6 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 96,8 | 96,2 | 97,5 | 1 430 |
| 6-8 | 1,9 | 1,8 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 97,5 | 97,6 | 98,0 | 831 |
| 9-11 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 95,5 | 97,4 | 96,0 | 731 |
| 12-17 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 97,5 | 98,4 | 98,0 | 1 288 |
| 18-23 | 1,6 | 1,4 | 3,6 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 94,6 | 97,8 | 95,0 | 1 339 |
| 24-35 | 2,0 | 1,5 | 3,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 94,2 | 97,9 | 94,7 | 2 517 |
| 36-47 | 1,5 | 1,4 | 6,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 91,9 | 98,1 | 92,2 | 2 724 |
| 48-59 | 1,9 | 1,9 | 6,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 91,2 | 97,8 | 91,5 | 2 690 |
| Sexe | | | | | | | | | | |
| Masculin | 1,6 | 1,4 | 4,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 94,1 | 97,9 | 94,5 | 6 835 |
| Féminin | 2,1 | 1,9 | 3,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 94,0 | 97,6 | 94,4 | 6 715 |
| Interview de la mère | | | | | | | | | | |
| Interviewée | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 95,2 | 98,2 | 95,6 | 12 230 |
| Mère non interviewée mais vivant dans le ménage | 20,2 | 19,9 | 17,3 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 66,7 | 79,2 | 67,9 | 312 |
| Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ⁹ | 2,0 | 1,8 | 9,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 88,0 | 97,6 | 88,4 | 1 008 |
| Département | | | | | | | | | | |
| Alibori | 1,5 | 1,5 | 4,1 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 93,6 | 97,8 | 94,4 | 1 555 |
| Atacora | 1,0 | 0,7 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 95,1 | 98,9 | 95,5 | 1 305 |
| Atlantique | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 94,1 | 97,9 | 94,2 | 1 258 |
| Borgou | 0,6 | 0,6 | 11,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 87,9 | 99,0 | 88,1 | 1 796 |
| Collines | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 97,1 | 98,8 | 97,4 | 1 040 |
| Couffo | 2,6 | 1,6 | 5,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 92,8 | 97,1 | 93,6 | 926 |
| Donga | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 95,4 | 97,6 | 95,8 | 1 012 |
| Littoral | 4,5 | 4,3 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 94,5 | 95,1 | 94,9 | 874 |
| Mono | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 95,8 | 96,9 | 96,7 | 687 |
| Ouémé | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 95,1 | 97,6 | 95,6 | 1 035 |
| Plateau | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 97,4 | 99,0 | 97,6 | 784 |
| Zou | 2,8 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 96,2 | 96,7 | 96,6 | 1 215 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | |
| Aucun | 1,7 | 1,5 | 4,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 93,2 | 97,7 | 93,7 | 8 277 |
| Primaire | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 97,4 | 98,3 | 97,8 | 2 217 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,2 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 96,9 | 97,5 | 97,5 | 1 468 |
| Secondaire 2 ^d cycle ou plus | 4,0 | 3,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 96,0 | 96,0 | 579 |
| Manquant | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 |
| Ensemble | 1,8 | 1,7 | 3,9 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 94,0 | 97,7 | 94,5 | 13 550 |

¹ La taille de l'enfant en centimètres est manquante, l'enfant n'était pas présent, l'enfant a refusé et code résultat "autre"

² Le poids de l'enfant en kilogrammes est manquant, l'enfant n'était pas présent, l'enfant a refusé et code résultat "autre"

³ Date de naissance incomplète ; une date de naissance complète comprend le jour/mois/année ou le mois/année

⁴ Les cas avec des données manquantes ou incomplètes ne sont pas considérés comme des cas hors limite.

⁵ Les cas hors limite pour la taille-pour-âge sont définis comme plus de 6 écarts type (ET) au-dessus ou en-dessous de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant.

⁶ Les cas hors limite pour le poids-pour-taille sont définis comme plus de 5 écarts type (ET) au-dessus ou en-dessous de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant.

⁷ Les cas hors limite pour le poids-pour-âge sont définis comme plus de 6 ET en-dessous ou 5 ET au-dessus de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant.

⁸ Pas de données manquantes, incomplètes ou hors limite

⁹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

Tableau C.8 Taille de la fratrie et rapport de masculinité des frères et sœurs

Taille moyenne de la fratrie et rapport de masculinité à la naissance des frères et sœurs, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge des enquêtées | Taille moyenne de la fratrie ¹ | Rapport de masculinité à la naissance ² |
|-------------------|---|--|
| 15-19 | 5,8 | 106,5 |
| 20-24 | 6,1 | 105,4 |
| 25-29 | 6,1 | 106,9 |
| 30-34 | 6,0 | 108,2 |
| 35-39 | 6,1 | 106,7 |
| 40-44 | 6,2 | 103,9 |
| 45-49 | 6,1 | 104,9 |
| Ensemble | 6,0 | 106,3 |

¹ Y compris l'enquêtée

² Non compris l'enquêtée

Tableau C.9 Mortalité liée à la grossesse

Estimations directes des taux de mortalité liée à la grossesse pour la période 7 ans avant l'enquête, par groupes d'âge quinquennaux, EDSB-V Bénin 2017-2018

| Âge | Pourcentage de décès de femmes liés à la grossesse | Décès liés à la grossesse ¹ | Années d'exposition | Taux de mortalité liée à la grossesse ² |
|----------------|--|--|---------------------|--|
| 15-19 | 18,1 | 16 | 35 355 | 0,44 |
| 20-24 | 35,0 | 31 | 39 226 | 0,78 |
| 25-29 | 32,9 | 28 | 36 426 | 0,76 |
| 30-34 | 35,2 | 43 | 30 122 | 1,42 |
| 35-39 | 24,7 | 20 | 21 197 | 0,94 |
| 40-44 | 20,9 | 11 | 13 405 | 0,81 |
| 45-49 | 14,1 | 5 | 7 810 | 0,66 |
| Ensemble 15-49 | 27,8 | 153 | 183 543 | 0,81 ^a |

¹ La mortalité liée à la grossesse est définie comme le décès d'une femme enceinte ou dans les deux mois suivant l'interruption de grossesse, de toute cause, y compris un accident ou la violence

² Exprimé par 1 000 années-femmes d'exposition

^a Taux ajusté selon l'âge

Tableau C.10 Nombre de grappes complétées par mois d'interview et selon la région

Nombre de grappes complétées par mois d'interview, selon la région, EDSB-V Bénin 2017-2018

| | Mois | | | | Ensemble |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| | Janvier 2018 | Février 2018 | Novembre 2017 | Décembre 2017 | |
| Département | | | | | |
| Alibori | 13 | 17 | 2 | 10 | 42 |
| Atacora | 9 | 8 | 4 | 18 | 39 |
| Atlantique | 24 | 6 | 10 | 25 | 65 |
| Borgou | 15 | 14 | 8 | 19 | 56 |
| Collines | 25 | 13 | 1 | 7 | 46 |
| Couffo | 13 | 10 | 4 | 15 | 42 |
| Donga | 12 | 11 | 2 | 7 | 32 |
| Littoral | 7 | 31 | 10 | 4 | 52 |
| Mono | 9 | 18 | 4 | 6 | 37 |
| Ouémé | 15 | 19 | 5 | 15 | 54 |
| Plateau | 13 | 5 | 5 | 15 | 38 |
| Zou | 18 | 6 | 8 | 20 | 52 |
| Pourcentage | 31,2 | 28,5 | 11,4 | 29,0 | 100,0 |
| Total | 173 | 158 | 63 | 161 | 555 |

Note : Les grappes sont classées par mois en fonction de la date à laquelle le dernier questionnaire sur les biomarqueurs a été rempli dans la grappe

Tableau C.11 Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois dont les résultats du test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme sont classés positifs, par mois et par département, EDSB-V Bénin 2017-2018

| | Mois | | | | Ensemble |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Janvier 2018 | Février 2018 | Novembre 2017 | Décembre 2017 | |
| Département | | | | | |
| Alibori | 27,2 | 29,2 | 56,0 | 47,0 | 36,0 |
| Atacora | 46,3 | 29,3 | 65,3 | 64,5 | 53,9 |
| Atlantique | 11,7 | * | 41,2 | 23,7 | 23,7 |
| Borgou | 58,9 | 4,6 | 57,8 | 52,9 | 51,3 |
| Collines | 41,4 | 38,8 | 37,7 | 47,7 | 41,6 |
| Couffo | 57,7 | 47,3 | 41,0 | 62,2 | 54,3 |
| Donga | 45,1 | 14,5 | 69,4 | 54,8 | 40,2 |
| Littoral | 6,5 | 4,3 | 3,4 | * | 4,2 |
| Mono | 30,7 | 15,2 | 35,6 | 26,8 | 25,9 |
| Ouémé | 12,6 | 9,2 | 31,0 | 11,5 | 14,5 |
| Plateau | 35,1 | (14,9) | 54,7 | 28,3 | 33,9 |
| Zou | 31,2 | 19,6 | 55,5 | 39,7 | 36,8 |
| Total | 34,8 | 20,2 | 45,8 | 42,3 | 36,4 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés
Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau C.12 Nombre d'enfant de 6 à 59 ans ayant effectué le test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme par mois et par département (non-pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| | Mois | | | | Ensemble |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Janvier 2018 | Février 2018 | Novembre 2017 | Décembre 2017 | |
| Département | | | | | |
| Alibori | 219 | 228 | 70 | 190 | 707 |
| Atacora | 180 | 77 | 122 | 217 | 596 |
| Atlantique | 220 | 10 | 124 | 211 | 565 |
| Borgou | 210 | 66 | 230 | 295 | 801 |
| Collines | 173 | 93 | 88 | 115 | 469 |
| Couffo | 137 | 61 | 89 | 154 | 441 |
| Donga | 166 | 128 | 69 | 89 | 452 |
| Littoral | 87 | 183 | 141 | 21 | 432 |
| Mono | 71 | 108 | 82 | 63 | 324 |
| Ouémé | 123 | 121 | 91 | 137 | 472 |
| Plateau | 116 | 39 | 69 | 107 | 331 |
| Zou | 212 | 69 | 102 | 219 | 602 |
| Total | 1 914 | 1 183 | 1 277 | 1 818 | 6 192 |

Tableau C.13 Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois dont les résultats du test de gouttes épaisses (Parasitémie palustre) sont classés positifs, par mois et par département, EDSB-V Bénin 2017-2018

| | Mois | | | | Ensemble |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Janvier 2018 | Février 2018 | Novembre 2017 | Décembre 2017 | |
| Département | | | | | |
| Alibori | 34,2 | 36,2 | 37,2 | 41,2 | 37,0 |
| Atacora | 52,4 | 36,0 | 60,9 | 47,9 | 49,7 |
| Atlantique | 37,1 | * | 30,7 | 34,0 | 34,2 |
| Borgou | 55,0 | 9,8 | 58,7 | 37,3 | 44,9 |
| Collines | 48,2 | 45,3 | 33,4 | 38,7 | 42,3 |
| Couffo | 57,9 | 40,2 | 32,6 | 61,6 | 51,3 |
| Donga | 47,5 | 38,0 | 58,0 | 53,9 | 47,1 |
| Littoral | 20,1 | 19,1 | 13,8 | * | 16,7 |
| Mono | 54,7 | 29,3 | 32,5 | 44,9 | 38,0 |
| Ouémé | 29,6 | 21,7 | 28,1 | 26,9 | 26,4 |
| Plateau | 36,4 | (43,1) | 38,0 | 34,0 | 37,2 |
| Zou | 38,4 | 27,4 | 38,8 | 38,2 | 36,9 |
| Total | 42,8 | 31,1 | 39,7 | 40,3 | 39,1 |

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés
Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau C.14 Nombre d'enfant de 6 à 59 ans ayant effectué le test de gouttes épaisses (Parasitémie palustre) par mois et par département (non-pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

| | Mois | | | | Ensemble |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Janvier 2018 | Février 2018 | Novembre 2017 | Décembre 2017 | |
| Département | | | | | |
| Alibori | 206 | 210 | 63 | 181 | 660 |
| Atacora | 173 | 76 | 111 | 210 | 570 |
| Atlantique | 202 | 10 | 122 | 196 | 530 |
| Borgou | 198 | 64 | 229 | 280 | 771 |
| Collines | 168 | 86 | 88 | 108 | 450 |
| Couffo | 128 | 59 | 85 | 148 | 420 |
| Donga | 158 | 119 | 67 | 86 | 430 |
| Littoral | 83 | 176 | 133 | 21 | 413 |
| Mono | 61 | 101 | 78 | 62 | 302 |
| Ouémé | 116 | 120 | 89 | 131 | 456 |
| Plateau | 113 | 39 | 65 | 103 | 320 |
| Zou | 206 | 67 | 106 | 210 | 589 |
| Total | 1 812 | 1 127 | 1 236 | 1 736 | 5 911 |

PERSONNEL NATIONAL

Coordination nationale

Mahounou Laurent Hounsa (Directeur Général de l'INSAE)
Armelle C. H. Ahamide Meangoua (Directrice Générale Adjointe de l'INSAE)
S. Alexandre Biaou (Directeur Général de l'INSAE au moment de la Collecte)

Coordination technique

Rémy Hounguevou (Directeur des Etudes Démographiques par Intérim de l'INSAE)
D. Dine Adechian (Directeur des Etudes Démographiques de l'INSAE au moment de l'enquête)

Coordination administrative et financière

Lisette Assemien (Directrice Administrative et Financière de l'INSAE)
Pascal W. Donou (Chef Comptable de l'INSAE au moment de l'enquête)

Comité de pilotage

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (Direction Générale)
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (Direction des Etudes Démographiques)
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (Direction Administrative et Financière)
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)
United States Agency for International Cooperation (USAID)
Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)
Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN)

Équipe technique, INSAE

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Djabar Dine Adechian | Renaud Yovoga |
| Mémounath Bissiriou Zounon | Sévérin Agbangla |
| Rémy Hounguevou | Oscar Houndonougbo |
| Bruno Djangba | Joëlle Domigo Folly |
| Jeannine Houeha | Charlotte Quenum |
| Gisèle Houessou Assaba | Gilles Kiki |
| Kocou Missihoun | |

Équipe d'analyse thématique

INSAE, partenaires et personnes ressources

Mahounou Laurent Hounsa
Armelle C. H. Ahamide Meangoua
Mémounath Bissiriu Zounon
Rémy Hounguevou
Jeannine Houeha
Gisèle Houessou Assaba
Kocou Missihoun
Renaud Yovoga
Sévérin Agbangla
Elise Ahovery
Bruno Djagba
Oscar Houndonougbo
Fèmi Christian Dossou
Eudes Hounkpodote

Mouchitaba Lawani Lawani
Charlotte Quenum
Gilles Kiki
Narcisse Kouton
Bertille Agueh Onambele
Roger Attemba
Odette Amlan Semevo
Etienne Somakou
Justin Dansou
Candide Atodjinou
Georges Kouchoro
Paterne Kougblenou
Yédodé Ahokossi
Antoinette Gbokli

Sectoriels

Virgile Dodoo (ANV-SSP/MS)
Aminatou Baco Mama Chabi (DSME/MS)
Augustin Koukpoliyi (CNHU-HKM/Parasitologie)
Bernadin Adanhoume (DNSP/MS)
Andréa Houindote (SP-CAN)
Georges Ogoudedji (SP-CAN)
Fiacre Affédjou (SP-CAN)

Mireille Houensou (SP-CAN)
Salimatou Assani (CNHU-HKM/Cardiologie)
Abou Bakary Pio (PNLP/MS)
Gaétan Cyriaque Goudjo (PNLMNT/MS)
José Ahyi (DSME/MS)
H. Cyrillia Yebe (DPFG/MASM)
Ibrahim Moussa (ABPF)

Équipe de lecture des chapitres

Kokou Zounon
Bruno Magloire Nouatin
sourou Koubadje Djaton
J. Thomas Tohouegnon
Maurice Dossou Bankole

Victor Valère O. Bankole
Nicaise Kodjogbe
Victorine Mensah
Bruno Djagba

Comité de relecture

Andrée Cossi
Fatahi Chitou
Françoise Allodjogbe

Djaoudath Alidou Dramane
Yves Dangnivo

Gestionnaires

Lisette Assemien
Pascal Donou Wadayi
Hermine Vigan

Bricette Adjovi
Cécile Ahouangbo
Magloire Djika
Claude Soton

Logistique

Alain Satcha

Hilarion Awo

Séidou Seko Baka

Secrétariat

Eléonore Ablefonlin
Solange Badjagou

Ruth Akplogan
Souliatou Chitou

Chauffeurs

Serge Gbedan
Bruno Hounou
Natacha Hounwoui
Alain Ahoyo

Vincent da Matha
Jean Jonhson
Magloire Atcho

Charge de courrier

Émile Aigbonoussi

Lina Agbotome

Personnel du Laboratoire de Parasitologie du CNHU (Test microscopique)

Coordonnateur principal

Professeur Achille Massougbodji

Chef du Laboratoire

Professeur Dorothée Kinde Gazard

Assistants

M. C. A. Aurore Ogouyemi Hounto

Dr. Yolande Sissinto Savi De Tove

Superviseur des activités, surveillant du laboratoire

Augustin L. Koukpoliyi

Microscopistes

Victoire Adinsi de Souza
Mireille Aguegue Soglo
David Biaou
Nicaise Gninou
Romaric Tchebe

Claude Kokoun
Serge Awolokou
Sidonie Koudebi
Andréa Dandjesso
Parthénos Ahouannou

Cartographie

Cartographes et énumérateurs

Zoumarou Safianou Djimba
B. K. Clovis Borkou
Abdoul-Wassihou Ouake Baoua
Abdel Aziz Boukari
Winrebassé Yintopa
Afiavi Cathérine Gandebagni
Koffi Adokou
Lucesse Annaïk Agblo
Cokou James Dansou
Giono Ahouignan
Aboudou Kafarou Sibrim
Franscica Houndonougbo
Rosel Sotinkon
Rosaline Assiba Hounguevou
Al-Faraj Y. N. Adam Soule
Odjo Olaitan Elegbe
Eugène Koussouma

Narcisse Tchibozo
Adéyèmi Eric Teka
Bertin Tchihoukpo
Kossi Glwladys Totehoue
Dominique Bonou
Jules Agbessi
Barnabé Egoudjobi
E. Honoré Agbodeji-Kpatinvo
Sarafadine Sambo
Fritzy Anianou
Bouraïma A. Nachirou
Jean-Baptiste Tindedjrohoun
Fawaz A. Adechy
Anne A. Akplogan
Saturnin Alavo
T. Franck Marius Heleme
F. S. Géraldo Houeha

John Bah Sato
Bachirou Tidjani Salami
Kassimou Mama
Abdel Sidikou Zime
Abiloyé Médard Akpo
Comlan Salomon Ahovery

Tédessi Igor Roger Hounzangli
Nassirou Issa
K. Gildas Martin Zankpo
O Moufalilou Alassani
A. Pierre Odo Adekoun

Enquête pilote

Superviseurs

Djabar Dine Adechian
Gisèle Houessou Assaba
Joëlle Domigo Folly
Rémy Hounguevou

Jeannine Houeha
Kocou Missihoun
Charlotte Quenum

Chefs d'équipes

Zolassi Albertine Hlihe
Fifonsi Brigitte Dako

Jonas Gbetie
Mounifa Karim Tidjani

Enquêteurs

B. Mariano Totin
K. Nicaise
S. Hountondji

Yao Robert Djogbenou
Mohamed Aminou Bagri Issa
Josué U. D. Lokossou Kpewege

Enquêtrices

Jacqueline Hermione M. Toviessi
Pauline Félicité Zounon
Danielle Renée M. Bankole
E. Murielle Ahouassou
Christelle Espérance Atchade
M. Octavie Estelle Kpoton
Carine Huguette Agbo

Agossi Perpétue Hermione Goukodadja
Odjo Eulalie Biao
Amlan Odette Semevo
Vidéhoun Solange Hounsa
Afiwa Clémence Flora Fagnon
S. Odette Dossou

Techniciens de santé

Adéba Odile Guegni
Taïdatou Issadou

Janine Salmath Avaligbe
Gb. Diane Djidonou

Appui des sectoriels aux différentes phases préparatoires

Virgile Dodoo (ANV-SSP/MS)
Armand Gandigbe (DRFMT/MS)
Georges Ogoudedji (SP-CAN)
G. Jeannine Agbo Monlemey Lawani (DSME/MS)
Mabou Ahokossi (DSME/MS)

Mouniratou Idrissou Mama Sanni (CNLS/MS)
Bella Hounkpe do Santos (PNLP/MS)
Philippe Tognisou (ANV-SSP/MS)
Augustin Koukpoliyi (Laboratoire CNHU)
Mireille Aguegue (Laboratoire CNHU)

Enquête principale

Chefs d'équipe

Mohamed Aminou Bagri Issa
Souradjou Salifou
Abdou Fataou Issifou
André Pierre Odo Adekoun
Ouorou Phales Assignitou
O. Eulalie Biao
Traoré Kabirou Bio Comada
Sewedo Christine Aidonougbo
Dalé Sylvain Awo
Abla Dahoeto
Charbel L. Edgard Pedanou

Emile Laurent Amakoué Mensah
Gildas Akadji
Bignon Mariano Totin
S. Odette Dossou
Jonas Gbetie
A. P. Hermione Goukodadja
Zolassi Albertine Hlihe
Alexis Hounsou
Biaou Félix Balogoun
K. Josué U. D. Lokossou
Fifonsi Brigitte Dako

Enquêtrices

Raïmatou Orou Seko
Chamsia Gado
Aya Assana
Salmata Tairou Moumouni
Roukiatou Adam
Rachidatou Amedowokpo
Augustine Owa M'po
K. Justine Kouagou Kroupe
Yépoudoua Patricia Kouagou
Clémence Daroukoua
Diawêyiah Prudencia Tablieni
Raïmatou Atchado Atta Gomina
Mouïna Issifou
Djoumai Kadidjatou Issouman
Taïdatou Issadou
Djamilath Tony
Rahimatou Zakari
Zoubérath Bio Tahirou
Gérôde Fifamè Nanhinde
Sylbine Bona Boni
Eunice-Landra Nansounon
Kadjogbé Hortense Abaya
V. J. Tatiana Amagnide
Sènan Anasthasie Tchakpa
Geneviève Tollegbe
Vidéhoun Solange Hounsa
Rouchidath A. Akinocho
F. I. Véronique Sandrine Ahouangannon
Armandine Félicité Sogadji
Thérèse Donou
A. C. Flora Fagnon
A. Sonia Degbe
Agathe Houetognon

Calilatou Allassane
Y. Euphrasie H. Boco
Thywill Gakpetor
Wanyinto Sidonie Agossou
Christelle Dossou
Satingo Marlène Danielle Sourou
M. Bénédicte Moide
Bossédé Elvire Senougbe
Jacqueline Hermione M. Toviessi
E. Blandine Degbeko
A. S. Nelly Gnancadja
Charlotte Hounkpe
Francine Houndonougbo
Ruth Gloria Zinsou
Kafilatou Aremou
Yasmine Carolle F. Koukpresso
G. Déborah Espérance Zohoun
Eve Josèthe Tossou
S. K. Rolande Koukouï
Clotilde Daga
Octavie Estelle Kpoton
Abran Christiane Winsavi
Yandibossi Ella Tawema
Pauline F. Zounon
Réanatou Adjiboye
Saba Tchari Kassa Delphine
Olouwatayo Georgette Olouyomi
Angèle Ahotondji
Huguette A. Kakpo
Gisèle Léonie Kanlinsou
H. M. Lidwine Sithon
Christelle Atchade
M. Geneviève Datondji

Agents de prélèvement

Anani Benoit Tohouenou
Nabilath Adenike Abike Mora
Iliassou Orou Gado
Zoubérou Naïmatou Adambi Bouhary
Akimou Aliou Banka
Abdou Sabour Alasane Ibrahim
Iradath Babio
N. Angélique Agossadou
Freddy Eudoxe Edikou
Adonis A. Hountondji
Axelle G. M. A. Dickinson

Adrien C. Hessavi Hodonou
Mireille Flenon
Achille Sessou
O. H. Laurel Ouidoh
Adéba Odile Guegni
Gb. Diane Djidonou
Salmath Janine Avaligbe
D. Christine Bossou
Faridath Adjokè Adechoubou
Yolande E. Ahodo-Ounsou
Adéyèmi Eric Tecka

Enquêteurs

A. Kankou Warissou Sanni
Souradjou Mama Yacoubou
N’Kouei André Fenonkperife
Raïssanou Abdoulaye
Mouzaminou Zakari Abdoulaye
Kabirou Aboubakari
Ayodélé Romuald Seriki
Dossa Florent Houefonde
Moufid Biao
Tchégnon Charlmelo Aho
Samuel D. M. Amoussou Adeble

Gilles Constantin Codjovi
Affolabi Boris Fayomi
Soumanou Moukaïla Soumanou
Sèlobo Dèfodji Emile Houssou
Ferdinand Dagba
Ulrich Peace Migan Gandonou
Yannick Lionel A. Sotomey
Adéyèmi Elie Chabi
Kabirou Ayodele
Jesugo Venceslas Andronicus Ahouangbo
Mègnonnan Nicolas Ahovey

Editeurs

Boni Soubo Bio Soubo
Djigbodi Rose Sodegadji
Salifou Essessinou
Chabi Olaoumi Georges Kouchoro

Aurel Cephas Ogoudjobi Attere
Amlan Odette Semevo
Djamal Dine Djaboutouboutou

Supervision technique

Rémy Hounguevou (INSAE)
Jeannine Houeha (INSAE)
Gisèle Houessou Assaba (INSAE)
Kocou Missihoun (INSAE)
Renaud Yovoga (INSAE)
Sévérin Agbangla (INSAE)
Bruno Djagba (INSAE)
Oscar Houndonougbo (INSAE)
Eudes Hounkpodote
Fèmi Christian Dossou (INSAE)
Mouchitaba Lawani Lawani (INSAE)
Charlotte Quenum (INSAE)
Gilles Kiki (INSAE)
Joelle Domingo (INSAE)
Emmanuel Goussanou (INSAE)
Didier Ganzo (INSAE)
Zulficar Sacko (INSAE)
Brice Tomavo (INSAE)

Serge Awolokou (Labo CNHU)
Claude Kokoun (Labo CNHU)
Sidonie Koudebi (Labo CNHU)
Andréa Dandjesso (Labo CNHU)
Parthénos Ahouannou (Labo CNHU)
MCA Aurore Ogouyemi-Hounto (CNERS/MS)
Dr Assomption Hounsa (CNERS/MS)
Gbodja Zomonto (CNERS/MS)
Idrissou Mama Sanni Mouniratou (CNLS/MS)
Mabou Ahokpossé (DSME/MS)
Jeannine Agbo Monlemey Lawani (DSME/MS)
Virgile Dodoo (ANV-SSP/MS)
Antoine Sianou (PNLP/MS)
Christian Godjo (PNLP/MS)
Georges Ogoudedji (SP-CAN)
Marcellin Zohoun (DDPD-Atlantique-Littoral)
T. Bienvenu Alohan (DDPD-Mono-Couffo)
Abdourassidou Zibrila (DDPD-Atacora-Donga)

Emile Aigbonoussi (INSAE)
Augustin L. Koukpoliyi (Labo CNHU)
Victoire Adinsi-de Souza (Labo CNHU)
Mireille Aguegue-Soglo (Labo CNHU)
David Biaou (Labo CNHU)
Nicaise Gninou (Labo CNHU)
Romaric Tchebe (Labo CNHU)

Jacques Tonon (DDPD-Atacora-Donga)
Boni Sounon Bouko (DDPD-Borgou-Alibori)
Franck Gohoungbe (DDPD-Borgou-Alibori)
Euloge Gaston Facounde (DDPD-Ouémé-Plateau)
Sabirou Aliou (DDPD-Ouémé-Plateau)
Yaovi Francis Kpohonsito (DDPD-Zou-Collines)

Coordination technique

Djabar Dine Adechian

Mémounath Bissiriou Zounon

Édition secondaire et finale

S. L. Gloria Solome
I. B. Nourou Dine Baparape Yallou
Alexandre Yessoufou
A. Jean-Baptiste Akonde
Abdouramane Idrissou
Etienne Somakou

Paterne Kougblenou
Jeannine Houeha
Renaud Yovoga
Rémy Hounguevou
Kocou Missihoun
Charlotte Quenum

Personnel d'ICF

Yodit Bekele
Bernard Barrère
Fidele Mutima
Ruilin Ren
Jose Miguel Guzman
Amadou Sow
Michel Toukam
Keith Purvis
Han Raggars
Sarah Balian
Monique Barrère
Rachel Orłowski

Metahan Traore
Jehan Ahmed
Tom Fish
Trinadh Dontamsetti
Natalie Shattuck
Chris Gramer
Nancy Johnson
Christian Reed
Jeremy Taglieri
Bridgette Wellington
Sarah Yang

ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE MÉNAGE

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

| IDENTIFICATION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| DÉPARTEMENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMMUNE | | | | | | | | | | | | | | | |
| URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMÉRO DE GRAPPE | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMÉRO DU MÉNAGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISITES D'ENQUÊTEURS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | VISITE FINALE | | | | | | | | | | | |
| DATE | _____ | _____ | _____ | JOUR <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MOIS | | | | | | | | | | | |
| NOM DE L'ENQUÊTEUR/ ENQUÊTRICE | _____ | _____ | _____ | ANNÉE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT* | _____ | _____ | _____ | No ENQUÊT <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RÉSULTAT* <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCHAINE DATE VISITE | _____ | _____ | | NOMBRE TOTAL DE VISITES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| HEURE | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | |
| *CODES RÉSULTAT : | | | TOTAL DE PERSONNES DANS LE MÉNAGE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 REMPLI | | | TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 PAS DE MEMBRE DU MÉNAGE À LA MAISON OU PAS D'ENQUÊTÉ COMPÉTENT À LA MAISON, AU MOMENT DE LA VISITE | | | TOTAL D'HOMMES ÉLIGIBLES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 MÉNAGE TOTALEMENT ABSENT POUR UNE LONGUE PÉRIODE | | | No DE LIGNE DE L'ENQUÊTÉ POUR LE QUESTION- NAIRE MÉNAGE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 DIFFÉRÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 REFUSÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 LOGEMENT VACANT OU PAS DE LOGEMENT À L'ADRESSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 LOGEMENT DÉTRUIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 LOGEMENT NON TROUVÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 AUTRE _____ (PRÉCISEZ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANGUE DU QUESTIONNAIRE** | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table> | 0 | 1 | LANGUE DE L'INTERVIEW** | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2) | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANGUE DU QUESTIONNAIRE** | FRANÇAIS | **CODES LANGUES : | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 FRANÇAIS | 03 Bariba | 05 Dendi | 07 Autre | | | | | | | | | | |
| | | 02 Adja | 04 Fon | 06 Yoruba | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISEUR | | ÉDITEUR | | | | | | | | | | | | | |
| _____ | | _____ | | | | | | | | | | | | | |
| NOM | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | NOM | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMÉRO | | NUMÉRO | | | | | | | | | | | | |

CETTE PAGE EST LAISSÉE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____. Je travaille pour l'INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE et de L'ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE). Nous effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets au Benin. Les informations que nous collectons aideront le gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre ménage. Les questions prennent habituellement entre 30-45 minutes. Toutes les informations que vous nous donnez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autres que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette enquête, mais nous espérons que vous accepterez de répondre à nos questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter les personnes figurant sur cette carte.

DONNEZ LA CARTE AVEC LES INFORMATIONS POUR CONTACTER CES PERSONNES

Avez-vous des questions à me poser ?
Puis-je commencer l'interview maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ ... 1
↓

L'ENQUÊTÉ REFUSE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ ... 2 → FIN

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 100 | NOTEZ L'HEURE. | HEURES | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | MINUTES | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

TABLEAU MÉNAGE

| No LIGNE | RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS | LIEN AVEC LE CHEF DE MÉNAGE | SEXE | RÉSIDENCE | | ÂGE | SI 10 ANS OU PLUS | ÉLIGIBILITÉ | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | ÉTAT MATRIMONIAL | 9 | | 10 | 11 | 11A | 11B | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SI MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME | |
| | S'il vous plaît, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage. APRÈS AVOIR LISTÉ LES NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 2A-2C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS APPROPRIÉES DES COLONNES 5-20A POUR CHAQUE PERSONNE. | Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ? VOIR CODES CI-DESSOUS. | (NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ? | (NOM) vit-il/elle ici habituellement ? | (NOM) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ? | Quel âge a (NOM) ? SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'. | Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM) ? 1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SÉPARÉ 3 = VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN | ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES DE 15-49 ANS | ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES HOMMES DE 15-64 ANS | ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES ENFANTS DE 0-5 ANS | ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 30-64 ANS | ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES FEMMES DE 30-49 ANS |
| 01 | | <input type="text"/> | M F 1 2 | O N 1 2 | O N 1 2 | EN ANNÉES <input type="text"/> | <input type="text"/> | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 02 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 03 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 04 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 05 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 06 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 07 | 75 | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 08 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
| 09 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 10 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

2A) Juste pour être sûre que j'ai une liste complète : y a-t-il d'autres personnes comme des petits enfants ou des nourrissons que nous n'avons pas listés ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

2B) Y a-t-il d'autres personnes qui ne sont peut-être pas membres de votre famille, comme des domestiques, locataires ou amis qui vivent habituellement ici ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

2C) Avez-vous des invités ou des visiteurs temporaires qui sont chez vous, ou d'autres personnes qui ont dormi ici la nuit dernière et qui n'ont pas été listés ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

- CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE**
- 01 = CHEF DE MÉNAGE
 - 02 = FEMME OU MARI
 - 03 = FILS OU FILLE
 - 04 = GENDRE OU BELLE-FILLE
 - 05 = PETIT FILS/FILLE
 - 06 = PÈRE/MÈRE
 - 07 = BEAU-PARENT
 - 08 = FRÈRE OU SOEUR
 - 09 = AUTRE PARENT
 - 10 = ADOPTÉ /EN GARDE/ ENFANT DE LA FEMME/MARI
 - 11 = AUTRE FEMME DU CM (SI CM=HOMME)
 - 12 = COÉPOUSE (SI CM=FEMME)
 - 13 = SANS PARENTÉ
 - 98 = NE SAIT PAS

TABLEAU MÉNAGE

| No LIGNE | MIGRATION DURÉE DE VIE POUR LES RESIDENTS | | | | | SI 0-17 ANS | | | |
|----------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | LIEU DE NAISSANCE | RÉSIDENCE ANTERIEURE | DURÉE DANS LA RÉSIDENCE ACTUELLE | MIGRANT RETOUR | STATUT MIGRATOIRE | ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES | | | |
| | 11C | 11D | 11E | 11F | 11G | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Dans quelle commune est né(e) (NOM) ? INSCRIRE DEP/COM OU PAYS POUR ETRANGER | Dans quelle commune residait (NOM) avant de s'installer ici ? INSCRIRE DEP/COM OU PAYS POUR ETRANGER | Quelle est la durée de séjour de (NOM) dans cette commune ? NOTER : 1 ET LE NOMBRE DE MOIS POUR DUREE < 1 AN OU 2 ET NOMBRE D'ANNEE POUR DUREE >= 1 AN ET 998 DEPUIS LA NAISSANCE → 11G | (NOM) est-elle de retour dans cette commune après y avoir séjourné pendant 6 mois au moins? O N 1 2 | DEDUIRE LE STATUT MIGRATOIRE. INSCRIRE 1=NON MIGRANT SI Q.11E=9 ET 98 2=MIGRANT RETOUR SI Q.11E=9 ET 98 ET Q.11F=1 3= AUTRE MIGRANT RETOUR SI Q.11E=9 ET 98 ET Q.11F=2 | La mère biologique de (NOM) est-elle en vie ? O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 14 | La mère biologique de (NOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DE LA MÈRE. SI NON, NOTEZ '00'. | Le père biologique de (NOM) est-il en vie ? O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 16 | Le père biologique de (NOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DU PERE. SI NON, NOTEZ '00'. |
| 01 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 02 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 03 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 04 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 05 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 06 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 07 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 08 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 09 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 10 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

CODES POUR Qs. 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION

NIVEAU

1 = PRIMAIRE
2 = SECONDAIRE 1
3 = SECONDAIRE 2
4 = SUPÉRIEUR
5 = PRE-PRIMAIRE/
MATERNELLE
8 = NE SAIT PAS

CLASSE

00 = MOINS D'1 ANNÉE ACHEVÉE
(UTILISEZ '00' POUR Q. 17 SEULEMENT.
CE CODE N'EST PAS AUTORISÉ
POUR Q. 19.)
98 = NE SAIT PAS

| | SI 5 ANS OU PLUS | | SI 5-24 ANS | | SI 0-4 ANS | SI AGE 6 ANS OU PLUS |
|----------|--|--|---|---|--|--|
| No LIGNE | A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE | | FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE | | ENREGISTREMENT DES NAISSANCES | ALPHABÉTISATION |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20A |
| | (NOM) a-t-il/elle déjà fréquenté l'école ? | Quel est le plus haut niveau d'études que (NOM) a atteint ? Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau ? VOIR CODES CI-DESSOUS. | (Nom) a-t-il/elle fréquenté l'école à n'importe quel moment durant l'année scolaire 2016-2017 ? | Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe était (NOM) ? VOIR CODES CI-DESSOUS. | (NOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ? SI NON, INSISTEZ : La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ? 1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉE 3 = NI L'UN, NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS | SI NIVEAU À COL.17 = 2, 3 OU 4 ; DEMANDEZ : (NOM) sait-il lire, écrire et comprendre au moins une langue nationale ? AUTRE ; DEMANDEZ (NOM) sait-il lire, écrire et comprendre au moins une langue ? SI OUI, lesquelles? 1 = AF 2 = ALN 3 = AFLN 4=NLE 8 = NE SAIT PAS |
| 01 | O N 1 2 ↓ 20A | NIVEAU CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/> | O N 1 2 ↓ 20A | NIVEAU CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 02 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 03 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 04 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 05 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 06 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 07 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 08 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 09 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 10 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

CODES POUR Qs. 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION / CLASSE

| NIVEAU ATTEINT | 1 = PRIMAIRE | 2 = SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE | 3 = SECONDAIRE 2 ND CYCLE | 4 = SUPÉRIEUR | 5 = PRE-PRIMAIRE / MATERNELLE |
|----------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|
| < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN CI | = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 6 ^{EME} = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 2 ^{NDE} = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 1 ^{ERE} AN. = 0 | |
| CI = 1 | 6 ^{EME} = 1 | 2 ^{NDE} = 1 | 1 ^{ERE} ANNÉE = 1 | | |
| ACHEVÉE CP = 2 | 5 ^{EME} = 2 | 1 ^{ERE} = 2 | 2 ^{EME} ANNÉE = 2 | | |
| AVEC CE1 = 3 | 4 ^{EME} = 3 | TERMINALE = 3 | 3 ^{EME} ANNÉE = 3 | | |
| SUCCÈS CE2 = 4 | 3 ^{EME} = 4 | | 4 ^{EME} AN. OU + = 4 | | |
| CM1 = 5 | | | | | |
| CM2 = 6 | | | | | |
| NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 | |

CODES POUR Q.20A : ALPHABÉTISATION

AF = Alphabétisé en français
 ALN = Alphabétisé en langues nationales
 AFLN = Alphabétisé français et en langues nationales
 NLE = Ne sait ni lire, ni écrire
 NSP = Ne sait pas

TABLEAU MÉNAGE

| No LIGNE | RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS | LIEN AVEC LE CHEF DE MÉNAGE | SEXE | RÉSIDENCE | | ÂGE | SI 10 ANS OU PLUS | ÉLIGIBILITÉ | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | ÉTAT MATRIMONIAL | 9 | | 10 | 11 | 11A | 11B | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11A | 11B | |
| | S'il vous plaît, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage. APRÈS AVOIR LISTÉ LES NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 2A-2C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS APPROPRIÉES DES COLONNES 5-20A POUR CHAQUE PERSONNE. | Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ? VOIR CODES CI-DESSOUS. | (NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ? | (NOM) vit-il/elle ici habituellement ? | (NOM) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ? | Quel âge a (NOM) ? SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'. | Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM) ? 1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SÉPARÉ 3 = VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN | ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES DE 15-49 ANS | SI MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME | ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES ENFANTS DE 0-5 ANS | ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 15-64 ANS | ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 30-64 ANS | ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 65-94 ANS |
| 11 | | <input type="text"/> | M F 1 2 | O N 1 2 | O N 1 2 | EN ANNÉES <input type="text"/> | <input type="text"/> | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 13 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 14 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 15 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 16 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 17 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 18 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 19 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 20 | | <input type="text"/> | 1 2 | 1 2 | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

COCHEZ ICI SI UNE AUTRE FEUILLE EST UTILISÉE

CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE

- | | |
|----------------------------|--|
| 01 = CHEF DE MÉNAGE | 09 = AUTRE PARENT |
| 02 = FEMME OU MARI | 10 = ADOPTÉ /EN GARDE/ ENFANT DE LA FEMME/MARI |
| 03 = FILS OU FILLE | 11 = AUTRE FEMME DU CM (SI CM=HOMME) |
| 04 = GENDRE OU BELLE-FILLE | 12 = COÉPOUSE (SI CM=FEMME) |
| 05 = PETIT FILS/FILLE | 13 = SANS PARENTÉ |
| 06 = PÈRE/MÈRE | 98 = NE SAIT PAS |
| 07 = BEAU-PARENT | |
| 08 = FRÈRE OU SOEUR | |

TABLEAU MÉNAGE

| No LIGNE | MIGRATION DURÉE DE VIE POUR LES RESIDENTS | | | | | SI 0-17 ANS | | | |
|----------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | LIEU DE NAISSANCE | RÉSIDENCE ANTÉRIEURE | DURÉE DANS LA RÉSIDENCE ACTUELLE | MIGRANT RETOUR | STATUT MIGRATOIRE | ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES | | | |
| | 11C | 11D | 11E | 11F | 11G | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Dans quelle commune est né(é) (NOM) ? INSCRIRE DEP/COM OU PAYS POUR ETRANGER | Dans quelle commune residait (NOM) avant de s'installer ici ? INSCRIRE DEP/COM OU PAYS POUR ETRANGER | Quelle est la durée de séjour de (NOM) dans cette commune ? NOTER : 1 ET LE NOMBRE DE MOIS POUR DUREE < 1 AN OU 2 ET NOMBRE D'ANNEE POUR DUREE >= 1 AN ET 998 DEPUIS LA NAISSANCE → 11G | (NOM) est-elle de retour dans cette commune après y avoir séjourné pendant 6 mois au moins? | DEDUIRE LE STATUT MIGRATOIRE. INSCRIRE 1=NON MIGRANT SI Q.11E=9 ET 98 2=MIGRANT RETOUR SI Q.11E#9 ET 98 ET Q.11F=1 3= AUTRE MIGRANT RETOUR SI Q.11E#9 ET 98 ET Q.11F=2 | La mère biologique de (NOM) est-elle en vie ? O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 14 | La mère biologique de (NOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DE LA MÈRE. SI NON, NOTEZ '00'. | Le père biologique de (NOM) est-il en vie ? O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 16 | Le père biologique de (NOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DU PÈRE. SI NON, NOTEZ '00'. |
| 11 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | O N 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 12 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 14 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 15 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 16 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 17 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 18 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 19 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 20 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | SI 5 ANS OU PLUS | | SI 5-24 ANS | | SI 0-4 ANS | SI AGE 6 ANS OU PLUS |
|----------|--|--|---|---|--|--|
| No LIGNE | A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE | | FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE | | ENREGISTREMENT DES NAISSANCES | ALPHABÉTISATION |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20A |
| | (NOM) a-t-il/elle déjà fréquenté l'école ? | Quel est le plus haut niveau d'études que (NOM) a atteint ? Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau ? VOIR CODES CI-DESSOUS. | (Nom) a-t-il/elle fréquenté l'école à n'importe quel moment durant l'année scolaire 2016-2017 ? | Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe était (NOM) ? VOIR CODES CI-DESSOUS. | (NOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ? SI NON, INSISTEZ : La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ? 1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉE 3 = NI L'UN, NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS | SI NIVEAU À COL.17 = 2, 3 OU 4 ; DEMANDEZ : (NOM) sait-il lire, écrire et comprendre au moins une langue nationale ? AUTRE ; DEMANDEZ (NOM) sait-il lire, écrire et comprendre au moins une langue ? SI OUI, lesquelles? 1 = AF 2 = ALN 3 = AFLN 4=NLE 8 = NE SAIT PAS |
| 11 | O N 1 2 ↓ 20A | NIVEAU CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/> | O N 1 2 ↓ 20A | NIVEAU CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 12 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 14 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 15 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 16 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 17 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 18 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 19 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 20 | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | 1 2 ↓ 20A | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

CODES POUR Qs. 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION / CLASSE

| NIVEAU ATTEINT | 1 = PRIMAIRE | 2 = SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE | 3 = SECONDAIRE 2 ND CYCLE | 4 = SUPÉRIEUR | 5 = PRÉ-PRIMAIRE / MATERNELLE |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| CLASSE | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN CI = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 6 ^{EME} = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 2 ^{NDE} = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 1 ^{ERE} AN. = 0 | |
| CLASSE | CI = 1 | 6 ^{EME} = 1 | 2 ^{NDE} = 1 | 1 ^{ERE} ANNÉE = 1 | |
| ACHEVÉE | CP = 2 | 5 ^{EME} = 2 | 1 ^{ERE} = 2 | 2 ^{EME} ANNÉE = 2 | |
| AVEC SUCCÈS | CE1 = 3 | 4 ^{EME} = 3 | TERMINALE = 3 | 3 ^{EME} ANNÉE = 3 | |
| | CE2 = 4 | 3 ^{EME} = 4 | | 4 ^{EME} AN. OU + = 4 | |
| | CM1 = 5 | | | | |
| | CM2 = 6 | | | | |
| | NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 | |

CODES POUR Q.20A : ALPHABÉTISATION

AF = Alphabétisé en français
 ALN = Alphabétisé en langues nationales
 AFLN = Alphabétisé français et en langues nationales
 NLE = Ne sait ni lire, ni écrire
 NSP = Ne sait pas

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|--|--|
| 101 | D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ? | <p>EAU DU ROBINET</p> <p>ROBINET DANS LOGEMENT 11</p> <p>ROBINET DANS COUR/PARCELLE 12</p> <p>ROBINET CHEZ UN VOISIN 13</p> <p>ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE 14</p> <p>PUITS À POMPE OU FORAGE 21</p> <p>PUITS CREUSÉ</p> <p>PUITS PROTÉGÉ 31</p> <p>PUITS NON PROTÉGÉ 32</p> <p>EAU DE SOURCE</p> <p>SOURCE PROTÉGÉE 41</p> <p>SOURCE NON PROTÉGÉE 42</p> <p>EAU DE PLUIE 51</p> <p>CAMION CITERNE 61</p> <p>CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ TONNEAU 71</p> <p>EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/ MARE/FLEUVE/CANAL/ CANAL D'IRRIGATION) 81</p> <p>EAU EN BOUTEILLE 91</p> <p>EAU EN SACHET 92</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p align="center">(PRÉCISEZ)</p> | <p>→ 106</p> <p>→ 103</p> <p>→ 103</p> |
| 102 | D'où provient principalement l'eau utilisée par votre ménage à d'autres fins comme pour faire la cuisine et se laver les mains ? | <p>EAU DU ROBINET</p> <p>ROBINET DANS LOGEMENT 11</p> <p>ROBINET DANS COUR/PARCELLE 12</p> <p>ROBINET CHEZ UN VOISIN 13</p> <p>ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE 14</p> <p>PUITS À POMPE OU FORAGE 21</p> <p>PUITS CREUSÉ</p> <p>PUITS PROTÉGÉ 31</p> <p>PUITS NON PROTÉGÉ 32</p> <p>EAU DE SOURCE</p> <p>SOURCE PROTÉGÉE 41</p> <p>SOURCE NON PROTÉGÉE 42</p> <p>EAU DE PLUIE 51</p> <p>CAMION CITERNE 61</p> <p>CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ TONNEAU 71</p> <p>EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/ MARE/FLEUVE/CANAL/ CANAL D'IRRIGATION) 81</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p align="center">(PRÉCISEZ)</p> | <p>→ 106</p> |
| 103 | Où est située cette source d'approvisionnement de l'eau ? | <p>DANS VOTRE LOGEMENT 1</p> <p>DANS VOTRE COUR/PARCELLE 2</p> <p>AILLEURS 3</p> | <p>→ 105</p> |
| 104 | Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre l'eau et revenir ? | <p>MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 998</p> | |
| 105 | <p>VÉRIFIEZ 101 ET 102 : CODE '14' OU '21' ENGERCLÉ</p> <p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p> | | <p>→ 107</p> |

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | |
|-----|---|---|---------|--|--|
| 106 | Est-ce qu'au cours des deux dernières semaines, il est arrivé qu'à cet endroit, l'eau n'ait pas été disponible pendant au moins toute une journée ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | |
| 107 | Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus saine à boire ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 109 | | |
| 108 | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? Quelque chose d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. | LA FAIRE BOUILLIR A AJOUTER EAU DE JAVEL/CHLORE B AJOUTER AQUATAB C LA FILTRER À TRAVERS UN LINGE D UTILISER UN FILTRE (CÉRAMIQUE/ SABLE/COMPOSITE/ETC.) E DÉSINFECTION SOLAIRE F LA LAISSER REPOSER G AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z | | | |
| 109 | Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils habituellement ? S'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DÉTERMINER LE TYPE DE TOILETTES, DEMANDEZ LA PERMISSION DE VOIR L'INSTALLATION. | CHASSE D'EAU/CHASSE MANUELLE CHASSE D'EAU CONNECTÉE À UN SYSTÈME D'ÉGOUT 11 À UNE FOSSE SEPTIQUE 12 À UNE FOSSE D'AISANCES 13 À QUELQUE CHOSE D'AUTRE 14 À NE SAIT PAS OÙ 15 FOSSE D'AISANCES FOSSES/LATRINES VENTILÉES AMÉLIORÉES 21 FOSSES D'AISANCES AVEC DALLE 22 FOSSES D'AISANCES SANS DALLE TROU OUVERT 23 TOILETTES À COMPOSTAGE 31 SEAU/TINETTE 41 TOILETTES/LATRINES SUSPENDUES 51 PAS DE TOILETTES/NATURE 61 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) | → 113 | | |
| 110 | Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ? | OUI 1 NON 2 | → 112 | | |
| 111 | En comptant votre propre ménage, combien de ménages utilisent ces toilettes ? | NOMBRE DE MÉNAGES SI MOINS DE 10 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> 10 MÉNAGES OU PLUS 95 NE SAIT PAS 98 | 0 | | |
| 0 | | | | | |
| 112 | Où se trouvent ces toilettes ? | DANS VOTRE LOGEMENT 1 DANS VOTRE COUR/PARCELLE 2 AILLEURS 3 | | | |

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|--|---------|
| 113 | Quel type de combustible votre ménage utilise-t-il principalement pour cuisiner ? | ÉLECTRICITÉ 01 GAZ PROPANE LIQUÉFIÉ (GPL) 02 GAZ NATUREL 03 BIOGAZ 04 KÉROSÉNE 05 CHARBON, LIGNITE 06 CHARBON DE BOIS 07 BOIS 08 PAILLE/BRANCHAGES/HERBES 09 RÉSIDUS AGRICOLES 10 BOUSE 11 PAS DE REPAS PRÉPARÉ DANS LE MÉNAGE 95 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | → 116 |
| 114 | Est-ce que la cuisine est faite habituellement dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ? | DANS LA MAISON 1 DANS UN BÂTIMENT SÉPARÉ 2 À L'EXTÉRIEUR 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) | → 116 |
| 115 | Avez-vous une pièce séparée que vous utilisez comme cuisine ? | OUI 1 NON 2 | |
| 116 | Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ? | NOMBRE DE PIÈCES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 117 | Est-ce que votre ménage possède du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ? | OUI 1 NON 2 | → 119 |
| 118 | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage en possède-t-il ? SI AUCUN, NOTEZ '00'. SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'. SI NE SAIT PAS, NOTEZ '98'. a) Vaches laitières ou taureaux ? b) Autre bétail ? c) Chevaux, ânes ou mules ? d) Chèvres ? e) Moutons ? f) Poulets ou autre volaille ? g) Porcs/cochons h) Lapins | a) VACHES/TAUREAUX <input type="text"/> <input type="text"/> b) AUTRE BÉTAIL <input type="text"/> <input type="text"/> c) CHEVAUX/ÂNES/MULES <input type="text"/> <input type="text"/> d) CHÈVRES <input type="text"/> <input type="text"/> e) MOUTONS <input type="text"/> <input type="text"/> f) POULETS/AUTRE VOLAILLE <input type="text"/> <input type="text"/> g) PORCS/COCHONS <input type="text"/> <input type="text"/> h) LAPINS <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 119 | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède des terres cultivables ? | OUI 1 NON 2 | → 121 |
| 120 | Combien d'hectares de terres cultivables les membres du ménage possèdent-ils ? SI 95 OU PLUS, ENCERCLEZ '950'. | HECTARES <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> 95 HECTARES OU PLUS 950 NE SAIT PAS 998 | |

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|--|---------|
| 121 | Dans ce ménage, avez-vous : | OUI NON | |
| | a) L'électricité ? | a) ÉLECTRICITÉ 1 2 | |
| | b) Un poste radio ? | b) RADIO 1 2 | |
| | c) Une télévision ? | c) TÉLÉVISION 1 2 | |
| | d) Un téléphone fixe ? | d) TÉLÉPHONE FIXE 1 2 | |
| | e) Un ordinateur ? | e) ORDINATEUR 1 2 | |
| | f) Un réfrigérateur ? | f) RÉFRIGÉRATEUR 1 2 | |
| | g) Groupe électrogène | g) GROUPE ELECTROG 1 2 | |
| | h) Chaîne HI-FI | h) CHAÎNE HI-FI 1 2 | |
| | i) Une cuisinière ? | i) CUISINIÈRE .. 1 2 | |
| | j) Lecteur VCD/DVD | j) LECTEUR DVD 1 2 | |
| | k) Magnétoscope | k) MAGNETOSCOPE .. 1 2 | |
| | l) Une connexion internet ? | l) CONNEXION INTERNET 1 2 | |
| | m) Une machine à laver | m) MACHINE A LAVER 1 2 | |
| 122 | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | OUI NON | |
| | a) Une montre ? | a) MONTRE 1 2 | |
| | b) Un téléphone portable ? | b) TÉLÉPHONE PORTABLE .. 1 2 | |
| | c) Une bicyclette ? | c) BICYCLETTE..... 1 2 | |
| | d) Une motocyclette ou un scooter ? | d) MOTOCYCLETTE/SCOOTER 1 2 | |
| | e) Une charrette tirée par un animal ? | e) CHARRETTE AVEC ANIMAL .. 1 2 | |
| | f) Une voiture ou une camionnette ? | f) VOITURE/CAMIONNETTE 1 2 | |
| | g) Un bateau à moteur ? | g) BATEAU À MOTEUR 1 2 | |
| | h) Une pirogue | h) PIROGUE 1 2 | |
| 123 | Est-ce qu'un membre de votre ménage a un compte en banque ? | OUI 1 NON 2 | |
| 123A | Est-ce qu'un membre de votre ménage a un compte dans une autre structure de micro-finance ? | OUI 1 NON 2 | |
| 124 | Est-ce qu'il arrive que quelqu'un fume dans votre maison ? Diriez-vous que cela arrive tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, moins d'une fois par mois ou jamais ? | TOUS LES JOURS 1 UNE FOIS PAR SEMAINE 2 UNE FOIS PAR MOIS 3 MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS 4 JAMAIS 5 | |
| 125 | Est-ce qu'à n'importe quel moment au cours des 12 derniers mois, quelqu'un est venu dans votre logement pour pulvériser les murs intérieurs contre les moustiques ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 127 |
| 126 | Qui a pulvérisé les murs du logement ? | EMPLOYÉ/PROGRAMME GOUVERNEMENT .. A SOCIÉTÉ PRIVÉE B ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) C AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z | |
| 127 | Est-ce que votre ménage a des moustiquaires ? | OUI 1 NON 2 | → 139 |
| 128 | Combien de moustiquaires votre ménage a-t-il ? SI 7 MOUSTIQUAIRES OU PLUS, NOTEZ '7'. | NOMBRE DE MOUSTIQUAIRES <input type="text"/> | |

MOUSTIQUAIRES

| | | MOUSTIQUAIRE #1 | MOUSTIQUAIRE #2 | MOUSTIQUAIRE #3 |
|-----|--|---|---|---|
| 129 | DEMANDEZ À L'ENQUÊTÉ DE VOUS MONTRER TOUTES LES MOUSTIQUAIRES DU MÉNAGE. SI PLUS DE 3 MOUSTIQUAIRES, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2 | OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2 | OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2 |
| 130 | Cela fait combien de mois que votre ménage a la moustiquaire ? SI MOINS D'UN MOIS, NOTEZ '00'. | IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98 | IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98 | IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98 |
| 131 | OBSERVEZ OU DEMANDEZ LA MARQUE/TYPE DE LA MOUSTIQUAIRE. SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE ET SI VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LA MOUSTIQUAIRE, MONTREZ À L'ENQUÊTÉ DES PHOTOS DE MARQUES ET DE TYPES COURANTS DE MOUSTIQUAIRE. | MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D'INSECTICIDE À LONGUE DURÉE D'ACTION (MILDA) PERMANET 11 OLYSET 12 DURANET 13 NETPROTECT 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE/NE CONNAÎT PAS LA MARQUE ... 16 (ALLEZ À 134) AUTRE TYPE 96 NE CONNAÎT PAS TYPE 98 | MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D'INSECTICIDE À LONGUE DURÉE D'ACTION (MILDA) PERMANET 11 OLYSET 12 DURANET 13 NETPROTECT 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE/NE CONNAÎT PAS LA MARQUE ... 16 (ALLEZ À 134) AUTRE TYPE 96 NE CONNAÎT PAS TYPE 98 | MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D'INSECTICIDE À LONGUE DURÉE D'ACTION (MILDA) PERMANET 11 OLYSET 12 DURANET 13 NETPROTECT 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE/NE CONNAÎT PAS LA MARQUE ... 16 (ALLEZ À 134) AUTRE TYPE 96 NE CONNAÎT PAS TYPE 98 |
| 132 | Depuis que vous avez la moustiquaire, a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide pour tuer ou éloigner les moustiques ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8 | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8 | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8 |
| 133 | Cela fait combien de mois que la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois ? S'IL Y A MOINS D'UN MOIS, INSCRIVEZ '00'. | IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98 | IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98 | IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98 |
| 134 | Avez-vous obtenu la moustiquaire à l'occasion d'une campagne de distribution de masse, durant une visite prénatale, au cours d'une visite pour une vaccination, ou dans une école primaire ? | OUI, CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 OUI, ÉCOLE PRIMAIRE 4 (ALLEZ À 136) NON 5 | OUI, CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 OUI, ÉCOLE PRIMAIRE 4 (ALLEZ À 136) NON 5 | OUI, CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 OUI, ÉCOLE PRIMAIRE 4 (ALLEZ À 136) NON 5 |
| 135 | Où avez-vous obtenu la moustiquaire ? | ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV. .. 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCHÉ .. 04 AGENT SANTÉ COMMUN. 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98 | ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV. .. 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCHÉ .. 04 AGENT SANTÉ COMMUN. 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98 | ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV. .. 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCHÉ .. 04 AGENT SANTÉ COMMUN. 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98 |

MOUSTIQUAIRES

| | | MOUSTIQUAIRE #1 | MOUSTIQUAIRE #2 | MOUSTIQUAIRE #3 |
|------|---|--|--|---|
| 135A | Comment cette moustiquaire a-t-elle été acquise ? | ACHAT SANS COUPON 01 ACHAT AVEC COUPON 02 GRATUITEMENT 03 AUTRE _____ .. 06 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 08 | ACHAT SANS COUPON 01 ACHAT AVEC COUPON 02 GRATUITEMENT 03 AUTRE _____ 06 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 08 | ACHAT SANS COUPON 01 ACHAT AVEC COUPON 02 GRATUITEMENT 03 AUTRE _____ .. 06 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 08 |
| 136 | Est-ce que, la nuit dernière, quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 138) ← PAS SÛR 8 | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 138) ← PAS SÛR 8 | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 138) ← PAS SÛR 8 |
| 137 | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ? INSCRIVEZ LE NOM DE LA PERSONNE ET SON NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE. | NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> | NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> | NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 138 | | RETOURNEZ À 129 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.139. | RETOURNEZ À 129 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.139. | ALLEZ À 129, PREMIÈRE COL. D'UN NOUVEAU QUESTIONNAIRE ; SI PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.139. |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|---|---------|
| 139 | Nous voudrions connaître l'endroit utilisé par les membres du ménage pour se laver les mains. Pouvez-vous me montrer, s'il vous plait, où les membres du ménage se lavent les mains ? | OBSERVÉ, ENDROIT FIXE 1 OBSERVÉ, NON FIXE 2 NON OBSERVÉ, PAS DANS LOGEMENT /COUR/PARCELLE ... 3 NON OBSERVÉ, PERMISSION DE VOIR NON OBTENUE 4 NON OBSERVÉ, AUTRE RAISON 5 | → 142 |
| 140 | OBSERVEZ LA PRÉSENCE D'EAU À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVÉ LES MAINS. NOTEZ L'OBSERVATION. | EAU DISPONIBLE 1 EAU NON DISPONIBLE 2 | |
| 141 | OBSERVEZ LA PRÉSENCE DE SAVON, DE DÉTERGENT OU D'AUTRES PRODUITS NETTOYANTS À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVÉ LES MAINS NOTEZ L'OBSERVATION. | SAVON OU DÉTERGENT (EN MORCEAU, LIQUIDE, POUDRE, PÂTE) A CENDRE, BOUE, SABLE B AUCUN Y | |
| 142 | OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU SOL DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION | MATÉRIAU NATUREL TERRE/SABLE 11 BOUSE 12 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE PLANCHES EN BOIS 21 PALMES/BAMBOU 22 MATÉRIAU ÉLABORÉ PARQUET OU BOIS CIRÉ 31 BANDES DE VINYLE/ASPHALTE 32 CARRELAGE 33 CIMENT 34 MOQUETTE 35 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | |
| 143 | OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU TOIT DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION. | MATÉRIAU NATUREL PAS DE TOIT 11 CHAUME/PALMES/FEUILLES 12 MOTTES DE TERRE 13 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE NATTE 21 PALMES/BAMBOU 22 PLANCHES EN BOIS 23 CARTON 24 MATÉRIAU ÉLABORÉ TÔLE 31 BOIS 32 ZINC/FIBRE DE CIMENT 33 TUILES 34 CIMENT 35 SHINGLES 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|--|---------|
| 144 | OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DES MURS EXTÉRIEURS DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION. | MATÉRIAU NATUREL PAS DE MUR 11 BAMBOU/CANE/PALME/TRONC 12 TERRE 13 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE BAMBOU AVEC BOUE 21 PIERRES AVEC BOUE 22 ADOBE NON RECOUVERT 23 CONTRE-PLAQUÉ 24 CARTON 25 BOIS DE RÉCUPÉRATION 26 MATÉRIAU ÉLABORÉ CIMENT 31 PIERRES AVEC CHAUX/CIMENT 32 BRIQUES 33 BLOCS DE CIMENT 34 ADOBE RECOUVERT 35 PLANCHE EN BOIS/SHINGLES 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | |
| 144A | Où jetez-vous habituellement vos ordures ménagères? | VOIRIE PUBLIQUE 01 VOIRIE PRIVÉE/ONG 02 ENTERREES 03 BRULÉES 04 DANS LA COUR 05 DANS LA NATURE/DEHORS 06 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | |
| 144B | Où jetez-vous habituellement vos eaux usées ? | CANIVEAU FERME 01 CANIVEAU A CIEL OUVERT 02 FOSSE SEPTIQUE 03 PUIITS PERDUS 04 EGOUTS 05 DANS LA COUR 06 DANS LA NATURE/DEHORS 7 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | |
| 145 | Je voudrais vérifier si le sel utilisé dans votre ménage est iodé. Puis-je avoir un peu de sel qui est utilisé pour cuisiner dans votre ménage ? TEST DU SEL POUR L'IODE | PRÉSENCE D'IODE 1 PAS D'IODE 2 PAS DE SEL DANS LE MÉNAGE 3 SEL NON TESTÉ _____ 6 (PRÉCISEZ LA RAISON) | |

SELECTION D'UN ENFANT POUR LE TRAVAIL ET DISCIPLINE DES ENFANTS

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|------|-------|-----|---|---|-----|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|--|
| 151 | VÉRIFIER COL. 7 DANS LA LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE ET ÉCRIRE LE NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DE 1-17 ANS. | NOMBRE TOTAL <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | <p>VÉRIFIER LE NOMBRE D'ENFANTS DE 1-17 ANS DANS Q.151:</p> <p style="text-align:center;">ZÉRO <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> → ALLER À Q. 185</p> <p style="text-align:center;">DEUX OU PLUS <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> ↓</p> <p style="text-align:center;">UN <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> →</p> | <p>ALLER À Q.159 ET ENREGISTRER LE NUMÉRO DE RANG COMME '1', ENTRER LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM DE L'ENFANT ET SON ÂGE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152A | <p>LISTER CHAQUE ENFANT ÂGÉ DE 1-17 ANS CI-DESSOUS DANS L'ORDRE DANS LEQUEL ILS APPARAISSENT DANS LA LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE. N'INCLUEZ PAS D'AUTRES MEMBRES DU MÉNAGE EN DEHORS DU GROUPE D'ÂGE 1-17 ANS. ENREGISTRER LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM, LE SEXE ET L'ÂGE DE CHAQUE ENFANT.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">153. NUMÉRO DE RANG</th> <th style="width:15%;">154. NUMÉRO DE LIGNE DE COL.1</th> <th style="width:35%;">155. NOM DE COL. 2</th> <th colspan="2" style="width:15%;">156. SEXE DE COL. 4</th> <th style="width:15%;">157. ÂGE DE COL. 7</th> </tr> <tr> <th>RANG</th> <th>LIGNE</th> <th>NOM</th> <th>M</th> <th>F</th> <th>ÂGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align:center;">1</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">3</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">4</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">5</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">6</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">7</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">8</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">9</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> </tbody> </table> | 153. NUMÉRO DE RANG | 154. NUMÉRO DE LIGNE DE COL.1 | 155. NOM DE COL. 2 | 156. SEXE DE COL. 4 | | 157. ÂGE DE COL. 7 | RANG | LIGNE | NOM | M | F | ÂGE | 1 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | 3 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | 4 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | 5 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | 6 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | 7 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | 8 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | 9 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | |
| 153. NUMÉRO DE RANG | 154. NUMÉRO DE LIGNE DE COL.1 | 155. NOM DE COL. 2 | 156. SEXE DE COL. 4 | | 157. ÂGE DE COL. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RANG | LIGNE | NOM | M | F | ÂGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | _____ | 1 | 2 | <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SELECTION D'UN ENFANT POUR LE TRAVAIL ET DISCIPLINE DES ENFANTS

158 VÉRIFIEZ LE DERNIER CHIFFRE DU NUMÉRO DU MÉNAGE SUR LA PAGE DE COUVERTURE. C'EST LE NUMÉRO DE LA LIGNE DU TABLEAU CI-DESSOUS SUR LAQUELLE VOUS DEVEZ ALLER. VÉRIFIEZ LE NOMBRE TOTAL D'ENFANTS Q. 151 SUR LA PAGE PRECEDENTE. C'EST LE NUMÉRO DE COLONNE DU TABLEAU CI-DESSOUS SUR LEQUEL VOUS DEVEZ ALLER.
 TROUVEZ LA CASE OÙ LA LIGNE ET LA COLONNE SE CROISENT ET ENERCLEZ LE NUMÉRO QUI APPARAÎT DANS LA CASE. C'EST LE NUMÉRO DU RANG DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ POUR TRAVAIL DES ENFANTS/DISCIPLINE DES ENFANTS DE LA BOÎTE DES ENFANTS ÉLIGIBLES DANS Q. 153. ENREGISTREZ LE NUMÉRO DU RANG, LE NUMÉRO DE LA LIGNE, L'ÂGE, ET LE NOM DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ DANS L'ESPACE CI-DESSOUS.
 EXEMPLE : LE NUMÉRO DU MÉNAGE EST '716' ET Q. 151 MONTRE QU'IL Y A TROIS ENFANTS ÉLIGIBLES DE 1-17 ANS DANS LE MÉNAGE. PUISQUE LE DERNIER CHIFFRE DU NUMÉRO DU MÉNAGE EST '6' ALLEZ À LA LIGNE '6' ET PUISQU'IL Y A TROIS ENFANTS ÉLIGIBLES, ALLEZ À LA COLONNE '3'. TROUVEZ LA CASE OU LA LIGNE ET LA COLONNE SE CROISENT ('2') ET ENERCLEZ LE NUMÉRO. MAINTENANT, ALLEZ À Q. 153 ET TROUVEZ LE DEUXIÈME ENFANT. ÉCRIVEZ LE NOM, L'ÂGE, LE NUMÉRO DE LA LIGNE, ET LE RANG DE L'ENFANT DANS L'ESPACE CI-DESSOUS.

| DERNIER CHIFFRE DU NUMÉRO DE MÉNAGE | NOMBRE TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES DE 1-17 ANS DANS LE MÉNAGE DE 716 | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |

159 NOM DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ _____

NUMÉRO DE LA LIGNE DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ ..

ÂGE DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ

NUMÉRO DU RANG DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ ..

TRAVAIL DES ENFANTS

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSER À | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|--|
| 161 | VÉRIFIEZ L'ÂGE DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ À Q. 159 : 5-17 ANS <input type="checkbox"/> | 1-4 ANS <input type="checkbox"/> | → 181 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce ménage peuvent faire. Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, (NOM) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement ? a) Est-ce que (NOM) a travaillé sur propre terrain/ferme/ potager ou aidé sur celui du ménage ou s'est occupé des animaux. Par exemple : faire pousser des produits de la ferme, les récolter, nourrir les animaux, les emmener au pâturage ou les traire ? b) Est-ce que (NOM) a aidé dans l'entreprise familiale, celle d'autres parents avec ou sans paiement ou a travaillé dans sa propre entreprise ? c) Est-ce que (NOM) a produit, vendu des articles, des produits artisanaux, des vêtements, de la nourriture ou des produits agricoles ? d) Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, (NOM) a-t-il/elle été engage(e) dans n'importe quelle autre activité en échange de paiement en espèces ou en nature, même pour une seule heure ? SI 'NON', INSISTEZ: Svp, inclure n'importe quelle activité que (NOM) a pu faire comme employé régulier ou occasionnel, pour sa propre entreprise ou comme employeur, ou comme travailleur familial non payé pour aider dans les affaires du ménage ou à la ferme. | <table border="0"> <tr> <td></td> <td align="right">O</td> <td align="right">N</td> </tr> <tr> <td>a) A TRAVAILLÉ SUR TERRAIN/FERME/POTAGER OU S'EST OCCUPE DES ANIMAUX</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>b) A AIDÉ DANS ENTREPRISE FAMILIALE/D'UN AUTRE PARENT/ DANS SA PROPRE AFFAIRE</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>c) A PRODUIT/VENDU DES ARTICLES/DE L'ARTISANAT/ DES VÊTEMENTS/NOURRITURE OU DES PRODUITS AGRICOLES</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>d) TOUTE AUTRE ACTIVITÉ</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> </table> | | O | N | a) A TRAVAILLÉ SUR TERRAIN/FERME/POTAGER OU S'EST OCCUPE DES ANIMAUX | 1 | 2 | b) A AIDÉ DANS ENTREPRISE FAMILIALE/D'UN AUTRE PARENT/ DANS SA PROPRE AFFAIRE | 1 | 2 | c) A PRODUIT/VENDU DES ARTICLES/DE L'ARTISANAT/ DES VÊTEMENTS/NOURRITURE OU DES PRODUITS AGRICOLES | 1 | 2 | d) TOUTE AUTRE ACTIVITÉ | 1 | 2 | |
| | O | N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) A TRAVAILLÉ SUR TERRAIN/FERME/POTAGER OU S'EST OCCUPE DES ANIMAUX | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) A AIDÉ DANS ENTREPRISE FAMILIALE/D'UN AUTRE PARENT/ DANS SA PROPRE AFFAIRE | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) A PRODUIT/VENDU DES ARTICLES/DE L'ARTISANAT/ DES VÊTEMENTS/NOURRITURE OU DES PRODUITS AGRICOLES | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) TOUTE AUTRE ACTIVITÉ | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | VÉRIFIEZ 162, a) À d) IL Y A AU MOINS UN 'OUI' <input type="checkbox"/> | TOUTES LES RÉPONSES SONT 'NON' <input type="checkbox"/> | → 168 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, a peu près combien d'heures au total est-ce que (NOM) a travaillé sur cette activité/ces activités ? SI MOINS D'1 HEURE, NOTER '00' | NOMBRE D'HEURES <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Est-ce que cette activité/ces activités nécessite(nt) de porter des charges lourdes ? | OUI 1 NON 2 | → 168 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Est-ce que cette activité/ces activités nécessite(nt) de travailler avec des outils dangereux (couteaux, etc.) ou de faire fonctionner des grosses machines ? | OUI 1 NON 2 | → 168 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 167 | Comment décririez-vous l'environnement de travail de (NOM) ? a) Est-ce que (NOM) est exposé à la poussière/fumées ou gaz ? b) Est-ce que (NOM) est exposé au froid, à la chaleur ou à de l'humidité extrême ? c) Est-ce que (NOM) est exposé à des bruits intenses ou des vibrations ? d) Est-ce que (NOM) est exposé à un travail en hauteur ? e) Est-ce que (NOM) est exposé à des produits chimiques, tels que des pesticides, des colles ou similaires ou des explosifs ? f) Est-ce que (NOM) est exposé à d'autres choses, ou soumis à des processus ou des conditions défavorables à sa santé ou sa sécurité ? | OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 | → 168 → 168 → 168 → 168 → 168 |
| 168 | Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, (NOM) est-il /elle allé chercher de l'eau pour le ménage ? | OUI 1 NON 2 | → 170 |
| 169 | Au total, depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, combien d'heures (NOM) a-t-il/elle passe à chercher de l'eau pour le ménage ? SI MOINS D'1 HEURE, NOTER '00' | NOMBRE D'HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 170 | Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, est-ce que (NOM) est allé chercher du bois pour le ménage ? | OUI 1 NON 2 | → 172 |
| 171 | Au total, depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier combien d'heures (NOM) a-t-il/elle passé à chercher du bois pour le ménage ? SI MOINS D'1 HEURE, NOTER '00' | NOMBRE D'HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 172 | Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, est-ce que (NOM) a fait une des tâches suivantes pour le ménage a) Des courses pour le ménage ? b) Cuisiner ? c) Laver la vaisselle ou nettoyer la maison ? d) Laver des vêtements ? e) Prendre soin des enfants ? f) Prendre soin des personnes âgées ou malades ? g) Autres tâches pour le ménage ? | OUI NON a) COURSES POUR LE MÉNAGE .. 1 2 b) CUISINER 1 2 c) LAVER USTENSILES / MAISON 1 2 d) LAVER LES VÊTEMENTS 1 2 e) PRENDRE SOIN DES ENFANTS .. 1 2 f) PRENDRE SOINS DES ÂGÉS/ DES MALADES 1 2 g) AUTRES TÂCHES 1 2 | |
| 173 | VÉRIFIEZ 172 a) À g): IL Y A AU MOINS <input type="checkbox"/> UN 'OUI' ↓ | TOUTES LES RÉPONSES <input type="checkbox"/> SONT 'NON' → | → 181 |
| 174 | Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, combien d'heures à peu près, (NOM) a-t-il/elle travaillé sur (cette/ces activité(s)) ? SI MOINS D'1 HEURE, NOTEZ '00' | NOMBRE D'HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> | |

DISCIPLINE DES ENFANTS

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSER À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 181 | VÉRIFIEZ L'ÂGE DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ À Q. 159 : 1-14 ANS <input type="checkbox"/> | 15-17 ANS <input type="checkbox"/> | → 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | ÉCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE L'ENFANT DE 159. | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | Maintenant je voudrais parler de quelque chose d'autre. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants à bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées. Dites-moi SVP, si vous avez ou n'importe quel autre membre de votre ménage a) Retirer des privilèges, interdire quelque chose que (NOM) aime faire ou ne pas lui permettre de quitter la maison. b) Expliquer a (NOM) pourquoi son comportement n'est pas bien. c) Le/la secouer. d) Hurler ou lui crier dessus. e) Lui donner quelque chose d'autre à faire. f) Lui donner une fessée, le frapper ou le taper sur les fesses à main nues. g) Le/la frapper sur les fesses ou sur d'autres parties du corps avec quelque chose tel ceinture, brosse à cheveux, bâton ou autre objet dur. h) Le/la traiter d'idiot, de paresseux ou d'un autre nom comme ça. i) Le/la frapper ou le/la gifler sur le visage, la tête ou les oreilles. j) Le/la frapper ou le/la taper sur les mains, les bras ou les jambes. k) Le/la battre, c'est-à-dire le/la frapper encore et encore aussi fort que possible. | <table border="0"> <tr> <td></td> <td align="right">O</td> <td align="right">N</td> </tr> <tr> <td>a) RETIRER DES PRIVILÈGES</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>b) EXPLIQUER LE MAUVAIS COMPORTEMENT</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>c) LE/LA SECOUER</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>d) HURLER, LUI CRIER DESSUS</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>e) DONNER QUELQUE CHOSE D'AUTRE À FAIRE</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>f) DONNER UNE FESSÉE, FRAPPER OU TAPER SUR LES FESSES AVEC MAINS NUES</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>g) FRAPPER AVEC CEINTURE, BROSSE, BÂTON OU AUTRES OBJETS DURS ..</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>h) LE/LA TRAITER D'IDIOT, PARESSEUX, OU D'AUTRES NOMS</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>i) LE/LA FRAPPER/GIFLER SUR LE VISAGE, LA TÊTE OU LES OREILLES</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>j) LE/LA FRAPPER/TAPER SUR LES MAINS, BRAS OU JAMBES</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>k) LE/LA BATTRE, FRAPPER ENCORE ET ENCORE AUSSI FORT QUE POSSIBLE</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> </table> | | O | N | a) RETIRER DES PRIVILÈGES | 1 | 2 | b) EXPLIQUER LE MAUVAIS COMPORTEMENT | 1 | 2 | c) LE/LA SECOUER | 1 | 2 | d) HURLER, LUI CRIER DESSUS | 1 | 2 | e) DONNER QUELQUE CHOSE D'AUTRE À FAIRE | 1 | 2 | f) DONNER UNE FESSÉE, FRAPPER OU TAPER SUR LES FESSES AVEC MAINS NUES | 1 | 2 | g) FRAPPER AVEC CEINTURE, BROSSE, BÂTON OU AUTRES OBJETS DURS .. | 1 | 2 | h) LE/LA TRAITER D'IDIOT, PARESSEUX, OU D'AUTRES NOMS | 1 | 2 | i) LE/LA FRAPPER/GIFLER SUR LE VISAGE, LA TÊTE OU LES OREILLES | 1 | 2 | j) LE/LA FRAPPER/TAPER SUR LES MAINS, BRAS OU JAMBES | 1 | 2 | k) LE/LA BATTRE, FRAPPER ENCORE ET ENCORE AUSSI FORT QUE POSSIBLE | 1 | 2 | |
| | O | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) RETIRER DES PRIVILÈGES | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) EXPLIQUER LE MAUVAIS COMPORTEMENT | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) LE/LA SECOUER | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) HURLER, LUI CRIER DESSUS | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) DONNER QUELQUE CHOSE D'AUTRE À FAIRE | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) DONNER UNE FESSÉE, FRAPPER OU TAPER SUR LES FESSES AVEC MAINS NUES | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) FRAPPER AVEC CEINTURE, BROSSE, BÂTON OU AUTRES OBJETS DURS .. | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) LE/LA TRAITER D'IDIOT, PARESSEUX, OU D'AUTRES NOMS | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) LE/LA FRAPPER/GIFLER SUR LE VISAGE, LA TÊTE OU LES OREILLES | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j) LE/LA FRAPPER/TAPER SUR LES MAINS, BRAS OU JAMBES | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k) LE/LA BATTRE, FRAPPER ENCORE ET ENCORE AUSSI FORT QUE POSSIBLE | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | Pensez-vous que pour élever ou éduquer correctement un enfant, il est nécessaire qu'il soit puni physiquement ? | OUI 1 NON 2 NSP/SANS OPINION 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | NOTEZ L'HEURE. | HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR/ENQUÊTRICE
À REMPLIR, UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES CONCERNANT L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATIONS DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATIONS DE LA CONTRÔLEUSE

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____ . Je travaille pour l'INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE et de L'ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE). Nous effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets au Benin. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement entre 60 et 90 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligée de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez de répondre à questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTRICE : _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉE ACCEPTE
D'ÊTRE INTERVIEWÉE . . . 1

L'ENQUÊTÉE REFUSE D'ÊTRE
INTERVIEWÉE . . . 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|---------|
| 101 | INSCRIVEZ L'HEURE. | HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 102 | Depuis combien de temps vivez-vous de manière continue à (NOM DE LA VILLE, PETITE VILLE OU VILLAGE ACTUEL DE RÉSIDENCE) ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00' ANNÉE. | ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> DEPUIS TOUJOURS 95 VISITEUR 96 | → 105 |
| 103 | Juste avant d'habiter ici, est-ce que vous viviez dans une ville à statut particulier, une aute ville ou dans une ville secondaire ? | VILLE À STATUT PARTICULIER 1 AUTRE VILLE 2 VILLE SECONDAIRE 3 EN DEHORS DU BÉNIN 4 | |
| 104 | Juste avant d'habiter ici, dans quel département est-ce que vous viviez ? | ALIBORI 01 ATACORA 02 ATLANTIQUE 03 BORGOU 04 COLLINES 05 COUFFO 06 DONGA 07 LITTORAL 08 MONO 09 OUÉMÉ 10 PLATEAU 11 ZOU 12 EN DEHORS DU BENIN 96 | |
| 105 | En quel mois et en quelle année êtes-vous née ? | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS L'ANNÉE 9998 | |
| 106 | Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? COMPAREZ ET CORRIGEZ 105 ET/OU106 SI INCOHÉRENT. | ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> | |

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|--|--|---------|
| 106A | VÉRIFIEZ COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE: MÉNAGE <input type="checkbox"/> SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME ↓ | MÉNAGE NON <input type="checkbox"/> SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME | → 107 |
| 106B | VÉRIFIEZ 106: | 15-29 ANS 1 30-49 ANS 2 | → 107 |
| 106C | Au cours de l'interview, je voudrais mesurer votre tension artérielle. Je le ferai trois fois au cours de l'interview. C'est une procédure qui ne comporte aucun danger. On l'effectue pour savoir si une personne a une tension artérielle élevée. Si elle n'est pas traitée, une tension élevée peut endommager sérieusement le cœur. Je vous donnerai les résultats de la mesure de la tension artérielle après l'interview en vous expliquant ce que signifient les chiffres de votre tension artérielle. Si votre tension artérielle est élevée, nous vous conseillerons de consulter dans un établissement de santé ou de voir un médecin car nous ne pouvons pas effectuer d'autre contrôle ou fournir un traitement au cours de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser sur les mesures de la tension artérielle ? Vous pouvez dire oui ou non ou vous pouvez aussi décider à n'importe quel moment de ne pas participer à la prise des mesures de la tension artérielle . _____ SIGNATURE ENQUÊTRICE _____ DATE | OUI, L'ENQUÊTÉE ACCEPTE 1 NON, L'ENQUÊTÉE N'ACCEPTE PAS 2 | → 107 |
| 106D | Avant de commencer à mesurer votre tension artérielle, je voudrais vous poser quelques questions sur des choses qui peuvent affecter ces mesures. Avez-vous fait l'une des choses suivantes dans les 30 dernières minutes : | OUI NON a) MANGER 1 2 b) CAFEINE 1 2 c) FUMER 1 2 d) PHYSIQUE 1 2 | |
| 106E | REGARDEZ LE BRAS DE L'ENQUÊTÉE ET PRENEZ LE BRASSARD APPROPRIÉ POUR PRENDRE LA TENSION | | |
| 106F | PRENEZ LA PRESSION ARTÉRIELLE. ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE. SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA PRESSION DE L'ENQUÊTÉE, ENREGISTREZ LA RAISON. | SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996 | |
| 107 | Êtes-vous allée à l'école ? | OUI 1 NON 2 | → 111 |
| 108 | Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : primaire, secondaire 1er cycle, secondaire 2nd cycle ou supérieur ? | PRIMAIRE 1 SECONDAIRE 1 ^{er} CYCLE 2 SECONDAIRE 2 ^{ème} CYCLE 3 SUPÉRIEUR 4 | |

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|--|---------|
| 109 | Quelle est LA CLASSE la plus élevée que vous avez achevée à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'. | CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 110 | VÉRIFIEZ 108: PRIMAIRE OU <input type="checkbox"/> SECONDAIRE (1er ou 2eme CYCLE) ↓ | SUPÉRIEUR <input type="checkbox"/> | → 113 |
| 111 | Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase. MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉE. SI L'ENQUÊTÉE NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ? | NE PEUT PAS LIRE DU TOUT 1 PEUT SEULEMENT LIRE UNE PARTIE DE LA PHRASE 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DEMANDÉE 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE 5 | |
| 112 | VÉRIFIEZ 111: CODE '2', '3' <input type="checkbox"/> OU '4' ↓ ENCERCLÉ | CODE '1' OU '5' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ | → 114 |
| 113 | Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ? | AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3 | |
| 114 | Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ? | AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3 | |
| 115 | Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ? | AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3 | |
| 116 | Est-ce que vous possédez un téléphone portable ? | OUI 1 NON 2 | → 118 |
| 117 | Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable pour faire des opérations financières ? | OUI 1 NON 2 | |
| 118 | Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-même ? | OUI 1 NON 2 | |
| 119 | Avez-vous déjà utilisé internet ? | OUI 1 NON 2 | → 122 |
| 120 | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL. | OUI 1 NON 2 | → 122 |
| 121 | Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ? | PRESQUE CHAQUE JOUR 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 3 PAS DU TOUT 4 | |

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|---|---------|
| 122 | Quelle religion pratiquez-vous ? | VODOUN 1 AUTRES TRADITIONNELLES 2 ISLAM 3 CATHOLIQUE 4 PROTESTANT METHODISTE 5 AUTRES PROTESTANTS 6 CELESTES 7 AUTRES CHRETIENS 8 AUTRES RELIGIONS 9 AUCUNE 10 | |
| 123 | Quelle est votre ethnie ? | ADJA ET APPARENTÉS 1 BARIBA ET APPARENTÉS 2 DENDI ET APPARENTÉS 3 FON ET APPARENTÉS 4 YOA ET LOKPA ET APPARENTÉS 5 BETAMARIBE ET APPARENTÉS 6 PEULH ET APPARENTÉS 7 YORUBA ET APPARENTÉS 8 AUTRE BÉNINOIS 96 (PRÉCISEZ) AUTRE NATIONALITÉS 97 (PRÉCISEZ) | |
| 123A | VÉRIFIEZ COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE: MÉNAGE SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> MÉNAGE NON SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> POUR ENQUÊTE HOMME ↓ POUR ENQUÊTE HOMME → | | → 124 |
| 123B | VÉRIFIEZ 106 : | 15-29 ANS 1 30-49 ANS 2 | → 124 |
| 123C | Est-ce que je peux mesurer votre pression artérielle maintenant ? SIGNATURE ENQUÊTRICE _____ DATE _____ | OUI, L'ENQUÊTÉE ACCEPTE 1 NON, L'ENQUÊTÉE N'ACCEPTE PAS 2 | → 124 |
| 123D | PRENEZ LA PRESSION ARTÉRIELLE. ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE. SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA PRESSION DE L'ENQUÊTÉE, ENREGISTREZ LA RAISON. | SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996 | |
| 124 | À combien de kilomètres se trouve le premier centre de santé public ? | KILOMÈTRES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998 | |
| 125 | Combien de temps faut-il pour atteindre le centre de santé public le plus proche? | MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998 | |

CODES POUR Qs. 108 ET 109: NIVEAU D'INSTRUCTION / CLASSE

| NIVEAU ATTEINT | 1 = PRIMAIRE | 2 = SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE | 3 = SECONDAIRE 2 ND CYCLE | 4 = SUPÉRIEUR |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|
| | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN CI = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 6 ^{ÈME} = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 2 ^{NDE} = 0 | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 1 ^{ÈRE} AN. = 0 |
| CLASSE | CI = 1 | 6 ^{ÈME} = 1 | 2 ^{NDE} = 1 | 1 ^{ÈRE} ANNÉE = 1 |
| ACHEVÉE | CP = 2 | 5 ^{ÈME} = 2 | 1 ^{ÈRE} = 2 | 2 ^{ÈME} ANNÉE = 2 |
| AVEC | CE1 = 3 | 4 ^{ÈME} = 3 | TERMINALE = 3 | 3 ^{ÈME} ANNÉE = 3 |
| SUCCÈS | CE2 = 4 | 3 ^{ÈME} = 4 | | 4 ^{ÈME} AN. OU + = 4 |
| | CM1 = 5 | | | |
| | CM2 = 6 | | | |
| | NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 |

SECTION 2. REPRODUCTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | |
|-----|--|---|---------|--|--|--|--|
| 201 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues durant votre vie. Avez-vous déjà donné naissance à des enfants ? | OUI 1 NON 2 | → 206 | | | | |
| 202 | Avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ? | OUI 1 NON 2 | → 204 | | | | |
| 203 | a) Combien de fils vivent avec vous ? b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. | a) FILS À LA MAISON b) FILLES À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 204 | Avez-vous des fils ou filles à qui vous avez donné naissance qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ? | OUI 1 NON 2 | → 206 | | | | |
| 205 | a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? b) Et combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. | a) FILS AILLEURS b) FILLES AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 206 | Avez-vous déjà donné naissance à un garçon ou à une fille qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON, INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ? | OUI 1 NON 2 | → 208 | | | | |
| 207 | a) Combien de garçons sont décédés ? b) Et combien de filles sont décédés ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. | a) GARÇONS DÉCÉDÉS b) FILLES DÉCÉDÉES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 208 | FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. | TOTAL NAISSANCES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | |
| | | | | | | | |
| 209 | VÉRIFIEZ 208: Je voudrais être sûre d'avoir bien compris: vous avez eu au TOTAL _____ naissances durant votre vie. Est-ce bien exact ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> INSISTEZ ET CORRIGEZ 201-208 COMME IL SE DOIT. | | | | | | |
| 210 | VÉRIFIEZ 208: UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> OU PLUS ↓ AUCUNE <input type="checkbox"/> | | → 226 | | | | |

SECTION 2. REPRODUCTION

211 Je voudrais maintenant faire la liste de toutes vos naissances, qu'elles soient encore en vie ou non, en commençant par la première.
INSCRIVEZ LE NOM DE TOUTES LES NAISSANCES À 212. INSCRIVEZ LES JUMEAUX/TRIPLÉS SUR DES LIGNES SÉPARÉES. S'IL Y A PLUS DE 10 NAISSANCES, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE, EN COMMENÇANT À LA SECONDE LIGNE .

| 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 SI EN VIE: | 218 SI EN VIE: | 219 SI EN VIE: | 220 SI DÉCÉDÉ: | 221 |
|---|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| <p>Quel nom a été donné à votre (premier enfant/ enfant suivant) ?</p> <p>INSCRIVEZ LE NOM.</p> <p>NO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.</p> | <p>(NOM) est-il un garçon ou une fille ?</p> | <p>Parmi ces naissances, y avait-il des jumeaux ?</p> | <p>Quel jour, quel mois et quelle année (NOM) est-il/elle né(e) ?</p> | <p>(NOM) est-il/elle encore en vie ?</p> | <p>Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?</p> <p>INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLUE .</p> | <p>(NOM) vit-il/elle avec vous ?</p> | <p>INSCRIVEZ LE NO DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE.</p> | <p>Quel âge avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ?</p> <p>SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM) avait eu son premier anniversaire ?</p> <p>PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.</p> | <p>Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (NOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (NOM), y compris des enfants qui sont décédés après la naissance ?</p> |
| 01 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (NAISSANCE SUIVANTE) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 02 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |
| 03 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |
| 04 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | YES 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |
| 05 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |

SECTION 2. REPRODUCTION

211 Je voudrais maintenant faire la liste de toutes vos naissances, qu'elles soient encore en vie ou non, en commençant par la première.
INSCRIVEZ LE NOM DE TOUTES LES NAISSANCES À 212. INSCRIVEZ LES JUMEAUX/TRIPLÉS SUR DES LIGNES SÉPARÉES. S'IL Y A PLUS DE 10 NAISSANCES, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE, EN COMMENÇANT À LA SECONDE LIGNE .

| 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 SI EN VIE: | 218 SI EN VIE: | 219 SI EN VIE: | 220 SI DÉCÉDÉ: | 221 |
|---|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
| <p>Quel nom a été donné à votre (premier enfant/ enfant suivant) ?</p> <p>INSCRIVEZ LE NOM.</p> <p>N0 DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.</p> | <p>(NOM) est-il un garçon ou une fille ?</p> | <p>Parmi ces naissances, y avait-il des jumeaux ?</p> | <p>Quel jour, quel mois et quelle année (NOM) est-il/elle né(e) ?</p> | <p>(NOM) est-il/elle encore en vie ?</p> | <p>Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?</p> <p>INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLUE .</p> | <p>(NOM) vit-il/elle avec vous ?</p> | <p>INSCRIVEZ LE No DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE.</p> | <p>Quel âge avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ?</p> <p>SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM) avait eu son premier anniversaire ?</p> <p>PUIS DEMANDEZ: Exactly combien de mois avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.</p> | <p>Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (NOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (NOM), y compris des enfants qui sont décédés après la naissance ?</p> |
| 06 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |
| 07 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |
| 08 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |
| 09 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |
| 10 | GAR. 1 FILLE 2 | SIMP. 1 MULT 2 | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220) | ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 NON 2 | NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221) | JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.) |

SECTION 2. REPRODUCTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|---|---------|
| 222 | Avez-vous eu d'autres naissances vivantes depuis la naissance de (NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE) ? | OUI 1 (INSCRIVEZ LA/LES NAISS. DANS LE TABLEAU) NON 2 | |
| 223 | COMPAREZ 208 AVEC LE NOMBRE DE NAISSANCES DANS LE TABLEAU DES NAISSANCES NOMBRES SONT ÉGAUX <input type="checkbox"/> NOMBRES SONT DIFFÉRENTS <input type="checkbox"/> (INSISTEZ ET CORRIGEZ) | | |
| 224 | VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NOMBRE DE NAISSANCES EN 2012-2017 | NOMBRE DE NAISSANCES! <input type="text"/> AUCUNE 0 | → 226 |
| 225 | C POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2012-2017, INSCRIVEZ 'N' AU MOIS DE NAISSANCE DANS LE CALENDRIER. INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENFANT À GAUCHE DU CODE 'N'. POUR CHAQUE NAISSANCE, DEMANDEZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS QUE LA GROSSESSE A DURÉ ET INSCRIVEZ 'G' À CHACUN DES MOIS PRÉCÉDENTS SELON LA DURÉE DE LA GROSSESSE. (NOTE: LE NOMBRE DE 'G' DOIT ÊTRE INFÉRIEUR DE 1 AU NOMBRE DE MOIS QUE LA GROSSESSE A DURÉ.) | | |
| 226 | Êtes-vous actuellement enceinte ? | OUI 1 NON 2 PAS SÛRE 8 | → 230 |
| 227 | Depuis combien de mois êtes-vous enceinte ? ENREGISTREZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS. C INSCRIVEZ 'G' DANS LE CALENDRIER, EN COMMENÇANT PAR LE MOIS DE L'ENQUÊTE ET POUR LE NOMBRE TOTAL DE MOIS RÉVOLUS. | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 228 | Quand vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ? | OUI 1 NON 2 | → 230 |
| 229 | VÉRIFIEZ 208: NOMBRE TOTAL DE NAISSANCES UNE OU PLUS <input type="checkbox"/> AUCUNE <input type="checkbox"/> a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ? b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez pas avoir d'enfant ? | PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2 | |
| 230 | Avez-vous déjà eu une grossesse qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ? | OUI 1 NON 2 | → 239 |
| 231 | Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ? | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |

SECTION 2. REPRODUCTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------------|---|---|---|
| 232 (1) | VÉRIFIEZ 231: DERNIÈRE GROSSESSE <input type="checkbox"/> TERMINÉE EN 2012- DERNIÈRE GROSSESSE <input type="checkbox"/> TERMINÉE AVANT JANVIER 2012 | | → 234 → 239 |
| LINE NO. | 233 En quel mois et en quelle année la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ? | 234 De combien de mois étiez-vous enceinte quand la dernière grossesse de ce genre s'est terminée ? | 235 (1) Depuis janvier 2012, avez-vous eu d'autres grossesses qui n'ont pas abouti à une naissance vivante ? |
| 01 | | <input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS | OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236 |
| 02 | <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE | <input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS | OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236 |
| 03 | <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE | <input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS | OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236 |
| 04 | <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE | <input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS | OUI 1 NON 2 → 236 |
| 236 | <p>C POUR CHAQUE GROSSESSE QUI NE S'EST PAS TERMINÉE PAR UNE NAISSANCE VIVANTE EN 2012-2017 OU PLUS TARD, INSCRIVEZ 'F' DANS LE CALENDRIER AU MOIS OÙ LA GROSSESSE S'EST TERMINÉE ET 'G' POUR LE NOMBRE RESTANT DE MOIS RÉVOLUS.</p> <p>S'IL Y A PLUS DE QUATRE GROSSESSES QUI NE SE SONT PAS TERMINÉES PAR UNE NAISSANCE VIVANTE, UTILISEZ DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN COMMENCANT À LA SECONDE LIGNE.</p> | | |
| 237 | Avez-vous eu une grossesse qui a pris fin avant 2012 et qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ? | OUI 1 NON 2 | → 239 |
| 238 | Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée avant 2012 ? | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |

SECTION 2. REPRODUCTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 239 | Quand vos dernières règles ont-elles commencé ? _____ (DATE, SI DONNÉE) | IL Y A JOURS 1 IL Y A SEMAINES 2 IL Y A MOIS 3 IL Y A ANNÉES 4 EN MÉNOPAUSE/ A EU UNE HYSTÉRECTOMIE 994 AVANT LA DERNIÈRE NAISSANCE 995 JAMAIS EU DE RÈGLES 996 | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 240 | Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ? | OUI 1 NON 2 PAS SÛRE 8 | → 242 | | | | | | | | |
| 241 | Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ? | JUSTE AVANT QUE LES RÉGLES COMMENCENT 1 PENDANT LES RÉGLES 2 JUSTE APRÈS LA FIN DES RÉGLES 3 AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES DE RÈGLES 4 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | |
| 242 | Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| | | | |
|-----|--|----------------------------|--|
| 301 | Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà entendu parler de (MÉTHODE) ? | | |
| 01 | Stérilisation féminine. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants. | OUI 1 NON 2 | |
| 02 | Stérilisation masculine. INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants. | OUI 1 NON 2 | |
| 03 | DIU. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant un ou plusieurs mois. | OUI 1 NON 2 | |
| 04 | Injectables. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par un agent de santé ou un relais communautaire pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus. | OUI 1 NON 2 | |
| 05 | Implants. INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un agent de santé un bâtonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus. | OUI 1 NON 2 | |
| 06 | Pilule. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse. | OUI 1 NON 2 | |
| 07 | Condom Masculin. INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels. | OUI 1 NON 2 | |
| 08 | Condom féminin. INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels. | OUI 1 NON 2 | |
| 09 | Pilule du lendemain. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre dans les trois jours qui suivent des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes. | OUI 1 NON 2 | |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| | | |
|----|--|---|
| 10 | <p>Méthode des jours fixes. INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.</p> | <p>OUI 1 NON 2</p> |
| 11 | <p>Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA). INSISTEZ : Pendant six mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.</p> | <p>OUI 1 NON 2</p> |
| 12 | <p>Méthode du rythme. INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.</p> | <p>OUI 1 NON 2</p> |
| 13 | <p>Retrait. INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.</p> | <p>OUI 1 NON 2</p> |
| 14 | <p>Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?</p> | <p>OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON Y</p> |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|----------------------------------|
| 302 | VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓ | ENCEINTE <input type="checkbox"/> | → 312 |
| 303 | Est-ce que vous, ou votre partenaire, faites actuellement quelque chose ou est-ce que vous utilisez actuellement une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ? | OUI 1 NON 2 | → 312 |
| 304 | Quelle méthode utilisez-vous ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI PLUS D'UNE MÉTHODE EST MENTIONNÉE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE PASSAGE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE. | STÉRILISATION FÉMININE A STÉRILISATION MASCULINE B DIU C INJECTABLES D IMPLANTS E PILULE F CONDOM MASCULIN G CONDOM FÉMININ H PILULE DU LENDEMAIN I MÉTHODE DES JOURS FIXES J MAMA K MÉTHODE DU RYTHME L RETRAIT M AUTRE MÉTHODE MODERNE X AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE Y | → 307 → 309 → 306 → 309 |
| 305 | Quelle est la marque de pilule que vous utilisez actuellement ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOÎTE. | HARMONIE 01 DUOFEM 02 MICROGYNON 03 EUGYNON 04 LO-FEMENAL 05 CONFIANCE 06 MINIDRIL 07 STEDIRIL 08 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98 | → 309 |
| 306 | Quelle est la marque de condom que vous utilisez actuellement ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOÎTE. | PRUDENCE 01 COOL 02 NO LOGO 03 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98 | → 309 |

SECTION 3. CONTRACEPTION (OPTION CAPI) (6)

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 311 | <p>VÉRIFIEZ 308 ET 309:</p> <p>ANNÉE EST 2012-2017 <input type="checkbox"/></p> <p>C INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION .</p> <p>ENSUITE CONTINUEZ</p> <p>↓</p> | <p>ANNÉE EST 2011 OU PLUS TÔT <input type="checkbox"/></p> <p>C INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À JANVIER 2012 .</p> <p>ENSUITE</p> <p>← (ALLEZ À 324)</p> | | |
| 312 | <p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les périodes où, durant ces dernières années, vous ou votre partenaire, avez utilisé une méthode pour éviter une grossesse.</p> <p>C UTILISEZ LE CALENDRIER POUR VÉRIFIER LES PÉRIODES ANTÉRIEURES D'UTILISATION ET DE NON UTILISATION, EN COMMENÇANT PAR L'UTILISATION LA PLUS RÉCENTE, EN PARTANT DE JANVIER 2012. UTILISEZ LES NOMS DES ENFANTS, DATES DE NAISSANCE ET PÉRIODES DE GROSSESSE COMME DES POINTS DE RÉFÉRENCE.</p> | | | |
| | | COLONNE 1 | COLONNE 2 | COLONNE 3 |
| 312A | <p>MOIS ET ANNÉE DU DÉBUT DE L'INTERVALLE D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION.</p> | <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p> | <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p> | <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p> |
| 312B | <p>Entre (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE) et (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE), avez-vous ou votre partenaire utilisé une méthode de contraception ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p> |
| 312C | <p>Quelle était cette méthode ?</p> | <p>CODE MÉTHODE .. <input type="text"/></p> | <p>CODE MÉTHODE .. <input type="text"/></p> | <p>CODE MÉTHODE .. <input type="text"/></p> |
| 312D | <p>Combien de mois après (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE) avez-vous commencé à utiliser (MÉTHODE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION DE LA</p> | <p>IMMÉDIATEMENT 00</p> <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE 95</p> | <p>IMMÉDIATEMENT 00</p> <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE 95</p> | <p>IMMÉDIATEMENT 00</p> <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE 95</p> |

| | | COLONNE 1 | COLONNE 2 | COLONNE 3 |
|------|--|--|--|--|
| 312E | INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A COMMENCÉ À UTILISER LA MÉTHODE. | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE |
| 312F | Pendant combien de mois avez-vous utilisé (MÉTHODE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE FIN | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95 | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95 | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95 |
| 312G | INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A ARRÊTÉ D'UTILISER LA MÉTHODE. | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE |
| 312H | Pourquoi avez-vous arrêté d'utiliser (MÉTHODE) ? | RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/> | RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/> | RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/> |
| 312I | | RETOURNEZ À 312A À LA COLONNE SUIVANTE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313. | RETOURNEZ À 312A À LA COLONNE SUIVANTE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313. | RETOURNEZ À 312A DANS LE NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313. |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|--|--|
| 313 | VÉRIFIEZ LE CALENDRIER POUR L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE À N'IMPORTE QUEL AUCUNE MÉTHODE UTILISÉE <input type="checkbox"/> UNE MÉTHODE UTILISÉE <input type="checkbox"/> | | → 315 |
| 314 | Avez-vous déjà utilisé quelque chose ou essayé par divers moyens de retarder ou d'éviter une grossesse ? | OUI 1 NON 2 | → 326 |
| 315 | VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLE À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE. | PAS DE CODE ENCERCLÉ 00 STÉRILISATION FÉMININE 01 STÉRILISATION MASCULINE 02 DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 MAMA 11 MÉTHODE DU RYTHME 12 RETRAIT 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96 | → 326 → 319 → 327 → 323 |
| 316 | Vous avez commencé à utiliser (MÉTHODE ACTUELLE) en (DATE À 309). Où l'avez-vous obtenue à ce moment-là ? INSISTEZ POUR IDENTIFIER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT) | SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12 CLINIQUE MOBILE 13 AGENT DE SANTÉ/ RELAIS COMMUNAUTAIRE 14 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21 PHARMACIE 22 SOIN MÉDICAL/CABINET CLINIQUE 23 CLINIQUE MOBILE 24 CENTRE/HÔPITAL CONFSSIONNELLE 25 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) ONG CLINIQUE PLANIFICATION FAMILIALE 31 AUTRE SOURCE BOUTIQUE 41 INSTITUTION RELIGIEUSE 42 AMIS/PARENTS 43 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | |
| 317 | VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLE À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE. | DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96 | → 323 → 322 → 323 |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|---|
| 318 | À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'effets secondaires que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ? | OUI 1 NON 2 | → 321 → 320 |
| 319 | Quand vous avez été stérilisée, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir à cause de la méthode ? | OUI 1 NON 2 | → 321 |
| 320 | Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ? | OUI 1 NON 2 | → 322 |
| 321 | Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ? | OUI 1 NON 2 | |
| 322 | VÉRIFIEZ 318 ET 319: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> UN <input type="checkbox"/> OUI! ↓ </div> <div style="border-left: 1px dashed black; width: 1px; height: 100px;"></div> <div style="text-align: center;"> AUTRE <input type="checkbox"/> ↓ </div> </div> <p>a) À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?</p> <p>b) Quand vous avez obtenu (MÉTHODE ACTUELLE DE 315) de (ENDROIT DE 307 OU 316), vous a-t-on parlé d'autres méthodes de PF que vous pouviez utiliser ?</p> | OUI 1 NON 2 | → 324 |
| 323 | Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ? | OUI 1 NON 2 | |
| 324 | VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE. | STÉRILISATION FÉMININE 01 STÉRILISATION MASCULINE 02 DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 MAMA 11 MÉTHODE DU RYTHME 12 RETRAIT 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96 | → 327 → 327 → 327 |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|--------------|
| 325 | <p>Où avez-vous obtenu (MÉTHODE ACTUELLE) la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12</p> <p>CLINIQUE MOBILE 13</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ RELAIS COMMUNAUTAIRE 14</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC 16</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21</p> <p>PHARMACIE 22</p> <p>SOIN MÉDICAL/CABINET CLINIQUE 23</p> <p>CLINIQUE MOBILE 24</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFESIONNELLE 25</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 26</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>ONG</p> <p>CLINIQUE PLANIFICATION FAMILIALE 31</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 41</p> <p>INSTITUTION RELIGIEUSE 42</p> <p>AMIS/PARENTS 43</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> | <p>→ 327</p> |
| 326 | Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | |
| 327 | Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez reçu la visite d'un relais communautaire ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | → 329 |
| 328 | Est-ce que le relais communautaire vous a parlé de planification familiale ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | |
| 329 | <p>VÉRIFIEZ 202: ENFANT VIVANT</p> <p>OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/></p> <p>a) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ou pour vos enfants ?</p> <p>b) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | → 401 |
| 330 | Est-ce qu'un membre du personnel de l'établissement de santé vous a parlé de méthodes de planification familiale ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 401 | VÉRIFIEZ 224: UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2012-2017 <input type="checkbox"/> | AUCUNE NAISSANCE EN 2012-2017 <input type="checkbox"/> | 648 |
| 402 | VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES À 403 ET LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE À 404 POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2012-2017. POSEZ LES QUESTIONS SUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCEZ PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. S'IL Y A PLUS DE 2 NAISSANCES, UTILISEZ LA DERNIÈRE COLONNE D'UN/DES QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années. (Nous parlerons d'un enfant à la fois). | | |
| 403 | NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES. | DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCE <input type="text"/> | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCE <input type="text"/> |
| 404 | À PARTIR DES QUESTIONS 212 ET 216: | NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> | NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> |
| 405 | Quand vous êtes tombée enceinte de (NOM), vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 408) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 426) ← |
| 406 | VÉRIFIEZ 208: SEULEMENT UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> PLUS D'UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou est-ce que vous ne vouliez pas d'enfant ? b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ? | PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2 (ALLEZ À 408) ← | PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2 (ALLEZ À 426) ← |
| 407 | Combien de temps de plus vouliez-vous attendre ? | MOIS 1 <input type="text"/> ANNÉES 2 <input type="text"/> NE SAIT PAS 998 | MOIS 1 <input type="text"/> ANNÉES 2 <input type="text"/> NE SAIT PAS 998 |
| 408 | Avez-vous consulté quelqu'un pour des soins prénatals pour cette grossesse ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 414) ← | |
| 409 | Qui avez-vous consulté ? Quelqu'un d'autre ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. | PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A INFIRMIÈRE B SAGE-FEMME C AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE D MATRONE E ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE F AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE G AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 410 | <p>Où avez-vous reçu les soins prénatals pour cette naissance ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>MAISON</p> <p>SA MAISON A</p> <p>AUTRE MAISON B</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT C</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT . . . D</p> <p>MATERNITÉ ISOLÉE E</p> <p>UNITÉ VILLAGEOISE F</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ G</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ H</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE I</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ J</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | De combien de mois étiez-vous enceinte quand vous avez reçu vos premiers soins prénatals pour cette grossesse ? | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> | NE SAIT PAS 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu des soins prénatals ? | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/> | NE SAIT PAS 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | Est-ce qu'au cours des visites prénatales durant cette grossesse, les examens suivants ont été effectués au moins une fois : | <table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Vous a-t-on pris la tension ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c) Vous a-t-on prélevé du sang ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d) Vous a-t-on pris le poids ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e) Vous a-t-on mesuré la taille ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f) Vous a-t-on palpé à l'abdomen?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g) Vous a-t-on fait une échographie?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>h) Vous a-t-on donné des conseils nutritionnels?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI | NON | a) Vous a-t-on pris la tension ? | 1 | 2 | b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ? | 1 | 2 | c) Vous a-t-on prélevé du sang ? | 1 | 2 | d) Vous a-t-on pris le poids ? | 1 | 2 | e) Vous a-t-on mesuré la taille ? | 1 | 2 | f) Vous a-t-on palpé à l'abdomen? | 1 | 2 | g) Vous a-t-on fait une échographie? | 1 | 2 | h) Vous a-t-on donné des conseils nutritionnels? | 1 | 2 | |
| | OUI | NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Vous a-t-on pris la tension ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Vous a-t-on prélevé du sang ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Vous a-t-on pris le poids ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Vous a-t-on mesuré la taille ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Vous a-t-on palpé à l'abdomen? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) Vous a-t-on fait une échographie? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) Vous a-t-on donné des conseils nutritionnels? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | Durant cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé d'avoir le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 417) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | Durant cette grossesse, combien de fois vous a-t-on fait une injection contre le tétanos ? | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> | NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ |
|------|---|---|---------------------------------------|
| 416 | VÉRIFIEZ 415: INJECTIONS ANTITÉTANIQUES | 2 FOIS OU PLUS <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 420) ← | |
| 417 | À n'importe quel moment avant cette grossesse, vous a-t-on fait des injections contre le tétanos ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 420) ← NE SAIT PAS 8 | |
| 418 | Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu des injections contre le tétanos ? SI 7 FOIS OU PLUS INSCRIVEZ '7'. | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> NE SAIT PAS 8 | |
| 419 | VÉRIFIEZ 418: SEULEMENT UNE FOIS <input type="checkbox"/> PLUS D'UNE FOIS <input type="checkbox"/> a) Il y a combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos ? b) Il y a combien d'années que vous avez reçu la dernière injection contre le tétanos avant cette grossesse ? | IL Y A ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 420 | Durant cette grossesse, vous a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ou du sirop contenant du fer ? MONTREZ LES COMPRIMÉS/SIROP. | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 422) ← NE SAIT PAS 8 | |
| 421 | Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris des comprimés ou du sirop ? SI LA RÉPONSE N'EST PAS NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UN NOMBRE | JOURS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998 | |
| 422 | Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments contre les vers intestinaux ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 423 | Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 426) ← NE SAIT PAS 8 | |
| 423A | Quels médicaments avez-vous pris ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI LE TYPE DE MÉDICAMENT N'EST PAS DÉTERMINÉ, MONTREZ DES ANTIPALUDÉENS COURANTS À L'ENQUÊTÉE. | SP/FANSIDAR A CHLOROQUINE B AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z | |
| 423B | VÉRIFIEZ 423A : SP/FANSIDAR PRIS À TITRE PRÉVENTIF CONTRE LE PALUDISME. | CODE 'A' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE 'A' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (PASSEZ À 426) ← | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE |
|------|--|--|--|
| | | NOM _____ | NOM _____ |
| 424 | Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous pris de la SP/Fansidar ? | NOMBRE DE FOIS ... <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 424B | Combien de fois avez-vous pris la SP/FANSIDAR sous direct observation d'un agent de santé? | NOMBRE DE FOIS ... <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE ... 0 | |
| 425 | Vous a-t-on donné la SP/Fansidar durant une visite prénatale, durant une autre visite médicale dans un établissement de santé ou l'avez-vous obtenue ailleurs ? SI PLUS D'UNE SOURCE, INSCRIVEZ LA PREMIÈRE SOURCE DE LA LISTE. | VISITE PRÉNATALE 1 AUTRE VISITE MÉDICALE 2 AILLEURS 6 | |
| 425A | VÉRIFIEZ 425 : VISITE PRÉNATALE | CODE '1' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE '1' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (PASSEZ À 426) ← | |
| 425B | Avez vous une carte prénatale pour le temps que vous étiez enceinte de (NOM) ? | OUI, CARTE VUE 1 OUI, CARTE PAS VUE 2 (ALLEZ À 426) ← PAS DE CARTE 8 | |
| 425C | VÉRIFIER LA CARTE PRÉNATALE ET ENREGISTRER LE NOMBRE DE FOIS LA SP/FANSIDAR EST DONNÉE | NOMBRE DE FOIS ... <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE ... 0 | |
| 426 | Quand (NOM) est né, était-il/elle très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne ou très petit ? | TRÈS GROS 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE 2 MOYEN 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE 4 TRÈS PETIT 5 NE SAIT PAS 8 | TRÈS GROS 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE 2 MOYEN 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE 4 TRÈS PETIT 5 NE SAIT PAS 8 |
| 427 | (NOM) a t-il /elle été pesé à la naissance ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 429) ← NE SAIT PAS 8 | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 429) ← NE SAIT PAS 8 |
| 428 | Combien (NOM) pesait-il/elle ? INSCRIVEZ LE POIDS EN KILOGRAMMES À PARTIR DU CARNET DE SANTÉ, SI DISPONIBLE. | KG DU CARNET 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KG DE MÉMOIRE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 99998 | KG DU CARNET 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KG DE MÉMOIRE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 99998 |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 429 | <p>Qui vous a assisté durant l'accouchement de (NOM) ?</p> <p>Quelqu'un d'autre ?</p> <p>INSISTEZ POUR LE/LES TYPES DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉE DÉCLARE QUE PERSONNE N'A ASSISTÉ L'ACCOUCHEMENT, INSISTEZ POUR DÉTERMINER SI DES ADULTES ÉTAIENT PRÉSENTS À L'ACCOUCHEMENT.</p> | <p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A INFIRMIÈRE B SAGE-FEMME C</p> <p>AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE D MATRONE E ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE F PARENT/AMI G AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y</p> | <p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A INFIRMIÈRE B SAGE-FEMME C</p> <p>AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE D MATRONE E ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE F PARENT/AMI G AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y</p> | | | | | | |
| 430 | <p>Où avez-vous accouché de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>MAISON SA MAISON 11 (PASSEZ À 434) ← AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT .. 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE .. 23 UNITÉ VILLAGEOISE .. 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONNELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL _____ 36 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) (PASSEZ À 434) ←</p> | <p>MAISON SA MAISON 11 (PASSEZ À 434) ← AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT .. 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE .. 23 UNITÉ VILLAGEOISE .. 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONNELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL _____ 36 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) (PASSEZ À 434) ←</p> | | | | | | |
| 431 | <p>Combien de temps après l'accouchement de (NOM) êtes-vous restée là ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p> | <p>HEURES 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>JOURS 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>SEMAINES 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>NE SAIT PAS 998</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 432 | <p>Avez-vous accouché de (NOM) par césarienne, c'est-à-dire que l'on vous a ouvert le ventre pour faire sortir le bébé ?</p> | <p>OUI 1 NON 2 (PASSEZ À 434) ←</p> | <p>OUI 1 NON 2 (PASSEZ À 434) ←</p> | | | | | | |
| 433 | <p>Quand la décision de pratiquer une césarienne a-t-elle été prise ? Était-ce avant ou après le début des douleurs ?</p> | <p>AVANT 1 APRÈS 2</p> | <p>AVANT 1 APRÈS 2</p> | | | | | | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE |
|------|--|--|--|
| | | NOM _____ | NOM _____ |
| 433A | Est-ce que vous avez payé pour accoucher par césarienne ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 |
| 434 | Est-ce que (NOM) a été posé sur votre poitrine, immédiatement après sa naissance ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 434B) ← | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 459) ← |
| 434A | Est-ce que la peau de (NOM) était en contact avec votre peau ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 |
| 434B | VÉRIFIEZ 430: LIEU D'ACCOUCHEMENT | CODE 11, 12, OU 96 ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 449) ← | |
| 435 | Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé pendant que vous étiez dans l'établissement ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 438) ← | |
| 436 | Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS. | HEURES 1 <input type="text"/> <input type="text"/> JOURS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> SEMAINES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998 | |
| 437 | Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE. | PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13 AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | |
| 437A | Est-ce qu'une femme paie pour avoir une césarienne au Bénin ? | OUI, PAIE 1 NON, NE PAIE PAS 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 438 | Je voudrais maintenant vous parler d'exams de la santé de (NOM) après la naissance – par exemple, quelqu'un qui a examiné (NOM), qui a vérifié le cordon ombilical ou qui s'est assuré que (NOM) allait bien. Est-ce que quelqu'un a vérifié l'état de santé de (NOM) pendant que vous étiez encore dans l'établissement ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 441) ← | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 439 | Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen de (NOM) ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS. | HEURES 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> JOURS 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> SEMAINES 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> NE SAIT PAS 998 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE | PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13 AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | Je voudrais maintenant parler de ce qui s'est passé après que vous ayez quitté l'établissement. Est-ce que quelqu'un a examiné votre état de santé après que vous ayez quitté l'établissement ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 445) ← | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | Combien de temps après l'accouchement a eu lieu cet examen ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS. | HEURES 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> JOURS 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> SEMAINES 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> NE SAIT PAS 998 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE. | PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13 AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 444 | <p>Où a eu lieu l'examen ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>MAISON SA MAISON 11 AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE ... 23 UNITÉ VILLAGEOISE ... 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p> | | | | | | | |
| 445 | <p>Je voudrais parler des examens de l'état de santé de (NOM) après votre départ de (ÉTABLISSEMENT À 430). Est-ce-qu'un prestataire de santé ou une accoucheuse traditionnelle a vérifié l'état de santé de (NOM) dans les deux mois après votre départ de (ÉTABLISSEMENT À 430) ?</p> | <p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 457) ← NE SAIT PAS 8</p> | | | | | | | |
| 446 | <p>Combien d'heures, de jours ou de semaines après la naissance de (NOM), cet examen a-t-il eu lieu ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p> | <p>HEURES 1 <table border="1" data-bbox="911 1272 1050 1323"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>JOURS 2 <table border="1" data-bbox="911 1323 1050 1375"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>SEMAINES 3 <table border="1" data-bbox="911 1375 1050 1426"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>NE SAIT PAS 998</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 447 | <p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p> | <p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13</p> <p>AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE ... 24</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p> | | | | | | | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 448 | <p>Où a eu lieu l'examen de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT ... 22</p> <p>MATERNITÉ ISOLÉE ... 23</p> <p>UNITÉ VILLAGEOISE ... 24</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC 26</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE ... 32</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 36</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____ (PRÉCISEZ) (ALLEZ À 457) ←</p> | | | | | | | |
| 449 | <p>Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé après la naissance de (NOM) ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>_____ (ALLEZ À 453) ←</p> | | | | | | | |
| 450 | <p>Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p> | <p>HEURES 1</p> <p>JOURS 2</p> <p>SEMAINES 3</p> <p>NE SAIT PAS 998</p> | <table border="1" data-bbox="911 1272 1050 1435"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 451 | <p>Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p> | <p>PROF. DE LA SANTÉ</p> <p>MÉDECIN 11</p> <p>INFIRMIÈRE 12</p> <p>SAGE-FEMME 13</p> <p>AUTRE PERSONNEL</p> <p>AIDE SOIGNANTE 21</p> <p>MATRONE 22</p> <p>ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23</p> <p>AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE ... 24</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> | | | | | | | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 452 | <p>Où a eu lieu ce premier examen ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>MAISON SA MAISON 11 AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE ... 23 UNITÉ VILLAGEOISE ... 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p> | | | | | | | |
| 453 | <p>Je voudrais vous parler des examens qui ont été faits pour vérifier l'état de santé de (NOM) après l'accouchement – par exemple, est-ce que quelqu'un a examiné (NOM), vérifié le cordon ou s'est assuré que (NOM) allait bien. Dans les deux mois après la naissance de (NOM), est-ce qu'un professionnel de santé ou une accoucheuse traditionnelle a vérifié l'état de santé de (NOM) ?</p> | <p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 457) ← NE SAIT PAS 8</p> | | | | | | | |
| 454 | <p>Combien d'heures, de jours ou de semaines après la naissance de (NOM), ce premier examen a-t-il eu lieu ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p> | <p>HEURES APRÈS NAISSANCE .. 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>JOURS APRÈS NAISSANCE .. 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>SEMAINES APRÈS NAISSANCE .. 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>NE SAIT PAS 998</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 455 | <p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p> | <p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13</p> <p>AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE ... 24</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p> | | | | | | | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|-----|-----|-----|-----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 456 | <p>Où a eu lieu le premier examen de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>MAISON SA MAISON 11 AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE ... 23 UNITÉ VILLAGEOISE ... 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC 26 _____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 36 _____ (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE 96 _____ (PRÉCISEZ)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | <p>Au cours des deux jours suivant la naissance de (NOM), est-ce qu'un prestataire de santé a fait l'une des choses suivantes ?</p> <p>a) Examiné le cordon ?</p> <p>b) Vérifié la température de (NOM) ?</p> <p>c) Vous a conseillé sur les signes de danger chez les nouveau-nés ?</p> <p>d) Vous a conseillé sur l'allaitement ?</p> <p>e) Observé (NOM) en train d'être allaité ?</p> | <table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) CORDON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) TEMP</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) SIGNES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) CONSEIL ALLAI- TEMENT ..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) OBSERVÉ ALLAI- TEMENT ..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI | NON | NSP | a) CORDON | 1 | 2 | 8 | b) TEMP | 1 | 2 | 8 | c) SIGNES | 1 | 2 | 8 | d) CONSEIL ALLAI- TEMENT .. | 1 | 2 | 8 | e) OBSERVÉ ALLAI- TEMENT .. | 1 | 2 | 8 | |
| | OUI | NON | NSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) CORDON | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) TEMP | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) SIGNES | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) CONSEIL ALLAI- TEMENT .. | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) OBSERVÉ ALLAI- TEMENT .. | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | <p>Vos règles sont-elles revenues depuis la naissance de (NOM) ?</p> | <p>OUI 1 (ALLEZ À 460) ←</p> <p>NON 2 (ALLEZ À 461) ←</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | <p>Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de (NOM) et votre grossesse suivante ?</p> | | <p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 463) ←</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | <p>Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu vos règles ?</p> | <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p> | <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | <p>VÉRIFIEZ 226: L'ENQUÊTÉE EST-ELLE ENCEINTE ?</p> | <p>PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/></p> <p>ENCEINTE OU PAS SÛRE <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 463) ←</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE | | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE | |
|-----|---|--|--|--|--|
| | | NOM _____ | | NOM _____ | |
| 462 | Avez-vous eu des rapports sexuels depuis la naissance de (NOM) ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 464) ← | | | |
| 463 | Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ? | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | |
| 464 | Avez-vous allaité (NOM) ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 466) ← | | OUI 1 NON 2 | |
| 465 | VÉRIFIEZ 404: L'ENFANT EST-IL VIVANT ? | VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 470) ← (ALLEZ À 471) ← | | | |
| 466 | Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ? SI MOINS D'1 HEURE, INSCRIVEZ '00' HEURE; SI MOINS DE 24 HEURES, INSCRIVEZ EN HEURES; SINON, EN JOURS. | IMMÉDIATEMENT 000 HEURES 1 <input type="text"/> <input type="text"/> JOURS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> | | | |
| 467 | Dans les trois premiers jours après la naissance, est-ce que (NOM) a reçu autre chose à boire que le lait maternel ? | OUI 1 NON 2 | | | |
| 468 | VÉRIFIEZ 404: L'ENFANT EST-IL VIVANT ? | VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 471) ← | | VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 471) ← | |
| 469 | Allaitez-vous encore (NOM) ? | OUI 1 NON 2 | | | |
| 470 | (NOM) a-t-il bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 471 | | RETOURNEZ À 405 À LA COLONNE SUIVANTE ; OU, S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 501A. | | RETOURNEZ À 405 À L'AVANT-DERNIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE ; OU, S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 501A. | |

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|---|------------------|
| 501A | VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES : UNE NAISSANCE EN 2014-2017? UNE NAISSANCE OU PLUS EN <input type="checkbox"/> 2014-2017 ↓ | AUCUNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> EN 2014-2017 | → 601 |
| 502A | INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DU DERNIER ENFANT NÉ EN 2014-2017. NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____ | NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 503A | VÉRIFIEZ 216 POUR ENFANT: VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ | DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> | → 501B |
| 504A | Avez-vous un carnet ou un autre document où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ? | OUI, A SEULEMENT UN CARNET 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT .. 2 OUI, A UN CARNET ET UN AUTRE DOCUMENT... 3 NON, PAS DE CARNET ET PAS D'AUTRE DOCUMENT 4 | → 507A → 507A |
| 505A | Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ? | OUI 1 NON 2 | |
| 506A | VÉRIFIEZ 504A: CODE '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE '4' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> | → 511A |
| 507A | Puis-je voir le carnet ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM) sont inscrites ? | OUI, SEULEMENT CARNET VU 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU 2 OUI, CARNET ET AUTRE DOCUMENT VUS 3 NI CARNET NI AUTRE DOCUMENT VUS 4 | → 511A |

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|--|---|---------|
| | NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____ | NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 511A | (NOM) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 525A |
| 512A | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans l'avant bras gauche qui laisse habituellement une cicatrice ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 514A | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 517A |
| 515A | Est-ce que (NOM) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les deux premières semaines après sa naissance ou plus tard ? | DEUX PREMIÈRES SEMAINES 1 PLUS TARD 2 | |
| 516A | Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ? | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> | |
| 517A | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection faite au bras gauche, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 519A |
| 518A | Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ? | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> | |

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-------|---|---|---------|
| | NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____ | NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 519A | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse gauche pour éviter la pneumonie ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 523A |
| 520A | Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ? | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> | |
| 523A | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 524A | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la fièvre jaune, c'est-à-dire une injection dans la cuisse droite pour lui éviter la fièvre jaune ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 524Aa | Est-ce que (NOM) a reçu certaines de ces vaccinations au cours des douze derniers mois lors d'une campagne (journée) nationale de vaccination ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 525A) NE SAIT PAS 8 | ← |
| 524Ab | Au cours de quelle campagne nationale de vaccination, (NOM) a-t-il reçu ces vaccinations ? [| AVRIL 2017 1 OCTOBRE 2017 2 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) | |
| 525A | Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) : a) Un mélange en poudre de micronutriments (MNP) ? b) Le Plumpy'Nuts ? c) Le Plumpy'Doz ? | OUI NON NSP a) POUDRE 1 2 8 b) PLUMPY NUTS 1 2 8 c) PLUMPY DOZ 1 2 8 | |
| 526A | CONTINUEZ AVEC 501B. | | |

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|---|------------------|
| 501B | VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES: D'AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017? D'AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017 <input type="checkbox"/> | PLUS DE NAISSANCE EN 2014-2017 <input type="checkbox"/> | → 601 |
| 502B | INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DE L'AVANT-DERNIER ENFANT NÉ EN 2014-2017. NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____ | NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> | |
| 503B | VÉRIFIEZ 216 POUR ENFANT ENFANT: VIVANT <input type="checkbox"/> | DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> | → 526B |
| 504B | Avez-vous un carnet ou un autre document où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ? | OUI, A SEULEMENT UN CARNET 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT .. 2 OUI, A UN CARNET ET UN AUTRE DOCUMENT... 3 NON, PAS DE CARNET ET PAS D'AUTRE DOCUMENT 4 | → 507B → 507B |
| 505B | Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ? | OUI 1 NON 2 | |
| 506B | VÉRIFIEZ 504B: CODE '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> | CODE '4' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> | → 511B |
| 507B | Puis-je voir le carnet ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM) sont inscrites ? | OUI, SEULEMENT CARNET VU 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU 2 OUI, CARNET ET AUTRE DOCUMENT VUS 3 NI CARNET NI AUTRE DOCUMENT VUS 4 | → 511B |

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|--|---|---------|
| | NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____ | NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 511B | (NOM) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 525B |
| 512B | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans l'avant bras gauche qui laisse habituellement une cicatrice ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 514B | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 517B |
| 515B | Est-ce que (NOM) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les deux premières semaines après sa naissance ou plus tard ? | DEUX PREMIÈRES SEMAINES 1 PLUS TARD 2 | |
| 516B | Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ? | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> | |
| 517B | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection faite au bras gauche, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 519B |
| 518B | Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ? | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> | |

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--|
| | NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____ | NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519B | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse gauche pour éviter la pneumonie ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 523B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520B | Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ? | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523B | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524B | Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la fièvre jaune, c'est-à-dire une injection dans la cuisse droite pour lui éviter la fièvre jaune ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524Ba | Est-ce que (NOM) a reçu certaines de ces vaccinations au cours des douze derniers mois lors d'une campagne (journée) nationale de vaccination ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 527B) NE SAIT PAS 8 | ← | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524Bb | Au cours de quelle campagne nationale de vaccination, (NOM) a-t-il reçu ces vaccinations ? | AVRIL 2017 1 OCTOBRE 2017 2 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525B | Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) : a) Un mélange en poudre de micronutriments (MNP) ? b) Le Plumpy'Nuts ? c) Le Plumpy'Doz ? | <table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) POUDRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) PLUMPY NUT</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) PLUMPY DOZ</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI | NON | NSP | a) POUDRE | 1 | 2 | 8 | b) PLUMPY NUT | 1 | 2 | 8 | c) PLUMPY DOZ | 1 | 2 | 8 | |
| | OUI | NON | NSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) POUDRE | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) PLUMPY NUT | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) PLUMPY DOZ | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526B | VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES: D'AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017? AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017 <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 502B DANS UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE) ← | PAS D'AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017 <input type="checkbox"/> | → 601 | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 601 | <p>VÉRIFIEZ 224:</p> <p>UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2012-2017 <input type="checkbox"/></p> <p>AUCUNE NAISSANCE EN 2012-2017 <input type="checkbox"/> → 648</p> | | |
| 602 | <p>VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES À 603 ET LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE À 604 POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2012-2017. POSEZ LES QUESTIONS SUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCEZ PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. S'IL Y A PLUS DE NAISSANCES, UTILISEZ LA DERNIÈRE COLONNE D'UN/DÉS QUESTIONNAIRES ADDITIONNEL(S).</p> <p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années. (Nous parlerons d'un enfant à la fois).</p> | | |
| 603 | <p>NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES</p> | <p>DERNIÈRES NAISSANCE NUMÉRO L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/></p> | <p>AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/></p> |
| 604 | <p>DE 212 ET 216:</p> | <p>NOM _____</p> <p>VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 646) ←</p> | <p>NOM _____</p> <p>VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 646) ←</p> |
| 605 | <p>Au cours des six derniers mois, a-t-on donné à (NOM) une dose de vitamine A comme [celle-ci/l'une de celles-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS CAPSULES.</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> |
| 606 | <p>Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) des comprimés de fer, des granules ou du sirop contenant du fer comme [celui-ci/l'un de ceux-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS DE COMPRIMÉS, GRANULES OU SIROP.</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> |
| 607 | <p>Au cours des six derniers mois, a-t-on donné à (NOM) des médicaments contre les vers intestinaux comme l'albendazole</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> |
| 608 | <p>(NOM) a-t-il eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 618) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 618) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> |

SECTION 6.SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE | | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE | |
|-----|---|---|---|--|--|
| | | NOM _____ | | NOM _____ | |
| 609 | <p>VÉRIFIEZ 469: ALLAITÉ ACTUELLEMENT</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON/ <input type="checkbox"/> PAS POSÉ </p> <p>a) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM) pendant la diarrhée, y compris le lait maternel. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p> | <p>b) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM) pendant la diarrhée. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p> | <p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTIT... 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>RIEN À BOIRE 5</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTIT... 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>RIEN À BOIRE 5</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | |
| 610 | <p>Quand (NOM) avait la diarrhée, lui a-t-on donné à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à manger beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p> | <p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTIT... 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>A STOPPÉ LA NOURRITURE... 5</p> <p>N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER 6</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTIT... 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>A STOPPÉ LA NOU... 5</p> <p>N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER 6</p> <p>NE SAIT PAS. 8</p> | | |
| 611 | <p>Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p style="text-align: right;">(ALLEZ À 615) ←</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p style="text-align: right;">(ALLEZ À 615) ←</p> | | |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ |
|-----|--|---|---|
| 612 | <p>Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>Quelque part ailleurs ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVT. A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ GOUVT. B</p> <p>CLINIQUE PF C</p> <p>AGENT DE TERRAIN D</p> <p>CENTRE SOCIAL. E</p> <p>AGENT DE SANTE STRAT AV F</p> <p>AGENT DE SANTE/ RELAI COMM G</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ H</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ I</p> <p>HÔPITAL CONFES-SIONNEL J</p> <p>CABINET MEDCAL PRIVÉ K</p> <p>PHARMACIE L</p> <p>ABPF M</p> <p>AGENT SANTÉ (ONG) N</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ _____ O</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE P</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL Q</p> <p>MARCHÉ R</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS S</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> | <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVT. A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ GOUVT. B</p> <p>CLINIQUE PF C</p> <p>AGENT DE TERRAIN D</p> <p>CENTRE SOCIAL. E</p> <p>AGENT DE SANTE STRAT AV F</p> <p>AGENT DE SANTE/ RELAI COMM G</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ H</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ I</p> <p>HÔPITAL CONFES-SIONNEL J</p> <p>CABINET MEDCAL PRIVÉ K</p> <p>PHARMACIE L</p> <p>ABPF M</p> <p>AGENT SANTÉ (ONG) N</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ _____ O</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE P</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL Q</p> <p>MARCHÉ R</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS S</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> |
| 613 | VÉRIFIEZ 612: | <p>DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 615) ←</p> | <p>DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉS <input type="checkbox"/></p> <p>SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 615) ←</p> |
| 614 | <p>Où êtes-vous allée en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 612.</p> | PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/> | PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/> |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE | | | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE | | | | |
|-----|---|--|--|-----|--------------------------|----------------------|-----|-----------------|-----|
| | | NOM _____ | | | NOM _____ | | | | |
| 615 | <p>Avez-vous donné à (NOM) les choses suivantes à n'importe quel moment dès qu'il/elle a commencé à avoir la diarrhée :</p> <p>a) Un liquide préparé à partir d'un sachet spécial appelé ORASEL ?</p> <p>b) Un liquide maison recommandé par le gouvernement ?</p> <p>c) Du zinc, en comprimés ou en sirop ?</p> | | OUI | NON | NSP | | OUI | NON | NSP |
| | | a) ORASEL .. | 1 | 2 | 8 | a) ORASEL .. | 1 | 2 | 8 |
| | | b) LIQUIDE MAISON .. | 1 | 2 | 8 | b) LIQUIDE MAISON .. | 1 | 2 | 8 |
| | | c) ZINC | 1 | 2 | 8 | c) ZINC | 1 | 2 | 8 |
| 616 | <p>VÉRIFIEZ 615:</p> <p>UN 'OUI' <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>a) A-t-on donné quelque chose d'autre pour traiter la diarrhée ?</p> <p>TOUT 'NON' OU 'NSP' <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>b) A-t-on donné quelque chose pour traiter la diarrhée ?</p> | | OUI | | 1 | OUI | | 1 | |
| | | | NON | | 2 | NON | | 2 | |
| | | | (ALLEZ À 618) ← | | | (ALLEZ À 618) ← | | | |
| | | | NE SAIT PAS | | 8 | NE SAIT PAS | | 8 | |
| 617 | <p>VÉRIFIEZ 615:</p> <p>UN 'OUI' <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>a) Qu'a t-on donné d'autre pour traiter la diarrhée ?</p> <p>Rien d'autre ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUS LES TRAITEMENTS DONNÉS.</p> <p>TOUT 'NON' OU 'NSP' <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>b) Qu'a t-on donné pour traiter la diarrhée ?</p> <p>Rien d'autre ?</p> | <p>COMPRIMÉ OU SIROP</p> <p>ANTIBIOTIQUE A</p> <p>ANTIMOTILITÉ B</p> <p>AUTRE (NON ANTIBIOTIQUE OU ANTIMOTILITÉ) C</p> <p>COMPRIMÉ OU SIROP INCONNU D</p> <p>INJECTION</p> <p>ANTIBIOTIQUE E</p> <p>NON-ANTIBIOTIQUE F</p> <p>INJECTION INCONNUE G</p> <p>(IV) INTRAVEINEUSE H</p> <p>REMÈDE MAISON/ HERBES MÉDICINALES I</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> | <p>COMPRIMÉ OU SIROP</p> <p>ANTIBIOTIQUE A</p> <p>ANTIMOTILITÉ B</p> <p>AUTRE (NON ANTIBIOTIQUE OU ANTIMOTILITÉ) C</p> <p>COMPRIMÉ OU SIROP INCONNU D</p> <p>INJECTION</p> <p>ANTIBIOTIQUE E</p> <p>NON-ANTIBIOTIQUE F</p> <p>INJECTION INCONNUE G</p> <p>(IV) INTRAVEINEUSE H</p> <p>REMÈDE MAISON/ HERBES MÉDICINALES I</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> | | | | | | |
| 618 | Est-ce que (NOM) a été malade avec de la fièvre à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ? | OUI | 1 | NON | 2 | NE SAIT PAS | 8 | (ALLEZ À 620) ← | |
| 619 | À n'importe quel moment au cours de sa maladie, est-ce qu'on a pris à (NOM) du sang de son doigt ou de son talon ? | OUI | 1 | NON | 2 | NE SAIT PAS | 8 | | |
| 620 | Est-ce que (NOM) a été malade avec de la toux à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ? | OUI | 1 | NON | 2 | NE SAIT PAS | 8 | | |
| 621 | Est-ce que (NOM) a eu un souffle court et rapide ou avait-il/elle des difficultés pour respirer à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ? | OUI | 1 | NON | 2 | NE SAIT PAS | 8 | (ALLEZ À 623) ← | |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ |
|-----|---|---|---|
| 622 | Est-ce que ce souffle rapide ou ces difficultés pour respirer étaient dus à un problème de bronche ou à un nez bouché ou qui coulait ? | BRANCHE SEULEMEN 1 NEZ SEULEMEN 2 LES DEUX 3 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 624) ← | BRANCHE SEULEMEN 1 NEZ SEULEMEN 2 LES DEUX 3 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 624) ← |
| 623 | VÉRIFIEZ 618: A EU DE LA FIÈVRE ? | OUI NON OU NSP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ← | OUI NON OU NSP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ← |
| 624 | Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la maladie ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 629) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À TO 629) ← |
| 625 | Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ? Quelque part ailleurs ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT) | SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUV.T. GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. C CLINIQUE MOBILE D AGENT DE SANTÉ/ AGENT COMMUNAUTAIRE .. E AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ G PHARMACIE H MÉDECIN PRIVÉ I CLINIQUE MOBILE J AGENT DE SANTÉ/ COMMUNAUTAIRE K AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE BOUTIQUE M PRATICIEN TRADITIONNEL N MARCHÉ O VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS P AUTRE X (PRÉCISEZ) | SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUV.T. GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. C CLINIQUE MOBILE D AGENT DE SANTÉ/ AGENT COMMUNAUTAIRE .. E AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ G PHARMACIE H MÉDECIN PRIVÉ I CLINIQUE MOBILE J AGENT DE SANTÉ/ COMMUNAUTAIRE K AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L (PRÉCISEZ) OTHER SOURCE BOUTIQUE M PRATICIEN TRADITIONNEL N MARCHÉ O VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS P AUTRE X (PRÉCISEZ) |
| 626 | VÉRIFIEZ 625: | DEUX SEULEMENT CODES UN OU PLUS CODE ENCERCLÉS ENCLÉ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 628) ← | DEUX SEULEMENT CODES UN OU PLUS CODE ENCERCLÉS ENCLÉ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 628) ← |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ |
|------|---|--|--|
| 627 | Où êtes-vous allée en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ? UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 625. | PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/> | PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/> |
| 628 | Combien de jours après le début de la maladie, avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour (NOM) ? SI MÊME JOUR, INSCRIRE '00'. | JOURS <input type="text"/> <input type="text"/> | JOURS <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 629 | Est-ce qu'à n'importe quel moment au cours de la maladie, (NOM) a pris des médicaments pour la maladie ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 646) ← NE SAIT PAS 8 | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 646) ← NE SAIT PAS 8 |
| 630 | Quels médicaments (NOM) a-t-il/elle pris ? Aucun autre médicament ? INSCRIVEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. | ANTIPALUDIQUES COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA .. A SP/FANSIDAR B CHLOROQUINE C AMODIAQUINE D COMPRIMÉS QUININE E INJECTION/IV F ARTESUNATE VOIE RECTALE G INJECTION/IV H AUTRE ANTIPALUDIQUE _____ I (PRÉCISEZ) ANTIBIOTIQUES COMPRIMÉS/SIROP J INJECTION/IV K AUTRES MÉDICAMENTS ASPIRINE L ACETAMINOPHEN M IBUPROFEN N PARACETEMOL O AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z | ANTIPALUDIQUES COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA .. A SP/FANSIDAR B CHLOROQUINE C AMODIAQUINE D COMPRIMÉS QUININE E INJECTION/IV F ARTESUNATE VOIE RECTALE G INJECTION/IV H AUTRE ANTIPALUDIQUE _____ I (PRÉCISEZ) ANTIBIOTIQUES COMPRIMÉS/SIROP J INJECTION/IV K AUTRES MÉDICAMENTS ASPIRINE L ACETAMINOPHEN M IBUPROFEN N PARACETEMOL O AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z |
| 631 | VÉRIFIEZ 630: Y A-T-IL UN CODE A-I ENCERCLÉ? | OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 646) ← | OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 646) ← |
| 631A | Combien avez-vous payé en tout pour les médicaments et consultations pour traiter la fièvre de (NOM) ? ENREGISTRER LE COÛT EN FCFA. SI PLUS DE 99 000FCFA, ENREGISTRER 99 000FCFA. | COÛT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> GRATUIT 99995 NE SAIT PAS 99998 | COÛT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> GRATUIT 99995 NE SAIT PAS 99998 |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE | | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE | |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | NOM _____ | | NOM _____ | |
| 632 | VÉRIFIEZ 630: COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE ('A') DONNÉE | CODE 'A' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'A' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 634) ← | CODE 'A' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'A' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 634) ← |
| 633 | Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre une combinaison à base d'artémisinine ? | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 |
| 634 | VÉRIFIEZ 630: SP/FANSIDAR ('B') DONNÉE | CODE 'B' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'B' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 636) ← | CODE 'B' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'B' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 636) ← |
| 635 | Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la SP/Fansidar ? | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 |
| 636 | VÉRIFIEZ 630: CHLOROQUINE ('C') DONNÉE | CODE 'C' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'C' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 638) ← | CODE 'C' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'C' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 638) ← |
| 637 | Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la Chloroquine ? | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 |
| 638 | VÉRIFIEZ 630: AMODIAQUINE ('D') DONNÉE | CODE 'D' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'D' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 640) ← | CODE 'D' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'D' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 640) ← |
| 639 | Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de l'amodiaquine ? | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | DERNIÈRE NAISSANCE | | AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE | |
|------|---|---|---|---|---|
| | | NOM _____ | | NOM _____ | |
| 640 | VÉRIFIEZ 630: QUININE ('E' OU 'F') DONNÉE | CODE 'E' OU 'F' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'E' OU 'F' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 642) | CODE 'E' OU 'F' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'E' OU 'F' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 642) |
| 641 | Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la quinine ? | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 |
| 642 | VÉRIFIEZ 630: ARTESUNATE ('G' OU 'H') DONNÉ | CODE 'G' OU 'H' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'G' OU 'H' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 644) | CODE 'G' OU 'H' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'G' OU 'H' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 644) |
| 643 | Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de l'artésunate ? | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 |
| 644 | VÉRIFIEZ 630: AUTRE ANTIPALUDIQUE ('I') DONNÉ | CODE 'I' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'I' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 646) | CODE 'I' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ | CODE 'I' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 646) |
| 645 | Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre un (AUTRE ANTIPALUDIQUE) ? | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 | MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8 |
| 645A | Est-ce que la prise en charge du paludisme pour les enfants âgés de moins de 5 ans est payable au Bénin ? | OUI, DOIT PAYER 1 NON, NE DOIT PAS PAYER 2 NE SAIT PAS 8 | OUI, DOIVENT PAYER 1 NON, NE DOIVENT PAS PAYER 2 NE SAIT PAS 8 | OUI, DOIT PAYER 1 NON, NE DOIT PAS PAYER 2 NE SAIT PAS 8 | OUI, DOIVENT PAYER 1 NON, NE DOIVENT PAS PAYER 2 NE SAIT PAS 8 |
| 646 | | RETOURNEZ À 604 À LA COLONNE SUIVANTE; OU S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 647. | RETOURNEZ À 604 À L'AVANT-DERNIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 647. | | |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|-----------------------------|
| 647 | <p>VÉRIFIEZ 615(a) ET 615(b), TOUTES LES COLONNES :</p> <p align="center"> AUCUN ENFANT N'A REÇU DE LIQUIDE DE SACHET SRO (ORASEL) <input type="checkbox"/> </p> | <p align="center"> UN ENFANT A REÇU DU LIQUIDE D'UN SACHET SRO (ORASEL) <input type="checkbox"/> </p> | <p align="center">→ 649</p> |
| 648 | <p>Avez-vous entendu parler d'un produit spécial appelé ORASEL que vous pouvez obtenir pour le traitement de la diarrhée ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | |
| 649 | <p>VÉRIFIEZ 215 ET 218, TOUTES LES LIGNES: NOMBRE D'ENFANTS NÉS EN 2015-2017 VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE</p> <p align="center"> UN OU PLUS <input type="checkbox"/> </p> <p align="center"> (NOM DU PLUS JEUNE ENFANT VIVANT AVEC ELLE) ↓ </p> | <p align="center"> AUCUN <input type="checkbox"/> </p> | <p align="center">→ 701</p> |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | | | ALLEZ À |
|-----|---|----------|--|-----|---------|
| 650 | <p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les liquides et aliments que (NOM DE 649) a consommés hier pendant le jour ou la nuit. J'aimerais, en particulier, savoir si votre enfant a reçu le liquide ou l'aliment que je vais citer, même s'il était mélangé avec d'autres nourritures.</p> | | | | |
| | | | OUI | NON | NSP |
| | a) De l'eau ? | a) | 1 | 2 | 8 |
| | b) Des jus ou des boissons à base de jus ? | b) | 1 | 2 | 8 |
| | c) Du bouillon ? | c) | 1 | 2 | 8 |
| | d) Du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou du lait frais d'animal ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a-t-il/elle bu du lait ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'. | d) | 1 | 2 | 8 |
| | | | NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A BU DU LAIT <input type="text"/> | | |
| | e) Du lait en poudre pour bébé ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a-t-il/elle bu du lait en poudre pour bébé ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'. | e) | 1 | 2 | 8 |
| | | | NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A BUT DU LAIT EN POUVRE <input type="text"/> | | |
| | f) D'autres liquides ? | f) | 1 | 2 | 8 |
| | g) Du yaourt ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a-t-il/elle mangé du yaourt ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'. | g) | 1 | 2 | 8 |
| | | | NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A MANGÉ DU YAOURT <input type="text"/> | | |
| | h) Une préparation d'aliments enrichis pour bébé comme cerelac, pépité d'or, ou céréso ? | h) | 1 | 2 | 8 |
| | i) Du pain, du riz, des pâtes, bouillie d'avoine (quaker) ou autres préparations à base de céréales ? | i) | 1 | 2 | 8 |
| | j) Des citrouilles (goussi), carottes, courges ou courgettes qui sont jaunes ou oranges à l'intérieur ? | j) | 1 | 2 | 8 |
| | k) Des pommes de terre blanches, ignames blanches, manioc, ou préparations à base de tubercules ? | k) | 1 | 2 | 8 |
| | l) Des légumes à feuilles vert foncé comme l'épinard ? | l) | 1 | 2 | 8 |

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|---------|
| | m) Des mangues, papayes mûres ou goyave ? | m) 1 2 8 | |
| | n) D'autres fruits ou légumes comme banane, pomme sauvage, compote de pomme, haricots verts, avocat, tomate ? | n) 1 2 8 | |
| | o) Du foie, rognons, coeur ou autres abats ? | o) 1 2 8 | |
| | p) De la viande, de boeuf, de porc, d'agneau, de chèvre, du poulet ou du canard ? | p) 1 2 8 | |
| | q) Des oeufs ? | q) 1 2 8 | |
| | r) Du poisson frais ou séché ou des crustacés ? | r) 1 2 8 | |
| | s) N'importe quelle préparation à base de haricots, pois, lentilles ou noix ? | s) 1 2 8 | |
| | t) Du fromage ou d'autres produits laitiers ? | t) 1 2 8 | |
| | u) N'importe quelle préparation à base d'aliments solides, semi solides, ou mous ? | u) 1 2 8 | |
| | v) Préparation à base d'huile de palme rouge, de noix de palme ou de sauce de pulpe de noix ? | v) 1 2 8 | |
| | w) Des patates douces qui sont jaunes a l'intérieur ? | w) 1 2 8 | |
| 651 | VÉRIFIEZ 650 (CATÉGORIES 'g' À 'w'): PAS UN SEUL 'OUI' <input type="checkbox"/> AU MOINS UN 'OUI' <input type="checkbox"/> | | → 653 |
| 652 | Est-ce que hier durant le jour ou la nuit (NOM DE 649) a mangé des aliments solides, semi solides ou mous ? SI 'OUI' INSISTEZ : Quel type d'aliments solide, semi solide ou mou (NOM) a-t-il/elle mangé ? | OUI 1 (RETOURNEZ À 650 POUR INSCRIRE LES ALIMENTS) (PUIS CONTINUEZ AVEC 653) NON 2 | → 654 |
| 653 | Combien de fois (NOM DE 649) a-t-il/elle mangé des aliments solides, semi solides ou mous hier durant le jour ou la nuit ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'. | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> NE SAIT PAS 8 | |
| 654 | La dernière fois que (NOM DE 649) est allé aux toilettes, qu'avez-vous fait des excréments ? | ENFANT A UTILISÉ TOILETTES OU LATRIN 01 A JETÉ/RINCÉ DANS TOILETTES OU LATRINES 02 A JETÉ/RINCÉ DANS ÉGOUT OU CANIVEAU 03 A JETÉ AUX ORDURES 04 A ENTERRÉ 05 A LAISSÉ À L'AIR LIBRE 06 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) | |

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|---|---------|
| 701 | Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous avec un homme comme si vous étiez mariée ? | OUI, ACTUELLEMENT MARIÉE 1 OUI, VIT AVEC UN HOMME 2 NON, PAS EN UNION 3 | → 704 |
| 702 | Avez-vous déjà été mariée ou avez-vous déjà vécu avec un homme comme si vous étiez mariée ? | OUI, A ÉTÉ MARIÉE 1 OUI, A VÉCU AVEC UN HOMME 2 NON 3 | → 712 |
| 703 | Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuve, divorcée ou séparée ? | VEUVE 1 DIVORCÉE 2 SÉPARÉE 3 | → 709 |
| 704 | Est-ce que votre (mari/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-il ailleurs ? | VIT AVEC ELLE 1 VIT AILLEURS 2 | |
| 705 | ENREGISTREZ LE NOM ET No DE LIGNE DU MARI/PARTENAIRE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE. S'IL N'EST PAS LISTÉ DANS LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'. | NOM _____ No LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 706 | Est-ce que votre (mari/partenaire) a d'autres épouses ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il était marié ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 709 |
| 707 | En tout, y compris vous-même, combien a-t-il d'épouses ou de partenaires avec qui il vit comme s'il était marié ? | NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | |
| 708 | Êtes-vous la première, deuxième, ... épouse ? | RANG <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 709 | Avez-vous été mariée ou avez-vous vécu avec un homme une seule fois ou plus d'une fois ? | SEULEMENT UNE FOIS 1 PLUS D'UNE FOIS 2 | |
| 710 | VÉRIFIEZ 709: MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME SEULEMENT UNE FOIS <input type="checkbox"/> ↓ a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (mari/partenaire) ? MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME PLUS D'UNE FOIS <input type="checkbox"/> ↓ b) Je voudrais maintenant vous parler de votre premier (mari/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec lui ? | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAÎT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998 | → 712 |
| 711 | Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec lui pour la première fois ? | ÂGE <input type="text"/> <input type="text"/> | |

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|---|--------------------|
| 712 | VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ. | | |
| 713 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ? | N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS 00 ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> | → 731 |
| 714 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES. | IL Y A DES JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/> | → 716 → 727 |

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| | | DERNIER PARTENAIRE SEXUEL | AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL | AVANT-AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL |
|-----|--|---|---|---|
| 715 | Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne pour la dernière fois ? | | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 716 | La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, un condom a-t-il été utilisé ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ← |
| 717 | Un condom a-t-il été utilisé chaque fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne au cours des 12 derniers mois ? | OUI 1 NON 2 | OUI 1 NON 2 | OUI 1 NON 2 |
| 718 | Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETIT AMI : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez mariés ? SI OUI, ENCERCLEZ '2' SI NON, ENCERCLEZ '3' | MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) | MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) | MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) |
| 719 | Il y a combien de temps que vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec cette personne ? | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/> | IL Y A JOURS . 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/> | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/> |

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| | | DERNIER PARTENAIRE SEXUEL | AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL | AVANT-AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL |
|-----|--|---|---|---|
| 720 | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'. | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/> | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/> | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 721 | Quel âge a cette personne ? | ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 |
| 722 | À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ? | OUI 1 (RETOURNEZ À 715 À COL. SUIVANTE) NON 2 (ALLEZ À 724) | OUI 1 (RETOURNEZ À 715 À COL. SUIVANTE) NON 2 (ALLEZ À 724) | |
| 723 | En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PERSONNES EST 95 OU PLUS, | | | NOMBRE DE PARTENAIRE DANS LES 12 DERNIERS MOIS .. <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 |

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|--|------------|
| 724 | VÉRIFIEZ 106: ÂGE 15-24 <input type="checkbox"/> ↓ PAS EN UNION <input type="checkbox"/> | ÂGE 25-49 <input type="checkbox"/> → | 727 |
| 725 | VÉRIFIEZ 701: PAS EN UNION <input type="checkbox"/> ↓ ACTUELLEMENT MARIÉE/ VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> | → | 727 |
| 726 | Au cours des 12 derniers mois avez-vous eu des rapports sexuels avec quelqu'un ou une relation sexuelle suivie avec quelqu'un parce qu'il vous a donné ou vous a dit qu'il vous donnerait des cadeaux, de l'argent, ou autre chose ? | OUI 1 NON 2 | |
| 727 | En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PARTENAIRE EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'. | NOMBRE DE PARTENAIRE DANS LA VIE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | |
| 728 | VÉRIFIEZ 716, PARTENAIRE LE PLUS RÉCENT (PREMIÈRE COLONNE): OUI, <input type="checkbox"/> CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ↓ NON, <input type="checkbox"/> CONDOM N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ QUESTION NON POSÉE <input type="checkbox"/> | → → | 731 731 |
| 729 | Vous avez dit que la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, un condom avait été utilisé. Quelle était la marque du condom utilisée cette fois là ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR L'EMBALLAGE. | PRUDENCE 01 COOL 02 NO LOGO 03 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98 | |

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---------|-----|-----|-------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|
| 730 | <p>Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12</p> <p>CLINIQUE MOBILE 13</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ RELAIS COMMUNAUTAIRE 14</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC 16</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21</p> <p>PHARMACIE 22</p> <p>SOIN MÉDICAL/CABINET CLINIQUE 23</p> <p>CLINIQUE MOBILE 24</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFSSIONNELLE 25</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 26</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>ONG</p> <p>CLINIQUE PLANIFICATION FAMILIALE 31</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 41</p> <p>INSTITUTION RELIGIEUSE 42</p> <p>AMIS/PARENTS 43</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS 98</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES DANS CETTE SECTION | <table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENFANTS <10</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>HOMMES ADULTES</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>FEMMES ADULTES</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI | NON | ENFANTS <10 | 1 | 2 | HOMMES ADULTES | 1 | 2 | FEMMES ADULTES | 1 | 2 | |
| | OUI | NON | | | | | | | | | | | | | |
| ENFANTS <10 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| HOMMES ADULTES | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| FEMMES ADULTES | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|---|-------------------------|
| 801 | VÉRIFIEZ 304: NI LUI, NI ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ ↓ | IL OU ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ | → 813 |
| 802 | VÉRIFIEZ 226: ENCEINTE <input type="checkbox"/> ↓ | PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE | → 804 |
| 803 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus en avoir ? | AVOIR UN AUTRE ENFANT' 1 N'EN VEUT PAS D'AUTRE 2 INDÉCISE/NE SAIT PAS 8 | → 805 → 812 |
| 804 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir (un/un autre) enfant ou préféreriez-vous ne pas (plus) avoir d'enfant ? | AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT 1 PAS D'AUTRE/AUCUN 2 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEIN[... 3 INDÉCISE/NE SAIT PAS 8 | → 807 → 813 → 811 |
| 805 | VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓ ENCEINTE <input type="checkbox"/> ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance (d'un/un autre) enfant ? b) Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ? | MOIS 1 ANNÉES 2 BIENTÔT/MAINTENAN' 993 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEIN[... 994 APRÈS LE MARIAGI 995 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998 | → 811 → 813 → 811 |
| 806 | VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓ | ENCEINTE <input type="checkbox"/> | → 812 |
| 807 | VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE? N'UTILISE PAS <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT ↓ | UTILISE <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT | → 813 |
| 808 | VÉRIFIEZ 805: '24' MOIS OU PLUS <input type="checkbox"/> OU '02' ANNÉES OU PLUS ↓ PAS <input type="checkbox"/> POSÉE ↓ '00-23' MOIS <input type="checkbox"/> OU '00-01' ANNÉE | | → 812 |
| 809 | VÉRIFIEZ 714: IL Y A DES JOURS, SEMAINES OU <input type="checkbox"/> MOIS ↓ | IL Y A DES <input type="checkbox"/> ANNÉES PAS <input type="checkbox"/> POSÉE | → 811 → 811 |

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|--|---------|
| 810 | <p>VÉRIFIEZ 804:</p> <p>VEUT AVOIR UN/ <input type="checkbox"/> UN AUTRE ENFANT ↓</p> <p>PAS D'AUTRE/ <input type="checkbox"/> AUCUN ↓</p> <p>a) Vous avez dit que dans l'immédiat, vous ne souhaitez pas (un/un autre) enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>Y-a-t-il une autre raison ?</p> <p>b) Vous avez dit que vous ne souhaitez pas (plus) d'enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>Y-a-t-il une autre raison ?</p> <p>REGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES</p> | <p>PAS MARIÉE A</p> <p>RAISONS RELATIVES À LA FÉCONDITÉ</p> <p>PAS DE RAPPORTS SEXUELS B</p> <p>RAP. SEXUELS PEU FRÉQUENTS C</p> <p>MÉNOPAUSE/HYSTÉRECTOMIE D</p> <p>NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE E</p> <p>PAS DE RÉGLES DEPUIS DERNIÈRE NAISSANCE F</p> <p>ALLAITE G</p> <p>FATALISTE H</p> <p>OPPOSITION À L'UTILISATION</p> <p>ENQUÊTÉE OPPOSÉE I</p> <p>MARI/PARTENAIRE OPPOSÉ J</p> <p>AUTRES OPPOSÉS K</p> <p>INTERDITS RELIGIEUX L</p> <p>MANQUE DE CONNAISSANCE</p> <p>NE CONNAÎT AUCUNE MÉTHODE M</p> <p>NE CONNAÎT AUCUN ENDROIT N</p> <p>RAISONS LIÉES À LA MÉTHODE</p> <p>EFFETS SECONDAIRES/ PROBLÈMES DE SANTÉ O</p> <p>PAS ACCESSIBLE/TROP ÉLOIGNÉ P</p> <p>TROP CHER Q</p> <p>MÉTHODE PRÉFÉRÉE</p> <p>NON DISPONIBLE R</p> <p>AUCUNE MÉTHODE DISPONIBLE S</p> <p>PAS PRATIQUE À UTILISER T</p> <p>INTERFÈRE AVEC LES FONCTIONS NORMALES DU CORPS U</p> <p>AUTRE X (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS Z</p> | |
| 811 | <p>VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ?</p> <p>PAS <input type="checkbox"/> POSÉE ↓ NON, N'UTILISE <input type="checkbox"/> PAS ACTUELLEMENT ↓ OUI, <input type="checkbox"/> UTILISE ACTUELLEMENT → 813</p> | | |
| 812 | <p>Pensez-vous que vous utiliserez, à un certain moment dans le futur, une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | |
| 813 | <p>VÉRIFIEZ 216:</p> <p>A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> VIVANTS ↓ AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> VIVANT ↓</p> <p>a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ?</p> <p>b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE</p> | <p>AUCUN 00 → 815</p> <p>NOMBRE <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUTRE 96 → 815 (PRÉCISEZ)</p> | |

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|----------------|--|-------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| 814 | Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ? | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center" colspan="2">GARÇONS</td> <td align="center" colspan="2">FILLES</td> <td align="center" colspan="2">PEU IMPORTE</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>NOMBRE ..</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p> | GARÇONS | | FILLES | | PEU IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARÇONS | | FILLES | | PEU IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 | Au cours des derniers mois, avez-vous : | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">OUI</th> <th align="center">NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre portable ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>e) Vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>f) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>g) Vu quelque chose sur la planification familiale dans une séance d'animation culturelle/éducative ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>h) Entendu parler de la planification familiale dans les lieux de culte (église/mosquée)?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>i) Entendu parler de la planification familiale à l'école?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI | NON | a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ? | 1 | 2 | b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ? | 1 | 2 | c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ? | 1 | 2 | d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre portable ? | 1 | 2 | e) Vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ? | 1 | 2 | f) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ? | 1 | 2 | g) Vu quelque chose sur la planification familiale dans une séance d'animation culturelle/éducative ? | 1 | 2 | h) Entendu parler de la planification familiale dans les lieux de culte (église/mosquée)? | 1 | 2 | i) Entendu parler de la planification familiale à l'école? | 1 | 2 | |
| | OUI | NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre portable ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) Vu quelque chose sur la planification familiale dans une séance d'animation culturelle/éducative ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) Entendu parler de la planification familiale dans les lieux de culte (église/mosquée)? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) Entendu parler de la planification familiale à l'école? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | A votre avis, est-il admissible ou inadmissible de parler de planification familiale: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">ADMIS-SIBLE</th> <th align="center">INAD-MISSI-BLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) À la radio ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>b) À la télévision ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>c) Dans un journal ou magazine ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>d) Sur votre portable ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>e) Sur une affiche ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>f) Dans un prospectus/brochure ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>g) A une séance d'animation culturelle/éducative ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>h) Dans les lieux de culte (église/mosquée)?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>i) A l'école?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table> | | ADMIS-SIBLE | INAD-MISSI-BLE | a) À la radio ? | 1 | 2 | b) À la télévision ? | 1 | 2 | c) Dans un journal ou magazine ? | 1 | 2 | d) Sur votre portable ? | 1 | 2 | e) Sur une affiche ? | 1 | 2 | f) Dans un prospectus/brochure ? | 1 | 2 | g) A une séance d'animation culturelle/éducative ? | 1 | 2 | h) Dans les lieux de culte (église/mosquée)? | 1 | 2 | i) A l'école? | 1 | 2 | |
| | ADMIS-SIBLE | INAD-MISSI-BLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) À la radio ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) À la télévision ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Dans un journal ou magazine ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Sur votre portable ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Sur une affiche ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Dans un prospectus/brochure ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) A une séance d'animation culturelle/éducative ? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) Dans les lieux de culte (église/mosquée)? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) A l'école? | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 | VÉRIFIEZ 701: | <p align="center"> OUI, <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT MARIÉE OUI, <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME NON, <input type="checkbox"/> PAS EN UNION </p> | → 901 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 | VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ? | <p align="center"> UTILISE <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT N'UTILISE PAS <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT PAS POSÉE <input type="checkbox"/> </p> | → 820 → 822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|---------|
| 819 | Diriez-vous que l'utilisation de la contraception est principalement votre décision, principalement celle de votre (mari/partenaire) ou est-ce une décision commune que vous avez prise ensemble ? | DÉCISION DE L'ENQUÊTÉ 1 DÉCISION DU MARI/PARTENAIRE 2 DÉCISION COMMUNE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) | → 821 |
| 820 | Diriez-vous que le fait de ne pas utiliser la contraception est principalement votre décision, principalement celle de votre (mari/partenaire) ou est-ce une décision commune que vous avez prise ensemble ? | DÉCISION DE L'ENQUÊTÉ 1 DÉCISION DU MARI/PARTENAIRE 2 DÉCISION COMMUNE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) | |
| 821 | VÉRIFIEZ 304: NI LUI, NI ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ ↓ | IL OU ELLE <input type="checkbox"/> _____ | → 901 |
| 822 | Est-ce que votre (mari/partenaire) veut le même nombre d'enfants que vous ou en veut-il plus ou moins que vous ? | MÊME NOMBRE 1 PLUS D'ENFANTS 2 MOINS D'ENFANTS 3 NE SAIT PAS 8 | |

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|--|---------|
| 901 | VÉRIFIEZ 701: ACTUELLEMENT MARIÉE/ <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> | PAS EN <input type="checkbox"/> UNION | → 909 |
| 902 | Quel âge avait votre (mari/partenaire) à son dernier anniversaire ? | ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> | |
| 903 | Est-ce que votre (mari/partenaire) a fréquenté l'école ? | OUI 1 NON 2 | → 906 |
| 904 | Quel est le plus haut niveau d'études qu'il a atteint : primaire, secondaire 1er cycle, secondaire 2nd cycle ou supérieur ? | PRIMAIRE 1 SECONDAIRE 1ER CYCLE 2 SECONDAIRE 2ND CYCLE 3 SUPÉRIEUR 4 NE SAIT PAS 8 | → 906 |
| 905 | Quelle est la [CLASSE/ANNÉE] la plus élevée qu'il a achevée à ce niveau ? SI MOINS D'1 CLASSE/ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'. | [CLASSE/ANNÉE] <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | |
| 906 | Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 7 derniers jours ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 908 |
| 907 | Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 12 derniers mois ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 909 |
| 908 | Quelle est l'occupation de votre (mari/ partenaire) ? C'est-à-dire quel genre de travail fait-il principalement ? | _____ _____ _____ <input type="text"/> | |
| 909 | En dehors de votre travail domestique, avez-vous travaillé au cours des sept derniers jours ? | OUI 1 NON 2 | → 913 |
| 910 | Comme vous le savez, certaines femmes font un travail pour lequel elles sont payées en argent ou en nature. Certaines ont un petit commerce ou une petite affaire ou travaillent sur les terres ou dans l'affaire de la famille. Au cours des sept derniers jours, avez-vous fait quelque chose de ce genre ou un autre travail ? | OUI 1 NON 2 | → 913 |
| 911 | Bien que vous n'avez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour vacances, maladie, maternité ou pour une autre raison ? | OUI 1 NON 2 | → 913 |
| 912 | Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ? | OUI 1 NON 2 | → 917 |
| 913 | Quelle est votre occupation? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ? | _____ _____ _____ <input type="text"/> | |

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|---------|
| 914 | Faites-vous ce travail pour un membre de votre famille, pour quelqu'un d'autre ou êtes-vous à votre compte ? | MEMBRE DE LA FAMILLE 1 QUELQU'UN D'AUTRE 2 À SON COMPTE 3 | |
| 915 | Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ? | TOUTE L'ANNÉE 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE 2 DE TEMPS EN TEMPS 3 | |
| 916 | Êtes-vous payée en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payée du tout ? | ARGENT SEULEMENT 1 ARGENT ET NATURE 2 NATURE SEULEMENT 3 PAS PAYÉE 4 | |
| 917 | VÉRIFIEZ 701: ACTUELLEMENT MARIÉE/VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> PAS EN UNION <input type="checkbox"/> | | → 925 |
| 918 | VÉRIFIEZ 916: CODE '1' OU '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> | | → 921 |
| 919 | Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ? | ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) | |
| 920 | Diriez-vous que vous gagnez plus que votre (mari/partenaire), moins ou à peu près la même chose ? | PLUS QUE LUI 1 MOINS QUE LUI 2 À PEU PRÈS LA MÊME CHOSE 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS 4 NE SAIT PAS 8 | → 922 |
| 921 | Habituellement, qui décide comment l'argent que votre (mari/partenaire) gagne va être utilisé: vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ? | ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) | |
| 922 | Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé: vous, votre (mari/partenaire), conjointement vous et votre (mari/partenaire) ou quelqu'un d'autre ? | ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6 | |
| 923 | Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ? | ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6 | |

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--------|-----|-----|------------------------------------|--------|----------|-----|----------------------------------|---------|------|-------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|--|
| 924 | Qui prend habituellement les décisions concernant les visites à votre famille ou parents ? | ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 | Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ? | SEULE SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMEI 2 SEULE ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4 | → 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | Avez-vous un acte de propriété pour une maison que vous possédez ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 | Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 | Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ? | SEULE SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMEI 2 SEULE ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4 | → 931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | Avez-vous un acte de propriété pour une terre que vous possédez ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 930 | Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES À CE POINT DE L'INTERVIEW (PERSONNES PRÉSENTES ET QUI ÉCOUTENT, PRÉSENTES MAIS QUI N'ÉCOUTENT PAS OU PAS PRÉSENTES). | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">PRES./</th> </tr> <tr> <th></th> <th>PRES./</th> <th>N'ÉCOUTE</th> <th>PAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ÉCOUTE.</th> <th>PAS.</th> <th>PRES.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENFANTS < 10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MARI</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRES HOMMES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRES FEMMES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | | PRES./ | | | | PRES./ | N'ÉCOUTE | PAS | | ÉCOUTE. | PAS. | PRES. | ENFANTS < 10 | 1 | 2 | 3 | MARI | 1 | 2 | 3 | AUTRES HOMMES | 1 | 2 | 3 | AUTRES FEMMES | 1 | 2 | 3 | |
| | PRES./ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRES./ | N'ÉCOUTE | PAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÉCOUTE. | PAS. | PRES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFANTS < 10 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARI | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTRES HOMMES | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTRES FEMMES | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 | Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Si elle sort sans le lui dire ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) Si elle néglige les enfants ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) Si elle argumente avec lui ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) Si elle brûle la nourriture ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI | NON | NSP | a) Si elle sort sans le lui dire ? | 1 | 2 | 8 | b) Si elle néglige les enfants ? | 1 | 2 | 8 | c) Si elle argumente avec lui ? | 1 | 2 | 8 | d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ? | 1 | 2 | 8 | e) Si elle brûle la nourriture ? | 1 | 2 | 8 | | | | | |
| | OUI | NON | NSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Si elle sort sans le lui dire ? | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Si elle néglige les enfants ? | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Si elle argumente avec lui ? | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ? | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Si elle brûle la nourriture ? | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 11. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------|--------------------|---------------------------|---------------------|---|---|---------------------------|---|---|-------------------|---|---|----------------------|---|---|--|
| 1101 | <p>Je voudrais maintenant vous poser d'autres questions concernant des problèmes de santé. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on fait une injection pour une raison quelconque ?</p> <p>SI OUI: Combien d'injections avez-vous eues ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p> | <p>NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE 00</p> | → 1104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | <p>Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre professionnel de santé ?</p> <p>SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p> | <p>NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE 00</p> | → 1104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | <p>La dernière fois que vous avez eu une injection effectuée du professionnel de santé, est-ce qu'il/elle a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf qui n'avait pas été ouvert ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | <p>Fumez-vous actuellement des cigarettes chaque jour, certains jours ou pas du tout ?</p> | <p>CHAQUE JOUR 1</p> <p>CERTAINS JOURS 2</p> <p>PAS DU TOUT 3</p> | → 1106 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | <p>En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous actuellement par jour ?</p> | <p>NOMBRE DE CIGARETTES <input type="text"/> <input type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | <p>Actuellement, est-ce que vous fumez ou utilisez un autre type de tabac chaque jour, certains jours ou pas du tout ?</p> | <p>CHAQUE JOUR 1</p> <p>CERTAINS JOURS 2</p> <p>PAS DU TOUT 3</p> | → 1108 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | <p>Actuellement, quel autre type de tabac fumez-vous ou utilisez-vous ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p> | <p>PIPES BOURRÉES DE TABAC B</p> <p>CIGARES C</p> <p>PIPE À EAU D</p> <p>TABAC À CHIQUER E</p> <p>TABAC/POUDRE À PRISER F</p> <p>TABAC À MÂCHER G</p> <p>CHIQUER DE BETEL AVEC TABAC H</p> <p>AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | <p>Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir un avis médical ou de se faire soigner. Quand vous êtes malade et que vous voulez un avis médical ou un traitement, est-ce que chacune des raisons suivantes constitue, pour vous, un problème important ou non:</p> <p>a) Obtenir la permission d'aller voir un médecin ?</p> <p>b) Obtenir l'argent nécessaire pour le conseil ou le traitement ?</p> <p>c) La distance pour atteindre l'établissement de santé ?</p> <p>d) Ne pas vouloir y aller seule ?</p> | <table> <thead> <tr> <th></th> <th>PROBLÈME IMPORTANT</th> <th>PAS UN PROBLÈME IMPORTANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) PERMISSION</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b) OBTENIR L'ARGEN'</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c) DISTANCE</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d) ALLER SEULE</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | | PROBLÈME IMPORTANT | PAS UN PROBLÈME IMPORTANT | a) PERMISSION | 1 | 2 | b) OBTENIR L'ARGEN' | 1 | 2 | c) DISTANCE | 1 | 2 | d) ALLER SEULE | 1 | 2 | |
| | PROBLÈME IMPORTANT | PAS UN PROBLÈME IMPORTANT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) PERMISSION | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) OBTENIR L'ARGEN' | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) DISTANCE | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) ALLER SEULE | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 11. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1109 | Êtes-vous couverte par une assurance médicale ? | OUI 1 NON 2 | → 1112 | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | Par quel type d'assurance médicale êtes-vous couverte ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. | MUTUELLE DE SANTÉ/ ASSURANCE SANTÉ COMMUNAUTAIRE A ASSURANCE SANTÉ PAR L'EMPLOYEUR B SÉCURITÉ SOCIALE C AUTRE ASSURANCE PRIVÉE COMMERCIALE D AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | VÉRIFIEZ COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE: MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME <input type="checkbox"/> ↓ | MÉNAGE NON SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME <input type="checkbox"/> | → 1201 | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | VÉRIFIEZ 106: | 15-29 ANS 1 30-49 ANS 2 | → 1201 | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | Est-ce que je peux mesurer maintenant votre tension artérielle ? _____ SIGNATURE ENQUÊTRICE _____ DATE | OUI, L'ENQUÊTÉE ACCEPTE 1 NON, L'ENQUÊTÉE N'ACCEPTE PAS 2 | → 1201 | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | LISEZ LES MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE. ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET LA PRESSION DIASTOLIQUE. SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE, ENREGISTREZ LA RAISON. | SYSTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> DIASTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 12. DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSER À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|-------------------|------|-------|-------------------|--------------------|---|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--|
| 1208A | VÉRIFIEZ 217 ET 218 : SÉLECTIONNEZ L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS VIVANT AVEC SA MÈRE ET ÉCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LA LIGNE. NOM DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS DE Q.212 _____ | NUMÉRO DE LA LIGNE DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS DE Q.219 <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1209 | (NOM) suit-il/elle un programme d'apprentissage éducatif ou une classe d'éveil, dans un établissement public ou privé, y compris un jardin d'enfants ou une garderie communautaire ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (NOM) à l'une des activités suivantes : SI OUI, DEMANDEZ : Qui a participé à cette activité avec (NOM) ? ENCERCLEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. a) Lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (NOM) ? b) Raconter des histoires a (NOM) ? c) Chanter des chansons a (NOM) ou avec (NOM), y compris des berceuses ? d) Emmener (NOM) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte ? e) Jouer avec (NOM) ? f) Nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (NOM) ? | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>MÈRE</th> <th>PÈRE</th> <th>AUTRE</th> <th>PERS SON NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) LIRE DES LIVRES</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>b) RACONTER DES HISTOIRES</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>c) CHANTER DES CHANSONS</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>d) PROMENER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>e) JOUER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>f) NOMMER/ COMPTER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> </tbody> </table> | | MÈRE | PÈRE | AUTRE | PERS SON NE | a) LIRE DES LIVRES | A | B | X | Y | b) RACONTER DES HISTOIRES | A | B | X | Y | c) CHANTER DES CHANSONS | A | B | X | Y | d) PROMENER | A | B | X | Y | e) JOUER | A | B | X | Y | f) NOMMER/ COMPTER | A | B | X | Y | |
| | MÈRE | PÈRE | AUTRE | PERS SON NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) LIRE DES LIVRES | A | B | X | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) RACONTER DES HISTOIRES | A | B | X | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) CHANTER DES CHANSONS | A | B | X | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) PROMENER | A | B | X | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) JOUER | A | B | X | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) NOMMER/ COMPTER | A | B | X | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la sante et le développement de votre enfant. Les enfants ne se développent pas tous de manière identique et ils n'apprennent pas tous à la même vitesse. Certains, par exemple, marchent plus tôt que d'autres. Ces questions portent sur plusieurs aspects du développement de votre enfant. Est-ce que (NOM) connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1212 | Est-ce que (NOM) peut lire au moins quatre mots simples, courants ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | Est-ce que (NOM) peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10 ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | Est-ce que (NOM) peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un bâton ou un caillou ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215 | Est-ce que (NOM) est parfois trop malade pour jouer ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 12. DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSER À |
|------|---|---|----------|
| 1216 | Est-ce que (NOM) est capable de suivre de simples instructions sur comment faire quelque chose correctement ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1217 | Quand on donne quelque chose à faire a (NOM), est-il/elle capable de le faire de manière indépendante ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1218 | Est-ce que (NOM) s'entend bien avec les autres enfants ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1219 | Est-ce que (NOM) donne des coups de pieds, mord, ou frappe les autres enfants ou les adultes ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1220 | Est-ce que (NOM) est facilement distrait ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|-----|----------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--|--|
| 1301 | <p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos frères et soeurs, c'est-à-dire sur tous les enfants nés de votre mère biologique, y compris ceux qui vivent avec vous, ceux qui vivent ailleurs et ceux qui sont décédés. Nous avons appris au cours des enquêtes précédentes qu'il peut être difficile d'établir une liste complète de tous les enfants nés de votre mère biologique. Nous travaillerons ensemble pour établir la liste la plus complète et pour vous aider à vous souvenir de tous vos frères et soeurs. Pouvez-vous maintenant me donner les noms de tous vos frères et soeurs nés de votre mère biologique ?</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>NOM</th> <th>NUMÉRO D'ORDRE</th> <th>NOM</th> <th>NUMÉRO D'ORDRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>k _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>b _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>l _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>c _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>m _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>d _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>n _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>e _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>o _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>f _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>p _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>g _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>q _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>h _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>r _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>i _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>s _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>j _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>t _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | NOM | NUMÉRO D'ORDRE | NOM | NUMÉRO D'ORDRE | a _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | k _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | b _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | l _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | c _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | m _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | d _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | n _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | e _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | o _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | f _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | p _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | g _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | q _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | h _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | r _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | i _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | s _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | j _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | t _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| NOM | NUMÉRO D'ORDRE | NOM | NUMÉRO D'ORDRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | k _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | l _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | m _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | n _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | o _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | p _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | q _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | r _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | s _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | t _____ | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | <p>VÉRIFIEZ 1301:</p> <p>AU MOINS UN FRÈRE <input type="checkbox"/> OU UNE SOEUR LISTÉ</p> <p>AUCUN FRÈRE <input type="checkbox"/> OU SOEUR LISTÉ</p> | | → 1304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | <p>LISEZ LEURS NOMS À L'ENQUÊTÉE ET APRÈS LE DERNIER, DEMANDEZ : Y a-t-il d'autres frères et soeurs de la même mère que vous n'avez pas cités ?</p> <p>NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/></p> <p>→ INSCRIVEZ D'AUTRES FRÈRES ET SOEURS À 1301.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | <p>Il arrive que des personnes oublient de citer des enfants de leur mère biologique parce qu'ils ne vivent pas avec eux ou parce qu'ils ne se voient pas très souvent. Y a-t-il des frères ou soeurs qui ne vivent pas avec vous que vous n'avez pas cités ?</p> <p>NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/></p> <p>→ INSCRIVEZ D'AUTRES FRÈRES ET SOEURS À 1301.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | <p>Il arrive parfois que des personnes oublient de citer des enfants de leur mère biologique parce qu'ils sont décédés. Avez-vous des frères et soeurs qui sont décédés que vous n'avez pas cités ?</p> <p>NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/></p> <p>→ INSCRIVEZ D'AUTRES FRÈRES ET SOEURS À 1301.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | <p>Certaines personnes ont des frères ou soeurs de la même mère mais d'un père différent. Y a-t-il des frères ou soeurs nés de votre mère biologique mais qui ont un père biologique différent que vous n'avez pas cités ?</p> <p>NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/></p> <p>→ INSCRIVEZ D'AUTRES FRÈRES ET SOEURS À 1301.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | <p>COMPTEZ LE NOMBRE DE FRÈRES OU DE SOEURS ENREGISTRÉS À 1301.</p> | TOTAL DE FRÈRES ET SOEURS ... <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|--|--|---------|
| 1308 | VÉRIFIEZ 1307: Juste pour être sûre que j'ai le bon résultat : Votre mère a eu au TOTAL _____ naissances, sans vous compter, durant sa vie. Est-ce correct ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> | VÉRIFIEZ ET CORRIGEZ 1301 ET/OU 1307. | |
| 1309 | VÉRIFIEZ 1307: AU MOINS UN FRÈRE <input type="checkbox"/> OU UNE SOEUR LISTÉ | AUCUN FRÈRE <input type="checkbox"/> OU SOEUR LISTÉ | 1401 |
| 1310 | Dites-mois, s'il vous plait, quel est le frère ou la soeur qui est né le premier (la première) ? Et qui a été le suivant/la suivante ? ENREGISTREZ '01' POUR LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301 POUR LE PREMIER FRÈRE OU SOEUR, '02' POUR LE SECOND ET AINSI DE SUITE JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ ENREGISTRÉ LE NUMÉRO D'ORDRE POUR TOUS LES FRÈRES ET SOEURS. | | |
| 1311 | Combien de naissances votre mère a-t-elle eues avant votre propre naissance ? | NOMBRE DE NAISSANCES PRÉCÉDENTES <input type="text"/> <input type="text"/> | |

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

| | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1312 | LISTEZ LES FRÈRES ET SOEURS SELON LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301. POSEZ 1313 JUSQU'À 1324 POUR UN FRÈRE OU UNE SOEUR AVANT DE PASSER AU FRÈRE OU SOEUR SUIVANT. S'IL Y A PLUS DE 12 FRÈRES ET SOEURS, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE. | | | | | | |
| 1313 | NOM DU FRÈRE OU DE LA SOEUR. | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) |
| 1314 | (NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ? | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 |
| 1315 | Est-ce que (NOM) est toujours en vie ? | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (02) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (03) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (04) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (05) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (06) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (07) ← |
| 1316 | Quel âge a (NOM) ? | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (02) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (03) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (04) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (05) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (06) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (07) |
| 1317 | Combien y a-t-il d'années que (NOM) est décédé(e) ? | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 1318 | Quel âge avait (NOM) lorsqu'il/elle est décédé(e) ? SI NE SAIT PAS, INSISTEZ ET POSEZ D'AUTRES QUESTIONS POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 |
| 1319 | (NOM) était-elle enceinte quand elle est décédée ? | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 |
| 1320 | Est-ce que (NOM) est décédée durant un accouchement ? | OUI 1 ALLEZ À (02) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (03) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (04) ← NON 2 | YES 1 ALLEZ À (05) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (06) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (07) ← NON 2 |
| 1321 | Est-ce que (NOM) est décédée dans les deux mois qui ont suivi la fin d'une grossesse ou un accouchement ? | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← |
| 1322 | Combien de jours après la fin de la grossesse ou l'accouchement (NOM) est-elle décédée ? | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1312 | LISTEZ LES FRÈRES ET SOEURS SELON LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301. POSEZ 1313 JUSQU'À 1324 POUR UN FRÈRE OU UNE SOEUR AVANT DE PASSER AU FRÈRE OU SOEUR SUIVANT. S'IL Y A PLUS DE 12 FRÈRES ET SOEURS, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE. | | | | | | |
| 1313 | NOM DU FRÈRE OU DE LA SOEUR. | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) |
| 1323 | Est-ce que le décès de (NOM) était dû à un acte de violence ? | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (02) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (03) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (04) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (05) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (06) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (07) ← |
| 1324 | Est-ce que le décès de (NOM) était dû à un accident ? | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (02) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (03) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (04) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (05) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (06) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (07) |
| SI PLUS AUCUN FRÈRE OU SOEUR, ALLER À SECTION SUIVANTE. | | | | | | | |

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

| | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1312 | LISTEZ LES FRÈRES ET SOEURS SELON LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301. POSEZ 1313 JUSQU'À 1324 POUR UN FRÈRE OU UNE SOEUR AVANT DE PASSER AU FRÈRE OU SOEUR SUIVANT. S'IL Y A PLUS DE 12 FRÈRES ET SOEURS, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE. | | | | | | |
| 1313 | NOM DU FRÈRE OU DE LA SOEUR. | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1314 | (NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ? | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 | MASC. 1 FEM. 2 |
| 1315 | Est-ce que (NOM) est toujours en vie ? | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (08) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (09) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (10) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (11) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (12) ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (13) ← |
| 1316 | Quel âge a (NOM) ? | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (08) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (09) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (10) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (11) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (12) | <input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (13) |
| 1317 | Combien y a-t-il d'années que (NOM) est décédé(e) ? | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 1318 | Quel âge avait (NOM) lorsqu'il/elle est décédé(e) ? SI NE SAIT PAS, INSISTEZ ET POSEZ D'AUTRES QUESTIONS POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 | <input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323 |
| 1319 | (NOM) était-elle enceinte quand elle est décédée ? | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2 |
| 1320 | Est-ce que (NOM) est décédée durant un accouchement ? | OUI 1 ALLEZ À (08) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (09) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (10) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (11) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (12) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (13) ← NON 2 |
| 1321 | Est-ce que (NOM) est décédée dans les deux mois qui ont suivi la fin d'une grossesse ou un accouchement ? | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← | OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ← |
| 1322 | Combien de jours après la fin de la grossesse ou l'accouchement (NOM) est-elle décédée ? | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1312 | LISTEZ LES FRÈRES ET SOEURS SELON LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301. POSEZ 1313 JUSQU'À 1324 POUR UN FRÈRE OU UNE SOEUR AVANT DE PASSER AU FRÈRE OU SOEUR SUIVANT. S'IL Y A PLUS DE 12 FRÈRES ET SOEURS, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE. | | | | | | |
| 1313 | NOM DU FRÈRE OU DE LA SOEUR. | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1323 | Est-ce que le décès de (NOM) était dû à un acte de violence ? | OUI 1 ALLEZ À (08) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (09) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (10) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (11) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (12) ← NON 2 | OUI 1 ALLEZ À (13) ← NON 2 |
| 1324 | Est-ce que le décès de (NOM) était dû à un accident ? | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (08) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (09) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (10) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (11) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (12) | OUI 1 NON 2 ALLEZ À (13) |
| SI PLUS AUCUN FRÈRE OU SOEUR, ALLER À SECTION SUIVANTE. | | | | | | | |

SECTION 10. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|--|------------------|
| 1000 | VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: MÉNAGE SÉLECTIONNÉE POUR L'ENQUÊTE HOMME ? MÉNAGE SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> POUR L'ENQUÊTE HOMME MÉNAGE NON SÉLECTIONNÉE <input type="checkbox"/> POUR L'ENQUÊTE HOMME | | → 1500 |
| 1001 | Je voudrais maintenant que nous parlions d'un autre sujet. Avez-vous déjà entendu parler de VIH ou de sida ? | OUI 1 NON 2 | → 1042 |
| 1002 | Le VIH est le virus qui cause le sida. Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en ayant juste un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a aucun autre partenaire sexuel ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1003 | Est-ce qu'on peut contracter le VIH par les piqûres de moustiques ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1004 | Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1005 | Est-ce qu'on peut contracter le VIH en partageant la nourriture avec une personne qui a le VIH ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1006 | Est-ce qu'on peut contracter le VIH par sorcellerie ou par des moyens surnaturels ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1007 | Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le VIH ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1008 | Est-ce que le VIH peut être transmis de la mère à son enfant : | OUI NON NSP a) DURANT LA GROSSESSE 1 2 8 b) DURANT ACCOUCHE 1 2 8 c) EN ALLAITANT 1 2 8 | |
| 1009 | VÉRIFIEZ 1008: AU MOINS <input type="checkbox"/> UN 'OUI' AUTRE <input type="checkbox"/> | | → 1011 |
| 1010 | Y a-t-il des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière/sage femme peut donner à une femme infectée par le VIH pour réduire le risque de transmission à son enfant ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1011 | VÉRIFIEZ 208 ET 215: DERNIÈRE NAISSANCE EN 2015-2017 <input type="checkbox"/> PAS DE NAISSANCE <input type="checkbox"/> DERNIÈRE NAISSANCE EN 2014 <input type="checkbox"/> | | → 1027 → 1027 |
| 1012 | VÉRIFIEZ 408 POUR DERNIÈRE NAISSANCE: A EU DES SOINS PRÉNATALS <input type="checkbox"/> PAS DE SOINS PRÉNATALS <input type="checkbox"/> | | → 1020 |

SECTION 10. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|-----|-----|-----|-------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|--|
| 1013 | VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUS LES EFFORTS POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | Au cours de l'une des visites prénatales pour votre dernière naissance, est-ce que l'on vous a parlé : a) Des bébés qui contractent le VIH de leur mère ? b) Des choses que vous pouvez faire pour ne pas contracter le VIH ? c) Effectuer un test du VIH ? | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) VIH DE LA MÈRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) CHOSES À FAIRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) TEST DU VIH</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI | NON | NSP | a) VIH DE LA MÈRE | 1 | 2 | 8 | b) CHOSES À FAIRE | 1 | 2 | 8 | c) TEST DU VIH | 1 | 2 | 8 | |
| | OUI | NON | NSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) VIH DE LA MÈRE | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) CHOSES À FAIRE | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) TEST DU VIH | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | Dans le cadre des visites prénatales, est-ce que l'on vous a proposé d'effectuer un test du VIH ? | OUI 1 NON 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous effectué un test du VIH dans le cadre de vos soins prénatals ? | OUI 1 NON 2 | → 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016A | Toutes les femmes sont censées recevoir des conseils avant effectué le test. Avant d'effectuer votre test, avez-vous reçu des conseils ? | OUI 1 NON 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT) | SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 12 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 13 CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE .. 14 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 15 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ 21 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 22 PHARMACIE 23 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 24 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE MAISON 31 LIEU DE TRAVAIL 32 CENTRE DE DÉTENTION 33 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018 | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous eu les résultats du test ? | OUI 1 NON 2 | → 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | Toutes les femmes sont censées recevoir des conseils après avoir effectué le test. Après avoir effectué votre test, avez-vous reçu des conseils ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | VÉRIFIEZ 430 POUR DERNIÈRE NAISSANCE: UN CODE <input type="checkbox"/> '21-36' ENCERCLÉ ↓ AUTRE <input type="checkbox"/> → 1024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | Entre le moment où vous êtes arrivée pour accoucher mais avant que l'enfant naisse, vous a-t-on proposé de faire un test du VIH ? | OUI 1 NON 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 10. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|---|---------|
| 1022 | Je ne veux pas connaître les résultats mais vous a-t-on fait un test du VIH à ce moment-là ? | OUI 1 NON 2 | → 1024 |
| 1023 | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous eu les résultats du test ? | OUI 1 NON 2 | → 1025 |
| 1024 | VÉRIFIEZ 1016: OUI <input type="checkbox"/> ↓ NON OU <input type="checkbox"/> PAS POSÉE | | → 1027 |
| 1025 | Avez-vous effectué un test du VIH depuis le moment où vous avez fait un test durant votre grossesse ? | OUI 1 NON 2 | → 1028 |
| 1026 | Il y a combien de mois que vous avez effectué votre test du VIH le plus récent ? | IL Y A DES MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> DEUX ANNÉES OU PLUS 95 | → 1033 |
| 1027 | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous déjà fait un test du VIH ? | OUI 1 NON 2 | → 1031 |
| 1028 | Il y a combien de mois que vous avez effectué votre test du VIH le plus récent ? | IL Y A DES MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> DEUX ANNÉES OU PLUS 95 | |
| 1029 | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous eu les résultats du test ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1030 | Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT) | SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12 CENTRE DE DEPISTAGE VOLONTAIRE CLINIQUE DE PLAN 13 SERVICES MOBILES DE TEST 14 AU ET CONSEIL 15 _____ 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ 21 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 22 PHARMACIE 23 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 24 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE MAISON 31 LIEU DE TRAVAIL 32 CENTRE DE DÉTENTION 33 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | → 1033 |
| 1031 | Connaissez-vous un endroit où les gens peuvent aller pour faire un test du VIH ? | OUI 1 NON 2 | → 1033 |

SECTION 10. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|---|---------|
| 1032 | <p>Où est-ce ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT B</p> <p>CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL C</p> <p>CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE D</p> <p>SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ G</p> <p>CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL H</p> <p>PHARMACIE I</p> <p>SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL J</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ K</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> | |
| 1033 | Avez-vous entendu parler de tests que les gens peuvent utiliser pour se tester eux-mêmes pour le VIH ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | → 1035 |
| 1034 | Vous êtes-vous testée vous-même en utilisant un kit de test ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | |
| 1035 | Est-ce que vous achèteriez des légumes frais à un marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne a le VIH ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p> | |
| 1036 | Pensez-vous que des enfants vivant avec le VIH devraient être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p> | |
| 1037 | Pensez-vous que les gens hésitent à faire un test du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat de leur test était VIH positif ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p> | |
| 1038 | Est-ce que les gens parlent mal de ceux qui vivent avec le VIH ou dont on pense qu'ils vivent avec le VIH ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p> | |
| 1039 | Est-ce que les gens qui vivent avec le VIH, ou dont on pense qu'ils vivent avec le VIH, perdent le respect des autres ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p> | |
| 1040 | Êtes-vous d'accord ou non avec la déclaration suivante : j'aurais honte si quelqu'un de ma famille avait le VIH. | <p>D'ACCORD 1</p> <p>PAS D'ACCORD 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p> | |
| 1041 | Avez-vous peur de contracter le VIH si vous étiez en contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>DIT QU'ELLE A LE VIH 3</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p> | |

SECTION 10. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|--|--|---------|
| 1042 | <p>VÉRIFIEZ 1001:</p> <p>A ENTENDU PARLER <input type="checkbox"/> PAS ENTENDU PARLER <input type="checkbox"/> DU VIH OU DU SIDA ↓ DU VIH OU DU SIDA ↓</p> <p>a) Mis à part le sida, avez-vous entendu parler d'autres infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ?</p> <p>b) Avez-vous entendu parler d'infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | |
| 1043 | <p>VÉRIFIEZ 713:</p> <p>A EU DES RAPPORTS <input type="checkbox"/> N'A JAMAIS EU DE <input type="checkbox"/> SEXUELS ↓ RAPPORTS SEXUELS →</p> | | → 1051 |
| 1044 | <p>VÉRIFIEZ 1042: A ENTENDU PARLER D'AUTRES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ?</p> <p>OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/></p> | | → 1046 |
| 1045 | <p>J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé au cours des 12 derniers mois. Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu une maladie que vous avez contractée par contact sexuel ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | |
| 1046 | <p>Il arrive parfois que les femmes aient des pertes vaginales, anormales et malodorantes. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des pertes vaginales anormales et malodorantes ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | |
| 1047 | <p>Il arrive parfois que les femmes aient une plaie ou un ulcère génital. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une plaie ou un ulcère génital ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | |
| 1048 | <p>VÉRIFIEZ 1045, 1046, ET 1047:</p> <p>A EU UNE <input type="checkbox"/> N'A PAS EU <input type="checkbox"/> INFECTION ↓ D'INFECTION OU (UN 'OUI') NE SAIT PAS →</p> | | → 1051 |
| 1049 | <p>La dernière fois que vous avez eu (PROBLEME DÉCLARÉ À 1045/1046/1047), avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | → 1051 |

SECTION 10. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|---|--|---------|
| 1050 | <p>Où êtes-vous allée ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT B</p> <p>CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL C</p> <p>CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE D</p> <p>SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ G</p> <p>CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL H</p> <p>PHARMACIE I</p> <p>SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL J</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ K</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE L</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> | |
| 1051 | Si une femme sait que son mari est atteint d'une maladie qu'elle peut contracter au cours de rapports sexuels, pensez-vous qu'il est justifié qu'elle lui demande qu'ils utilisent un condom quand ils ont des rapports sexuels ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | |
| 1052 | Est-ce que vous pensez qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | |
| 1053 | <p>VÉRIFIEZ 701:</p> <p>ACTUELLEMENT MARIÉE/ <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME ↓</p> <p>PAS EN UNION <input type="checkbox"/> → 1401</p> | | |
| 1054 | Pouvez-vous refuser d'avoir des rapports sexuels avec votre (mari/partenaire) quand vous ne souhaitez pas en avoir ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>ÇA DÉPEND/PAS SÛR 8</p> | |
| 1055 | Pourriez-vous demander à votre (mari/partenaire) d'utiliser un condom si vous vouliez qu'il en utilise un ? | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>ÇA DÉPEND/PAS SÛR 8</p> | |

SECTION 14. MALADIES NON TRANSMISSIBLES POUR LE QUESTIONNAIRE FEMME

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|--|---|---------|
| 1401 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé a déjà vérifié votre tension artérielle ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1402 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ? | OUI 1 NON 2 | → 1406 |
| 1403 | Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1404 | Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1405 | Est-ce que vous prenez actuellement des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1406 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé a déjà mesuré le niveau de sucre dans votre sang ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 1407 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ? | OUI 1 NON 2 | → 1411 |
| 1408 | Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1409 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre niveau de sucre ou de diabète ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1410 | Est-ce que vous prenez des médicaments pour contrôler votre niveau élevé de sucre dans le sang ou votre diabète ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1411 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ? | OUI 1 NON 2 | → 1413 |
| 1412 | Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1413 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique telle que l'asthme ? | OUI 1 NON 2 | → 1415 |
| 1414 | Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1415 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un cancer ou une tumeur ? | OUI 1 NON 2 | → 1417 |
| 1416 | Suivez-vous actuellement un traitement pour un cancer ou une tumeur ? | OUI 1 NON 2 | |

SECTION 14. MALADIES NON TRANSMISSIBLES POUR LE QUESTIONNAIRE FEMME

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|--|--|------------------|
| 1417 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous faisiez une dépression ? | OUI 1 NON 2 | → 1419 |
| 1418 | Suivez-vous actuellement un traitement pour dépression ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1419 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez de l'arthrite ? | OUI 1 NON 2 | → 1421 |
| 1420 | Suivez-vous actuellement un traitement pour l'arthrite ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1421 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une autre maladie chronique, c'est à-dire une autre maladie de longue durée ? | OUI 1 NON 2 (SPÉCIFIEZ LA MALADIE CHRONIQUE) | → 1423 |
| 1422 | Suivez-vous actuellement un traitement pour (MALADIE CHRONIQUE À 1421) ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1423 | Avez-vous entendu parler du cancer du col de l'utérus ? | OUI 1 NON 2 | → 1425 |
| 1424 | Avez-vous entendu parler de tests pour le cancer du col de l'utérus ? | OUI 1 NON 2 | |
| 1425 | Je vais, maintenant, vous poser des questions sur des tests qu'un professionnel de santé peut faire pour détecter un cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus est la partie qui relie l'utérus au vagin. Pour effectuer un test du cancer du col de l'utérus, on demande à la femme de s'allonger sur le dos en écartant les jambes. Ensuite, en utilisant une petite brosse ou un coton-tige, le professionnel de santé prélève à l'intérieur de l'utérus un échantillon. L'échantillon est envoyé dans un laboratoire pour être testé. Ce test est appelé un frottis Pap ou un test PVH. Il y a une autre méthode qui est appelée IVA ou Inspection Visuelle après application d'Acide ascétique. Au cours de ce test, le professionnel de santé applique du vinaigre dilué sur le col utérin pour voir si une réaction se produit. | | |
| 1426 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà fait un test de dépistage du cancer du col de l'utérus ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 1430 |
| 1427 | Quand a eu lieu votre dernier test pour le cancer de l'utérus ? SI MOINS D'1 ANNÉE, INSCRIVEZ '00'. | ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | |
| 1428 | Quel était le résultat de votre dernier test pour le cancer du col de l'utérus ? | NORMAL / NÉGATIF 1 ANORMAL / POSITIF 2 PAS CLAIR / NON CONCLUANT 3 N'A PAS REÇU DE RÉSULTATS 4 NE SAIT PAS 8 | → 1430 → 1430 |
| 1429 | Avez-vous suivi un traitement pour le col de l'utérus ou avez-vous fait des visites de suivi à cause des résultats du test ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |

SECTION 14. MALADIES NON TRANSMISSIBLES (TENSION ARTÉRIELLE MOYENNE)

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODE | ALLEZ À | |
|------|---|--|---|--------|
| 1430 | VÉRIFIEZ Q123D ET Q1115: PRESSIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q123D ET À Q1115 | PRESSIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉES À Q123D ET À Q1115 | → 1436 | |
| 1431 | ENREGISTREZ ET CALCULEZ LA MOYENNE DE LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DE LA PRESSION DIASTOLIQUE DE Q123D ET Q1115. | | | |
| 1432 | MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE Q123D | SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 1433 | MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE Q1115 | SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 1434 | SOMME DE Q1432 + Q1433 | SOMME SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | SOMME DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 1435 | DIVISEZ Q1434 PAR 2 | MOYENNE SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | MOYENNE DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | → 1440 |
| 1436 | VÉRIFIEZ Q123D PRESSION SYSTOLIQUE <u>ET</u> PRESSION DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉES À Q123D | LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q123D | | → 1439 |
| 1437 | VÉRIFIEZ Q1115: PRESSION SYSTOLIQUE ET PRESSION DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉE À Q1115 | LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q1115 | | → 1439 |
| 1438 | VÉRIFIEZ Q106F: PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q106F | LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE <u>NON</u> ENREGISTRÉES À Q106F | | → 1500 |
| 1439 | ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE. | SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |

SECTION 14. MALADIES NON TRANSMISSIBLES (TENSION ARTÉRIELLE MOYENNE)

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODE | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------|---------|----------------|---|--|----------------|-------|---------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|---|-------------|----------------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1440 | <p>UTILISEZ LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR DÉTERMINER LE CODE CORRECT POUR ENREGISTRER DANS LE RAPPORT SUR LA TENSION ARTÉRIELLE ET SUR LE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE .</p> <p>ENCERCLEZ LA LIGNE OÙ VOUS TROUVEZ LA VALEUR DE LA PRESSION SYSTOLIQUE DE Q1435 OU Q1439 .</p> <p>ENSUITE, ENCERCLEZ LA COLONNE OÙ VOUS TROUVEZ LA VALEUR DE LA PRESSION DIASTOLIQUE DE Q1435 OU Q1439 .</p> <p>LA VALEUR QUI SE TROUVE À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE ENCERCLÉES DANS LE TABLEAU SERA UTILISÉE POUR COMPLÉTER Q1441.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE</th> <th colspan="6">PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE</th> </tr> <tr> <th><84</th> <th>85-89</th> <th>90-99</th> <th>100-109</th> <th>110-119</th> <th>≥ 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤129</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>130-139</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>140-159</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>160-179</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>180-209</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>≥ 210</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE | PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE | | | | | | <84 | 85-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | ≥ 120 | ≤129 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 130-139 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 140-159 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 160-179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 180-209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ≥ 210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE | PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <84 | 85-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | ≥ 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤129 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130-139 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140-159 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160-179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180-209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥ 210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | <p>ENREGISTREZ DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS LE NOMBRE QUE VOUS AVEZ ENCERCLÉ À Q1440. UTILISEZ ENSUITE LES INSTRUCTIONS À DROITE DE CE NOMBRE POUR COMPLÉTER LE RAPPORT SUR LA TENSION ARTÉRIELLE ET LE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE POUR L'ENQUÊTÉE. DONNEZ À L'ENQUÊTÉE LE FORMULAIRE ET RÉPONDEZ À TOUTES SES QUESTIONS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE</th> <th>CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE DANS :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NORMALE</td> <td>24 MOIS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL</td> <td>12 MOIS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL</td> <td>2 MOIS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MODÉRÉMENT ÉLEVÉE</td> <td>1 MOIS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TRÈS ÉLEVÉE</td> <td>7 JOURS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE</td> <td>AUJOURD'HUI</td> </tr> </tbody> </table> | | CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE | CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE DANS : | 1 | NORMALE | 24 MOIS | 2 | À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL | 12 MOIS | 3 | AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL | 2 MOIS | 4 | MODÉRÉMENT ÉLEVÉE | 1 MOIS | 5 | TRÈS ÉLEVÉE | 7 JOURS | 6 | EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE | AUJOURD'HUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE | CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE DANS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NORMALE | 24 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL | 12 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL | 2 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MODÉRÉMENT ÉLEVÉE | 1 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TRÈS ÉLEVÉE | 7 JOURS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE | AUJOURD'HUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

| No. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|---------------------------|-----|---------------------------|--------------|---|-----|-----|--------------|---------------------|-----|--|------------------|-----|-----|---|--------------------|---|---|-----|--------------------|---|---|------------------------------------|---|-----|-----|---|---|--|
| 1500 | <p>VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: MÉNAGE ET FEMME SÉLECTIONNÉE POUR LE MODULE VD ?</p> <p>MÉNAGE ET FEMME SÉLECTIONNÉE <input type="checkbox"/> POUR CETTE SECTION ↓</p> <p>MÉNAGE ET FEMME <input type="checkbox"/> NON SÉLECTIONNÉE</p> | | → 1533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | <p>VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES: NE PAS CONTINUEZ TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS CERTAINE D'ÊTRE EN PRIVÉ.</p> <p>VOUS ÊTES EN PRIVÉ 1 ↓</p> <p>IMPOSSIBLE D'ÊTRE EN PRIVÉ 2 →</p> | | → 1532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501A | <p>LISEZ À L'ENQUÊTÉE :</p> <p>Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant certains autres aspects importants de la vie d'une femme. Vous allez trouver certaines de ces questions très personnelles. Cependant, vos réponses sont très importantes pour nous aider à connaître la condition des femmes au BÉNIN. Je vous garantis que vos réponses resteront complètement confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. Je tiens aussi à vous assurer que personne d'autre que vous dans votre ménage ne saura que l'on vous a posé ces questions. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | <p>VÉRIFIEZ 701 ET 702:</p> <p>ACTUELLEMENT EN UNION/ VIVANT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>PRÉCÉDEMMENT EN UNION/ A VÉCU AVEC UN HOMME (LISEZ AU PASSÉ ET UTILISEZ "DERNIER" AVEC MARI/PARTENAIRE) ↓</p> <p>JAMAIS EN UNION/ JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> →</p> | | → 1516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1503 | <p>Tout d'abord, je vais vous poser des questions sur des situations auxquelles certaines femmes sont confrontées. Dites-moi, s'il vous plaît, si les situations suivantes s'appliquent à vos relations avec votre (dernier) (mari/partenaire) ?</p> <p>a) Il (est/était) jaloux ou en colère si vous (parlez/parliez) à d'autres hommes ?</p> <p>b) Il vous (accuse/accusait) souvent d'être infidèle ?</p> <p>c) Il ne vous (permet/permettait) pas de voir vos amies ?</p> <p>d) Il (essaye/essayait) de limiter vos contacts avec votre famille ?</p> <p>e) Il (insiste/insistait) pour savoir où vous (êtes/étiez) à tous moments ?</p> | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">OUI</th> <th align="center">NON</th> <th align="center">NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JALOUX</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">8</td> </tr> <tr> <td>ACCUSE</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">8</td> </tr> <tr> <td>VOIR AMIES</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">8</td> </tr> <tr> <td>VOIR FAMILLE</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">8</td> </tr> <tr> <td>OÙ VOUS ÊTES</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">8</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI | NON | NSP | JALOUX | 1 | 2 | 8 | ACCUSE | 1 | 2 | 8 | VOIR AMIES | 1 | 2 | 8 | VOIR FAMILLE | 1 | 2 | 8 | OÙ VOUS ÊTES | 1 | 2 | 8 | | | | | | |
| | OUI | NON | NSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JALOUX | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCUSE | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOIR AMIES | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOIR FAMILLE | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OÙ VOUS ÊTES | 1 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504 | <p>Maintenant, je voudrais vous poser d'autres questions sur vos relations avec votre (dernier) (mari/partenaire).</p> <p>A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire) :</p> <p>a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ?</p> <p>b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ?</p> <p>c) Vous insulte ou vous rabaisse ?</p> | <p>B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">DÉJÀ ARRIVÉ</th> <th colspan="3">TEMPS EN PAS DANS 12 MOIS</th> </tr> <tr> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>SOUVENT</th> <th>TEMPS DERNIERS MOIS</th> <th>PAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2 ↓</td> <td align="center">→ 1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">3</td> </tr> <tr> <td>b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2 ↓</td> <td align="center">→ 1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">3</td> </tr> <tr> <td>c) Vous insulte ou vous rabaisse ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2 ↓</td> <td align="center">→ 1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">3</td> </tr> </tbody> </table> | | DÉJÀ ARRIVÉ | | TEMPS EN PAS DANS 12 MOIS | | | OUI | NON | SOUVENT | TEMPS DERNIERS MOIS | PAS | a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ? | 1 | 2 ↓ | → 1 | 2 | 3 | b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ? | 1 | 2 ↓ | → 1 | 2 | 3 | c) Vous insulte ou vous rabaisse ? | 1 | 2 ↓ | → 1 | 2 | 3 | |
| | DÉJÀ ARRIVÉ | | | TEMPS EN PAS DANS 12 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OUI | NON | SOUVENT | TEMPS DERNIERS MOIS | PAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ? | 1 | 2 ↓ | → 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ? | 1 | 2 ↓ | → 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Vous insulte ou vous rabaisse ? | 1 | 2 ↓ | → 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

| No. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSEZ À |
|------|--|--|--|
| 1505 | A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire) vous ait fait l'une des choses suivantes : | B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, de temps en temps ou pas du tout ? | |
| | | DÉJÀ ARRIVÉ | TEMPS EN PAS DANS 12 TEMPS DERNIERS MOIS |
| | | SOUVENT | |
| | a) vous bouscule, secoue ou vous jette quelque chose ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | b) vous gifle ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | c) vous torde le bras ou vous tire les cheveux ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | d) vous frappe à coups de poings ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | e) vous donne des coups de pieds, vous traîne par terre ou vous batte ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | f) essaye de vous étrangler ou de vous brûler avec l'intention de le faire ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | g) vous menace ou vous attaque avec un couteau, un fusil ou une autre arme ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | h) vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne le vouliez pas ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | i) vous force physiquement à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| | j) vous force en vous menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ? | OUI 1 NON 2 | → 1 2 3 |
| 1506 | VÉRIFIEZ 1505A (a-j): AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' ↓ | PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' → | 1509 |
| 1507 | Combien de temps (après votre mariage/après avoir commencé à vivre) avec (dernier) (mari/partenaire), cet acte s'est-il produit ou ces actes se sont-ils produits pour la première fois ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00'. | NOMBRE D'ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> AVANT MARIAGE/AVANT VIVRE ENSEMBLE 95 | |
| 1508 | Est-ce qu'à la suite d'actes commis envers vous par votre (dernier) (mari/partenaire), il vous est arrivé d'avoir : | | |
| | a) des coupures, des hématomes ou des douleurs ? | OUI 1 NON 2 | |
| | b) des hématomes aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures ? | OUI 1 NON 2 | |
| | c) des blessures profondes, des os cassés, des dents cassées ou d'autres blessures graves ? | OUI 1 NON 2 | |

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

| No. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSEZ À |
|------|---|--|----------|
| 1509 | Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de battre, de gifler, de donner des coups de pied ou de faire quelque chose d'autre avec l'intention de blesser physiquement votre (dernier) (mari/partenaire) alors qu'il ne vous battait pas et ne vous faisait pas de mal physiquement ? | OUI 1 NON 2 | → 1511 |
| 1510 | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de faire cela à votre (dernier) (mari/partenaire) : souvent, de temps en temps ou pas du tout ? | SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 PAS DU TOUT 3 | |
| 1511 | Est-ce que votre (dernier) (mari/partenaire) boit (buvait) de l'alcool ? | OUI 1 NON 2 | → 1513 |
| 1512 | Combien de fois lui arrive-t-il (lui est-il arrivé) d'être ivre : souvent, de temps en temps ou jamais ? | SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 JAMAIS 3 | |
| 1513 | Vous est-il arrivé d'avoir peur (d'avoir eu peur) de votre (dernier) (mari/partenaire) : de nombreuses fois, parfois ou jamais ? | DE NOMBREUSES FOIS 1 PARFOIS PEUR 2 JAMAIS PEUR 3 | |
| 1514 | VÉRIFIEZ 709: MARIÉE PLUS <input type="checkbox"/> D'UNE FOIS ↓ MARIÉE SEULEMENT <input type="checkbox"/> UNE FOIS | | → 1516 |
| 1515 | A. Jusqu'ici, nous avons parlé du comportement de votre (actuel/dernier) (mari/partenaire). Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le comportement de votre ou d'un de vos (mari(s)/partenaire(s)) précédent(s) . a) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pieds ou vous fasse quelque chose pour vous blesser physiquement ? b) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous force physiquement à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels contre votre volonté ? c) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous humilie devant d'autres personnes, menace de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche, vous insulte ou vous rabaisse ? | B. Il y a combien de temps que cela s'est produit ? DÉJÀ ARRIVÉ IL Y A 0-11 MOIS IL Y A 12 MOIS OU PLUS NE SE PAS SOUVIENT PAS OUI 1 NON 2 ↓ OUI 1 NON 2 ↓ OUI 1 NON 2 ↓ | |
| 1516 | VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ a) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un d'autre que (votre/un) (mari/partenaire) vous a battu, giflé, donné des coups de pieds ou fait quelque chose pour vous faire mal physiquement ? b) JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ c) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un vous a battu, giflé ou donné des coups de pieds ou fait quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement ? | OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3 | → 1519 |

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

| No. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSEZ À |
|-------|--|--|-------------------|
| 1517 | Qui vous a agressé de cette façon ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. | MÈRE/ FEMME DU PÈRE A PÈRE/ MARI DE LA MÈRE B SOEUR/FRÈRE C FILLE/FILS D AUTRE PARENT E PETIT AMI ACTUEL F PETIT AMI PRÉCÉDEN G BELLE-MÈRE H BEAU-PÈRE I AUTRE BEAU-PARENT J ENSEIGNANT K EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL L POLICE/SOLDAT M AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) | |
| 1518 | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé que (cette personne/ces personnes) vous agresse (vous agressent) physiquement : souvent, de temps en temps ou pas du tout ? | SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 PAS DU TOUT 3 | |
| 1519 | VÉRIFIEZ 201, 226 ET 230: A DÉJÀ ÉTÉ ENCEINTE <input type="checkbox"/> (OUI À 201 OU 226 OU 230) ↓ | N'A JAMAIS ÉTÉ ENCEINTE <input type="checkbox"/> | → 1522 |
| 1520 | Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pieds ou vous fasse quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement alors que vous étiez enceinte ? | OUI 1 NON 2 | → 1522 |
| 1521 | Qui a agi ainsi pour vous faire mal physiquement pendant que vous étiez enceinte ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. | MARI/PARTENAIRE ACTUEL A MÈRE/ FEMME DU PÈRE B PÈRE/ MARI DE LA MÈRE C SOEUR/FRÈRE D FILLE/FILS E AUTRE PARENT F ANCIEN MARI/PARTENAIRE G PETIT AMI ACTUEL H ANCIEN PETIT AMI I BELLE-MÈRE J BEAU-PÈRE K AUTRE BEAU-PARENT L ENSEIGNANT M EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL N POLICE/SOLDAT O AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) | |
| 1522 | VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/A DÉJÀ VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> ↓ | JAMAIS MARIÉE/JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> | → 1522B |
| 1522A | Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur des choses qui ont pu vous être faites par quelqu'un d'autre que (votre/un) (mari/partenaire). À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? | OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3 | → 1523 → 1524A |

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

| No. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSEZ À |
|-------|--|---|----------|
| 1522B | À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? | OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3 | → 1526 |
| 1523 | Quelle est la personne qui vous a forcé la première fois que cela est arrivé? | MARI/PARTENAIRE ACTUEL 01 ANCIEN MARI/PARTENAIRE 02 PETIT AMI ACTUEL/ANCIEN 03 PÈRE/BEAU-PÈRE 04 FRÈRE/BEAU-FRÈRE 05 AUTRE PARENT 06 BEAU-PARENT 07 AMI/RENCONTRE 08 AMI DE LA FAMILLE 09 ENSEIGNANT 10 EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL 11 POLICE/SOLDAT 12 PRÊTRE/RELIGIEUX 13 INCONNU 14 AUTRE _____ 96 (PRECISEZ) | |
| 1524 | VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ a) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un, autre que (votre/un) (mari/partenaire) vous a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels contre votre volonté ? JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ b) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un vous a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels contre votre volonté ? | OUI 1 NON 2 | → 1525 |
| 1524A | VÉRIFIEZ 1505A (h-j) et 1515A(b): AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' ↓ PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' → | | → 1526 |
| 1525 | VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ a) Quel âge aviez-vous la première fois que quelqu'un, y compris (votre/un de vos) mari/partenaire, vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ b) Quel âge aviez-vous la première fois que l'on vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? | ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | |

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

| No. | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | PASSEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|-------------------------|-----|------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|--|
| 1526 | VÉRIFIEZ 1505A (a-j), 1515A (a,b), 1516, 1520, 1522A ET 1522B: AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' ↓ | PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' | → 1530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1527 | Pensez à ce qui vous est arrivé parmi les choses dont nous venons de parler. Vous est-il arrivé de rechercher de l'aide ? | OUI 1 NON 2 | → 1529 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | Après de qui avez-vous recherché de l'aide ? Personne d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. | PROPRE FAMILLE A FAMILLE DU MARI/PARTENAIRE B MARI/PARTENAIRE ACTUEL/ANCIEN C PETIT AMI ACTUEL /ANCIEN D AMI E VOISIN F RELIGIEUX G MÉDECIN/PERSONNEL SANTÉ H POLICE I HOMME DE LOI J SERVICE SOCIAL K ONG L AUTRE X (PRÉCISEZ) | → 1530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1529 | Avez-vous parlé de cela à quelqu'un ? | OUI 1 NON 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530 | Pour autant que vous le sachiez, est-ce que votre père battait votre mère ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMERCIEZ L'ENQUÊTÉE DE SA COOPÉRATION ET RÉAFFIRMEZ-LUI QUE SES RÉPONSES RESTERONT CONFIDENTIELLES. COMPLÉTEZ LES QUESTIONS CI-DESSOUS CONCERNANT LE MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE SEULEMENT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | AVEZ-VOUS DÛ INTERROMPRE L'INTERVIEW PARCE QU'UN ADULTE A ESSAYÉ D'ÉCOUTER, EST VENU DANS LA PIÈCE OU A ESSAYÉ D'INTERVENIR D'UNE AUTRE MANIÈRE ? | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI 1 FOIS</th> <th>OUI, PLUS D'UNE FOIS</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARI</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRE HOMME ADULTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>FEMME ADULTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | | OUI 1 FOIS | OUI, PLUS D'UNE FOIS | NON | MARI | 1 | 2 | 3 | AUTRE HOMME ADULTE | 1 | 2 | 3 | FEMME ADULTE | 1 | 2 | 3 | |
| | OUI 1 FOIS | OUI, PLUS D'UNE FOIS | NON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARI | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTRE HOMME ADULTE | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEMME ADULTE | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532 | COMMENTAIRES DE L'ENQUÊTRICE / SI L'ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE N'A PU ÊTRE MENÉE, DONNEZ LES RAISONS. _____ _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1533 | ENREGISTREZ L'HEURE. | HEURES MINUTES | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTRICE
À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATION DE LA CONTRÔLEUSE

INSTRUCTIONS:

UN SEUL CODE DOIT FIGURER DANS CHAQUE CASE.
UN CODE DOIT ÊTRE INSCRIT À CHAQUE MOIS À LA COLONNE 1.

CODES À UTILISER POUR CHAQUE COLONNE

COLONNE 1: NAISSANCES, GROSSESSES, UTILIS. CONTRACEP. (2)

N NAISSANCES
G GROSSESSES
F FIN DE GROSSESSE

0 AUCUNE MÉTHODE

1 STÉRILISATION FÉMININE
2 STÉRILISATION MASCULINE
3 DIU
4 INJECTABLES
5 IMPLANTS
6 PILULE
7 CONDOM
8 CONDOM FÉMININ
9 PILULE DU LENDEMAIN
J MÉTHODE DES JOURS FIXES
K MÉTHODE DE L'AMÉNORRHÉE ET DE L'ALLAITEMENT MATERNEL
L MÉTHODE DU RYTHME

M RETRAIT
X AUTRE MÉTHODE MODERNE
Y AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE

COLONNE 2: DISCONTINUATION DE L'UTILISATION CONTRACEPTIVE

0 RAPPORTS SEX. PEU FRÉQUENTS/MARI ABSENT
1 TOMBÉE ENCEINTE ALORS QU'ELLE UTILISAIT
2 SOUHAITAIT TOMBER ENCEINTE
3 MARI/PARTENAIRE DÉSAPPROUVE
4 VOULAIT MÉTHODE PLUS EFFICACE
5 PEUR DES EFFETS SECONDAIRES
6 MANQUE D'ACCESSIBILITÉ/TROP ÉLOIGNÉ
7 COÛTE TROP CHER
8 PAS PRATIQUE À UTILISER
F FATALISTE
A DIFFICULTÉS POUR TOMBER ENCEINTE/MÉNOPAUSE
D DISSOLUTION DU MARIAGE/SÉPARATION
X AUTRE

(PRÉCISEZ)

Z NE SAIT PAS

| | | | COL. 1 | COL. 2 |
|------------|----|---------|--------|----------|
| | 12 | DEC | 01 | |
| | 11 | NOV | 02 | |
| | 10 | OCT | 03 | |
| 2 | 09 | SEP | 04 | 2 |
| | 08 | AOUT | 05 | |
| 0 | 07 | JUL | 06 | 0 |
| 1 | 06 | JUIN | 07 | 1 |
| | 05 | MAI | 08 | |
| 7 | 04 | AVRIL | 09 | 7 |
| (1) | 03 | MARS | 10 | |
| | 02 | FEVRIER | 11 | |
| | 01 | JAN | 12 | |
| <hr/> | | | | |
| | 12 | DEC | 13 | |
| | 11 | NOV | 14 | |
| | 10 | OCT | 15 | |
| 2 | 09 | SEP | 16 | 2 |
| | 08 | AOUT | 17 | |
| 0 | 07 | JUL | 18 | 0 |
| 1 | 06 | JUIN | 19 | 1 |
| | 05 | MAI | 20 | |
| 6 | 04 | AVRIL | 21 | 6 |
| | 03 | MARS | 22 | |
| | 02 | FEVRIER | 23 | |
| | 01 | JAN | 24 | |
| <hr/> | | | | |
| | 12 | DEC | 25 | |
| | 11 | NOV | 26 | |
| | 10 | OCT | 27 | |
| 2 | 09 | SEP | 28 | 2 |
| | 08 | AOUT | 29 | |
| 0 | 07 | JUL | 30 | 0 |
| 1 | 06 | JUIN | 31 | 1 |
| | 05 | MAI | 32 | |
| 5 | 04 | AVRIL | 33 | 5 |
| | 03 | MARS | 34 | |
| | 02 | FEVRIER | 35 | |
| | 01 | JAN | 36 | |
| <hr/> | | | | |
| | 12 | DEC | 37 | |
| | 11 | NOV | 38 | |
| | 10 | OCT | 39 | |
| 2 | 09 | SEP | 40 | 2 |
| | 08 | AOUT | 41 | |
| 0 | 07 | JUL | 42 | 0 |
| 1 | 06 | JUIN | 43 | 1 |
| | 05 | MAI | 44 | |
| 4 | 04 | AVRIL | 45 | 4 |
| | 03 | MARS | 46 | |
| | 02 | FEVRIER | 47 | |
| | 01 | JAN | 48 | |
| <hr/> | | | | |
| | 12 | DEC | 49 | |
| | 11 | NOV | 50 | |
| | 10 | OCT | 51 | |
| 2 | 09 | SEP | 52 | 2 |
| | 08 | AOUT | 53 | |
| 0 | 07 | JUL | 54 | 0 |
| 1 | 06 | JUIN | 55 | 1 |
| | 05 | MAI | 56 | |
| 3 | 04 | AVRIL | 57 | 3 |
| | 03 | MARS | 58 | |
| | 02 | FEVRIER | 59 | |
| | 01 | JAN | 60 | |
| <hr/> | | | | |
| | 12 | DEC | 61 | |
| | 11 | NOV | 62 | |
| | 10 | OCT | 63 | |
| 2 | 09 | SEP | 64 | 2 |
| | 08 | AOUT | 65 | |
| 0 | 07 | JUL | 66 | 0 |
| 1 | 06 | JUIN | 67 | 1 |
| | 05 | MAI | 68 | |
| 2 | 04 | AVRIL | 69 | 2 |
| | 03 | MARS | 70 | |
| | 02 | FEVRIER | 71 | |
| | 01 | JAN | 72 | |

(1) On suppose que l'année de la collecte est 2017. Pour la collecte commençant en 2018, toutes les références aux années de calendrier doivent être augmentées d'une année ; par exemple, 2011 doit être changé en 2012, 2012 doit être changé en 2013, 2013 doit être changé en 2014, et ainsi de suite pour toutes les années dans tout le questionnaire.

(2) Des codes peuvent être ajoutés pour d'autres méthodes, comme celles basées sur la connaissance de la fécondité.

ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE HOMME

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

| IDENTIFICATION | | | | |
|--|--------|-------|---------|----------------------------------|
| DÉPARTEMENT _____ | | | | |
| COMMUNE _____ | | | | |
| URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2) | | | | |
| NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____ | | | | |
| NUMÉRO DE GRAPPE | | | | |
| NUMÉRO DU MÉNAGE | | | | |
| NOM ET NUMÉRO DE LIGNE DE L'HOMME _____ | | | | |
| MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON) | | | | |
| VISITES D'ENQUÊTEURS | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | VISITE FINALE |
| DATE | _____ | _____ | _____ | JOUR _____ |
| NOM DE L'ENQUÊTEUR | _____ | _____ | _____ | MOIS _____ |
| RÉSULTAT* | _____ | _____ | _____ | ANNÉE 2 0 1 _____ |
| PROCHAINE DATE VISITE | _____ | _____ | _____ | No ENQUÊT _____ |
| HEURE | _____ | _____ | _____ | RÉSULTAT* _____ |
| | | | | NOMBRE TOTAL DE VISITES _____ |
| *CODES RÉSULTAT : 1 COMPLÉTÉ 4 REFUSÉ 2 PAS À LA MAISON 5 PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ 7 AUTRE _____ 3 DIFFÉRÉ 6 INCAPACITÉ (PRÉCISEZ) | | | | |
| LANGUE DU QUESTIONNAIRE** 0 1 LANGUE DE L'INTERVIEW** _____ LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** _____ TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2) _____ | | | | |
| LANGUE DU QUESTIONNAIRE** FRANÇAIS **CODES LANGUES : 01 FRANÇAIS 03 Bariba 05 Dendi 07 Yoruba 02 Adja 04 Fon 06 Ditamari 08 Autres | | | | |
| SUPERVISEUR | | | ÉDITEUR | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| NOM | NUMÉRO | NOM | NUMÉRO | |

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____. Je travaille avec l'INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE et de L'ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE). Effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets au Benin. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement environ 20 et 30 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez de répondre à nos questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ ... 1

L'ENQUÊTÉ REFUSE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ ... 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------|--|---|---------|
| 101 | INSCRIVEZ L'HEURE. | HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 102 | Depuis combien de temps vivez-vous de manière continue à (NOM DE LA VILLE, PETITE VILLE OU VILLAGE ACTUEL DE RÉSIDENCE) ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00' ANNÉE. | ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> TOUJOURS 95 VISITEUR 96 | → 105 |
| 103 | Juste avant d'habiter ici, est-ce que vous viviez dans une ville à statut particulier, une autre ville ou dans une ville secondaire ? | VILLE À STATUT PARTICULIER 1 AUTRE VILLE 2 VILLE SECONDAIRE 3 EN DEHORS DU BÉNIN 4 | |
| 104 | Juste avant d'habiter ici, dans quel département est-ce que vous viviez ? | ALIBORI 01 ATACORA 02 ATLANTIQUE 03 BORGOU 04 COLLINES 05 COUFFO 06 DONGA 07 LITTORAL 08 MONO 09 OUÉMÉ 10 PLATEAU 11 ZOU 12 EN DEHORS DU BENIN 96 | |
| 105 | En quel mois et en quelle année êtes-vous né ? | MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS L'ANNÉE 9998 | |
| 106 | Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? COMPAREZ ET CORRIGEZ 105 ET/OU 106 SI INCOHÉRENT. | ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 106B | VÉRIFIEZ 106: <input type="checkbox"/> | 15-29 ANS 1 30-64 ANS 2 | → 107 |


SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 106C | <p>Au cours de l'interview, je voudrais mesurer votre tension artérielle. Je le ferai trois fois au cours de l'interview. C'est une procédure qui ne comporte aucun danger. On l'effectue pour savoir si une personne a une pression artérielle élevée. Si elle n'est pas traitée, une pression élevée peut endommager sérieusement le coeur. Je vous donnerai les résultats de la mesure de la pression artérielle après l'interview en vous expliquant ce que signifient les chiffres de votre tension artérielle. Si votre tension artérielle est élevée, nous vous conseillerons de consulter dans un établissement de santé ou de voir un médecin car nous ne pouvons pas effectuer d'autre contrôle ou fournir un traitement au cours de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser sur les mesures de la tension artérielle ?</p> | <p>OUI, ENQUÊTÉ ACCEPTE 1 NON, ENQUÊTÉ N'ACCEPTE PAS 2</p> | → 107 | | | | | | | | | | | | |
| | <p>_____</p> <p>SIGNATURE ENQUÊTEUR DATE</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 106D | <p>Avant de commencer à mesurer votre tension artérielle, je voudrais vous poser quelques questions sur des choses qui peuvent affecter ces mesures. Avez-vous fait l'une des choses suivantes dans les 30 dernières minutes :</p> | <p>OUI NON</p> <p>a) MANGÉ 1 2 b) CAFÉINE 1 2 c) FUMÉ 1 2 d) PHYSIQUE 1 2</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 106E | REGARDEZ LE BRAS DE L'ENQUÊTÉ ET PRENEZ LE BRASSARD APPROPRIÉ POUR PRENDRE LA TENSION | | | | | | | | | | | | | | |
| 106F | <p>LISEZ LES MESURES DE LA PRESSION ARTÉRIELLE .</p> <p>ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET LA PRESSION DIASTOLIQUE.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA PRESSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉ, ENREGISTREZ LA RAISON.</p> | <p>SYSTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>DIASTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Êtes-vous allé à l'école ? | <p>OUI 1 NON 2</p> | → 111 | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : primaire, secondaire 1er cycle, secondaire 2nd cycle ou supérieur ? | <p>PRIMAIRE 1 SECONDAIRE 1^{er} CYCLE 2 SECONDAIRE 2nd CYCLE 3 SUPÉRIEUR 4</p> | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|--|---------|
| 109 | Quelle est LA CLASSE la plus élevée que vous avez atteint à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'. | CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 110 | VÉRIFIEZ 108: PRIMAIRE OU <input type="checkbox"/> SECONDAIRE (1er ou 2eme CYCLE) ↓ SUPÉRIEUR <input type="checkbox"/> → | | 113 |
| 111 | Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase. MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉ. SI L'ENQUÊTÉ NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ? | NE PEUT PAS LIRE DU TOUT 1 PEUT LIRE SEULEMENT UNE PARTIE DE LA PHRASE 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DE L'ENQUÊTÉ 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE 5 | |
| 112 | VÉRIFIEZ 111: CODE '2', '3' <input type="checkbox"/> OU '4' ↓ ENCERCLÉ CODE '1' OU '5' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ → | | 114 |
| 113 | Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ? | AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3 | |
| 114 | Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ? | AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3 | |
| 115 | Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ? | AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3 | |
| 116 | Est-ce que vous possédez un téléphone portable ? | OUI 1 NON 2 | → 118 |
| 117 | Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable pour faire des opérations financières ? | OUI 1 NON 2 | |
| 118 | Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-même ? | OUI 1 NON 2 | |
| 119 | Avez-vous déjà utilisé internet ? | OUI 1 NON 2 | → 122 |
| 120 | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL | OUI 1 NON 2 | → 122 |
| 121 | Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ? | PRESQUE CHAQUE JOUR 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 3 PAS DU TOUT 4 | |

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 122 | Quelle religion pratiquez-vous ? | VODOUN 1 AUTRES TRADITIONNELLES 2 ISLAM 3 CATHOLIQUE 4 PROTESTANT METHODISTE 5 AUTRES PROTESTANTS 6 CELESTES 7 AUTRES CHRETIENS 8 AUTRES RELIGIONS 9 AUCUNE 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Quelle est votre ethnie ? | ADJA ET APPARENTÉS 1 BARIBA ET APPARENTÉS 2 DENDI ET APPARENTÉS 3 FON ET APPARENTÉES 4 YOA ET LOKPA ET APPARENTÉS 5 BETAMARIBE ET APPARENTÉS 6 PEULH ET APPARENTÉS 7 YORUBA ET APPARENTÉS 8 AUTRE BÉNINOIS 96 (PRÉCISER) AUTRE NATIONALITÉS 97 (PRÉCISER) | | | | | | | | | | | | | |
| 123B | VÉRIFIEZ 106:  | 15-29 ANS 1 30-64 ANS 2 | → 201 | | | | | | | | | | | | |
| 123C | Est-ce que je peux commencer maintenant à mesurer votre tension artérielle ? SIGNATURE ENQUÊTEUR _____ DATE _____ | OUI, ENQUÊTÉ ACCEPTE 1 NON, ENQUÊTÉ N'ACCEPTE PAS 2 | → 201 | | | | | | | | | | | | |
| 123D | PRENEZ LES MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE. ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET LA PRESSION DIASTOLIQUE. SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA PRESSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉ, ENREGISTREZ LA RAISON. | SYSTOLIQUE <table border="1" data-bbox="1129 1032 1334 1144"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> DIASTOLIQUE <table border="1" data-bbox="1129 1084 1334 1144"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

CODES POUR Qs. 108 ET 109: NIVEAU D'INSTRUCTION / CLASSE

| NIVEAU ATTEINT | 1 = PRIMAIRE | 2 = SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE | 3 = SECONDAIRE 2 ND CYCLE | 4 = SUPÉRIEUR |
|--------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | < D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN CI = 0 | < D'1 ANNÉE ACHEVÉE EN 6 ^{ÈME} = 0 | < D'1 ANNÉE ACHEVÉE EN 2 ^{NDE} = 0 | < D'1 ANNÉE ACHEVÉE EN 1 ^{ÈRE} AN. = 0 |
| CLASSE | CI = 1 | 6 ^{ÈME} = 1 | 2 ^{NDE} = 1 | 1 ^{ÈRE} ANNÉE = 1 |
| ACHEVÉE | CP = 2 | 5 ^{ÈME} = 2 | 1 ^{ÈRE} = 2 | 2 ^{ÈME} ANNÉE = 2 |
| AVEC SUCCÈS | CE1 = 3 | 4 ^{ÈME} = 3 | TERMINALE = 3 | 3 ^{ÈME} ANNÉE = 3 |
| | CE2 = 4 | 3 ^{ÈME} = 4 | | 4 ^{ÈME} AN. OU + = 4 |
| | CM1 = 5 | | | |
| | CM2 = 6 | | | |
| | NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 | NSP = 8 |

SECTION 2. REPRODUCTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 201 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur tous les enfants que vous avez eus durant votre vie. Je m'intéresse à tous vos enfants biologiques, même s'ils ne sont pas légalement les vôtres ou s'ils ne portent pas votre nom. Avez-vous ou avez-vous eu des enfants que vous avez engendrés ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 206 | | | | | | | | |
| 202 | Avez-vous des fils ou des filles dont vous êtes le père et qui vivent actuellement avec vous ? | OUI 1 NON 2 | → 204 | | | | | | | | |
| 203 | a) Combien de fils vivent avec vous ? b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. | a) FILS À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 204 | Avez-vous des fils ou filles dont vous êtes le père qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ? | OUI 1 NON 2 | → 206 | | | | | | | | |
| 205 | a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? b) Combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. | a) FILS AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 206 | Avez-vous eu une fille ou un garçon qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 208 | | | | | | | | |
| 207 | a) Combien de garçons sont décédés ? b) Combien de filles sont décédées ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. | a) GARÇONS DÉCÉDÉS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES DÉCÉDÉES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 208 | FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. | TOTAL DES ENFANTS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 209 | VÉRIFIEZ 208: A EU PLUS D'UN ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ N'A EU AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> | A EU SEULEMENT UN ENFANT <input type="checkbox"/> → 211 N'A EU AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> → 301 | | | | | | | | | |
| 210 | Est-ce que tous les enfants dont vous êtes le père ont tous la même mère biologique ? | OUI 1 NON 2 | | | | | | | | | |
| 211 | VÉRIFIEZ 208: A EU PLUS D'UN ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ A EU SEULEMENT UN ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ a) Quel âge aviez-vous quand votre premier enfant est né ? b) Quel âge aviez-vous quand votre enfant est né ? | ÂGE EN ANNÉES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 212 | VÉRIFIEZ 203 ET 205: AU MOINS UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> | AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> → 301 | | | | | | | | | |

SECTION 2. REPRODUCTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|--|--------------|
| 213 | <p>VÉRIFIEZ 203 ET 205:</p> <p>PLUS D'UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>a) Quel âge a votre plus jeune enfant ?</p> <p>SEULEMENT UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>b) Quel âge a votre enfant ?</p> | <p>ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/></p> | |
| 214 | <p>VÉRIFIEZ 213:</p> <p>(LE PLUS JEUNE) ENFANT A 0-2 ANS <input type="checkbox"/></p> <p>(LE PLUS JEUNE) ENFANT A 3 ANS OU PLUS <input type="checkbox"/></p> | <p>→ 301</p> | |
| 215 | <p>VÉRIFIEZ 203 ET 205:</p> <p>PLUS D'UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>a) Quel est le nom de votre plus jeune enfant ?</p> <p>SEULEMENT UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>b) Quel est le nom de votre enfant ?</p> | <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENFANT (LE PLUS JEUNE))</p> | |
| 216 | <p>Quand la mère de (NOM) était enceinte de (NOM), a-t-elle eu des examens prénatals ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>→ 218</p> |
| 217 | <p>Est-ce que vous étiez présent pendant l'un de ces examens prénatals ?</p> | <p>PRÉSENT 1</p> <p>PAS PRÉSENT 2</p> | |
| 218 | <p>Est-ce que (NOM) est né dans un hôpital ou un établissement de santé ?</p> | <p>HÔPITAL/ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 1</p> <p>AUTRE 2</p> | |
| 219 | <p>Quand un enfant a la diarrhée, quelle quantité de liquides doit-on lui donné à boire : plus que d'habitude, environ la même quantité que d'habitude, moins que d'habitude ou rien à boire du tout ?</p> | <p>PLUS QUE D'HABITUDE 1</p> <p>ENVIRON MÊME QUANTITÉ 2</p> <p>MOINS QUE D'HABITUDE 3</p> <p>RIEN À BOIRE 4</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| | | | |
|-----|--|----------------------------|--|
| 301 | Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà entendu parler de (MÉTHODE) ? | | |
| 01 | Stérilisation féminine. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants. | OUI 1 NON 2 | |
| 02 | Stérilisation masculine. INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants. | OUI 1 NON 2 | |
| 03 | DIU. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant un ou plusieurs mois. | OUI 1 NON 2 | |
| 04 | Injectables. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de santé pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus. | OUI 1 NON 2 | |
| 05 | Implants. INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un médecin ou une infirmière un batonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus. | OUI 1 NON 2 | |
| 06 | Pilule. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse. | OUI 1 NON 2 | |
| 07 | Condom. INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels. | OUI 1 NON 2 | |
| 08 | Condom féminin. INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels. | OUI 1 NON 2 | |
| 09 | Pilule du lendemain. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre dans les trois jours après des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes. | OUI 1 NON 2 | |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| | | |
|----|--|--|
| 10 | Méthode des jours fixes. INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels. | OUI 1 NON 2 |
| 11 | Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA). INSISTEZ : Pendant six mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit. | OUI 1 NON 2 |
| 12 | Méthode du rythme. INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes. | OUI 1 NON 2 |
| 13 | Retrait. INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation. | OUI 1 NON 2 |
| 14 | Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ? | OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON Y |

SECTION 3. CONTRACEPTION

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | | | ALLEZ À |
|-----|---|---|---------------------|-----|---------|
| 302 | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous : | | OUI | NON | |
| | a) Entendu à la radio un message sur la planification familiale ? | a) RADIO | 1 | 2 | |
| | b) Vu à la télévision quelque chose sur la planification familiale ? | b) TÉLÉVISION | 1 | 2 | |
| | c) Lu dans un journal ou un magazine quelque chose sur la planification familiale ? | c) JOURNAL OU MAGAZINE | 1 | 2 | |
| | d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur un téléphone portable ? | d) PORTABLE | 1 | 2 | |
| | e) Vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ? | e) AFFICHE | 1 | 2 | |
| | f) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un prospectus/brochure ? | f) PROSPECTUS/BROCHURE | 1 | 2 | |
| | g) Vu quelque chose sur la planification familiale dans une séance d'animation culturelle/éducative ? | g) ANIMATION CULTURELLE | 1 | 2 | |
| | h) Entendu parler de la planification familiale dans les lieux de culte (église/mosquée)? | h) ÉGLISE/MOSQUÉE | 1 | 2 | |
| | i) Entendu parler de la planification familiale à l'école? | i) A L'ÉCOLE | 1 | 2 | |
| 303 | Au cours des derniers mois, avez-vous parlé de planification familiale avec un agent de santé ou un professionnel de santé ? | OUI | 1 | 2 | |
| | | NON | 2 | | |
| 304 | Je voudrais maintenant vous parler des risques de tomber enceintes. Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ? | OUI | 1 | | → 306 |
| | | NON | 2 | | |
| | | NE SAIT PAS | 8 | | |
| 305 | Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ? | JUSTE AVANT QUE LES RÉGLES COMMENCENT | 1 | | |
| | | PENDANT LES RÉGLES | 2 | | |
| | | JUSTE APRÈS LA FIN DES RÉGLES | 3 | | |
| | | AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES | 4 | | |
| | | AUTRE _____ (PRÉCISEZ) | 6 | | |
| | | NE SAIT PAS | 8 | | |
| 306 | Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ? | OUI | 1 | | |
| | | NON | 2 | | |
| | | NE SAIT PAS | 8 | | |
| 307 | Je vais vous lire maintenant certaines déclarations sur la contraception. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune de ces déclarations ? | | PAS D'ACC- D'ACCORD | NSP | |
| | a) La contraception est un problème de femme et un homme ne doit pas s'en préoccuper. | a) CONTRACEPTION PROBLÈME DE FEMME | 1 | 2 | 8 |
| | b) Une femme qui utilise la contraception peut devenir une femme légère. | b) FEMME PEUT DEVENIR LÉGÈRE | 1 | 2 | 8 |

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | |
|-----|---|---|--|--|
| 401 | Êtes-vous actuellement marié ou vivez-vous avec une femme comme si vous étiez marié ? | OUI, ACTUELLEMENT MARIÉ 1 OUI, VIT AVEC UNE FEMME 2 NON, PAS EN UNION 3 | → 404 | |
| 402 | Avez-vous déjà été marié ou avez-vous vécu avec une femme comme si vous étiez marié ? | OUI, A ÉTÉ MARIÉ 1 OUI, A VÉCU AVEC UNE FEMME 2 NON 3 | → 413 | |
| 403 | Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuf, divorcé ou séparé ? | VEUF 1 DIVORCÉ 2 SÉPARÉ 3 | → 410 | |
| 404 | Est-ce que votre (épouse/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-elle ailleurs ? | VIT AVEC LUI 1 VIT AILLEURS 2 | | |
| 405 | Avez-vous d'autres épouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous étiez marié ? | OUI (PLUS D'UNE ÉPOUSE) 1 NON (SEULEMENT UNE ÉPOUSE) 2 | → 407 | |
| 406 | En tout, combien d'épouses ou de partenaires avec qui vous vivez comme si vous étiez marié avez-vous ? | NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ | <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 407 | <p>VÉRIFIEZ 405:</p> <p>UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>a) Dites-moi, s'il vous plaît, le nom de (votre épouse/femme avec qui vous vivez comme si vous étiez marié) ?</p> <p>PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>b) Dites-moi, s'il vous plaît, le nom de chacune de vos épouses ou femmes avec qui vous vivez comme si vous étiez marié) ?</p> <p>INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE DE CHACUNE DES ÉPOUSES ET DES FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ.</p> <p>SI UNE FEMME N'EST PAS LISTÉE DANS LE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.</p> | <p>NUMÉRO DE LIGNE</p> <p>NOM</p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> | <p>408 (1)</p> <p>Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?</p> <p>ÂGE</p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> | |
| 408 | POSEZ 408 POUR CHAQUE PERSONNE. | | | |
| 409 | <p>VÉRIFIEZ 407:</p> <p>UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> | | → 411 | |
| 410 | Avez-vous été marié ou avez-vous vécu avec une femme une seule fois ou plus d'une fois ? | PLUS D'UNE FOIS 1 UNE SEULE FOIS 2 | | |

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|--|---------------------------|
| 411 | <p>VÉRIFIEZ 405 ET 410:</p> <p>LES DEUX SONT <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> CODE '2'</p> <p>a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (épouse/partenaire) ?</p> <p>b) Je voudrais maintenant vous parler de votre première (épouse/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec elle ?</p> | <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE CONNAIT PAS LE MOIS 98</p> <p>ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE CONNAIT PAS L'ANNÉ 9998</p> | <p>→ 413</p> |
| 412 | <p>Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec elle pour la première fois ?</p> | <p>ÂGE <input type="text"/> <input type="text"/></p> | |
| 413 | <p>VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR ÊTRE EN PRIVÉ.</p> | | |
| 414 | <p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que toutes vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?</p> | <p>N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS 00</p> <p>ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p>→ 501</p> |
| 415 | <p>Je voudrais vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?</p> <p>SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.</p> | <p>IL Y A DES JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p>→ 417</p> <p>→ 427</p> |

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| | | DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE | AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE | AVANT-AVANT DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE |
|-----|--|---|---|---|
| 416 | Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne pour la dernière fois ? | | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 417 | La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, un condom a-t-il été utilisé ? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ← |
| 418 | Un condom a-t-il été utilisé chaque fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne au cours des 12 derniers mois ? | OUI 1 NON 2 | OUI 1 NON 2 | OUI 1 NON 2 |
| 419 | Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETITE AMIE : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez marié ? SI OUI, ENCERCLEZ '2'. SI NON, ENCERCLEZ '3'. | ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) | ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) | ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) |
| 420 | Il y a combien de temps que vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec cette personne ? | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/> | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/> | IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 421 | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'. | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/> | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/> | NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/> |

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| | | DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE | AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE | AVANT-AVANT DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE |
|-----|---|--|--|---|
| 422 | Quel âge a cette personne ? | ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 |
| 423 | À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ? | OUI 1] (RETOURNEZ À 416COL. SUIVANTE) NON 2] (ALLEZ À 425) | OUI 1] (RETOURNEZ À 416 COL. SUIVANTE) NON 2] (ALLEZ À 425) | |
| 424 | En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PERSONNES EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'. | | | NOMBRE DE PARTENAIRES DANS LES 12 DERNIERS MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 |

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|------------|--|--|------------|
| 425 | VÉRIFIEZ 419 (TOUTES LES COLONNES): AU MOINS UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> EST UNE PROSTITUÉE ↓ | AUCUNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> N'EST UNE PROSTITUÉE → | 427 |
| 426 | VÉRIFIEZ 419 ET 417 (TOUTES LES COLONNES): CONDOM UTILISÉ AVEC <input type="checkbox"/> CHAQUE PROSTITUÉE | AUTRE <input type="checkbox"/> | 430 431 |
| 427 | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous payé quelqu'un en échange de rapports sexuels ? | OUI 1 NON 2 | 429 |
| 428 | Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de payer quelqu'un en échange de rapports sexuels ? | OUI 1 NON 2 | 431 |
| 429 | La dernière fois que vous avez payé quelqu'un en échange de rapports sexuels, un condom a-t-il été utilisé ? | OUI 1 NON 2 | 431 |
| 430 | Est-ce qu'au cours des 12 derniers mois, un condom a été utilisé chaque fois que vous avez payé quelqu'un en échange de rapports sexuels ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 431 | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des cadeaux ou des présents pour avoir des rapports sexuels ou pour avoir une relation sexuelle suivie avec quelqu'un ? | OUI 1 NON 2 | 433 |
| 432 | Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de donner des cadeaux ou des présents pour avoir des rapports sexuels ou pour avoir une relation sexuelle suivie avec quelqu'un ? | OUI 1 NON 2 | |
| 433 | En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'. | NOMBRE DE PARTENAIRES SUR LA DURÉE DE VIE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98 | |
| 434 (2) | VÉRIFIEZ 417: PARTENAIRE LA PLUS RÉCENTE (PREMIÈRE COLONNE) CONDOM UTILISÉ <input type="checkbox"/> ↓ | PAS POSÉE <input type="checkbox"/> PAS DE CONDOM UTILISÉ <input type="checkbox"/> | 438 438 |
| 435 | Vous avez dit que la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, un condom avait été utilisé. Quelle était la marque du condom utilisée cette fois là ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR L'EMBALLAGE. | PRUDENCE 01 COOL 02 NO LOGO 03 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98 | |

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|--|---------------------------|
| 436 | <p>Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p> | <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12</p> <p>CLINIQUE MOBILE 13</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ RELAIS COMMUNAUTAIRE 14</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC 16</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21</p> <p>PHARMACIE 22</p> <p>SOIN MÉDICAL/CABINET CLINIQUE 23</p> <p>CLINIQUE MOBILE 24</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFESIONNELLE 25</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 26</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>ONG</p> <p>CLINIQUE PLANIFICATION FAMILIALE 31</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 41</p> <p>INSTITUTION RELIGIEUSE 42</p> <p>AMIS/PARENTS 43</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> | |
| 437 | <p>La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une autre méthode que le condom pour éviter ou retarder une grossesse ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>→ 439</p> <p>→ 440</p> |
| 438 | <p>La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une méthode pour éviter ou retarder une grossesse ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> | <p>→ 440</p> |
| 439 | <p>Quelle méthode avez-vous, ou votre partenaire, utilisé ?</p> <p>INSISTEZ: Est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une autre méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p> | <p>STÉRILISATION FÉMININE A</p> <p>STÉRILISATION MASCULINE B</p> <p>DIU C</p> <p>INJECTABLES D</p> <p>IMPLANTS E</p> <p>PILULE F</p> <p>CONDOM G</p> <p>CONDOM FÉMININ H</p> <p>PILULE DU LENDEMAIN I</p> <p>MÉTHODE DES JOURS FIXES J</p> <p>MAMA K</p> <p>MÉTHODE DU RYTHME L</p> <p>RETRAIT M</p> <p>AUTRE MÉTHODE MODERNE X</p> <p>AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE Y</p> | <p>→ 501</p> |
| 440 | <p>Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?</p> | <p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> | |

SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 501 | VÉRIFIEZ 401: ACTUELLEMENT MARIÉ OU <input type="checkbox"/> NON MARIÉ ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> | | → 514 | | | | | | | | |
| 502 | VÉRIFIEZ 439: HOMME NON <input type="checkbox"/> HOMME <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ <input type="checkbox"/> | | → 514 | | | | | | | | |
| 503 | VÉRIFIEZ 407: UNE ÉPOUSE/ <input type="checkbox"/> PLUS D'UNE <input type="checkbox"/> PARTENAIRE <input type="checkbox"/> ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/> | | → 509 | | | | | | | | |
| 504 | Est-ce que votre (épouse/partenaire) est actuellement enceinte ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 507 | | | | | | | | |
| 505 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous et votre (épouse/partenaire) attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfants ? | AVOIR UN AUTRE ENFANT 1 PAS D'AUTRE ENFANT 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8 | → 514 | | | | | | | | |
| 506 | Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ? | MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT 993 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998 | | | | | | | | | → 514 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 507 | VÉRIFIEZ 208: A EU <input type="checkbox"/> N'A PAS <input type="checkbox"/> DES ENFANTS <input type="checkbox"/> D'ENFANT <input type="checkbox"/> a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ? | VEUT (UN/UN AUTRE) ENFANT 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN 2 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 3 ÉPOUSE/PARTENAIRE STÉRILISÉE 4 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8 | → 514 | | | | | | | | |
| 508 | VÉRIFIEZ 208: A <input type="checkbox"/> N'A PAS <input type="checkbox"/> DES ENFANTS <input type="checkbox"/> D'ENFANT <input type="checkbox"/> a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ? | MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT 993 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 994 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998 | | | | | | | | | → 514 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 509 | Est-ce que l'une de vos (épouses/partenaires) est actuellement enceinte ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 512 | | | | | | | | |

SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----|--|--|--|------------|--|--|--|
| 510 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après la naissance (de/des enfant) que vos (épouses/partenaires) attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? | AVOIR UN AUTRE ENFANT 1 NE PLUS EN AVOIR 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8 | → 514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ? | MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT 993 AUTRE _____ 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998 | | | | | | | | | → 514 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | VÉRIFIEZ 208: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? </td> <td style="vertical-align: top;"> b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ? </td> </tr> </table> | A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ | N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ | a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? | b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ? | AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 3 ÉPOUSE (ÉPOUSES/PARTENAIRES) STÉRILISÉES 4 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8 | → 514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ | N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? | b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | VÉRIFIEZ 208: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? </td> <td style="vertical-align: top;"> b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ? </td> </tr> </table> | A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ | N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ | a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? | b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ? | MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 994 AUTRE _____ 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ | N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? | b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | VÉRIFIEZ 203 ET 205: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> A DES ENFANTS VIVANTS <input type="checkbox"/> ↓ </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? </td> <td style="vertical-align: top;"> b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? </td> </tr> </table> INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE. | A DES ENFANTS VIVANTS <input type="checkbox"/> ↓ | AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ | a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? | b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? | AUCUN 00 NOMBRE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) | | | → 601 → 601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A DES ENFANTS VIVANTS <input type="checkbox"/> ↓ | AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? | b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ? | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">GARÇONS</td> <td style="text-align: center;">FILLES</td> <td style="text-align: center;">PEU IMPORTE</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE ..</td> <td><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td> <td><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td> <td><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td> </tr> <tr> <td>AUTRE _____</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">(PRÉCISEZ)</td> </tr> </table> | | GARÇONS | FILLES | PEU IMPORTE | NOMBRE .. | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | AUTRE _____ | 96 | | | | (PRÉCISEZ) | | | |
| | GARÇONS | FILLES | PEU IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE .. | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTRE _____ | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (PRÉCISEZ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| 601 | Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 7 derniers jours ? | OUI 1 NON 2 | → 604 | | |
| 602 | Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour vacances, maladie, maternité ou pour une autre raison ? | OUI 1 NON 2 | → 604 | | |
| 603 | Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ? | OUI 1 NON 2 | → 607 | | |
| 604 | Quelle est votre occupation ? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ? | _____ _____ _____ | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | |
| | | | | | |
| 605 | Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ? | TOUTE L'ANNÉE 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE 2 DE TEMPS EN TEMPS 3 | | | |
| 606 | Êtes-vous payé en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payé du tout ? | ARGENT SEULEMENT 1 ARGENT ET NATURE 2 NATURE SEULEMENT 3 PAS PAYÉ 4 | | | |
| 607 | VÉRIFIEZ 401: ACTUELLEMENT MARIÉ OU <input type="checkbox"/> VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE ↓ NON MARIÉ ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE | | → 612 | | |
| 608 | VÉRIFIEZ 606: CODE '1' OU '2' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ ↓ AUTRE <input type="checkbox"/> | | → 610 | | |
| 609 | Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (épouse/partenaire), ou conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ? | ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) | | | |
| 610 | Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé : vous, votre (épouse/partenaire), conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ou quelqu'un d'autre ? | ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6 | | | |
| 611 | Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ? | ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6 | | | |

SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|--|---------|
| 612 | Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ? | SEUL SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMENT 2 SEUL ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4 | → 615 |
| 613 | Avez-vous un acte de propriété pour une maison que vous possédez ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 615 |
| 614 | Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 615 | Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ? | SEUL SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMENT 2 SEUL ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4 | → 618 |
| 616 | Avez-vous un acte de propriété pour une terre que vous possédez ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 618 |
| 617 | Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 618 | Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : | | |
| | | OUI NON NSP | |
| | a) Si elle sort sans le lui dire ? | a) SORT SANS LE LUI DIRE 1 2 8 | |
| | b) Si elle néglige les enfants ? | b) NÉGLIGE LES ENFANTS 1 2 8 | |
| | c) Si elle argumente avec lui ? | c) ARGUMENTE 1 2 8 | |
| | d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ? | d) REFUSE RAP. SEXUELS 1 2 8 | |
| | e) Si elle brûle la nourriture ? | e) BRÛLE NOURRITURE 1 2 8 | |

SECTION 7. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|--|---------|
| 701 | Je voudrais maintenant que nous parlions d'un autre sujet. Avez-vous déjà entendu parler de VIH ou de sida ? | OUI 1 NON 2 | → 727 |
| 702 | Le VIH est le virus qui cause le sida. Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en ayant juste un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a aucun autre partenaire sexuel ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 703 | Est-ce qu'on peut contracter le virus du sida par les piqûres de moustiques ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 704 | Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 705 | Est-ce qu'on peut contracter le virus du sida en partageant la nourriture avec une personne qui a le sida ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 706 | Est-ce qu'on peut contracter le virus du sida par sorcellerie ou par des moyens surnaturels ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 707 | Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le virus du sida ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 708 | Est-ce que le virus qui cause le sida peut être transmis de la mère à son enfant : | | |
| | a) Durant la grossesse ? | OUI NON NSP a) DURANT GROSSESSE 1 2 8 | |
| | b) Durant l'accouchement ? | b) DURANT ACCOUCHEMENT 1 2 8 | |
| | c) En allaitant ? | c) EN ALLAITANT 1 2 8 | |
| 709 | VÉRIFIEZ 708: AU MOINS <input type="checkbox"/> UN 'OUI' ↓ AUTRE <input type="checkbox"/> | | → 711 |
| 710 | Y a-t-il des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière peut donner à une femme infectée par le virus du sida pour réduire le risque de transmission à son enfant ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 711 | VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ. | | |
| 712 | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous déjà fait un test du VIH ? | OUI 1 NON 2 | → 716 |
| 713 | Il y a combien de mois que vous avez effectué votre test du VIH le plus récent ? | IL Y A MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> DEUX ANS OU PLUS 95 | |

SECTION 7. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|---------|
| 714 | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous eu les résultats du test ? | OUI 1 NON 2 | |
| 715 | Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT) | SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 12 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 13 CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE .. 14 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 15 AUTRE SECTEUR PUBLIC 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ. 21 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 22 PHARMACIE 23 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 24 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 26 (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE MAISON 31 LIEU DE TRAVAIL 32 CENTRE DE DÉTENTION 33 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) | → 718 |
| 716 | Connaissez-vous un endroit où les gens peuvent aller pour faire un test du VIH ? | OUI 1 NON 2 | → 718 |
| 717 | Où est-ce ? Pas d'autre endroit ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT) | SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT B CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL C CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE D SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL E AUTRE SECTEUR PUBLIC F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ. G CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL H PHARMACIE I SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL J AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ K (PRÉCISEZ) AUTRE X (PRÉCISEZ) | |

SECTION 7. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|---------|
| 718 | Avez-vous entendu parler de kits de tests que les gens peuvent utiliser pour se tester eux-mêmes pour le VIH ? | OUI 1 NON 2 | → 720 |
| 719 | Vous êtes-vous testé vous-même en utilisant un kit de test ? | OUI 1 NON 2 | |
| 720 | Est-ce que vous achèteriez des légumes frais à un marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus du sida ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8 | |
| 721 | Pensez-vous que des enfants vivant avec le VIH devraient être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH ? | YES 1 NO 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8 | |
| 722 | Pensez-vous que les gens hésitent à faire un test du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat de leur test était VIH positif ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8 | |
| 723 | Est-ce que les gens parlent mal de ceux qui vivent avec le VIH ou dont on pense qu'ils vivent avec le VIH ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8 | |
| 724 | Est-ce que les gens qui vivent avec le VIH, ou dont on pense qu'ils vivent avec le VIH, perdent le respect des autres ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8 | |
| 725 | Êtes-vous d'accord ou non avec la déclaration suivante : j'aurais honte si quelqu'un de ma famille avait le VIH. | D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8 | |
| 726 | Avez-vous peur de contracter le VIH si vous étiez en contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH ? | OUI 1 NON 2 DÉCLARE QU'IL A LE VIH 3 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8 | |
| 727 | VÉRIFIEZ 701: A ENTENDU PARLER DU VIH <input type="checkbox"/> OU DU SIDA ↓ N'A PAS ENTENDU PARLER DU VIH <input type="checkbox"/> OU DU SIDA ↓ a) Mis à part le sida, avez-vous entendu parler d'autres infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ? b) Avez-vous entendu parler d'infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ? | OUI 1 NON 2 | |
| 728 | VÉRIFIEZ 414: A DÉJÀ EU DES RAPPORTS SEXUELS <input type="checkbox"/> N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS <input type="checkbox"/> | | → 736 |
| 729 | VÉRIFIEZ 727: A ENTENDU PARLER D'AUTRES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> | | → 731 |
| 730 | J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé au cours des 12 derniers mois. Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu une maladie que vous avez contractée par contact sexuel ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 731 | Il arrive parfois que les hommes aient un écoulement du pénis qui n'est pas normal. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un écoulement anormal du pénis ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |

SECTION 7. VIH/SIDA

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|--|---------|
| 732 | Il arrive parfois que les hommes aient une plaie ou un ulcère dans la zone génitale. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une plaie ou un ulcère dans la zone génitale ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 733 | VÉRIFIEZ 730, 731 ET 732: A EU UNE <input type="checkbox"/> INFECTION (UN 'OUI') | N'A PAS EU <input type="checkbox"/> INFECTION OU NE SAIT PAS | → 736 |
| 734 | La dernière fois que vous avez eu (PROBLEME DÉCLARÉ À 730/731/732), avez-vous recherché des conseils ou un traitement ? | OUI 1 NON 2 | → 736 |
| 735 | Où êtes-vous allé ? Pas d'autre endroit ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT) | SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL C CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE .. D SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEILS E AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ G CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL H PHARMACIE I SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEILS J AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ K (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE BOUTIQUE L AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) | |
| 736 | Si une femme sait que son mari est atteint d'une maladie qu'elle peut contracter au cours de rapports sexuels, pensez-vous qu'il est justifié qu'elle lui demande qu'ils utilisent un condom quand ils ont des rapports sexuels ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 737 | Est-ce que vous pensez qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec une femme autre que ses épouses ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|----------------|
| 801 | Certains hommes sont circoncis, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé entièrement le prépuce du pénis. Êtes-vous circoncis ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | → 805 |
| 802 | Quel âge aviez-vous quand vous avez été circoncis ? | ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> PENDANT L'ENFANCE (<5 ANS) 95 NE SAIT PAS 98 | |
| 803 | Qui a effectué la circoncision ? | PRATICIEN TRADITIONNEL/FAMILLE/AMIS 1 AGENT DE SANTÉ/PROFESSIONNEL 2 AUTRE 3 NE SAIT PAS 8 | |
| 804 | Où a été effectuée la circoncision ? | ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 1 MAISON D'UN AGENT DE SANTÉ/ PROFESSIONNEL 2 CIRCONCISION FAITE À LA MAISON 3 ENDROIT RITUEL 4 AUTRE MAISON/ENDROIT 5 NE SAIT PAS 8 | |
| 805 | Je voudrais maintenant vous poser d'autres questions concernant des problèmes de santé. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on fait une injection pour une raison quelconque ? SI OUI: Combien d'injections avez-vous eu ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. | NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE 00 | → 808 |
| 806 | Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre personnel de santé ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. | NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE 00 | → 808 |
| 807 | La dernière fois que vous avez eu une injection effectuée du personnel de santé, est-ce qu'il/elle a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf qui n'avait pas été ouvert ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 808 | Fumez-vous actuellement du tabac tous les jours, certains jours ou pas du tout ? | TOUS LES JOURS 1 CERTAINS JOURS 2 PAS DU TOUT 3 | → 811 → 810 |
| 809 | Dans le passé, est-ce que vous fumiez tous les jours ? | OUI 1 NON 2 | → 812 |
| 810 | Dans le passé, est-ce que vous fumiez tous les jours, certains jours ou est-ce que vous ne fumiez pas ? | TOUS LES JOURS 1 CERTAINS JOURS 2 PAS DU TOUT 3 | → 813 |

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|--|---|
| 811 | <p>En moyenne, parmi les produits suivants, combien en fumez-vous actuellement par jour ? Dites-mois aussi si vous consommez ces produits mais pas chaque jour.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUS LES JOURS, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.</p> <p>a) Des cigarettes fabriquées commercialement ?</p> <p>b) Des cigarette roulées à la main ?</p> <p>c) Des pipes à tabac?</p> <p>d) Des cigares, cheroots ou cigarillos ?</p> <p>e) Nombre de séances de pipe à eau/narguilé ?</p> <p>f) Autre chose ? _____ (PRÉCISEZ)</p> | <p style="text-align: center;">NOMBRE PAR JOUR</p> <p>a) CIGARETTES COMMERCIALES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b) CIGARETTES ROULÉES .. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d) PIPES À TABAC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e) CIGARES, CHEROOTS OU CIGARILLOS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>f) NOMBRE DE SÉANCES DE PIPE À EAU/NARGULIÉ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>g) AUTRE CHOSE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p style="text-align: center;">→ 813</p> |
| 812 | <p>En moyenne, parmi les produits suivants, combien en fumez-vous actuellement par semaine ? Dites-moi aussi si vous consommez ces produits, mais pas chaque jour.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUTES LES SEMAINES, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.</p> <p>a) Des cigarettes fabriquées commercialement ?</p> <p>b) Des cigarette roulées à la main ?</p> <p>c) Des pipes à tabac?</p> <p>d) Des cigares, cheroots ou cigarillos ?</p> <p>e) Nombre de séances de pipe à eau/narguilé ?</p> <p>f) Autre chose ? _____ (PRÉCISEZ)</p> | <p style="text-align: center;">NOMBRE PAR SEMAINE</p> <p>a) CIGARETTES COMMERCIALES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b) CIGARETTES ROULÉES .. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>c) PIPES À TABAC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d) CIGARES, CHEROOTS OU CIGARILLOS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e) NOMBRE DE SÉANCES DE PIPE À EAU/NARGULIÉ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>f) AUTRE CHOSE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | |
| 813 | <p>Consommez-vous actuellement du tabac non-fumé chaque jour, certains jours ou pas du tout ?</p> | <p>TOUS LES JOURS 1</p> <p>CERTAINS JOURS 2</p> <p>PAS DU TOUT 3</p> | <p style="text-align: center;">→ 815</p> <p style="text-align: center;">→ 816</p> |

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|---|--|
| 814 | <p>En moyenne, combien de fois par jour utilisez-vous les produits suivants ? Dites-moi aussi si vous utilisez le produit, mais pas chaque jour.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUS LES JOURS, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.</p> <p>a) Du tabac à chiquer, dans la bouche ?</p> <p>b) Du tabac à priser, à inhaler par le nez ?</p> <p>c) Du tabac à mâcher ?</p> <p>d) Du Betel à mâcher ?</p> <p>e) Autre chose ? _____</p> <p style="text-align: center;">(PRÉCISEZ)</p> | <p style="text-align: center;">NOMBRE PAR JOUR</p> <p>a) TABAC À CHIQUER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b) TABAC À PRISER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>c) TABAC À MÂCHER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d) BETEL À MÂCHER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e) AUTRE CHOSE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p style="text-align: center;">→ 816</p> |
| 815 | <p>En moyenne, combien de fois par semaine utilisez-vous les produits suivants ? Dites-moi aussi si vous utilisez ce produit, mais pas chaque semaine.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUTES LES SEMAINES, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.</p> <p>a) Du tabac à chiquer, dans la bouche ?</p> <p>b) Du tabac à priser, à inhaler par le nez ?</p> <p>c) Du tabac à mâcher ?</p> <p>d) Du Betel à mâcher ?</p> <p>e) Autre chose ? _____</p> <p style="text-align: center;">(PRÉCISEZ)</p> | <p style="text-align: center;">NOMBRE PAR SEMAINE</p> <p>a) TABAC À CHIQUER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b) TABAC À PRISER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>c) TABAC À MÂCHER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d) BETEL À MÂCHER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e) AUTRE CHOSE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | |

SECTION 9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES POUR LE QUESTIONNAIRE HOMME

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|---|---|---------|
| 901 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé a déjà vérifié votre tension artérielle ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 902 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ? | OUI 1 NON 2 | → 906 |
| 903 | Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ? | OUI 1 NON 2 | |
| 904 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ? | OUI 1 NON 2 | |
| 905 | Est-ce que vous prenez actuellement des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ? | OUI 1 NON 2 | |
| 906 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé a déjà mesuré le niveau de sucre dans votre sang ? | OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 | |
| 907 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ? | OUI 1 NON 2 | → 911 |
| 908 | Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin un autre professionnel de santé vous a dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ? | OUI 1 NON 2 | |
| 909 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre niveau de sucre ou de diabète ? | OUI 1 NON 2 | |
| 910 | Est-ce que vous prenez des médicaments pour contrôler votre niveau élevé de sucre dans le sang ou votre diabète ? | OUI 1 NON 2 | |
| 911 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ? | OUI 1 NON 2 | → 913 |
| 912 | Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ? | OUI 1 NON 2 | |
| 913 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ? | OUI 1 NON 2 | → 915 |
| 914 | Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ? | OUI 1 NON 2 | |

SECTION 9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES POUR LE QUESTIONNAIRE HOMME

| No | QUESTIONS ET FILTRES | CODES | ALLEZ À |
|-----|--|--|---------|
| 915 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un cancer ou une | OUI 1 NON 2 | → 917 |
| 916 | Suivez-vous actuellement un traitement pour un cancer ou une tumeur ? | OUI 1 NON 2 | |
| 917 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous faisiez une dépression ? | OUI 1 NON 2 | → 919 |
| 918 | Suivez-vous actuellement un traitement pour dépression ? | OUI 1 NON 2 | |
| 919 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez de l'arthrite ? | OUI 1 NON 2 | → 921 |
| 920 | Suivez-vous actuellement un traitement pour l'arthrite ? | OUI 1 NON 2 | |
| 921 | Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une autre maladie chronique, c'est à-dire une autre maladie de longue durée ? | OUI 1 NON 2 (SPÉCIFIEZ LA MALADIE CHRONIQUE) | → 931 |
| 922 | Suivez-vous actuellement un traitement pour (MALADIE CHRONIQUE À 921) ? | OUI 1 NON 2 | |

SECTION 9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES (TENSION ARTÉRIELLE MOYENNE)

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODE | ALLEZ À | |
|-----|---|--|---|-------|
| 931 | VÉRIFIEZ Q123D ET Q817D: PRESSIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q123D ET À Q817D | PRESSIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉES À Q123D ET À Q817D | → 937 | |
| 932 | ENREGISTREZ ET CALCULEZ LA MOYENNE DE LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DE LA PRESSION DIASTOLIQUE DE Q123D ET Q817D. | | | |
| 933 | MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE Q123D | SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 934 | MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE Q817D | SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 935 | SOMME DE Q933 + Q934 | SOMME SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | SOMME DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| 936 | DIVISEZ Q935 PAR 2 | MOYENNE SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | MOYENNE DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | → 941 |
| 937 | VÉRIFIEZ Q123D PRESSION SYSTOLIQUE ET PRESSION DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉES À Q123D | LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q123D | → 940 | |
| 938 | VÉRIFIEZ Q817D: PRESSION SYSTOLIQUE ET PRESSION DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉE À Q817D | LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q817D | → 940 | |
| 939 | VÉRIFIEZ Q106F: PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q106F | LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE <u>NON</u> ENREGISTRÉES À Q106F | → 943 | |
| 940 | ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE. | SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |

SECTION 9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES (TENSION ARTÉRIELLE MOYENNE)

| NO. | QUESTIONS ET FILTRES | CODE | ALLEZ À | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|---------|---------|----------------|---|--|----------------|-------|---------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|---|-------------|----------------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 941 | <p>UTILISEZ LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR DÉTERMINER LE CODE CORRECT POUR ENREGISTRER DANS LE RAPPORT SUR LA TENSION ARTÉRIELLE ET SUR LE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE .</p> <p>ENCERCLEZ LA LIGNE OÙ VOUS TROUVEZ LA VALEUR DE LA PRESSION SYSTOLIQUE DE Q936 OU Q940.</p> <p>ENSUITE, ENCERCLEZ LA COLONNE OÙ VOUS TROUVEZ LA VALEUR DE LA PRESSION DIASTOLIQUE DE Q936 OU Q940.</p> <p>LA VALEUR QUI SE TROUVE À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE ENCERCLÉES DANS LE TABLEAU SERA UTILISÉE POUR COMPLÉTER Q942.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE</th> <th colspan="6">PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE</th> </tr> <tr> <th><84</th> <th>85-89</th> <th>90-99</th> <th>100-109</th> <th>110-119</th> <th>≥ 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤129</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>130-139</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>140-159</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>160-179</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>180-209</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>≥ 210</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE | PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE | | | | | | <84 | 85-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | ≥ 120 | ≤129 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 130-139 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 140-159 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 160-179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 180-209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ≥ 210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE | PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <84 | 85-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | ≥ 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤129 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130-139 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140-159 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160-179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180-209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥ 210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 942 | <p>ENREGISTREZ DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS LE NOMBRE QUE VOUS AVEZ ENCERCLÉ À Q941. UTILISEZ ENSUITE LES INSTRUCTIONS À DROITE DE CE NOMBRE POUR COMPLÉTER LE RAPPORT SUR LA TENSION ARTÉRIELLE ET LE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE POUR L'ENQUÊTÉ. DONNEZ À L'ENQUÊTÉ LE FORMULAIRE ET RÉPONDEZ À TOUTES SES QUESTIONS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE</th> <th>CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE <u>DANS</u> :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NORMALE</td> <td>24 MOIS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL</td> <td>12 MOIS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL</td> <td>2 MOIS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MODÉRÉMENT ÉLEVÉE</td> <td>1 MOIS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TRÈS ÉLEVÉE</td> <td>7 JOURS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE</td> <td>AUJOURD'HUI</td> </tr> </tbody> </table> | | CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE | CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE <u>DANS</u> : | 1 | NORMALE | 24 MOIS | 2 | À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL | 12 MOIS | 3 | AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL | 2 MOIS | 4 | MODÉRÉMENT ÉLEVÉE | 1 MOIS | 5 | TRÈS ÉLEVÉE | 7 JOURS | 6 | EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE | AUJOURD'HUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE | CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE <u>DANS</u> : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NORMALE | 24 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL | 12 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL | 2 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MODÉRÉMENT ÉLEVÉE | 1 MOIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TRÈS ÉLEVÉE | 7 JOURS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE | AUJOURD'HUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ## | ENREGISTREZ L'HEURE. | HEURES..... | <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MINUTES | <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVATION DE L'ENQUÊTEUR
À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATION DU CONTRÔLEUR

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR #1**

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

IDENTIFICATION (1)

| NOM DE LA LOCALITÉ _____ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|-------------|-----------|----------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|
| NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMÉRO DE GRAPPE | | | | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMÉRO DU MÉNAGE | | | | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON) 1 <input type="checkbox"/> → CONTINUEZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 <input type="checkbox"/> → UTILISEZ LE QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR #2 | | | | | | | | | | | | | | |
| VISITES L'AGENT DE TERRAIN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | VISITE FINALE | | | | | | | | | | |
| DATE | _____ | _____ | _____ | JOUR <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NOM DE L'AGENT DE TERRAIN | _____ | _____ | _____ | MOIS | | | | | | | | | | |
| | | | | ANNÉE <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td> </td></tr></table> | 2 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| PROCHAINE DATE VISITE | _____ | _____ | | NOMBRE TOTAL DE VISITES <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| HEURE | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | |
| NOTES: _____ _____ _____ _____ | | | | TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LANGUE DU QUESTIONNAIRE** | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table> | 0 | 1 | LANGUE DE L'INTERVIEW** | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2) | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td></tr></table> | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LANGUE DU QUESTIONNAIRE** | FRANÇAIS | | **CODES LANGUES : | | | 01 FRANÇAIS | 03 BARIBA | 05 DENDI | 07 YORUBA | | | | | |
| | | | 02 ADJA | 04 FON | 06 DITAMARI | 08 AUTRE | | | | | | | | |
| SUPERVISEUR | | | | ÉDITEUR | | | | | | | | | | |
| _____ | | | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | | _____ | | | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td></tr></table> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NOM | | | NUMÉRO | NOM | | | NUMÉRO | | | | | | | |

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE DES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DÉS QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 1 | ENFANT 2 | ENFANT 3 |
| 102 | VÉRIFIER TABLEAU MÉNAGE : NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 . NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 103 | SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ? | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 104 | VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2012-2017? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ← |
| 105 | POIDS EN KILOGRAMMES. | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 |
| 106 | TAILLE EN CENTIMÈTRES. | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ← | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ← | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ← |
| 107 | MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ? | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 |
| 108 | MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO L'AGENT DE TERRAIN. | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN |
| 110 | NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE . | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) |
| 111 | RETOURNEZ À Q.103 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIÈRE COLONNE DE LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, FIN. | | | |

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE DES ENFANTS DE AGE 0-5 ANS

| | | ENFANT 4 | ENFANT 5 | ENFANT 6 |
|-----|---|---|---|---|
| 102 | VÉRIFIER TABLEAU MÉNAGE : NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 . NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 103 | SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ? | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 104 | VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2012-2017? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ← |
| 105 | POIDS EN KILOGRAMMES. | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 |
| 106 | TAILLE EN CENTIMÈTRES. | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ← | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ← | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ← |
| 107 | MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ? | ALLONGÉ 1 DEBOU' 2 | ALLONGÉ 1 DEBOU' 2 | ALLONGÉ 1 DEBOU' 2 |
| 108 | MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO L'AGENT DE TERRAIN. | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN |
| 110 | NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE . | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) |
| 111 | RETOURNEZ À Q.103 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIÈRE COLONNE D'UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, FIN. | | | |

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR #2**

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

IDENTIFICATION (1)

| | | |
|--|----------------------------|--|
| DÉPARTEMENT _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| COMMUNE _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| URBAIN/RURAL _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| NUMÉRO DE GRAPPE | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| NUMÉRO DU MÉNAGE | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| MÉNAGE NON SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON) | 1 <input type="checkbox"/> | CONTINUEZ |
| | 2 <input type="checkbox"/> | UTILISEZ LE QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR #1 |

VISITES L'AGENT DE TERRAIN

| | 1 | 2 | 3 | VISITE FINALE |
|---------------------------|---|-------|-------|--|
| DATE | _____ | _____ | _____ | JOUR <input type="text"/> |
| NOM DE L'AGENT DE TERRAIN | _____ | _____ | _____ | MOIS <input type="text"/> |
| | | | | ANNÉE <input type="text"/> |
| PROCHAINE DATE VISITE | _____ | _____ | | NOMBRE TOTAL DE VISITES <input type="text"/> |
| HEURE | _____ | _____ | | |
| NOTES: | _____ _____ _____ _____ _____ | | | TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES <input type="text"/> |
| | | | | TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES <input type="text"/> |

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** LANGUE DE L'INTERVIEW** LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2)

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **FRANÇAIS**

**CODES LANGUES :

01 FRANÇAIS

03 Bariba

05 Dendi

07 Yoruba

02 Adja

04 Fon

06 Ditamari

08 Autres

SUPERVISEUR

ÉDITEUR

NOM NUMÉRO

NOM NUMÉRO

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 1 | ENFANT 2 | ENFANT 3 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 103 | SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE : DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ? | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 104 | VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2012-2017? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ← |
| 105 | POIDS EN KILOGRAMMES. | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 |
| 106 | TAILLE EN CENTIMÈTRES. | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ← | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ← | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ← |
| 107 | MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ? | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 |
| 108 | MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO D'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 1 | ENFANT 2 | ENFANT 3 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 109 | VÉRIFIEZ 103: EST-CE QUE L'ENFANT A 0-5 MOIS, C'EST-À-DIRE QU'IL EST NÉ DURANT LE MOIS DE L'ENQUÊTE OU DANS LES 5 MOIS PRÉCÉDENTS ? | 0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2 | 0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2 | 0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2 |
| 110 | No DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE . | No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) | No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) | No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) |

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 111 | DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST D'ANÉMIE AU PARENT/AUTRE ADULTE. | <p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Nous demandons que tous les enfants nés en 2012, ou plus tard, participent au test d'anémie inclus dans cette enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test.</p> <p>Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test d'anémie ?</p> | | |
| 112 | ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ. | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 |

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST DE PALUDISME

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 113 | DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST DE PALUDISME AU PARENT/AUTRE ADULTE. | <p>Dans le cadre de cette enquête, nous demandons que les enfants dans tout le pays participent à un test pour vérifier s'ils ont ou non le paludisme. Le paludisme est un problème de santé sérieux causé par un parasite transmis par la piqûre d'un moustique. Cette enquête aidera le gouvernement à développer des programmes pour prévenir le paludisme.</p> <p>Nous demandons que tous les enfants nés en 2012 ou plus tard participent au test de paludisme inclus dans cette enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Nous utiliserons le sang de la même piqûre au même doigt que pour le test d'anémie. Une goutte de sang sera testée pour le paludisme immédiatement et les résultats vous seront communiqués tout de suite. Un traitement sera proposé aux enfants présentant un paludisme simple s'ils ne sont pas déjà sur traitement. Les enfants avec paludisme grave seront référés à un établissement de santé. Quelques gouttes seront prélevées sur une ou des lames et envoyées à un laboratoire pour être testées. Les résultats du test de laboratoire ne vous seront pas divulgués. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test de paludisme?</p> | | |
| 114 | ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ. | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 |
| 115 | PRÉPAREZ L'EQUIPEMENT ET LES FOURNITURES SEULEMENT POUR LE/LES TESTS POUR LESQUELS VOUS AVEZ OBTENU LE CONSENTEMENT ET CONTINUEZ AVEC LE/LES TESTS. | | | |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 1 | ENFANT 2 | ENFANT 3 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 116 | PLACEZ LES ÉTIQUETTES CODE BARRE. | <p>COLLEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE99994 A REFUSÉ.....99995 AUTRE99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p> | <p>LEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE99994 A REFUSÉ.....99995 AUTRE99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p> | <p>LEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE99994 A REFUSÉ.....99995 AUTRE99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p> |
| 117 | INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE ANÉMIE ET PALUDISME. | G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS995 AUTRE996 | G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS995 AUTRE996 | G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS995 AUTRE996 |
| 118 | ENREGISTREZ LE CODE DU RÉSULTAT DU TDR DU PALUDISME. | TESTÉ 1 ABSENT..... 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ← | TESTÉ 1 ABSENT..... 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ← | TESTÉ 1 ABSENT..... 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ← |
| 119 | ENREGISTREZ LE RESULTAT DU TDR DU PALUDISME ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANÉMIE ET LE PALUDISME. | POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX ... 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6 | POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX .. 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6 | POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX .. 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6 |
| 120 | VÉRIFIEZ 122: NIVEAU D'HÉMOGLOBINE | EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT..... 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ← | EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT..... 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ← | EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT..... 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ← |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 1 | ENFANT 2 | ENFANT 3 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____ |
| 121 | DÉCLARATION DE REFERENCE POUR ANÉMIE SÉVÈRE. | Le test pour le diagnostic d'anémie montre que (NOM DE L'ENFANT) a une anémie sévère. Votre enfant est sérieusement malade et doit être amené à un établissement de santé immédiatement. ALLEZ À 132 | | |
| 122 | Est-ce que (NOM) souffre d'une des maladies suivantes ou présente un ou des symptômes suivants: a Faiblesse extrême? b Problèmes cardiaques? c Perte de conscience? d Respiration rapide ou difficulté de respirer? e Convulsions? f Saignements anormaux? g Jaunisse/peau jaune ? h Urine foncée? SI AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS, ENCERCLEZ CODE Y. | FAIBLESSE EXTRÊME ... A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE ... C RESPIRATION RAPIDE ... D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y | FAIBLESSE EXTRÊME .. A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE .. C RESPIRATION RAPIDE .. D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y | FAIBLESSE EXTRÊME .. A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE .. C RESPIRATION RAPIDE .. D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y |
| 123 | VÉRIFIEZ 122: Y A-T-IL UN CODE A-H ENCERCLÉ ? | UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2 | UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2 | UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2 |
| 124 | VÉRIFIEZ 117: NIVEAU D'HÉMOGLOBINE | EN-DESSOUS DE 8.0 G/DI 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ← | EN-DESSOUS DE 8.0 G/D 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ← | EN-DESSOUS DE 8.0 G/D 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ← |
| 125 | DÉCLARATION POUR REFERENCE POUR PALUDISME GRAVE. | Le test pour le diagnostic du paludisme montre que (NOM DE L'ENFANT) a du paludisme. Votre enfant a également des symptômes de paludisme grave. Le médicament que j'ai contre le paludisme n'aidera pas votre enfant, et je ne peux pas lui donner de traitement. Votre enfant est sérieusement malade et doit être amené tout de suite à un établissement de santé. ALLEZ À 131 | | |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 1 | ENFANT 2 | ENFANT 3 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 126 | Au cours des deux dernières semaines, est-ce que (NOM) a pris ou (NOM) prend-il de la CTA donné par un médecin, un centre de santé ou un agent de santé communautaire pour traiter le paludisme ? VÉRIFIEZ EN DEMANDANT DE VOIR LE TRAITEMENT. | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ← |
| 127 | DÉCLARATION DE REFERENCE POUR LES ENFANTS PRENANT DÉJÀ UN MÉDICAMENT DE LA CTA. | Vous m'avez dit que (NOM DE L'ENFANT) a déjà reçu de la CTA pour le paludisme. Je ne peux pas vous donner une CTA supplémentaire. Cependant, le test montre qu'il/elle a du paludisme. Si votre enfant a de la fièvre pendant 2 jours après la dernière dose de CTA, vous devrez amener l'enfant au centre de santé le plus proche pour des examens plus approfondis. ALLEZ À 132 | | |
| 128 | LIRE LES INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME ET LA DÉCLARATION DE CONSENTEMENT AU PARENT OU AUTRE ADULTE RESPONSABLE POUR L'ENFANT. | Le test du paludisme montre que votre enfant a du paludisme. Nous pouvons vous donner gratuitement des médicaments. Le médicament est appelé CTA. La CTA est très efficace et d'ici quelques jours, il n'aura plus de fièvre, ni d'autres symptômes. Vous n'êtes pas obligé de donner le médicament à l'enfant. C'est vous qui décidez. Dites-moi s'il vous plait, si vous acceptez, ou non, le médicament. | | |
| 129 | ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET APPOSEZ VOTRE SIGNATURE. | MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ← | MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ← | MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ← |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---|-------------------|------------|--|--|--------|--------|--------|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------|---|---|---|
| | | ENFANT 1 | ENFANT 2 | ENFANT 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | TRAITEMENT POUR LES ENFANTS DONT LE TEST DU PALUDISME EST POSITIF. | <p>INSTRUCTION POUR LE DOSAGE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">POIDS (en Kg)/ÂGE</th> <th colspan="3">TRAITEMENT</th> </tr> <tr> <th>Jour 1</th> <th>Jour 2</th> <th>Jour 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">4,5 à 8 kg (6 -11 mois)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> </tr> <tr> <td align="center">9 -17 kg (1-5 ans)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> </tr> </tbody> </table> <p>DITES AUSSI AU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR L'ENFANT: Si [NOM] a une fièvre élevée, une respiration difficile ou rapide, s'il ne peut pas boire ou téter, si son état s'aggrave ou s'il ne va pas mieux dans les deux jours, vous devrez l'amener immédiatement voir un professionnel de santé pour qu'il soit traité.</p> | | | POIDS (en Kg)/ÂGE | TRAITEMENT | | | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | 4,5 à 8 kg (6 -11 mois) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 9 -17 kg (1-5 ans) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) |
| POIDS (en Kg)/ÂGE | TRAITEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,5 à 8 kg (6 -11 mois) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 -17 kg (1-5 ans) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | ENREGISTREZ LE CODE RÉSULTAT DU TRAITEMENT POUR LE PALUDISME OU DE LA FICHE DE REFERENCE. | MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6 | MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6 | MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | RETOURNEZ À Q.103 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIERE COLONNE DE LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, ALLEZ À 201. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 4 | ENFANT 5 | ENFANT 6 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 103 | SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE : DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ? | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 104 | VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2012-2017? | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ← |
| 105 | POIDS EN KILOGRAMMES. | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 | KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 |
| 106 | TAILLE EN CENTIMÈTRES. | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ← | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ← | CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ← |
| 107 | MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ? | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 | ALLONGÉ 1 DEBOUT 2 |
| 108 | MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO D'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 4 | ENFANT 5 | ENFANT 6 |
| 102 | VÉRIFIER NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 109 | VÉRIFIEZ 103: EST-CE QUE L'ENFANT A 0-5 MOIS, C'EST-À-DIRE QU'IL EST NÉ DURANT LE MOIS DE L'ENQUÊTE OU DANS LES 5 MOIS PRÉCÉDENTS ? | 0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2 | 0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2 | 0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2 |
| 110 | No DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE . | No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) | No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) | No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ) |

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 111 | DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST D'ANÉMIE AU PARENT/AUTRE ADULTE. | <p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Nous demandons que tous les enfants nés en 2012, ou plus tard, participent au test d'anémie inclus dans cette enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test.</p> <p>Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test d'anémie ?</p> | | |
| 112 | ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ. | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 |

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST DE PALUDISME

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| 113 | DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST DE PALUDISME AU PARENT/AUTRE ADULTE. | <p>Dans le cadre de cette enquête, nous demandons que les enfants dans tout le pays participent à un test pour vérifier s'ils ont ou non le paludisme. Le paludisme est un problème de santé sérieux causé par un parasite transmis par la piqûre d'un moustique. Cette enquête aidera le gouvernement à développer des programmes pour prévenir le paludisme.</p> <p>Nous demandons que tous les enfants nés en 2012 ou plus tard participent au test de paludisme inclus dans cette enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Nous utiliserons le sang de la même piqûre au même doigt que pour le test d'anémie. Une goutte de sang sera testée pour le paludisme immédiatement et les résultats vous seront communiqués tout de suite. Un traitement sera proposé aux enfants présentant un paludisme simple s'ils ne sont pas déjà sur traitement. Les enfants avec paludisme grave seront référés à un établissement de santé. Quelques gouttes seront prélevées sur une ou des lames et envoyées à un laboratoire pour être testées. Les résultats du test de laboratoire ne vous seront pas divulgués. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test de paludisme?</p> | | |
| 114 | ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ. | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 | ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3 |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 4 | ENFANT 5 | ENFANT 6 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 115 | PRÉPAREZ L'EQUIPEMENT ET LES FOURNITURES SEULEMENT POUR LE/LES TESTS POUR LESQUELS VOUS AVEZ OBTENU LE CONSENTEMENT ET CONTINUEZ AVEC LE/LES TESTS. | | | |
| 116 | PLACEZ LES ÉTIQUETTES CODE BARRE. | <p align="center">COLLEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE 99994 A REFUSÉ 99995 AUTRE 99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p> | <p align="center">LEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE 99994 A REFUSÉ 99995 AUTRE 99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p> | <p align="center">LEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE 99994 A REFUSÉ 99995 AUTRE 99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p> |
| 117 | INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE ANÉMIE ET PALUDISME. | G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996 | G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996 | G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996 |
| 118 | ENREGISTREZ LE CODE DU RÉSULTAT DU TDR DU PALUDISME. | TESTÉ 1 ABSENT 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ← | TESTÉ 1 ABSENT 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ← | TESTÉ 1 ABSENT 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ← |
| 119 | ENREGISTREZ LE RESULTAT DU TDR DU PALUDISME ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANÉMIE ET LE PALUDISME. | POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX ... 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6 | POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX .. 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6 | POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX .. 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6 |
| 120 | VÉRIFIEZ 122: NIVEAU D'HÉMOGLOBINE | EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ← | EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ← | EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ← |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 4 | ENFANT 5 | ENFANT 6 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____ |
| 121 | DÉCLARATION DE REFERENCE POUR ANÉMIE SÉVÈRE. | Le test pour le diagnostic d'anémie montre que (NOM DE L'ENFANT) a une anémie sévère. Votre enfant est sérieusement malade et doit être amené à un établissement de santé immédiatement. ALLEZ À 132 | | |
| 122 | Est-ce que (NOM) souffre d'une des maladies suivantes ou présente un ou des symptômes suivants: a Faiblesse extrême? b Problèmes cardiaques? c Perte de conscience? d Respiration rapide ou difficulté de respirer? e Convulsions? f Saignements anormaux? g Jaunisse/peau jaune ? h Urine foncée? SI AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS, ENCERCLEZ CODE Y. | FAIBLESSE EXTRÊME ... A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE ... C RESPIRATION RAPIDE ... D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y | FAIBLESSE EXTRÊME .. A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE .. C RESPIRATION RAPIDE .. D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y | FAIBLESSE EXTRÊME .. A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE .. C RESPIRATION RAPIDE .. D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y |
| 123 | VÉRIFIEZ 122: Y A-T-IL UN CODE A-H ENCERCLÉ ? | UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2 | UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2 | UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2 |
| 124 | VÉRIFIEZ 117: NIVEAU D'HÉMOGLOBINE | EN-DESSOUS DE 8.0 G/DI 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ← | EN-DESSOUS DE 8.0 G/D 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ← | EN-DESSOUS DE 8.0 G/D 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ← |
| 125 | DÉCLARATION POUR REFERENCE POUR PALUDISME GRAVE. | Le test pour le diagnostic du paludisme montre que (NOM DE L'ENFANT) a du paludisme. Votre enfant a également des symptômes de paludisme grave. Le médicament que j'ai contre le paludisme n'aidera pas votre enfant, et je ne peux pas lui donner de traitement. Votre enfant est sérieusement malade et doit être amené tout de suite à un établissement de santé. ALLEZ À 131 | | |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | ENFANT 4 | ENFANT 5 | ENFANT 6 |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 126 | Au cours des deux dernières semaines, est-ce que (NOM) a pris ou (NOM) prend-il de la CTA donné par un médecin, un centre de santé ou un agent de santé communautaire pour traiter le paludisme ? VÉRIFIEZ EN DEMANDANT DE VOIR LE TRAITEMENT. | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ← | OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ← |
| 127 | DÉCLARATION DE REFERENCE POUR LES ENFANTS PRENANT DÉJÀ UN MÉDICAMENT DE LA CTA. | Vous m'avez dit que (NOM DE L'ENFANT) a déjà reçu de la CTA pour le paludisme. Je ne peux pas vous donner une CTA supplémentaire. Cependant, le test montre qu'il/elle a du paludisme. Si votre enfant a de la fièvre pendant 2 jours après la dernière dose de CTA, vous devrez amener l'enfant au centre de santé le plus proche pour des examens plus approfondis. ALLEZ À 132 | | |
| 128 | LIRE LES INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME ET LA DÉCLARATION DE CONSENTEMENT AU PARENT OU AUTRE ADULTE RESPONSABLE POUR L'ENFANT. | Le test du paludisme montre que votre enfant a du paludisme. Nous pouvons vous donner gratuitement des médicaments. Le médicament est appelé CTA. La CTA est très efficace et d'ici quelques jours, il n'aura plus de fièvre, ni d'autres symptômes. Vous n'êtes pas obligé de donner le médicament à l'enfant. C'est vous qui décidez. Dites-moi s'il vous plait, si vous acceptez, ou non, le médicament. | | |
| 129 | ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET APOSEZ VOTRE SIGNATURE. | MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ← | MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ← | MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ← |

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

| 101 | VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|-------------------|------------|--|--|--------|--------|--------|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------|---|---|---|
| | | ENFANT 4 | ENFANT 5 | ENFANT 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2 | NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | TRAITEMENT POUR LES ENFANTS DONT LE TEST DU PALUDISME EST POSITIF. | <p>INSTRUCTION POUR LE DOSAGE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">POIDS (en Kg)/ÂGE</th> <th colspan="3">TRAITEMENT</th> </tr> <tr> <th>Jour 1</th> <th>Jour 2</th> <th>Jour 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">4,5 à 8 kg (6 -11 mois)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> </tr> <tr> <td align="center">9 -17 kg (1-5 ans)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> </tr> </tbody> </table> <p>DITES AUSSI AU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR L'ENFANT: Si [NOM] a une fièvre élevée, une respiration difficile ou rapide, s'il ne peut pas boire ou téter, si son état s'aggrave ou s'il ne va pas mieux dans les deux jours, vous devrez l'amener immédiatement voir un professionnel de santé pour qu'il soit traité.</p> | | | POIDS (en Kg)/ÂGE | TRAITEMENT | | | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | 4,5 à 8 kg (6 -11 mois) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 9 -17 kg (1-5 ans) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) |
| POIDS (en Kg)/ÂGE | TRAITEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,5 à 8 kg (6 -11 mois) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | 1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 -17 kg (1-5 ans) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | ENREGISTREZ LE CODE RÉSULTAT DU TRAITEMENT POUR LE PALUDISME OU DE LA FICHE DE REFERENCE. | MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6 | MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6 | MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | RETOURNEZ À Q.103 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIERE COLONNE DE LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, ALLEZ À 201. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 201 | VÉRIFIER LA COLONNE 9 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM, L'ÂGE ET LE STATUT MATRIMONIAL DE TOUTES LES FEMMES ÉLIGIBLES AUX QUESTIONS 202, 203 ET 204. S'IL Y A PLUS DE 3 FEMMES, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES. | | | |
| | | FEMME 1 | FEMME 2 | FEMME 3 |
| 202 | VÉRIFIEZ LE TABLEAU MÉNAGE : NUMÉRO DE LIGNE DE LA COLONNE 9. NOM DE LA COLONNE 2. | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ | NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____ |
| 203 | VÉRIFIEZ LE TABLEAU MÉNAGE COLONNE 7 (ÂGE) : | 15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 | 15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 | 15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 |
| 204 | VÉRIFIEZ LE TABLEAU MÉNAGE COLONNE 8 (STATUT MATRIMONIAL) : | CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 | CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 | CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 |
| 205 | POIDS EN KILOGRAMMES. | KG. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 99994 REFUS 99995 AUTRE 99996 | KG. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 99994 REFUS 99995 AUTRE 99996 | KG. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 99994 REFUS 99995 AUTRE 99996 |
| 206 | TAILLE EN CENTIMÈTRES. | CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 | CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 | CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 |
| 207 | MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO L'AGENT DE TERRAIN. | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN |
| 208 | VÉRIFIEZ 203 : ÂGE | 15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 (ALLEZ À 210) ← | 15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 (ALLEZ À 210) ← | 15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 (ALLEZ À 210) ← |
| 209 | VÉRIFIEZ 204 : STATUT MATRIMONIAL | CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 (ALLEZ À 212) ← | CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 (ALLEZ À 212) ← | CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 (ALLEZ À 212) ← |

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

| | | FEMME 1 | FEMME 2 | FEMME 3 |
|---|----------------------|---|--|--|
| | NOM DE LA COLONNE 2. | NOM _____ | NOM _____ | NOM _____ |
| CONSENTEMENT DE L'ENQUÊTEE ADULTE POUR LE TEST D'ANÉMIE | | | | |
| C O N S E N T E M E N T A D U L T E | 210 | <p>DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST D'ANÉMIE.</p> <p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie.</p> <p>Pour le test d'anémie, nous avons besoins de quelques gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Voulez-vous participer au test d'anémie ?</p> | | |
| | 211 | <p>ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.</p> <p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉE REFUSE 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> | <p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉE REFUSE 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> | <p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉE REFUSE 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> |
| | 211A | <p>VÉRIFIEZ 226 DANS QUESTIONNAIRE FEMME OU DEMANDEZ : Êtes-vous enceinte ?</p> <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p> | <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p> | <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p> |

| CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE | | | | |
|--|-----|--|---|---|
| P A R E N T A D U L T E R E S P . | 212 | <p>DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE.</p> <p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie.</p> <p>Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué à vous et à (NOM DU MINEUR} tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision.</p> | | |
| | 213 | <p>ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.</p> <p>ACCORDÉ 1 } PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> | <p>ACCORDÉ 1 } PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> | <p>ACCORDÉ 1 } PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> |

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

| | | FEMME 1 | FEMME 2 | FEMME 3 |
|---|----------------------|---|--|--|
| | NOM DE LA COLONNE 2. | NOM _____ | NOM _____ | NOM _____ |
| C O N S E N T E M E N T D E M I N E U R E | 214 | <p>DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DE L'ENQUÊTÉE MINEURE POUR LE TEST D'ANÉMIE.</p> <p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie.</p> <p>Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué à vous et à (NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE) tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision.</p> | | |
| | 215 | <p>ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.</p> <p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉ MINEUR A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> | <p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉ MINEUR A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> | <p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉ MINEUR A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p> |
| | 215A | <p>VÉRIFIEZ 226 DANS QUESTIONNAIRE FEMME OU DEMANDEZ : #N/A</p> <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p> | <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p> | <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p> |
| | 216 | <p>INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE ANÉMIE .</p> <p>G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/></p> <p>ABSENTE 994 REFUS 995 AUTRE 996</p> | <p>G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/></p> <p>ABSENTE 994 REFUS 995 AUTRE 996</p> | <p>G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/></p> <p>ABSENTE 994 REFUS 995 AUTRE 996</p> |
| | 217 | <p>RETOURNEZ À 202 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIÈRE COLONNE D'UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE; SI PLUS DE FEMMES, FIN ENQUÊTE.</p> | | |

AUTRES OUTILS DU PROGRAMME DHS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le Website du DHS Program – Télécharger gratuitement les rapports DHS, la documentation standard, les données sur les indicateurs clé ainsi que les outils de formation et les annonces. | DHSprogram.com |  | |
| STATcompiler – Créer des tableaux, des graphiques et des cartes personnalisés, en utilisant les données de 90 pays et des milliers d'indicateurs. | Statcompiler.com |  | |
| Programme DHS pour les appareils mobiles – Accéder aux indicateurs clés DHS pour 90 pays sur votre appareil mobile (Apple, Android, ou Windows). | Recherchez DHS Program dans iTunes ou Google Play Store |  | |
| Programme DHS pour utiliser les forum – Poster des questions sur les données DHS et rechercher les FAQ. | userforum.DHSprogram.com |  | |
| Vidéos d'animation – Regarder les interviews avec des experts et apprendre les bases de DHS, comme l'échantillonnage et la pondération, télécharger des ensembles de données et apprendre comment lire les tableaux DHS. | www.youtube.com/DHSProgram |  | |
| Ensemble de données – Télécharger des ensembles de données pour l'analyse. | DHSprogram.com/Data |  | |
| Spatial Data Repository – Télécharger des données démographiques et de santé localisées géographiquement pour les représenter sous forme de carte dans un système d'information géographique (SIG). | spatialdata.DHSprogram.com |  | |
| Media sociaux – Suivre le DHS Program et participer aux discussions. Rester en contact par l'intermédiaire de : | | | |
|  Facebook www.facebook.com/DHSprogram |  |  LinkedIn www.linkedin.com/company/dhs-program |  |
|  YouTube www.youtube.com/DHSprogram |  |  Blog Blog.DHSprogram.com |  |
|  Twitter www.twitter.com/DHSprogram |  | | |