



Enquête Continue 2017

VIH


Sénégal



Au cours de l'ECPSS 2017, 396 structures de santé ont été étudiées. Les résultats sont représentatifs pour les structures publiques et privées et pour les 14 régions.

Disponibilité des services de conseils et de dépistage du VIH par région

Parmi toutes les structures (N=396), pourcentage avec un système de dépistage du VIH



L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en collaboration avec le Ministère de la Santé et l'Action Sociale (MSAS), est chargée de la mise en œuvre de l'Enquête Continue :

• **Le volet ménage** : appelé Enquête Démographique et de Santé (EDS-Continue), qui collecte des données auprès des membres des ménages, des femmes, des hommes et des enfants.

• **Le volet structures de santé** : appelé Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS), qui collecte des données auprès des structures de santé, des prestataires de soins de santé et des clients des structures de santé.

Pour tous renseignements concernant les deux volets de l'Enquête Continue 2017, contacter :

Au Sénégal :

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Rocade Fann Bel-air Cerf-volant- B.P. 116 ; Dakar RP (Sénégal), Téléphone : (221) 33 869 21 39/33 869 21 60 ; Fax : (221) 33 824 36 15, E-mail : statsenegal@ansd.sn/ statsenegal@yahoo.fr ; Site web : www.ansd.sn

Aux États-Unis :


The DHS Program
530 Gaither Road, Suite 500
Rockville, MD 20850 USA ; Téléphone: +1-301-407-6500 ; Fax: +1-301-407-6501 ; E-mail : info@DHSprogram.com
www.DHSprogram.com ; STATcompiler.com

L'Enquête Continue 2017 a été exécutée d'avril à décembre 2017 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS) et la Cellule de Lutte contre la Malnutrition. L'Enquête Continue 2017 a été réalisée avec l'appui financier du Gouvernement du Sénégal, de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), de l'UNICEF (United Nations Children Fund), de l'UNFPA (United Nations Population Fund) de Nutrition International, et de la Banque Mondiale. Elle a bénéficié de l'assistance technique de The Demographic and Health Surveys (DHS) Program de ICF dont l'objectif est de collecter, d'analyser et de diffuser des données démographiques et de santé. Le Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop et le Laboratoire de Bactériologie et de Virologie de l'Hôpital Universitaire Aristide Le Dantec ont apporté leur expertise à la réalisation de cette opération.

Intégration du dépistage du VIH dans les structures

Parmi toutes les structures (N=396), pourcentage avec test de diagnostic rapide (TDR) du VIH intégré dans les services spécifiques :

- Service offert
- TDR du VIH disponible dans le service




Indicateurs du VIH dans l'Enquête Continue 2017

Au cours de l'EDS-Continue 2017, plus de 8 300 ménages ont été enquêtés sur la connaissance et les comportements vis-à-vis le VIH. De plus, environ 7 600 femmes de 15-49 ans et 6 700 hommes de 15-59 ans ont été testés pour le VIH. Les résultats sont représentatifs pour l'ensemble du pays, pour le milieu urbain et rural et pour les 14 régions.


Connaissance des moyens de prévention du VIH/PTME

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que l'on peut réduire les risques de contracter le VIH en :




Connaissance de transmission du VIH de la mère à l'enfant (TME)

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que :



Connaissance complète sur le VIH parmi les jeunes selon le milieu de résidence


Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans ayant une connaissance complète* sur le VIH



*La connaissance complète : les enquêtés qui savent que l'utilisation régulière du condom au cours de rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire non infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH, ceux qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du VIH.


Test de dépistage du VIH antérieur à l'enquête

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans




Prévalence du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans séropositifs



Prévalence du VIH selon la région

Pourcentage de l'ensemble des femmes et des hommes de 15-49 ans séropositifs



Taux de réponse et méthodologie : Les données sur la prévalence du VIH ont été obtenues à partir d'un échantillon de gouttes de sang séché, prélevées volontairement par piqûre au bout du doigt auprès des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans. Environ 90 % de femmes et 83 % d'hommes ont été testés. Dans l'ensemble, 87 % des 15 828 enquêtés de 15-49 ans ont été testés.