



Share

Français English

ابحث

المواضيع الطبية المغطيت والإصابات مركز وسائل الإعلام موارد المعلومات البلدان البرامج معلومات عن المنظمة

فيروس كورونا | كيف تحمي نفسك والآخرين من المرض | تصحيح المفاهيم المغلوطة | لقاح كوفيد-19

المفاهيم المغلوطة عن لقاح كوفيد-19

فيروس كورونا

الاحتفال بعيد الفطر 2021 بأمان  
في ظل كوفيد-19  
عن مرض كوفيد-19  
الوسائط المتعددة  
موارد المعلومات  
خدمات الصحة النفسية والدعم  
النفسى

**حقيقة**

اللقاحات فعالة، لكنها تعمل فقط مع التدابير الوقائية الأخرى. ولن تقلل اللقاحات من انتشار كوفيد-19 حتى يتم تطعيم معظم الأشخاص.

#كوفيد\_19  
#اللقاحات\_تعمل

منظمة  
الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

**ادعاء**

يرتفع عدد حالات كوفيد-19 مع بدء نشر اللقاحات.

تحميل

**حقيقة**

لا تحتوي لقاحات كوفيد-19 على أي فيروس حي ولا تسبب اللقاحات أي عدوى حتى لو أدت إلى آثار جانبية قصيرة الأمد مثل الحمى أو التعب. ولذلك لا يلزم العزل أو الحجر الصحي.

#كوفيد\_19  
#اللقاحات\_تعمل

منظمة  
الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

**ادعاء**

يجب على الشخص الذي يتلقى لقاح كوفيد-19 الحجر الصحي لمدة 2-14 يوماً لأن بإمكانه نقل العدوى.

تحميل

**حقيقة**

لن يسبب لقاح كوفيد-19 ضرر لشخص مصاب بالعدوى بدون ظهور أعراض. ولا يعد إجراء فحص الـ سي آر تي ضرورياً قبل التطعيم.

#كوفيد\_19  
#اللقاحات\_تعمل

منظمة  
الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

**ادعاء**

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على لقاح كوفيد-19 أن يُجري فحص الـ سي آر تي للتأكد من عدم إصابته بكوفيد-19.

تحميل

**حقيقة**

لا يحتاج الشخص المصاب بكوفيد-19 إلى التطعيم على الفور. كما لا ينبغي تطعيم الحالات الحرجة والمؤكدة من خلال فحص الـ سي آر تي إلا بعد تعافياها واستيفاء معايير الحجر الصحي.

#كوفيد\_19  
#اللقاحات\_تعمل

منظمة  
الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

**ادعاء**

يجب على الأشخاص المصابين بكوفيد-19 أخذ اللقاح.

تحميل

Share

### حقيقة

الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعات اللقاح تعتمد على نوع اللقاح. سنتلقي النصح من السلطات الوطنية حول توقيت الجرعة الثانية عندما تتلقى جرعتك الأولى.

#كوفيد\_19  
#اللقاحات\_تعمل

منظمة الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

### ادعاء

يجب أن تكون الفترة الزمنية بين جرعتين من لقاح كوفيد-19 ثلاثة أشهر، وليس شهراً واحداً.

تحميل

### حقيقة

ينبغي أن تكون هناك فترة زمنية لا تقل عن 14 يوماً بين إعطاء لقاح كوفيد-19 وأي لقاح آخر ضد الأمراض الأخرى.

#كوفيد\_19  
#اللقاحات\_تعمل

منظمة الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

### ادعاء

يمكنني أخذ لقاح كوفيد-19 إذا كنت قد تلقيت للتو لقاحاً آخر ضد مرض آخر.

تحميل

مكاتب منظمة الصحة العالمية  
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لأفريقيا  
المكتب الإقليمي للأمريكتين  
المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا  
المكتب الإقليمي لأوروبا  
المكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ

مساعدة وخدمات  
التوظيف  
حقوق الطبع  
الخصوصية  
إتصل بنا  
للعاملين بالمكتب  
تسجيل الدخول

خريطة الموقع  
الصفحة الرئيسية  
المواضيع الطبية  
المعطيات والإحصائيات  
مركز وسائل الإعلام  
مصادر المعلومات  
البلدان  
البرامج  
معلومات عن المنظمة

© منظمة الصحة العالمية 2021. جميع الحقوق محفوظة