Typ-1-Diabetes und Covid-19 – Therapieanpassung in einer Extremsituation Hilfestellung zur Diabetestherapie in häuslicher Quarantäne während einer Pandemie

Hiermit möchten wir Euch wichtige Tipps und Hinweise mit auf den Weg geben, um mit Typ1-Diabetes bestmöglich durch eine häusliche Quarantäne während einer Pandemie zu
kommen. Weiterhin möchten wir euch Informationen zur eigenverantwortlichen
Therapieanpassung im Falle einer Erkrankung an Covid-19 bereitstellen.

Dokumentiert Eure Diabetestherapie inkl. aller Details, am besten bereits zu Beginn der Quarantäne. Anbei ein Vorschlag:

Insulintherapie:																									
	Intensivierte Insulintherapie (ICT)																								
Mał	ılzei	teni	nsul	lin (Nan	ne):																			
Basa	alins	sulir	ı (N	ame):																				
Insulin						Morgens					Mittags					Abends					Nachts				
Mahlzeiteninsulin					IE/BE					IE/BE					IE/BE					IE/BE					
Korrekturfaktor																_									
Basalinsulin						IE				IE					IE					IE					
Summe BE (ca.)																									
☐ Insulinpumpentherapie (CSII) Pumpentyp: Infusionsset (Name und Nadellänge): Insulin (Name): Basalrate/Summe gesamt: IE/ 24														- h											
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
01	02		04			07	08	09	10					15	16					21	22	23	24		
																		ı							
Bolusinsulin						orge	ens			Mittags					Abends				N	Nachts					
Mahlzeiteninsulin					IE/BE					IE/BE					IE/BE				,	IE/BE					
Korrekturinsulin																									
Summe BE																									
											Modell:ard Gehr; CGM- und Insulinp										 el				
The same		3. A	ufla	ige 2	2019	, 56	0 Se	eiter	1 24	,90 €	€, IS	BN	978	-3-	8740	9-6	41-6	©							