

Tuberculosis (TB) - Español

CDC > Tuberculosis > Tratamiento

🏠 Tuberculosis

Datos básicos sobre la tuberculosis +

Historias personales sobre la tuberculosis

Tratamiento -

Cuándo tratar la infección de tuberculosis latente

Esquemas posológicos para el tratamiento de la infección de tuberculosis latente

Tratamiento para la enfermedad de tuberculosis

Eventos adversos

Tratamiento para niños contra la tuberculosis

Esquemas de tratamiento de tuberculosis

[English \(US\)](#)

Hay varios esquemas de tratamiento recomendados para la enfermedad de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis puede durar 4, 6 o 9 meses según el esquema. Los esquemas de tratamiento de tuberculosis incluyen:

- **Esquema de tratamiento para la tuberculosis con rifampina y moxifloxacina**
 - [Esquema de 4 meses con rifampina y moxifloxacina para el tratamiento de la tuberculosis \(TB\) pulmonar: medicamentos, guía provisional de los CDC, Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad](#)
 - [Preguntas frecuentes sobre el esquema de tratamiento de tuberculosis de 4 meses con rifampina y moxifloxacina](#)
- **Esquema de tratamiento para la tuberculosis sensible a los fármacos**
 - [Tratamiento de la tuberculosis sensible a los fármacos: Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad, Infect Dis, 2016](#)
 - [Tabla 3. Dosis de medicamentos contra la tuberculosis en adultos y niños](#) [↗](#)



to para la enfermedad de

en los Estados Unidos para
tuberculosis puede llevar

atamiento para la

de 4 meses con

[ifloxacina para el](#)
[ar sensible a los](#)

[Estados Unidos, 2022.](#)

[d \(MMWR\), 2022.](#)

[a de tratamiento para la](#)

[a y moxifloxacina](#)

de 6 a 9 meses con RIPE

[s medicamentos](#) . *Clin*

[a la tuberculosis para](#)

En esta página

Esquemas de tratamiento para la
enfermedad de tuberculosis
sensible a los medicamentos

Consideraciones del esquema de
tratamiento para grupos
específicos de personas con la
enfermedad de tuberculosis

Consideraciones de evaluación y
pruebas para los esquemas de
tratamiento de la tuberculosis
pulmonar sensible a los
medicamentos