

# Vademécum

de la Dirección de Respuesta al VIH,  
ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis.

# Índice

Antirretrovirales de uso general .....	3
Antirretrovirales de uso en pacientes con múltiples fracasos terapéuticos....	5
No antirretrovirales de uso general .....	6
No antirretrovirales de uso nominal .....	8
Medicación para tratamiento de tuberculosis p.línea .....	9
Medicación para tratamiento de tuberculosis s .línea .....	10
Asistencia nutricional .....	11
Medicamentos para el tratamiento de lepra .....	12

# ANTIRRETROVIRALES DE USO GENERAL

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN (Las presentaciones eventualmente pueden diferir de las indicadas.)
ABACAVIR 20 mg/ml jbe.	Frasco 240 ml.
ABACAVIR/LAMIVUDINA 600/300 mg comp.	Envase 30 comprimidos.
ABACAVIR 120 mg/LAMIVUDINA 60 mg comp. dispersables	Envase 30 comprimidos dispersables.
DARUNAVIR/RITONAVIR 800/100 mg comp.	Envase 30 comprimidos.
DOLUTEGRAVIR 50 mg comp.	Envase 30 comprimidos.
EFAVIRENZ 600 mg comp.	Envase 30 comprimidos.
LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA 150/300 mg comp.	Envase 60 comprimidos.
LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA/NEVIRAPINA 150/300/200 mg comp.	Envase 60 comprimidos.
LAMIVUDINA 150 mg comp.	Envase 60 comprimidos.
LAMIVUDINA 300 mg comp.	Envase 30 comprimidos.
LAMIVUDINA + DOLUTEGRAVIR 300/50 mg comprimidos	Envase 30 comp. de Lamivudina y 30 comp. de Dolutegravir.
LAMIVUDINA 10 mg/ml jbe.	Frasco 240 ml.

<b>LOPINAVIR/ RITONAVIR 80/20 mg/ 5ml jarabe</b>	Frasco 160 ml.
<b>LOPINAVIR/ RITONAVIR 100/25 mg comprimidos.</b>	Envase 60 comprimidos.
<b>NEVIRAPINA 200 mg comp.</b>	Envase 60 comprimidos.
<b>NEVIRAPINA 50 mg comp. dispersables.</b>	Envase 30 comprimidos dispersables.
<b>TENOFOVIR/EMTRICITABINA 300/200 mg comp.</b>	Envase 30 comprimidos.
<b>TENOFOVIR/EMTRICITABINA/ EFAVIRENZ 300/200/600 mg comp.</b>	Envase 30 comprimidos.
<b>TENOFOVIR/LAMIVUDINA 300/300 mg comp.</b>	Envase 30 comprimidos.
<b>TENOFOVIR/ALAFENAMIDA/ EMTRICITABINA 25/200 mg comp.</b>	Envase 30 comprimidos.
<b>TENOFOVIR/LAMIVUDINA/ DOLUTEGRAVIR 300/300/50 mg comp.</b>	Envase 30 comprimidos.
<b>ZIDOVUDINA 10 mg/ml jbe.</b>	Frasco 240 ml.
<b>ZIDOVUDINA 200 mg FA.</b>	Ampolla contenido 20ml.

# ANTIRRETROVIRALES DE USO EN PACIENTES CON MÚLTIPLES FRACASOS TERAPÉUTICOS

<b>MEDICAMENTO</b>	<b>PRESENTACIÓN</b> (Las presentaciones eventualmente pueden diferir de las indicadas.)
<b>DARUNAVIR/RITONAVIR 600/100 mg comp.</b>	Envase 60 comprimidos.
<b>ETRAVIRINA 200 mg comp.</b>	Envase 60 comprimidos.
<b>MARAVIROC 150 mg comp.</b>	Envase 60 comprimidos.
<b>MARAVIROC 300 mg comp.</b>	Envase 60 comprimidos.
<b>RALTEGRAVIR 100 mg granulado.</b>	Envase 60 sobres.
<b>RALTEGRAVIR 100 mg comp. masticable</b>	Envase 60 comprimidos.
<b>RALTEGRAVIR 400 mg comp.</b>	Envase 60 comprimidos.

## NO ANTIRRETROVIRALES DE USO GENERAL

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN (Las presentaciones eventualmente pueden diferir de las indicadas.)
ACICLOVIR 500 mg FA.	Envase secundario conteniendo de 1 a 25 frasco amp .
ACICLOVIR 800 mg comp.	Envase secundario conteniendo de 10 a 40 comp.
ANFOTERICINA B 50 mg FA.	1 ampolla.
AZITROMICINA 250 mg comp.	Envase secundario conteniendo 3 a 150 comp.
AZITROMICINA 500 mg comp.	Envase secundario conteniendo 3 a 150 comp .
CEFTRIAXONA 1 gr. FA.	Envase secundario conteniendo 50 frasco amp.
CLINDAMICINA 300 mg comp.	Envase secundario conteniendo 16 a 100 caps.
CLINDAMICINA 600 mg amp.	Envase secundario conteniendo 100 amp.
DAPSONA 100 mg comp.	Envase secundario conteniendo 20 a 100 comp.
DOXICICLINA 100 mg comp.	Envase secundario conteniendo 10 a 20 comp.
FLUCONAZOL 100 mg comp.	Envase secundario conteniendo 7 a 100 comp.
FLUCONAZOL 200 mg FA.	Envase secundario conteniendo 1 a 48 amp .
FLUCONAZOL 200 mg comp.	Envase secundario conteniendo 7 a 100 comp.
FOSCARNET 12 mg/ml FA.	1 ampolla.

<b>GANCICLOVIR 500 mg FA.</b>	Envase secundario conteniendo 25 amp.
<b>ITRACONAZOL 100 mg comp.</b>	Envase secundario conteniendo 14 a 30 comp.
<b>LEUCOVORINA 15 mg comp.</b>	Envase secundario conteniendo 20 comp.
<b>METRODINAZOL 500 mg comp.</b>	Envase secundario conteniendo 3 a 150 comp.
<b>NISTATINA 100.000UI/ml suspensión</b>	Frasco por 60 a 120 ml.
<b>PENICILINA BENZATINICA 2.4 millones UI FA.</b>	Envase secundario conteniendo entre 10 a 50 amp.
<b>PENTAMIDINA 300 mg FA.</b>	1 ampolla.
<b>PIRIMETAMINA 25 mg comp.</b>	Envase secundario conteniendo 10 a 20 comp.
<b>SULFADIAZINA 500 mg comp.</b>	Envase secundario conteniendo 40 a 100 comp.
<b>SULFAMETOXAZOL 200 mg / 5 ml + TRIMETOPRIMA 40 mg / 5 ml jarabe (TMS jarabe)</b>	Frasco por 60 o 100 ml.
<b>SULFAMETOXAZOL 400 mg / 5 ml + TRIMETOPRIMA 80 mg / 5 ml ampollas (TMS ampollas).</b>	Envase secundario conteniendo entre 5 a 25 amp.
<b>SULFAMETOXAZOL 800 mg + TRIMETOPRIMA 160 mg comprimidos (TMS Forte 160/800 mg comp)</b>	Envase secundario conteniendo 10 a 500 comp.

## NO ANTIRRETROVIRALES DE USO NOMINAL

<b>MEDICAMENTO</b>	<b>PRESENTACIÓN</b> (Las presentaciones eventualmente pueden diferir de las indicadas.)
ANFOTERICINA B LIPOSOMAL 50 mg FA.	1 ampolla.
RIFABUTINA 150 mg comp.	Envase por 30 comp.
VALGANCICLOVIR 450 mg comp.	Envase por 60 comp.



# MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS. PRIMERA LÍNEA.

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN (Las presentaciones eventualmente pueden diferir de las indicadas.)
<b>ESTREPTOMICINA 1 gr. FA.</b>	Envase secundario conteniendo entre 1 a 50 ampollas.
<b>ETAMBUTOL 100 mg comp.</b>	Envase por 100 comp.
<b>ETAMBUTOL 400 mg comp.</b>	Envase por 672 comp.
<b>ISONIACIDA/RIFAMPICINA/ PIRAZINAMIDA/ETAMBUTOL 75/150/400/275 mg comp.</b> (cuádruple asociación)	Envase por 672 comp..
<b>ISONIACIDA/RIFAMPICINA/ PIRAZINAMIDA 75/150/400 mg comp.</b> (triple asociación)	Envase por 84 comp.
<b>ISONIACIDA/RIFAMPICINA 150/300 mg comp. (doble asociación)</b>	Envase por 84 comp.
<b>ISONIACIDA/RIFAMPICINA/ PIRAZINAMIDA 50/75/150 mg comp.</b> dispersables (triple asociación pediátrica)	Envase por 84 comp dispersables.
<b>ISONIACIDA/RIFAMPICINA 50/75 mg comp. dispersables</b> (doble asociación pediátrica)	Envase por 84 comp dispersables.
<b>ISONIACIDA 300 mg comp.</b>	Envase por 100 comp.
<b>ISONIACIDA 100 mg comp.</b>	Envase por 100 comp.
<b>PIRAZINAMIDA 400 mg comp.</b>	Envase por 102 comp.
<b>RIFAMPICINA 300 mg cápsulas</b>	Envase por 320 comp.
<b>RIFAMPICINA 5/100 mg/ml jbe.</b>	Frasco conteniendo entre 50 y 100ml .
<b>VITAMINA B6 50 mg comp.</b>	Envase por 50 comp.

# MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS. SEGUNDA LÍNEA.

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN (Las presentaciones eventualmente pueden diferir de las indicadas.)
<b>AMIKACINA 500 mg.</b> FA.	Envase secundario conteniendo entre 1 y 100 ampollas.
<b>BEDAQUILINA 100 mg</b> comp.	Envase por 188 comp.
<b>CICLOSERINA 250 mg</b> comp.	Envase secundario conteniendo de 100 comp a 150 comp.
<b>CLOFAZIMINA 100 mg</b> comp.	Envase por 100 comp.
<b>ERTAPENEM 1 gr.</b> FA.	1 ampolla.
<b>ETIONAMIDA 125 mg</b> cápsulas	Envase por 100 caps.
<b>ETIONAMIDA 250 mg</b> comp.	Envase por 100 caps.
<b>LEVOFLOXACINA 100 mg</b> comp. dispersables	Envase por 100 caps.
<b>LEVOFLOXACINA 500 mg</b> comp.	Envase por 100 caps.
<b>LINEZOLID 600 mg</b> comp.	Envase por 100 caps.
<b>MOXIFLOXACINA 400 mg</b> comp.	Envase por 100 caps.

## ASISTENCIA NUTRICIONAL.

<b>MEDICAMENTO</b>	<b>PRESENTACIÓN</b> (Las presentaciones eventualmente pueden diferir de las indicadas.)
<b>LECHE DE INICIO</b> (0 a 6 meses)	Envases conteniendo 900 a 1.000 gramos de producto.

## MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LEPROSA.

<b>MEDICAMENTO</b>	<b>PRESENTACIÓN</b> (Las presentaciones eventualmente pueden diferir de las indicadas.)
<b>KIT LEPROSA PLAUBACILAR</b>	Envase por 180 comp.
<b>KIT LEPROSA MULTIBACILAR</b> pediátrico	Envase por 276 comp.
<b>KIT LEPROSA MULTIBACILAR</b>	Envase por 360 comp.
<b>TALIDOMIDA 100 mg</b> comp.	Envase secundario conteniendo 10 a 100 comprimidos .
<b>MINOCILINA 50 mg</b> comp.	Envase secundario conteniendo 10 a 30 comprimidos.

